



Kurse für die Vorbereitung der Kenntnisprüfung

Kardiologie





Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) +++

- Atherosklerose der peripheren Arterien, die zu einer arteriellen Minderperfusion führt.
- Prävalenz : Allgemeinbevölkerung: 5–10%. Personen >70 Jahre: 15–20%

Ätiologie

Ätiologie der chronischen pAVK

RF → Rauchen
DM
a-Hypertonie
Hyperlipidämie

- Atherosklerose (95%) : die Hauptrisikofaktoren sind Nikotinabusus, Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie, Dyslipidämie (Insb. LDL-Erhöhung oder HDL-Erniedrigung)
- Weitere Ursachen (Differentialdiagnosen?) : Vaskulitis (z.B. Thrombangiitis obliterans).
Fibromuskuläre Dysplasie
Großgefäßvaskulitis, Takayasu

Ätiologie der akuten arteriellen Verschlüsse

- Arterielle Embolien (z.B. aus Popliteaaneurysma oder kardialen Thromben bei Vorhofflimmern)
- Lokale Thrombosen (durch Plaqueruptur)

Klassifikation

Befall der unteren Extremität (90%) (atteinte)

- Beckentyp (35%): Stenosen im Bereich von Aorta abdominalis und Aa. iliacae.
Leriche-Syndrom (1%) ist Verschluss auf Höhe der Aortenbifurkation
- Oberschenkeltyp (50%): Stenosen im Bereich von A. femoralis und A. poplitea
- Unterschenkeltyp (15%): Stenosen distal der A. poplitea
- Mehretagentyp

„Abhängig von Risikofaktoren zeigt die pAVK ein unterschiedliches Befallsmuster: Bei Rauchern manifestiert sie sich eher im Becken, bei Diabetikern an Unterschenkel und Akren. Aber Vorsicht, Verwechslungsgefahr: Die Thrombangiitis obliterans, die vorwiegend junge Raucher betrifft, führt ebenso wie der Diabetes eher zu einem Befall der distalen und akralen Gefäße!“

Befall der oberen Extremität (10%)

- Schultertyp (30%): Stenosen im Bereich von A. subclavia und A. axillaris
- Digitaler Typ (70%): Stenosen im Bereich der Aa. digitales

Symptome/Klinik

Die chronische pAVK verläuft in frühen Erkrankungsstadien häufig asymptomatisch. Ausmaß und Höhe der Symptomatik sind abhängig von Stenosegrad, Kollateralkreisläufen sowie der

3 Lokalisation der Stenose.


Initiale Symptome : Claudicatio intermittens (Schaufensterkrankheit)

- Belastungsabhängige, krampfartige Schmerzen.
- Besserung durch Pausen.
- Häufig verbunden mit Schwäche- und Kältegefühl.
- Lokalisation distal der vorliegenden Stenose : Beckentyp (Gesäß, Oberschenkel), Leriche-Syndrom (Gesäß, Oberschenkel, Impotenz), Oberschenkeltyp (Unterschenkel), Unterschenkeltyp (Fuß)

Symptome bei kritischer Extremitätenischämie

- Ischämischer Ruheschmerz : Besserung durch Tieflagerung
- Trophische Störungen : Gangrän, Ulkus (Ulcus cruris arteriosum), Nekrosen. Sehr schmerzhaft. Häufig an der Außenseite des Unterschenkels (am Außenknöchel) und an den Zehen.
- Blasse, kühle Haut

Akren =
Dist.
Vaskulitis (jung)



Die fibromuskuläre Dysplasie ist eine Erkrankung der Arterien (vor allem der A. carotis interna und der A. renalis) und ist gekennzeichnet durch eine Proliferation des Binde- und Muskelgewebes in der Gefäßwand. Dabei kann es aufgrund von Stenosen zu ischämischen Ereignissen in den nachgeschalteten Organen (bzw. im Fall der Niere zu einer sekundären Hypertonie) kommen.


Diagnostik

- Digitale Subtraktionsangiografie (DSA) zeigt segmentale Hyperplasien (Tunica media) und perlschnurartige Stenosen
- Histologischer Nachweis in einem Biopsat

Therapie

- Nierenarterie: Meist erfolgreiche Ballondilatation
- Hirnarterie: Thrombozytenaggregationshemmer, Blutdruckeinstellung, ggf. Dilatation ± Stent oder Gefäßersatz

Leriche-Syndrom



Leriche-Syndrom

ist ein kompletter Verschluss der Aorta distal des Abganges der Nierenarterien, meist vor der Bifurkation in die Beckenarterien.

+ Impotenz



Stadien nach Fontaine

| | |
|--------------------|---|
| Stadium I | asymptomatisch |
| Stadium II | Belastungsschmerz. IIa: Schmerzfreie Gehstrecke >200 m IIb: Schmerzfreie Gehstrecke <200 m |
| Stadium III | Ischämischer Ruheschmerz |
| Stadium IV | Trophische Störungen: Nekrosen/Gangrän/Ulkus (Ulcus cruris arteriosum) |

Die Einteilung der pAVK nach Rutherford (von Stadium 0 bis Stadium 6) ist nicht in Praxis benutzt.

Diagnostik

Anamnese

Erfragen von Schmerzcharakter (OPQRST) sowie Risikofaktoren

körperliche Untersuchung

- **Inspektion:** Hautfarbe (blass, ggf. zyanotisch), **Schweißbildung**, **trophische Störungen?**
- **Auskultation** der Extremitäten im Seitenvergleich: **Systolisches Stenosegeräusch** über betroffenem Gefäß
- **Palpation** der Extremitäten im Seitenvergleich. **Temperatur**, **Sensibilität**, **Pulsstatus** (A. femoralis, A. poplitea, A. dorsalis pedis, A. tibialis posterior, A. brachialis, A. radialis, A. carotis communis)
- **Ratschow-Lagerungsprobe**: Der Patient wird auf dem Rücken gelagert, hebt die Beine im 90°-Winkel an, führt Bewegungen im Sprunggelenk durch und hält diese Position über 2 Minuten (oder bis zum Einsetzen von Schmerzen). Anschließend wird der Patient mit herabhängenden Beinen hingesetzt und die Färbung und Venenfüllung der Füße beurteilt.

Normal: Leichte **Rötung** innerhalb von ca. 5 Sekunden, **Venenfüllung** innerhalb von ca. 20 Sekunden; bei Vorliegen einer pAVK dauert dies deutlich länger. In der Phase nach dem Herabhängen der Extremität ist eine **reaktive Hyperämie** physiologisch, d.h. eine reaktiv stärkere Durchblutung. Auch diese tritt bei der pAVK erst verzögert ein oder ist gar nicht feststellbar. **Kontraindiziert bei pAVK Stadium III und IV**

- **Obere Extremität: Faustschlussprobe, Allen--Test**

„- Die Befunde aus Anamnese, Inspektion, Auskultation und Palpation sollten immer zusammen beurteilt werden. Ein alleiniges Tasten der Pulse ist unzureichend und fehlerbehaftet!“

⚠ Bei der durch eine Mikroangiopathie ausgelösten pAVK (bspw. im Rahmen eines Diabetes mellitus) können die Fußpulse weiterhin tastbar sein!“

Labor










BB, Kreatinin, Kalium, Natrium, **Glukose**, **HbA1C**, **gesamte Chol**, **LDL**, **HDL** und **TG**

Apparative Diagnostik

Knöchel-Arm-Index (AKI oder ABI)

- **Systolischer BD des Unterschenkels / systolischer BD des Oberarmes (Quotient)**
- **Im Liegen und nach 10 Minuten Ruhe**, Blutdruckmessung an Oberarm und Unterschenkel durch **Blutdruckmanschette und Dopplersonde**.
- Dafür wird an beiden **Oberarmen** je eine Messung durchgeführt und anschließend der Mittelwert der beiden Werte verwendet. Ausnahme: **Beträgt der Druckunterschied ≥ 10 mmHg, wird der höhere Wert genutzt.** Am **Unterschenkel** wird der systolische Blutdruck der A. dorsalis pedis und der A. tibialis posterior bestimmt. Von diesen beiden Werten für den Knöchelarteriendruck ist **der niedrigere Wert maßgeblich** (=entscheidend) zur Diagnosestellung und zum Ausschluss der pAVK und **der höhere Wert maßgeblich zur Beurteilung der hämodynamischen Relevanz und Durchblutung.**
- **Variante:** Erheben des Knöchel-Arm-Index 1 Minute nach Belastung. Zum Nachweis gut kollateralisierter Verschlüsse oder hämodynamisch grenzwertig relevanter Stenosen

„Bei Diabetikern zeigen sich aufgrund einer Mönckeberg-Mediasklerose in 20% der Fälle falsch hohe ABI-Werte!“

| OPQRST-Schema  | | |
|---|---|---|
| Akronym | Bedeutung | Relevante Information |
| O | „Onset/Origin“ | <ul style="list-style-type: none">• In welchem Rahmen sind die Symptome aufgetreten? • War der Beginn plötzlich oder schleichend?• Sind weitere Begleitsymptome vorhanden?• Gab es in der Vergangenheit Episoden mit ähnlicher Symptomatik? |
| P | „Provocation/Palliation“ | <ul style="list-style-type: none">• Provozierende Faktoren • Lindernde Faktoren  |
| Q | „Quality“ | <ul style="list-style-type: none">• Subjektive Wahrnehmung der Symptome• Beschwerdecharakter • Beschwerdedynamik  |
| R | „Radiated or referred pain/Region“ | <ul style="list-style-type: none">• In welcher Region des Körpers treten die Symptome auf?• Besteht eine Ausstrahlung oder Weiterleitung von Schmerzen?  |
| S | „Severity“ | <ul style="list-style-type: none">• Wie hoch ist die Beeinträchtigung durch die Symptome?• Wie stark sind die Schmerzen?   |
| T | „Time/Duration“ | <ul style="list-style-type: none">• Seit wann bestehen die Symptome? |

| | |
|----------|---------------------------------------|
| >0,9–1,2 | Normwert |
| 0,75–0,9 | Leichte pAVK |
| 0,5–0,75 | Mittelschwere pAVK |
| <0,5 | Schwere pAVK |
| >1,3 | Kann auf eine Mediasklerose hinweisen |

Anamnese
Bewusstseins
RF
VE

KU

AKI
ABI

Belastungs-
untersuchung
Gehstrecke

FKDS

CT, MRT
Angio
DSA

- atrophische
Hautveränderungen
- Puls
- Strömungsgeräusche
- Ratschow
Lagerungsprobe

Mönckeberg

Belastungsuntersuchung

Zur Quantifizierung der Gehstrecke mittels Laufbandergometrie

Farbkodierte Dopplersonographie (FKDS)

Untersuchung der ersten Wahl zur Beurteilung der peripheren Arterien

Angiographie

- **CT-Angiographie** oder **MRT-Angiographie**: Zur detaillierten Detektion von Stenosen oder Okklusionen, wenn FKDS nicht ausreichend.
- **Digitale Subtraktionsangiographie (DSA)** (Goldstandard). Sie soll nur bei therapeutischer Konsequenz (insb. vor geplanter Operation) eingesetzt werden.

Differentialdiagnosen

Bei Claudicatio intermittens

- Claudicatio spinalis (Lumbale Spinalkanalstenose)
- Gonarthrose, Koxarthrose
- Thrombangiitis obliterans

Bei Ruheschmerzen

- Akuter arterieller Verschluss. Thrombangiitis obliterans
- TVT
- Wurzelreizsyndrome (Diskusprolaps)

Bei Ulzera der Füße

- Ulcus cruris venosum ^{am Innenknöchel}
- Ulzera bei Diabetes mellitus (Malum perforans) ^{plantar?}

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Nikotinverzicht
- Blutdruckeinstellung
- Blutzuckereinstellung (HbA1C < 7 %)
- Regelmäßiges Gehtraining (Im Stadium II)
- Wundbehandlung (Im Stadium IV)

RF modifizieren
Gehtraining
Ulkusmanagement

Medikamentöse Therapie

- **Statine**: z.B. Atorvastatin 40 mg (Ziel: siehe KHK)
- **Thrombozytenaggregationshemmer**: Acetylsalicylsäure (ASS) 75–100 mg/d oder Clopidogrel 75 mg/d
- Ggf. **Vasodilatator** (Naftidrofuryl) im Stadium II
- Ggf. **Prostanoide** (Prostaglandin E₁) im Stadium III

Mit erheblich verringerter Lebensqualität, Gehstrecke <200 Meter und eingeschränkt/nicht möglichem Gehtraining

Interventionelle und operative Therapie

Interventionelle therapie

- **Perkutane transluminale Angioplastie (PTA)** mit **Ballondilatation** und ggf. Stent-Einlage: Vorschieben (avancer) eines Führungsdrahtes (fil-guide) über die Stenose → Einführen eines aufblasbaren (gonflable) Ballons → Dilatation der Engstelle (Ballondilatation) → Ggf. Stentimplantation

⊕ Systemische AB Stadium IV

Prostaglandin E₁ 40 µg i.v. 2x/Tag oder 60 µg i.v. 1x/Tag, Gabe hierbei gelöst in 250–500 mL Kochsalzlösung über 2 h oder 10–20 µg i.a. 1x/Tag nach Protokoll der jeweiligen durchführenden angiologischen Einrichtung; Wirkverstärkung von Antikoagulanzen und Antihypertensiva möglich; kontraindiziert bei akuten kardiopulmonalen Erkrankungen, einem kardiovaskulären Ereignis in den letzten 6 Monaten und/oder Niereninsuffizienz mit GFR <30 mL/min, Therapie i.d.B. über 14–28 Tage unter stationärer Überwachung oder ambulant mit individuell nach Verträglichkeit festzulegenden Überwachungsintervallen

Naftidrofuryl (z.B. Dusodril®) 200 mg p.o. 1-1-1 über 6 Monate, tritt innerhalb von 3 Monaten keine Besserung ein, soll die Gabe abgebrochen werden
Cilostazol (z.B. Pladizol®) 100 mg p.o. 2x/Tag, tritt innerhalb von 3 Monaten keine Besserung ein, soll die Gabe abgebrochen werden; kontraindiziert bei Kreatinin-clearance ≤25 mL/min, mittelschweren oder schweren Leberfunktionsstörungen, klinisch manifester Herzinsuffizienz, instabiler Angina pectoris und Herzinfarkt oder koronarer Intervention in den letzten 6 Monaten

Operative therapie

- **Bypass-Operation** : Überbrückung von Gefäßverschlüssen.
 - **Material**
 - 1. Wahl: Autologer Venen-Bypass (V. saphena magna)
 - 2. Wahl: Alloplastisches Bypassmaterial (Dacron®-Bypass)
 - **Lokalisation**
 - **Anatomischer Bypass**: Der Bypass befindet sich entlang der „anatomisch korrekten“ arteriellen Leitungsbahn : Iliakofemoraler Bypass, Femoropoplitealer Bypass, Aortobifemoraler Bypass
 - **Extraanatomischer Bypass**: Der Bypass befindet sich nicht entlang der „anatomisch korrekten“ arteriellen Leitungsbahn : Axillobifemoraler Bypass, Femorofemoraler Crossover-Bypass
- **Ultima Ratio**: Amputation der betroffenen Extremität

Indikationen

- Ab Stadium III. Stadium II (Insb. IIb) nur bei erfolgloser konservativer und medikamentöser Therapie
 - Wenn möglich interventionelle Revaskularisation (Aufgrund der niedrigeren Morbidität, Mortalität und Invasivität sowie der geringeren Kosten)
 - Operative Revaskularisation bei erfolgloser oder ungeeigneter interventioneller Revaskularisation (Femoralisgabelläsion, Gelenküberschreitende Läsion, lange Läsion)

Komplikationen

- Hohes Risiko für Auftreten von Myokardinfarkt und Schlaganfall
- Akuter arterieller Verschluss einer Extremität
- Wundinfektion, Sepsis
- Operationsrisiken: Blutung, Protheseninfektion, Rezidiv

Prognose

- 5-Jahres Mortalität : 20 % (Asymptomatische pAVK), 25 % (Symptomatische pAVK)
- Bei manifester pAVK: Risiko für andere kardiovaskuläre Ereignisse erhöht
 - Myokardinfarkt: 3-fach erhöhtes Risiko
 - Schlaganfall: 4-fach erhöhtes Risiko

Prävention

- Primär- und Sekundärprävention der Arteriosklerose : Nikotinkarenz, Lebensstiländerung, Blutdruck- und Blutzuckereinstellung, Therapie der Dyslipidämie
- Fußpflege, Vermeidung von Kompression und Kälteexposition

Akuter arterieller Verschluss einer Extremität ++

Akute Ischämie einer Extremität, die unbehandelt zur irreversiblen Gewebsnekrose führt.

Ätiologie

Akuter Beginn

Arterielle Embolie (80%) : Meist femoropopliteale Arterien betroffen

- o **Kardial** (90% der Embolien, Insb. **Vorhofflimmern**, aber auch Klappenvitien, Herzwandaneurysma, Endokarditis usw.) fehler durch hämatogen verschlepptes thrombotisches Material (= Embolus). Andere Embolusarten (z. B. Luft, Fett, Tumorzellen oder Fremdkörper) sind sehr selten.

- o **Arterielle Aneurysmata** (z.B. Aortenaneurysma, Popliteaaneurysma)

Subakuter Beginn

Arterielle Thrombose (20%): **Arteriosklerose (pAVK)**, Gefäßprothese, traumatisch, hormonelle Kontrazeption, Polyglobulie, Thrombozytose

- **Dissektion**

Pathophysiologie

- Ischämietoleranz (3-6-12) : Haut: 12h. Muskeln: 6h. Nerven: 3h
- Bei Überschreiten der Ischämietoleranz → irreversible Schädigung des Gewebes

Symptome/Klinik

- **6 "P" nach Pratt** :

- o **Pain (Schmerz)**
- o **Paleness (Blässe)** (im Verlauf ggfs. Zyanotisch)
- o **Pulselessness (Pulslosigkeit)**
- o **Paralysis (Paralyse/Parese)** Lähmung
- o **Paresthesia (Parästhesie)**
- o **Prostration (Schock)**

- **Bei Embolie**: Akuter Beginn, Herzerkrankung in der Anamnese **VF**

- **Bei arteriellen Thrombosen**: Subakuter Beginn, pAVK in der Anamnese

- **(Akutes) Leriche-Syndrom** : Schmerzen in beiden Beinen, fehlende Leistenpulse und periphere Pulse, neurologische Ausfälle, Schock

Leriche-Syndrom

ist ein kompletter Verschluss der Aorta distal des Abganges der Nierenarterien, meist vor der Bifurkation in die Beckenarterien.

Stadien : Einteilung nach TASC (Transatlantic Inter-Society Consensus) oder Rutherford

| Grad | Neurologische Defizite | | Dopplersignal | | Gefährdung und Therapiemöglichkeiten |
|------------|------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---|
| | Sensibilität | Motorik | Arteriell | Venös | |
| I | Normal | Normal | Nachweisbar | Nachweisbar | Nicht gefährdet |
| II | Minimale Einschränkung | Normal | Off nicht nachweisbar | Nachweisbar | Gering gefährdet → Dringliche Revaskularisation |
| | | Parese | Nicht nachweisbar | Nachweisbar | Unmittelbar gefährdet → Sofortige Revaskularisation |
| III | Anästhesie | Paralyse | Nicht nachweisbar | Nicht nachweisbar | Irreversibel geschädigt → Amputation |

„Insbesondere Einschränkungen der Motorik und/oder der Sensibilität sind entscheidende Parameter, um die Bedrohung der Extremität zu beurteilen! Ein beginnender Sensibilitätsverlust ist häufig das erste Zeichen für eine akute vitale Gefährdung der Extremität!“

Diagnostik

Anamnese


Anamnese zu pAVK, Herzerkrankungen etc.

Körperliche Untersuchung

- Hautfarbe und -temperatur
- Überprüfung der pDMS

look Haut Farbe blau (livide) atrophische Änderungen
 Feel Temp. kalt pulse sensibilität
 move motorik

Leriche-Syndrom



Leriche-Syndrom

ist ein kompletter Verschluss der Aorta distal des Abganges der **Nierenarterien**, meist vor der Bifurkation in die Beckenarterien.



Paradoxe Embolie

Synonym: gekreuzte **Embolie**

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Pathogenese
- 3 Diagnostik
- 4 Komplikationen

1 Definition

Unter einer **paradoxen Embolie** versteht man das Übertreten eines **Embolus** vom venösen in das arterielle System des **Körperkreislaufs** durch einen Defekt im Bereich der **Herzsepten**.

2 Pathogenese

Voraussetzung ist für eine paradoxe Embolie ist eine Öffnung im Bereich der Herzsatrien oder -ventrikel (z.B. **Foramen ovale persistens**) mit **Rechts-Links-Shunt** (RLS). Zusätzlicher Faktor ist eine Druckerhöhung im **Lungenkreislauf**, z.B. durch eine **Lungenembolie**, aber auch durch heftiges **Husten**, **Niesen** oder Pressen beim Stuhlgang.

3 Diagnostik

Der Nachweis des RLS erfolgt durch

Transösophageale Echokardiographie (TEE)

kontrastmittelverstärkte transkranielle Dopplersonographie (KM-TCD)

4 Komplikationen

Mögliche Folgen einer paradoxen Embolie sind **Hirnfarkt**, **hämorrhagischer Darminfarkt** oder **Myokardinfarkt**.

Als **Parese** bezeichnet man Störungen der Motorik, die mit einer ->Lähmung einzelner Muskeln oder Muskelgruppen der Extremitäten oder des Rumpfs verbunden sind. Bei vollständigem Funktionsausfall spricht man von einer ->Plegie oder **Paralyse**.

1 Definition

Die **Parese** ist ein mehr oder weniger ausgeprägter Teilausfall der **motorischen** Funktion eines **Muskels**, einer Muskelgruppe oder einer **Extremität**. Im Deutschen spricht man von einer **Lähmung**

Als **Paralyse** bezeichnet man eine *vollständige* **Lähmung** eines Körperteils - im Gegensatz zur **Parese**, die eine *teilweise* Lähmung darstellt.

Bildgebende Verfahren

- **Doppler-Sonographie**, farbkodierte Duplexsonographie der Extremität
- **Evtl. Angiographie (DSA, Angio-CT, Angio-MRT)** : Nur wenn zeitlich vertretbar, insbesondere bei arterieller Thrombose indiziert; bei eindeutiger Embolie kann darauf verzichtet werden.
 - Embolie: Kurzstreckiger Verschluss
 - Thrombose: Langstreckiger Verschluss
- Evtl. **transösophageales Echo** (bei Verdacht auf Beteiligung der thorakalen Aorta)

Therapie (Notfall)

Allgemeine Maßnahmen

- UFH
- **Heparin 5000 I.E.** i.v. als Bolus, anschließend Heparininfusor (15 IE/kg/h)
 - **Analgesie** : **Morphin 5-10mg iv**
 - **Extremitätentieflagerung**
 - **Watteverband** (betroffene Extremität vor Auskühlung schützen)

Interventionelle Therapie

- **Katheterthrombembolktomie nach Fogarty** (insb. bei **Embolie**) : Ein Ballonkatheter wird über den Thrombus hinaus vorgeschoben, anschließend der Ballon befüllt und zurückgezogen, sodass der Thrombus mit herausgezogen wird.
- **Lokale Thrombolysetherapie** mittels Alteplase (insb. **bei Thrombose**) Fibrinolyse lokal (über arteriellen Lysekatheter)
- **Aspirationsthrombembolktomie** Katheter-Schlauch System, Absaugen-Methode / Perkutan

Chirurgische Therapie

- **Thrombendarteriektomie** (insb. **bei Thrombose**)
- **Bypassverfahren** (insb. **bei Thrombose**)
- Ultima ratio: **Amputation** der Extremität

Evtl. Konservative Therapie

- Evtl. Fibrinolyse-Therapie mittels Alteplase Systemisch iv.

Kausale Therapie

Mögliche **Emboliequelle** (z.B. Rhythmusstörungen) abklären und behandeln.

Komplikationen (nach Therapie)

- **Tourniquet-Syndrom (Reperfusions-Syndrom, Postischämiesyndrom)**
 - Nach Reperfusion können durch Einschwellen angesamelter Metabolite Komplikationen entstehen, insbesondere bei zu später Reperfusion (> 6 h)
 - **Mögliche Folgen** :
 - **Azidose, Hyperkaliämie** → **Herzrhythmusstörungen**
 - **Rhabdomyolyse** → Myoglobininurie → **Crush-Niere** (akutes Nierenversagen)
 - **Reperfusionsoedem** → **Kompartmentsyndrom**, **hypovolämischer Schock**
 - **DIC** (Disseminierte intravasale Gerinnung)
 - **Multiorganversagen**
 - **Therapie** : Symptomatische Therapie, Überwachung, evtl. Amputation der betroffenen Extremität notwendig


Prognose

- Gute Prognose, wenn Embolektomie in den ersten 6 Stunden durchgeführt wird
- Schlechte Prognose bei Verschlüssen über 6 Stunden → Evtl. Amputation

Prävention

- Therapie der Grunderkrankung
 - **Popliteaaneurysma** : Indikationen zur Operation (Veneninterponat mit chirurgischer Exklusion des Aneurysmas)
 - **Symptomatische** Aneurysmata
 - **Asymptomatische** Aneurysmata: **Durchmesser >2 cm**
- Evtl. Antikoagulation (z.B. bei VHF)

Or, v/p, keine EM Injektion



- Bevorzugen einer operativen Versorgung bei [7]
- Fehlendem Leistenpuls, bspw. bei
 - **Beidseitigem Verschluss der A. iliaca communis**
 - **Verschluss der A. femoralis communis**
 - **Verschluss in unmittelbarer Nähe der A. femoralis communis**
 - **Langstreckigen Verschlüssen**, bspw. bei
 - **Verschlüssen der Trifurkation bei gleichzeitigem langstreckigen Verschluss der A. femoralis superficialis und A. poplitea**
 - **Vorhandensein eines möglichen Anschlusssegmentes für einen Bypass bei langstreckigen Verschlüssen der A. poplitea, der Trifurkation und aller Unterschenkelarterien**
 - **Bereits eingeschränkter Nierenfunktion**
 - **Gelenküberschreitenden Verschlüssen**

prostration:

Volumensubstitution,
Schockprophylaxe

Hydratation
Deuittika
Alkalisierung der Urin

Dermatofaziotomie

interposition Graft

prophylaxe

1 Arteriellcs Gefäßsystem

Tab. 1.8 Anamnestiche und klinische Differenzierung zwischen embolischem und thrombotischem Gefäßverschluss

| | arterielle Embolie | akute arterielle Thrombose |
|------------------------|---|--|
| Gefäßsystem | meistens intakt | chronisch vorgeschädigtes Gefäßsystem (Atherosklerose) |
| Vorerkrankungen | bekannte Emboliequellen: Herzerkrankungen (v. a. Vorhofflimmern), Aneurysmen | bekannte Atherosklerose: Claudicatio intermittens, Angina abdominalis, Angina pectoris bekanntes Aneurysma Z. n. revaskularisierenden Eingriffen |
| Beginn der Symptomatik | hochakut-schlagartig | subakut (weniger dramatisch) |
| Schmerzen | stark | mäßig bis stark |
| Ischämiesyndrom | häufig komplett → keine Kollateralisierung (motorische und sensible Ausfälle) | häufig inkomplett → Kollateralisierung (Motorik und Sensibilität erhalten) |

Tab. 1.9 Stadieneinteilung der akuten kritischen Ischämie (nach Rutherford)

| Kategorie | klinischer Befund | Diagnostik | Therapie | Prognose |
|-----------|---|--|---|--|
| I | Pulse: arterielle und venöse Fußpulse ableitbar Sensibilität und Motorik: normal (→ inkomplettes Ischämiesyndrom) | Dopplersonografie, Duplexsonografie, Angiografie | lokale Lysetherapie, Aspirations-thrombektomie, chirurgische Thrombektomie, konservative Therapie | keine akute Gefährdung der Extremität, mit Therapie gut |
| Ila | Pulse: arterielle Fußpulse nicht sicher ableitbar, venöse Fußpulse ableitbar Sensibilität: im Zehenbereich evtl. leicht vermindert Motorik: normal (→ inkomplettes Ischämiesyndrom) | Dopplersonografie, Angiografie | lokale Lysetherapie, Aspirations-thrombektomie, chirurgische Thrombektomie | Extremität gefährdet, Ischämie bei rascher Therapie reversibel |
| Ilb | Pulse: arterielle Fußpulse nicht sicher ableitbar, venöse Fußpulse ableitbar Sensibilität: im Zehenbereich und/oder Unterschenkel fehlend Motorik: leichte bis mäßige Muskelschwäche (→ komplettes Ischämiesyndrom) | keine weitere Diagnostik (→ Zeitverzögerung) | sofortige operative Therapie | Extremität akut gefährdet, Ischämie bei sofortiger Therapie reversibel |
| III | Pulse: arterielle und venöse Fußpulse nicht sicher ableitbar Sensibilität: ausgedehnte Sensibilitätsverluste Motorik: ausgedehnte Muskelschwäche bis Paralyse (→ komplettes Ischämiesyndrom) | keine weitere Diagnostik (→ Zeitverzögerung) | sofortige operative Therapie | irreversible ischämische Schädigung → Amputation unvermeidbar |

Therapie:

Die Auswahl des Therapieverfahrens richtet sich nach der Lokalisation des Verschlusses (supra- oder infrapopliteal), der Schwere der Ischämie und der lokalen Verfügbarkeit: chirurgische Thrombektomie, perkutane Aspirationstherapie, kathetergestützte Fibrinolyse.

Sofortmaßnahmen: *iv Zugang + Labor, Volumen Therapie*

Extremität tieflagern und in Watte packen (keine Wärmeapplikation -+ Verkürzung der Ischämietoleranzzeit!), ausreichende Analgesie (z.B. 5-10 mg Morphin i. v.), sofortige therapeutische Heparinisierung (initial 1 5000-10000 IE i. v.) zur Vermeidung eines appositionellen Thrombuswachstums und Volumengabe zur Schockprophylaxebehandlung.

Lokale Fibrinolyse: *Lysetherapie mit rtPA*

Sie ist bei inkomplettem Ischämiesyndrom (AI Stadium I und IIa) durch arterielle Thrombosen oder periphere Embolien indiziert.

Gegebenenfalls kann sie mit einer Katheterthrombektomie kombiniert werden.

↑ Fernembolisation (Fogarty)

Chirurgische Maßnahmen:

Bei einem kompletten Ischämiesyndrom (AI Stadium IIb) ist wegen des Zeitfaktors die operative Rekanalisation (Thrombektomie, Embolektomie, Thrombendarteriektomie, Bypass) zu bevorzugen. Bei einer AI Stadium III oder sehr spätem Behandlungsbeginn mit entsprechendem Gewebeuntergang ist eine Amputation meistens unvermeidbar.

Postoperative Antikoagulation:

Postoperativ bzw. post interventionell wird eine Antikoagulation mit Heparin eingeleitet. Patienten mit arterieller Thrombose erhalten längerfristig ASS. Bei Patienten mit embolischen Gefäßverschluss und nicht ausschaltbarer Emboliequelle ist eine orale Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten indiziert.

post op BeinSchmerzen

⚡
Reperfusion syn.

Anamnese

KU V/Z Hypotonus Tachykardie Hypovolämie
Kompartmentsyn.?

lab

BGA Azidose? K^+ ?

Retentionsparameter Akutes Nierenversagen

Elektrolyten Hyperkalämie

Urinstatus Myoglobinnurie

Akutes Nierenversagen Volumenzufuhr
Diuretika
Alkalisierung des Urin

Schock Schock management

Kompartmentsyn. Dermatofasciotomie

HRS AK^+ -Management

DIC

Koronare Herzkrankheit (KHK) ++

Definition

- **Arteriosklerose:** Verhärtung der Arterienwand. Unterformen sind die Atherosklerose (häufigste Form) und die Mönckeberg-Mediasklerose (DM)
 - **Atherosklerose:** Entzündliche Erkrankung der Intima der Arterien mit Lipidablagerung.
 - **Koronare Herzkrankheit:** Atherosklerose der Koronararterien, die zu einer Minderperfusion des Myokards führt. Sie ist weltweit die häufigste Todesursache.
 - **Angina pectoris :** (=Brustenge) Retrosternale Schmerzen oder Druckgefühl infolge einer Myokardischämie.
 - **Einteilung nach Stromgebiet:**
 - A. coronaria sinistra : Hauptstamm dann Bifurkation → Ramus interventricularis anterior (RIVA = LAD) und Ramus circumflexus (RCX)
 - A. coronaria dextra : (RCA) = Rechte Koronararterie
 - Prävalenz >65 Jahre : Frauen: 20%. Männer: 30%. ♀ < ♂.
- „Kardiovaskuläre Erkrankungen sind in Deutschland die führende Todesursache!“

Ätiologie

Atherosklerose ++ : Risikofaktoren für die Entstehung einer Atherosklerose

1. Tabakkonsum
2. Diabetes mellitus
3. Arterielle Hypertonie
4. Dyslipidämie: LDL-Cholesterinerhöhung (>160 mg/dL); HDL-Cholesterinerniedrigung (♂ <40 mg/dL bzw. ♀ <50 mg/dL)
5. Alter (Männer ≥45 Jahre; Frauen ≥55 Jahre)
6. Familienanamnese: Kardiovaskuläre Ereignisse bei Familienangehörigen 1. Grades vor dem 55.(♂)/65.(♀) Lebensjahr


Metabolisches
syn

- Alter
- FH
- DM
- HTN
- Dyslipidämie
- Adipositas
- Tabakkonsum

* **"Metabolisches Syndrom"**: Kombination von Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie, Dyslipidämie (Triglyceride erhöht/HDL-Cholesterin vermindert) und Adipositas

Pathogenese der Atherosklerose


- Risikofaktoren KHK → Endotheldysfunktion → Lipidablagerung → Einwanderung von Entzündungszellen → Entstehung einer stenosierenden Plaque (stabile AP) → Ggf. Plaqueruptur mit Thrombusbildung und Verschluss einer Koronararterie (ACS)
- Plaque = Lipidkern + fibröse Kappe



Risikofaktoren
Endothel dysfunktion
Lipidablagerung
Einwanderung der Entzündungszellen
Entstehung einer Plaque
Plaqueruptur
Thrombose
Koronararterienverschluss
ACS

Atherosklerotisch bedingte Erkrankungen

- Koronare Herzkrankheit (KHK)
- Ischämischer Apoplex (durch Karotisstenose)
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
- Aortenaneurysma




Koronargefäße und Versorgungstypen:

Verantwortlich für die Durchblutung des Herzmuskels sind die beiden Koronargefäße: **A. coronaria dextra (RCA)** und **A. coronaria sinistra (LCA)**. Die LCA zweigt sich in den **Ramus inter ventricularis anterior (RIVA)** und **Ramus circumflexus (RCX)** auf.

Abhängig von den jeweiligen Versorgungsgebieten der einzelnen Gefäße unterscheidet man verschiedene Versorgungstypen. Am häufigsten ist der **ausgeglichene Typ**, d. h. die linke Koronararterie versorgt die Vorderwand des linken Ventrikels und einen Großteil des Septums und die rechte Koronararterie den rechten Ventrikel mitsamt einem Streifen der linksventrikulären Hinterwand und dem hinteren Teil des Septums.

Wesentlich seltener sind der sog. Links- bzw. Rechtsversorgungstyp (jeweils 15 %).

Durchblutet werden die Koronararterien vorwiegend in der Diastole.



Pathophysiologie

Relative Koronarinsuffizienz (= Stabile AP)

- Arterielle Ischämie als Folge eines Missverhältnisses von O₂-Angebot und O₂-Bedarf der Kardiomyozyten = Senkung des O₂-Angebots oder Steigerung des O₂-Bedarfs
- Ursachen
 - Vermindertes O₂-Angebot
 - Hauptursache (>95%): Stenosierende Atherosklerose
 - Weitere Ursachen: Abnahme der Diastolendauer bei erhöhter Herzfrequenz (Die Koronararterienperfusion erfolgt während der Diastole und ist somit bei kürzeren Diastolen infolge von Tachykardien vermindert). Anämie. Arteriitis der Koronararterien
 - Erhöhter O₂-Bedarf, z.B. durch Hypertone Entgleisung. Hyperthyreose
- Pathophysiologische Folgen: Häodynamische Veränderungen (Diastolische Relaxationsstörung. Systolische Kontraktionsstörung. Eingeschränkte Koronarreserve)

Absolute Koronarinsuffizienz → ACS Instabile AP

Symptome/Klinik

Leitsymptom: Angina pectoris

- Retrosternale Schmerzen oder Druckgefühl. Ausstrahlung in den linken Arm, Hals, Unterkiefer, Oberbauch oder Rücken
- Begleitsymptomatik: Unruhe, Angst. Ggf. Dyspnoe, Nausea, Hyperhidrosis

Verlaufsformen EKG: UA

Stabile Angina pectoris (= stabile KHK)

1. Angina pectoris ohne Anhalt für eine klinische Progredienz (stabile Stenose).
 2. Die Schmerzen sind durch körperliche Belastung oder emotionalen Stress provozierbar
 3. Besserung der Symptome durch Ruhe und/oder Gabe von Nitrate (Nitroglycerin)
- **Stadieneinteilung der stabilen Angina pectoris** (Canadian Cardiovascular Society)
 - Grad 0 – Keine Beschwerden (Asymptomatische Ischämie)
 - Grad I - Beschwerden bei schwerer körperlicher Aktivität
 - Grad II - Geringe Symptomatik bei normaler körperlicher Aktivität
 - Grad III [?] Erhebliche Symptomatik bei normaler körperlicher Aktivität
 - Grad IV - Beschwerden bereits bei geringer Belastung und/oder in Ruhe

Instabile Angina pectoris

1. Angina pectoris mit progredienter bedrohlicher Ischämie (Plaqueruptur) mit Thrombusbildung) = eine Form von ACS
 2. Schmerzen in Ruhe oder bei geringster Belastung
 3. Die Beschwerden halten länger als bei stabiler Angina pectoris an (>20 Minuten)
 4. Verzögertes oder fehlendes Ansprechen auf Nitrate
- **Verlauf:** Übergang in stabile Situation oder akuten Myokardinfarkt (20 %) ist möglich
 - **Diagnostik**

- Troponin negativ
- EKG: ST-Streckensenkungen, T-Negativierungen oder unauffälliges EKG ^{häufig}


Formen

De-novo-Angina: ^{jede} neu aufgetretene Angina pectoris

Crescendo-Angina: zunehmende Angina pectoris

Zunahme der Anfallsdauer, Anfallshäufigkeit und Schmerzintensität bei ungenügender Medikamentenwirkung

in Ruhe
> 20 min
Keine Besserung mit Nitrat



Sonderformen

Prinzmetal-Angina (vasospastische Angina pectoris)

- Ätiologie: Passagere Koronarspasmen
- Symptomatik: belastungsunabhängige Angina pectoris
- Diagnostik
 - EKG: **Reversible ST-Hebung** Während eines Anfalls kommt es häufig zu sehr ausgeprägten EKG-Veränderungen. Im Gegensatz zum Myokardinfarkt normalisiert sich der EKG-Befund bei einer Prinzmetal-Angina jedoch in kürzester Zeit selbstständig oder nach Gabe von Nitroglycerin.
 - **Troponin negativ**
 - **Koronarangiographie: Passagere Koronarspasmen**
- Therapie
 - **Calciumantagonisten, ggf. Nitrate** *vasodilatation* *Isosorbiddinitrate*
 - **Kontraindiziert sind Beta-Blocker!** *Senkung des Vorlast, Dilatation des Koronarastens, Freisetzung von NO \Rightarrow Relaxation von Glattmuskulatur*
- Prognose: Risiko für einen Herzinfarkt zu erleiden ist 20% *Prophylaxe Molsidomin*

Walking-through-Angina

- Angina-pectoris-Beschwerden, die zu Beginn einer Belastung auftreten, bei Fortführung der Belastung jedoch wieder verschwinden
- **Lokale Freisetzung vasodilatierender Metabolite**, die aufgrund des anaeroben Stoffwechsels entstehen \rightarrow Verbesserung der myokardialen Perfusion und Sistieren der Beschwerden

Diagnostik

Anamnese

Erfragen von **Schmerzcharakter** sowie **Risikofaktoren** und Familienanamnese

Körperliche Untersuchung

Meist unauffällig, jedoch können **Hinweise auf eine atherosklerotische Gefäßerkrankung an anderer Stelle aufgedeckt werden** (z.B. Fehlen der Fußpulse, Strömungsgeräusche über den Karotiden oder die peripheren Arterien)

EKG

Bei stabiler Angina pectoris meist unauffällig

Echokardiographie

- Beurteilung der globalen und regionalen Myokardfunktion (Wandbewegungsstörungen),
- Abklärung von Differentialdiagnosen (z.B. Aortenstenose)


Labor

BB, Kreatinin, Kalium, Natrium, Glukose, HbA1C, gesamte Chol, LDL, HDL und TG. Ggf. Troponin, BNP

Ischämiediagnostik

Belastungs-EKG (Ergometrie)

- Kontrollierte körperliche Belastung, mittels Fahrrad-Ergometer oder Laufband
- Monitoring mittels kontinuierlicher 12-Kanal-EKG-Ableitung sowie Messung von Blutdruck und Herzfrequenz
- **Indikation** : Nachweis einer Myokardischämie bei stabiler Angina pectoris
- **Pathologische Befunde**
 - Klinisch : Auftreten von Angina-pectoris
 - Elektrokardiographisch : Deszendierende oder horizontale ST-Streckensenkungen von $\geq 0,1$ mV
- **Kontraindikationen** : Akuter Myokardinfarkt, Akute Herzinsuffizienz, Peri-/Myokarditis, TVT, Lungenembolie



Myokardszintigraphie

Bildliche Darstellung der Perfusion des Myokards, zeigt sog. Funktionsstoffwechsel

Stress-Echokardiographie

Prüfung der Pumpfunktion unter Belastung mit Augenmerk auf regionale Wandbewegungsstörungen

Stress-MRT

Koronarangiographie

- **Goldstandard** zur Diagnostik einer KHK: Nachweis von Koronarstenosen mit Bestimmung des Stenosegrades

- **Möglichkeit zur therapeutischen Intervention** mittels PTCA/PCI



„Eine Koronarangiographie sollte nur dann angeboten werden, wenn eine therapeutische Konsequenz im Sinne einer Revaskularisation zu erwarten ist!“

Differentialdiagnosen

- **Kardial** : Akutes Koronarsyndrom, Perikarditis.
- **Gastrointestinal** : Refluxkrankheit, Ulcus ventriculi, Ösophagusspasmus.
- **Da-Costa-Syndrom** (Herzneurose = funktionelle Herzbeschwerden) es handelt sich um Symptome (u.a. linksthorakale Schmerzen, Angst), die nicht durch eine somatische Erkrankung ausgelöst werden.

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Tabakkarenz
- Diätetische Maßnahmen, Gewichtsreduktion
- körperliches Ausdauertraining (nach der Einführung der Therapie)
- Blutdruckeinstellung (<140/90 mmHg)
- Blutzuckereinstellung (HbA1C < 7 %)

Medikamentöse Therapie

- **Statine** (CSE-Hemmer : Cholesterin-Synthese-Enzymhemmer) : z.B. **Atorvastatin**. Ziel : Senkung des LDL-Cholesterins auf Werte unter 70 mg/dL (Ggf. 55) bzw. eine mindestens 50%ige Reduktion des Ausgangswertes
- **Thrombozytenaggregationshemmer** : Acetylsalicylsäure (ASS) 75–100 mg/d oder Clopidogrel 75 mg/d
- **Antianginöse Therapie** : **Kurz wirksame Nitrate** (Nitroglycerin sublingual bei Bedarf) + **Beta-Blocker** (Bisoprolol). Ggf. **Calciumantagonisten** (Amlodipin)

Interventionelle und operative Therapie

Interventionelle therapie

- **Perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA) = Perkutane Koronarintervention (PCI)** mit **Ballondilatation** und **Stent-Einlage** : Vorschieben (avancer) eines Führungsdrahtes (fil-guide) über die Stenose → Einführen eines aufblasbaren (gonflable) Ballons → Dilatation der Engstelle (Ballondilatation) → Ggf. Stentimplantation
- **Vorteile** : Geringeres Komplikationsrisiko. Kürzerer Krankenhausaufenthalt
- **Nachteile** : Ergebnisse bei komplexer KHK schlechter (3-Gefäß-Erkrankung oder Bifurkationsstenosen)

Operative therapie

- **Bypass-Operation** : Überbrückung von Gefäßverschlüssen oder Gefäßverengungen.
- **Vorteile** : Bessere Ergebnisse bei komplexer KHK
- **Nachteile** : Operationsrisiko

Kriterien zur Auswahl des Verfahrens

- **Komplexität der Koronarstenosen** (Bestimmung über SYNTAX-Score)
- **Anzahl der betroffenen Gefäße**
- **Individuelles Operationsrisiko** (Bestimmung über Euroscore)

Prognose

- **Stabile Angina pectoris**
 - Jährliche Mortalität: ca. 5%
 - 25% der Patienten erleiden innerhalb von fünf Jahren einen Myokardinfarkt
 - Höhergradige Stenose geht mit schlechterer Prognose einher

Komplikationen

- Myokardinfarkt
- Plötzlicher Herztod
- Herzinsuffizienz
- Herzrhythmusstörungen

Thoraxschmerz ++

- Akuter Thoraxschmerz kann Ausdruck vieler schwerwiegender Erkrankungen wie u.a. Myokardinfarkt, Lungenembolie, Aortendissektion und (Spannungs-)Pneumothorax sein. Daher muss dieses Symptom immer ernst genommen und schnellstmöglich abgeklärt werden!
- Neben Warnhinweisen, die sich durch die Bestimmung der Vitalparameter ergeben können, spielen das EKG, Laboruntersuchungen (insb. "Herzenzyme") sowie die Bildgebung (insb. CT) eine wichtige Rolle. Erst wenn akut lebensbedrohliche Diagnosen (insb. kardiale und pulmonale Erkrankungen) ausgeschlossen wurden, sollten mittels weiterführender Diagnostik andere (auch gastrointestinale, muskuloskelettale oder psychogene) Ursachen in Betracht gezogen werden.
- **Vorgehen** : Anamnese (SAMPLE, OPQRST) → Körperliche Untersuchung (Vitalparameter, Herz, Pulse, Lungen,...) → EKG, Labor (Herzenzyme, D-Dimere,...), ggf. Bildgebung (Angio-CT) → ggf. weiterführende Diagnostik


Differentialdiagnosen

| Erkrankung | Anamnese/Klinik | | | | Diagnostik |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|---|--|
| | Plötzliches Auftreten | Belastung sabhängig | Atemab hängig | Charakteristika | |
| Kardial | | | | | |
| ACS/Angina pectoris (CCS) | X | X | | <ul style="list-style-type: none">• Ausstrahlung linke Schulter• Eher älterer Patient | <ul style="list-style-type: none">• EKG: STEMI?• Labor: <u>Troponin T/I</u> |
| Perimyokarditis (oder Perikarditis oder Myokarditis) | (X) | | X (Perikarditis) | <ul style="list-style-type: none">• <u>Im Liegen verstärkt</u>• Eher <u>jüngerer Patient</u>• Ggf. <u>Infektanamnese</u> | <ul style="list-style-type: none">• Auskultation: Evtl. <u>ohnnahes Reiben</u>• Echo: <u>Perikarderguss</u> |
| Tako-Tsubo-Kardiomyopathie | X | X | | <ul style="list-style-type: none">• Vor allem <u>ältere Frauen</u>• Vor Durchführung eines Herzkatheters kaum von einem ACS zu unterscheiden | <ul style="list-style-type: none">• Herzkatheter ohne Nachweis einer Koronarstenose bzw. Gefäßverschluss |
| Pulmonal | | | | | |
| Lungenembolie | X | | X | <ul style="list-style-type: none">• <u>Thromboseanamnese/-befund</u>• Akut einsetzende Dyspnoe | <ul style="list-style-type: none">• Labor: <u>D-Dimere</u>• EKG, ggf. <u>Echokardio</u>: Rechtsherzbelastung• <u>CT-Angiographie</u> |
| (Spannungs-) Pneumothorax | X | | X | <ul style="list-style-type: none">• Plötzliche Dyspnoe• Spannungspneumothorax: Schocksymptomatik | <ul style="list-style-type: none">• <u>Hypersonorer Klopfeschall</u>, <u>abgeschwächtes Atemgeräusch</u>• <u>Röntgen-Thorax</u> (erhöhte Transparenz) |
| Pneumonie | | | X | <ul style="list-style-type: none">• <u>Fieber</u>• Dyspnoe, <u>Husten</u> | <ul style="list-style-type: none">• <u>Entzündungsparameter</u>• <u>Röntgen-Thorax</u> (Infiltrat?) |
| Pleuritis (sicca) | | | X | | <ul style="list-style-type: none">• Auskultation: <u>Pleurareiben</u>• <u>Sono/Röntgen-Thorax</u> → <u>Pleuraerguss</u> |
| Mediastinal | | | | | |
| Aortendissektion | X | X | | <ul style="list-style-type: none">• Vernichtungsschmerz an <u>Rücken</u>/Abdomen | <ul style="list-style-type: none">• <u>Echo</u>• <u>CT-Angio Thorax und Abdomen</u> (Stanford A/B?) |

| | Plötzliches Auftreten | Belastung sabhängig | Atemab hängig | Charakteristika | Diagnostik |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|---|---|
| Gastrointestinal | | | | | |
| Refluxkrankheit | (X) | | | <ul style="list-style-type: none"> Im Liegen verstärkt Druckgefühl/Sodbrennen | <ul style="list-style-type: none"> Gastroskopie |
| Mallory-Weiss- und Boerhaave- Syndrom | X | | | <ul style="list-style-type: none"> Unmittelbare Episode heftigen Erbrechens Mallory-Weiss-Syndrom: Hämatemesis Boerhaave-Syndrom: Haut- oder Mediastinalemphysem | <ul style="list-style-type: none"> Endoskopie Boerhaave-Syndrom <ul style="list-style-type: none"> Röntgen mit wasserlöslichem Kontrastmittel CT |
| Störungen der Ösophagusmotilität | | | | | |
| Ulcus ventriculi | (X) | | | <ul style="list-style-type: none"> NSAR-Einnahme Evtl. Hämatemesis, Teerstuhl | <ul style="list-style-type: none"> Anämie (Blutung) Gastroskopie |
| Akute Pankreatitis | (X) | | | <ul style="list-style-type: none"> Gürtelförmiger Schmerz mit „Gummibauch“ | <ul style="list-style-type: none"> Lipase↑ Sono. Ggf. CT |
| Funktionelle Herzbeschwerden | | | | | |
| Funktionelle Herzbeschwerden | X | | | <ul style="list-style-type: none"> In stressigen Situationen <ul style="list-style-type: none"> Streng linksthorakale Schmerzen (da wo das Herz ist) Angst Tachykardie | <ul style="list-style-type: none"> Unauffällig Ausschlussdiagnose |
| Weitere (Ausschluss-)diagnosen: Muskuloskelettaler Schmerz, Interkostalneuralgie, Tietze-Syndrom (Schmerzen und Schwellung der Rippenknorpel am Ansatz des Sternums), Herpes zoster | | | | | |

EKG

Lagetyp



Akutes Koronarsyndrom (ACS) und Myokardinfarkt (MI) ++

I. Definition

- ACS : Plaqueruptur mit Thrombusbildung und Verschluss einer Koronararterie, die zu einer Ruheischämie führt.
- Myokardschädigung : Erhöhung des Troponins. Sie kann akut oder chronisch sein
- MI : Zelltod von Herzmuskelzellen in Zusammenhang mit klinischen Zeichen einer akuten Myokardischämie = Myokardschädigung durch akute myokardiale Ischämie

II. Formen

A. Instabile Angina pectoris

- Infarkttypische Symptomatik (s.u.) (>20 min). Ggf. neu aufgetretene oder zunehmende AP (mit CCS III oder IV)
- Verzögertes oder fehlendes Ansprechen auf Nitrate
- EKG : ST-Streckensenkungen ($\geq 0,5$ mm), T-Negativierungen. Ggf. unauffälliges EKG
- Troponin negativ

(Canadian Cardiovascular Society)

- Grad 0 - Asymptomatische Ischämie
- Grad I - Beschwerden bei schwerer körperlicher Belastung
- Grad II - Geringe Symptomatik bei normaler körperlicher Aktivität
- Grad III - Erhebliche Symptomatik bei normaler körperlicher Aktivität
- Grad IV - Beschwerden bereits bei geringer Belastung und/oder in Ruhe

Ruhschmerz

B. Nicht-ST-Hebungs-Myokardinfarkt (NSTEMI)

Nekrose der Innenschicht


- Infarkttypische Symptomatik (>20 min)
- Verzögertes oder fehlendes Ansprechen auf Nitrate
- EKG : ST-Streckensenkungen ($\geq 0,5$ mm), T-Negativierungen. Ggf. transitorische ST-Strecken-Hebung ?
- Troponin positiv

C. ST-Hebungs-Myokardinfarkt (STEMI)

Transmurale Nekrose

- Infarkttypische Symptomatik (>20 min)
- Verzögertes oder fehlendes Ansprechen auf Nitrate
- EKG : persistierende ST-Strecken-Hebung (≥ 1 mm, ggf. spiegelbildliche ST-Senkungen) oder neu aufgetretener Linksschenkelblock
- Troponin positiv

tiefes in V1, breites QRS in V6 mit ST



III. Pathophysiologie

A. Risikofaktoren und Pathogenese der Atherosklerose → KHK

B. Relative Koronarinsuffizienz → KHK

C. Absolute Koronarinsuffizienz

1. Instabile Angina pectoris : Teilweiser Verschluss
2. Myokardinfarkt : Kompletter Verschluss mit Nekrose
 - STEMI : transmurale Nekrose durch kompletten Verschluss
 - NSTEMI : Nekrose der Innenschicht durch teilweisen Verschluss mit distalen Embolien (Verschleppung)

IV. Ätiologie

- Atherosklerotische Plaqueruptur mit Thrombusbildung: meistens
- Sauerstoffdefizit : selten
 - Erhöhter myokardialer Sauerstoffbedarf : Anhaltende Tachykardie
 - Reduziertes myokardiales Sauerstoffangebot : Koronarspasmen (Prinzmetal-Angina), Koronardissektion (iatrogen bei Herzkatheteruntersuchung, traumatisch oder spontan), Koronare Thromboembolie
- Intervention oder Operation : PCI-assoziiert (Thrombose, Restenose), Bypass-assoziiert

V. Symptome/Klinik

A. Symptome

- Akut einsetzende, anhaltende **Retrosternale Schmerzen** oder Druckgefühl. Ausstrahlung in den linken Arm, Hals, Unterkiefer, Oberbauch oder Rücken
- Begleitsymptomatik : Unruhe, Angst. Ggf. Dyspnoe, **Nausea**, **Emesis**, **Hyperhidrosis**

B. Besonderheiten

- **Diabetiker** : Häufig „stumme Infarkte“ aufgrund Polyneuropathie
- **Inferiorer Hinterwandinfarkt** : **Epigastrische Schmerzen**.

„Insb. bei Frauen, Diabetikern, älteren oder herzoperierten Patienten sowie Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz erschweren andersartige, „atypische“ Symptome (abdominelle Schmerzen, Übelkeit, zunehmende Luftnot) die Diagnose eines Myokardinfarktes!“

VI. Diagnostik *Anamnese, KU, EKG, Labor, Echokardiographie, Koronarangiographie*

A. Anamnese

Erfragen von Schmerzcharakter sowie Risikofaktoren und Familienanamnese

B. Körperliche Untersuchung

- **Inspektion** : Zyanose, Blässe, Orthopnoe, **Kaltschweißigkeit**
- **Auskultation**
 - **Herz**: **Systolikum** bei Ventrikelseptumperforation, Ventrikelperforation (Perforation der freien Wand) oder Mitralsuffizienz
 - **Lunge**: **Feuchte Rasselgeräusche** bei Lungenödem

C. EKG

- **12-Kanal-EKG** : **<10 min** nach Erstkontakt. **Wiederholung**: Nach 6 und 12 Stunden Ggf. Ableitung zusätzlicher Kanäle (z.B. bei V.a. Hinterwandinfarkt oder Rechtsherzinfarkt)
- **Monitoring**: Kontinuierliche Ableitung bis zur Intervention bzw. Ausschluss eines Myokardinfarktes

STEMI

- **Signifikante ST-Hebungen**
 - ① In mind. zwei benachbarten Ableitungen $\geq 0,1$ mV (= 1 mm), gemessen am J-Punkt

NB Für ST-Hebungen in V2 und V3 :

- Männer <40 Jahre: ST-Hebungen $\geq 0,25$ mV (= 2,5 mm)
- Männer ≥ 40 Jahre: ST-Hebungen $\geq 0,2$ mV (= 2 mm)
- Frauen: ST-Hebungen $\geq 0,15$ mV (= 1,5 mm)

- **Indirekte Infarktzeichen**: spiegelbildliche ST-Senkungen

„ST-Senkungen $\geq 0,05$ mV (= 0,5 mm) in den Ableitungen V1–4 deuten auf einen posterioren Hinterwandinfarkt hin. In diesem Fall sollte ein zweites EKG zusätzlich mit den Ableitungen von V7–9 erfolgen.“

- **Linksschenkelblock**: Sgarbossa-Kriterien ermöglichen Diagnose eines STEMI bei LSB. Diagnose eines STEMI sobald eines der folgenden drei Kriterien positiv ausfällt :

- Konkordante ST-Hebung ≥ 1 mm (V5, V6, I, aVL)
- Konkordante ST-Senkung ≥ 1 mm (V1–V3)
- Diskordante ST-Hebung $\geq \frac{1}{3}$ mm bzw. $\geq 25\%$ vom S (V1–V3)

+ bzw. ST-Streckenhebung ≥ 5 mm in Ableitungen mit einem negativen QRS-Komplex

- **Stadienhafter Verlauf des STEMI**

- **Frühstadium** : T-Überhöhung, sog. „Erstickungs-T“.
- **Stadium 1** : Zusätzlich ST-Streckenhebung
- **Stadium 2** : ST-Strecke senkt sich ab. Terminale T-Negativierung, R-Verlust, pathologische Q-Zacke (Breite $\geq 0,03$ Sekunden, Tiefe ≥ 1 mm oder 0,1 mV).
- **Stadium 3** : (chronisches Stadium) Persistierende Q-Zacke. Ggf. persistierende T-Negativierung

- **Differentialdiagnose ST-Hebung im EKG**

- **Kardiale Ursachen** : Schenkelblock, Herzschrittmacher, Perimyokarditis, Brugada-Syndrom, Herzwandaneurysma, Tako-Tsubo-Kardiomyopathie, verfrühte Repolarisation

Schenkelblock
Perimyokarditis
HBM
Takv-Tsubo
↑ K⁺
LE
ICB

LSB ohne akute Ischämie

LSB mit akuter Ischämie

≥1 Ableitung mit
konkordanter

ST-Hebung ≥ 1 mm

≥1 Ableitung von
V1-V3 mit

konkordanter
ST-Senkung ≥ 1 mm


≥1 Ableitung mit
diskordanter

ST-Hebung ≥ 1 mm
und ≥ 25% vom S

V₅, I, aVF


V₁-V₃

V₁-V₃



Überhöhte T-Welle

Oben: Physiologisches EKG. Unten: Deutlich überhöhte, „zeltförmige“ T-Welle. Auftreten: Physiologisch bei hohem Vagotonus („vegetatives T“); pathologisch bspw. bei Hyperkaliämie oder als frühes Infarktzeichen (sog. „Erstickungs-T“).



Stadienhafter Verlauf des STEMI

Schematische Darstellung typischer EKG-Veränderungen im Verlauf eines STEMI.


Es muss betont werden, dass die entsprechenden Veränderungen nicht immer in der hier gezeigten stereotypen Art und Weise ablaufen - beispielsweise kann im chronischen Stadium auch eine T-Negativierung persistieren.

Frühstadium: T-Überhöhung, sog. „Erstickungs-T“.

Stadium 1: Zusätzlich ST-Streckenhebung


Stadium 2: ST-Strecke senkt sich ab. Terminale T-Negativierung, R-Verlust, pathologische Q-Zacke (Breite $\geq 0,03$ Sekunden, Tiefe ≥ 1 mm oder 0,1 mV).

Stadium 3: (chronisches Stadium) Persistierende Q-Zacke. Ggf. persistierende T-Negativierung




12-Kanal-EKG bei Vorderwandinfarkt (STEMI)

12-Kanal-EKG mit 50mm/s Vorschub: Sinusrhythmus; Kammerfrequenz ca. 68/min; Indifferenztyp; Zeiten unauffällig; PQ ca. 180ms, QRS ca. 80ms, QT ca. 400ms; auffällig sind ST-Strecken-Hebungen in aVL und V2-V5; außerdem Q-Zacke in aVL; insbesondere die ST-Hebungen aus der R-Zacke heraus in V3-V5 sind als akute Ischämiezeichen zu bewerten; Diagnose: akuter ST-Strecken-Hebungsinfarkt (STEMI) der Vorderwand im Stadium I.



Anamnese: 77-jähriger Patient mit Herzschrittmacher, der vor einer Woche über Brustschmerzen klagte und aktuell luftnötig ist. EKG (12-Kanal-EKG, Papiervorschub von 50mm/s): Herzfrequenz ca. 90/min, Indifferenztyp (Ableitungen I, II und III positiv, I>II), Verdacht auf Vorhofflimmern bei unregelmäßigem Rhythmus und nicht sicher abgrenzbarer P-Welle, präterminale bis terminale T-Negativierung in den inferioren Ableitungen II, III, aVF, zusätzlich pathologisches Q ($\geq 0,04$ Sek.) in III und aVF, dezente horizontale ST-Streckensenkung in I und V2, deszendierende ST-Senkungen mit präterminal negativem T in V4-V6, Schrittmacherspikes mit typischem schenkelblockartig verbreiterten QRS-Komplexen (rot eingekreist). Diagnose: Großer Hinterwandinfarkt im Zwischenstadium (pathologisches Q und terminale T-Negativierungen in II, III, aVF, spiegelbildlich indirekte Infarkt- bzw. Ischämiezeichen in I, V2 und V4-6), der teilweise durch eine ventrikuläre Herzschrittmacherstimulation maskiert wird.




ICB
LE
ST-Hebung $\uparrow K^+$

- **Extrakardiale Ursachen** : Hyperkaliämie, intrakranielle Blutungen, Lungenembolie
- **Infarktlokalisation**
 - **Vorderwandinfarkt**: RIVA (V1-V4. Ggf. auch V5, V6, I, aVL) *ausgedehnter VWI*
 - **Seitenwandinfarkt**: RCX oder RIVA (V5, V6, I, aVL)
 - **Hinterwandinfarkt**: RCA oder RCX (Inferiorer HWI: II, III, aVF. **Posteriorer HWI**: V7-V9)
- **Zeichen eines älteren Myokardinfarktes** : Pathologische Q-Zacke *Breite > 0.03 ms, Höhe > 1 mm > 0.1 mV*

NSTEMI

- **Signifikante horizontale oder deszendierende ST-Senkungen**: In mind. zwei benachbarten Ableitungen $\geq 0,5$ mm, gemessen am J-Punkt
- **T-Inversion (terminale T-Negativierung)**: In mind. zwei benachbarten Ableitungen (ggf. mit deutlich positivem R oder R/S-Verhältnis >1)



D. Labor

Labordiagnostik

- **Sequentielle Troponinbestimmung**
 - 1. Messung: Bei Erstkontakt
 - 2. Messung: Nach **6 Stunden** bzw. nach **3 Stunden** bei hochsensitiven Assays

| | | Anstieg | Maximum | Normalisierung | Charakteristika |
|----------------|-----------|---------|---------|----------------|---|
| Biomarker | | | | | |
| Troponin T / I | | 3 - 6 h | 12h–4T | 6–14 Tage | - Wichtigster Marker für Herzinfarkt - Herzspezifisch mit hoher Sensitivität |
| Myoglobin | | 3 h | 6–12 h | 24 h | Nicht herzspezifisch |
| Enzyme | | | | | |
| Kreatin kinase | CK-Gesamt | 3–6 h | 12–24 h | 2–3 Tage | Nicht herzspezifisch |
| | CK-MB | | | | Herzspezifisch |

- **Stabile/Instabile Angina Pectoris**: normale Biomarker und Herzenzyme
- **NSTEMI/STEMI**: Erhöhung der Biomarker und Herzenzyme (insb. Troponin positiv)
- **Differentialdiagnosen der Troponin-Erhöhung** :
 - **Kardiale Ursachen**: Myokarditis, Lungenembolie, Tachykardie Herzrhythmusstörungen, Tako-Tsubo-Kardiomyopathie
 - **Nicht-kardiale Ursachen**: Niereninsuffizienz, Schlaganfall, Sepsis

„Infarkttypische Symptomatik sowie entsprechende EKG-Befunde stellen bereits die Indikation zur Koronarangiographie. Diese sollte durch einen ausstehenden Troponinwert nicht verzögert werden!“

Standardlabor

BB, Kreatinin, Kalium, Natrium, Glukose, HbA1C, gesamte Chol, LDL, HDL und TG, Quick-Wert, aPTT, (Ggf. BNP, D-Dimere)

E. Echokardiographie




Beurteilung der globalen und regionalen Myokardfunktion (Wandbewegungsstörungen), Abklärung von Differentialdiagnosen (Aortendissektion, Lungenembolie), Detektion von Komplikationen (Aneurysma, Klappeninsuffizienz, Perikarderguss).

F. Koronarangiographie



Nachweis von Koronarklusion und Möglichkeit zur therapeutischen Intervention

VII. Differentialdiagnosen


- **Kardial** : Perikarditis, Myokarditis, Tako-Tsubo-Kardiomyopathie
- **Pulmonal** : Pulmonalembolie, Pneumonie, Pleuritis, Pneumothorax





Schematische Übersicht über die Koronararterien und ihre Bezüge zu den EKG-Ableitungen



Facies sternocostalis
(ventrale Ansicht)



Facies diaphragmatica
(dorsokaudale Ansicht)




EKG mit akutem Vorderwandinfarkt

73-jähriger Patient nach erfolgreicher kardiopulmonaler Reanimation, der ein akuter Thoraxschmerz und eine Bewusstlosigkeit vorausgegangen war. 12-Kanal-EKG, Papervorschub 25mm/s:

Herzfrequenz ca. 90/min, Sinusrhythmus, Linkstyp, ventrikuläre (A) und supraventrikuläre (B) Extrasystolen, ST-Hebungen in allen Brustwandableitungen sowie in Ableitung I und aVL, am deutlichsten in V2-V4, deutliches Q in V3 (in dieser Ableitung immer pathologisch).

Diagnose: Akuter Vorderwandinfarkt




EKG mit ST-Hebungsinfarkt der Vorderwand

62-jährige Patientin mit Übelkeit und bis in den Thorax ziehenden Oberbauchschmerzen. 12-Kanal-EKG, Papiervorschub 50mm/s: Herzfrequenz ca. 65/min, Sinusrhythmus, Indifferenztyp (I, II und III positiv und I > III), PQ-Zeit ca. 0,14s (normwertig), ST-Streckenhebungen in V2-V6 und angedeutet in I und aVL. Diagnose: Akuter Vorderwandinfarkt

© Urheberrechte






Vorderwandinfarkt in subakutem Stadium

58-jähriger Patient mit intermittierenden retrosternalen Schmerzen seit 2 Tagen. 12-Kanal-EKG, Papiervorschub 50 mm/s: Herzfrequenz ca. 60/min, Sinusrhythmus, Indifferenztyp (Ableitungen I, II und III positiv und I > III), PQ-Zeit noch normwertig mit ca. 0,18 Sekunden; QRS-Komplex nicht verbreitert, in den Ableitungen aVF und V1-4 dezent ST-Streckenhebung; terminale T-Negativierung in V1-5 sowie I und aVL (vertikal bis nach rechts verlaufende Winkelhalbierende, in V4 exemplarisch dargestellt).
Diagnose: Vorderwandinfarkt im Zwischenstadium.





Hinterwandinfarkt

12-Kanal EKG-Befund, Papiervorschub 50mm/s:

Normofrequenter Sinusrhythmus, Steiltyp, signifikante ($>0,1\text{mV}$) ST-Hebungen in II, III, aVF, sowie nicht-signifikanter, erhöhter ST-Strecken-Abgang in V5 und V6 mit spiegelbildlichen ST-Senkungen in I, aVL, V1-4. Entsprechend einem akuten transmuralen Hinterwandinfarkt.



- **Mediastinal** : Aortendissektion
- **Gastrointestinal** : Refluxkrankheit, Ulcus ventriculi, Ösophagusspasmus, akute Pankreatitis
- **Da-Costa-Syndrom** (Herzneurose = funktionelle Herzbeschwerden)

VIII. Therapie

A. Erstmaßnahmen

- Gefäßzugang
- Monitoring (RR, Puls, Pulsoxymetrie, EKG).
- Sauerstoffgabe (per Maske oder Nasensonde) bei Sauerstoffsättigung <90%
- Intramuskuläre Injektionen vermeiden
- Reanimationsbereitschaft: Defibrillator bereithalten, ggf. Elektroden aufkleben
- **Intensivmedizinische Überwachung**: Mind. 24 h erforderlich (nach Reperfusionstherapie)

B. Medikamentöse Therapie

- **Thrombozytenaggregationshemmer**: Acetylsalicylsäure **250 mg i.v.** oder p.o.
+ Ticagrelor 180 mg oral (Alternativ: Prasugrel oder Clopidogrel)
- **Antikoagulans** : Unfraktioniertes Heparin. Alternativ : niedermolekulares Heparin
- **Analgesie und Beruhigung** : Morphin (2,5 - 5 mg i.v.), Diazepam
- **Antianginöse Therapie** (Bei instabiler AP oder NSTEMI): Nitrate (Nitroglycerin sublingual oder i.v.) + Beta-Blocker (Bisoprolol, bei stabilen Patienten) CI bei Bradykardie, HI, Alter >70, Schock, vorbestehende Ca-Kanal-Blockern
- Ggf. **Statine** : Atorvastatin 40-90 mg p.o. ↓ Risiko von Komplikationen
- Ggf. zusätzlich **PPI** ↓ Sauerstoffbedarf

C. Weitere Therapie

STEMI

- **Dringliche Indikation für eine Koronarangiographie** mit folgender **perkutaner transluminaler koronarer Angioplastie (PTCA) = Perkutane Koronarintervention (PCI)**: mit **Ballondilatation** und **Stent-Einlage** (Technik : siehe KHK)
 - Indikationen der primären PCI : Immer, wenn innerhalb von **120 min** verfügbar
 - <12 h nach Symptombeginn
 - >12 h nach Symptombeginn, falls weiterhin Symptome, hämodynamische Instabilität oder Arrhythmien
 - 12-48 h nach Symptombeginn möglich als Routine-PCI
 - **Bevorzugter Zugangsweg**: Radial (vs. femoral).
 - **Bevorzugtes Verfahren**: Stent-Implantation (vs. Ballonangioplastie).
 - **Stent der Wahl**: DES (Drug-eluting-Stent = Medikamentenfreisetzender Stent) der 2. Generation (vs. BMS : Bare-Metal-Stent)
- **Alternativ**: Thrombolytische Therapie („Lysetherapie“) = Fibrinolytika, Thrombolytika (Tenecteplase oder Alteplase i.v.)
 - **Indikation**: wenn PTCA nicht binnen 120 Minuten verfügbar und Beschwerdebeginn <12 Stunden
 - Blutungskomplikationen möglich
 - Bei Fehlgeschlagene Fibrinolyse: Sofortige Angiographie und Rescue-PCI
 - Auch nach erfolgreicher Lyse sollte im Verlauf eine Koronarangiographie erfolgen

NSTEMI

Durchführung einer PTCA innerhalb von **2-72 h** (nach Risikoabschätzung).

Operative therapie (Bypass-Operation)

Bei ungeeigneter Anatomie für eine PTCA

Typische Symptomatik ohne EKG-Veränderungen oder Herzenzym-Nachweis

Stationäre Aufnahme, Überwachung, Kontrolle von EKG und Herzenzymen, Nicht-invasive Diagnostik

6-12 St.

3-6 St

- Monitoring
- O₂
- Zugang
- Blutentnahme
- EKG < 10 m
- Reanimationsbereitschaft
- CCU
- Herz-Kreisl. Beobacht. am
- ASA - Ticagrelor
- UFH
- Morphin
- Nitrat
- B-Blocker
- Statine
- PPS
- STEMI → PCI
- oder - Lysetherapie
- Bypass

Primäre PCI bei NSTEMI [17][18]

- Indikation : Bei hohem Risiko, d.h. anhaltenden ischämischen Symptomen und
 - hämodynamischer Instabilität oder kardiogenem Schock
 - rezidivierenden oder anhaltenden, behandlungsrefraktären Brustschmerzen
 - lebensbedrohlichen Arrhythmien oder Herzstillstand
 - mechanischen Komplikationen des Myokardinfarktes
 - akuter Herzinsuffizienz mit refraktärer Angina oder ST-Streckenveränderungen
 - rezidivierenden dynamischen ST-Strecken- oder T-Wellenveränderungen, insb. bei intermittierender ST-Streckenhebung
 - Patient:innen mit oraler Antikoagulation
 - PCI ohne Pausierung der oralen Antikoagulation
 - Unter VKA: Kein UFH, wenn INR-Wert >2,5
 - Unter NOAK: Zusätzlich niedrig dosiertes parenterales Antikoagulans
 - ASS: Indiziert
 - P2Y₁₂-Rezeptorantagonisten: Vorbehandlung vermeiden
 - Glykoprotein-IIb/IIIa-Antagonisten: Nur bei periprozeduralen Komplikationen
-

Postinterventionelles Vorgehen [13][15]

- Inspektion des arteriellen Zugangsweges
 - Sofort nach Intervention und
 - Im Verlauf nach 2–4 h
- Entfernung des Druckverbandes: Abhängig von Empfehlung des Interventionalisten
- Auskultation: Ausschluss AV-Fistel
 - Duplex-Sonografie: Bei Nachweis eines Strömungsgeräusches
- EKG-Monitoring (telemetrisch): Für mind. 24 Stunden
- Routine-12-Kanal-EKG: Am Folgetag nach Intervention
- Routine-Labor : Blutbild, Gerinnung, CK, Troponin, Kreatinin
- Intensivüberwachung: 24–48 h abhängig von Infarktgröße und klinischem Verlauf
- Transthorakale Echokardiografie
 - Einschätzung der Pumpfunktion: Bei reduzierter linksventrikulärer Funktion medikamentöse Therapieanpassung
 - Ausschluss von Komplikationen
- Postakute KHK-Therapie: Optimierung
- Entlassung: Frühestens nach (48–)72 Stunden

Medikamentöse Fibrinolyse (STEMI)

Eine medikamentöse Fibrinolyse sollte in Deutschland nur in Einzelfällen nach sorgfältiger Risiko-Nutzen-Abwägung unter Einbeziehung von Alternativen (bspw. verspätete primäre PCI) erfolgen!

Allgemeines [13][15]

- Indikation
 - **Primäre PCI nicht binnen 120 min nach STEMI-Diagnose verfügbar und Beschwerdebeginn <12 h zurückliegend**
 - Ggf. „Notfall-Lyse“ bei erfolgloser Reanimation
- Durchführung: Innerhalb von **10 min nach STEMI-Diagnose**
- Verlegung in PCI-Krankenhaus: Sofort nach Fibrinolyse
 - Bei anschließender PCI: DAPT aus ASS + P2Y₁₂-Inhibitor für 12 Monate
- Beurteilung der Wirksamkeit: 60–90 min nach Fibrinolysebeginn
 - Erfolgreiche Fibrinolyse: Angiografie 2–24 h nach Fibrinolysebeginn
 - Fehlgeschlagene Fibrinolyse, Reokklusion oder Reinfarkt: Sofortige Angiografie und Rescue-PCI
- Komplikationen: Schwerwiegende Blutungen möglich (z.B. intrazerebrale Blutung)

Medikamente [13][15]

- Tenecteplase i.v.
 - Alternativen: Streptokinase, Alteplase (tPA), Reteplase (rPA)
- ASS p.o. oder i.v. und Clopidogrel oral
- Enoxaparin i.v., dann s.c.
 - Alternativen: UFH oder Fondaparinux i.v.

15 mg Bolus i.v. / dann über 30 min 0,75 mg/kgKG (bis max. 50 mg) i.v. / dann über 60 min 0,5 mg/kgKG (bis max. 35 mg) i.v.

Kontraindikationen [13][15]

- Absolute Kontraindikationen
 - Vorherige **intrakranielle Blutung** oder Schlaganfall **unbekannter Ursache**
 - **Ischämischer Schlaganfall** in letzten 6 Monaten
 - Verletzung des ZNS, Neoplasien, arteriovenöse Malformation
 - **Trauma/Chirurgie/Kopfverletzung im letzten Monat**
 - **Magen-Darm-Blutung im letzten Monat**
 - **Bekannte Blutungsstörung** (Ausnahme: Menses)
 - **Aortendissektion**
 - Nicht komprimierbare Punktionsstelle in den letzten 24 Stunden
- Relative Kontraindikationen
 - TIA in letzten 6 Monaten
 - Orale Antikoagulation
 - Schwangerschaft oder Entbindung in letzter Woche
 - Refraktäre Hypertonie
 - Fortgeschrittene Lebererkrankung
 - Infektiöse Endokarditis
 - Aktives Magengeschwür
 - Langwierige oder traumatische Reanimation

IX. Komplikationen

A. Frühkomplikationen

- **Plötzlicher Herztod**
- **Herzrhythmusstörungen** : Ventrikuläre Extrasystolen, Ventrikuläre Tachykardien, Kammerflimmern, Vorhofflimmern
- **AV-Block**
- **Akute Linksherzinsuffizienz** : Kontraktionsausfall. Akute Mitralklappeninsuffizienz durch Dysfunktion oder Riss eines Papillarmuskels
- **Rupturen** : Herzwandruptur mit Perikardtamponade. Ventrikelseptumruptur
- **Kardiogener Schock**
- **Pericarditis epistenocardica** („Frühperikarditis“)

B. Spätkomplikationen

- ① **Herzwandaneurysma (Ventrikulaneurysma)**
 - Hinweis: Persistierende ST-Streckenhebungen. Diagnostik: Echokardiographie
 - Komplikationen : Herzrhythmusstörungen, Ruptur, Thrombusbildung → Arterielle Embolie
 - Therapie: Zunächst Antikoagulation, ggf. Operation
- ② **Chronische Herzinsuffizienz**
- ③ **Postmyokardinfarkt-Syndrom** (Dressler-Syndrom, „Spätperikarditis“): autoimmune Genese. Therapie mit NSAR
- ④ **Reinfarkt**

X. Prävention (Sekundärprophylaxe)

D. Allgemeine Maßnahmen

- Tabakkarenz
- Diätetische Maßnahmen, Gewichtsreduktion
- körperliches Ausdauertraining
- Blutdruckeinstellung <140/90 mmHg
- Blutzuckereinstellung (HbA1C < 7 %)

E. Medikamentöse Therapie

- **Thrombozytenaggregationshemmer:**
 - ASS 75–100 mg/d lebenslang.
 - Zusätzlich ein *P2Y₁₂-Rezeptorantagonist* für bis zu 12 Monate (duale Thrombozytenaggregationshemmung). Ticagrelor 90 mg 2×/d (Alternative : Prasugrel oder Clopidogrel)
- **Statine** : z.B. Atorvastatin. Ziel : Senkung des LDL-Cholesterins auf Werte unter 55 mg/dL bzw. eine mindestens 50%ige Reduktion des Ausgangswertes
- **ACE-Hemmer** : Ramipril (oder Sartan) *1.25 mg 1-0-0, Valerian 40mg 1-0-1*
- **Beta-Blocker** : Bisoprolol *1.25 mg 1-0-0*

XI. Prognose

- Die Killip-Klassifikation dient der Prognosebeurteilung in der Frühphase nach einem Myokardinfarkt

| Killip-Klassifikation | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| Killip-Stadium | Ausmaß der Linksherzinsuffizienz | Symptomatik/klinische Zeichen | 30-Tages-Mortalität |
| I | keine | keine | <5% |
| II | mäßig <i>δ</i> | basal betonte Rasselgeräusche, evtl. Auftreten eines 3. Herztons | ≤20% |
| III | schwer | grobblasige Rasselgeräusche über der ganzen Lunge | ≤40% |
| IV | kardiogener Schock | Blutdruck ≤90 mmHg systolisch, Oligurie, periphere Zyanose und Kaltschweißigkeit | ≤90% |

Koronararterielle Bypasschirurgie +/-

Definition



- **Aortokoronarer Bypass (ACB):** Revaskularisierungsverfahren unter Umgehung einer Stenose mittels Graft-Gefäß, das die Aorta mit einer Koronararterie verbindet
- „Als Graft-Gefäß können sowohl Arterien als auch Venen verwendet werden, wobei arterielle Bypässe bessere Langzeitergebnisse erzielen!“
- Ein koronarer Bypass ist eine symptomatische Therapie, keine kurative.

Ablauf/Durchführung

- **Grundprinzip:** Thorakotomie (standardmäßig als komplette mediane Sternotomie) → Erstellung eines extrakorporalen Kreislaufs (Herz-Lungen-Maschine) → Kardioplegische Stilllegung des Herzens → Anastomosierung der Bypassgefäße distal der Stenose der Koronararterie unter Verwendung autologer Gefäße
- **Revaskularisierungsmöglichkeiten**
 - **Arterieller Bypass:** A. thoracica interna: Gute Zugänglichkeit, räumliche Nähe zum Herzen
 - **Aortokoronarer Venenbypass (ACVB):** als Alternative. Vena saphena magna

Indikationⁿ

- Bei persistierender Symptomatik trotz optimaler konservativer Therapie: Jede Stenose >50%
- Hauptstammstenose der linken Koronararterie >90% (bzw. >50%)
- Proximale RIVA-Stenose >50%
- Stenose >50% in der letzten verbliebenen offenen Koronararterie
- Zwei- oder Dreifäßerkrankung mit Stenosen je >50% und LVEF ≤35%
- Nachweis eines großen Ischämiegebietes (Einschränkung der linksventrikulären Funktion >10% und/oder FFR <0,75)



Aortendissektion ++

Definition


- **Auftrennung** der Aortenwandschichten durch **Einblutung** in die Media und **Ausbildung** eines wahren und eines falschen Lumens

Ätiologie (Risikofaktoren) AAA

- Grunderkrankungen : **Arterielle Hypertonie**, **Arteriosklerose**, **Aneurysmata der Aorta**
- Iatrogen
- Genetisch : **Marfansyndrom**, **Bikuspide Aortenklappe**

Klassifikation (Stanford-Klassifikation)

- **Stanford-Typ A**: Betrifft die **Aorta ascendens**
- **Stanford-Typ B**: Betrifft die **thorakale Aorta ab Arcus aortae**
isolierte



Pathophysiologie

- **Einriss der Intima** („Entry“) → Einblutung in die Media mit Bildung eines falschen Lumens.

Symptome/Klinik

- **Symptome der Dissektion**: „**Vernichtungsschmerz**“, **plötzlich einsetzende, stärkste (Brust-)Schmerzen**, ggf. **Rückenschmerzen**
- **Symptome bei Komplikationen**
 - **Malperfusion von Organen**: Symptome einer **Myokardischämie**, eines **akuten Nierenversagens**, **Synkope**, **Neurologische Ausfallerscheinungen**, **periumbilikale, kolikartige Schmerzen (akute Mesenterialischämie)**
 - **Bei akuter Blutung**: **Hämorrhagischer Schock**
 - **Kardiale Symptome bei Dissektion Stanford Typ A**: Symptome einer **Perikardtamponade** oder **akuten Aortenklappeninsuffizienz (akute Herzinsuffizienz)**

Diagnostik

Körperliche Untersuchung

- Evtl. **Puls- und Blutdruckdifferenz** je nach Lokalisation (A. carotis, A. subclavia, A. radialis, A. femoralis)
- **Warnzeichen** bei Dissektion vom Typ A nach Stanford
 - **Pulsdefizite der A. carotis** Differenz zwischen tatsächlicher Herzfrequenz (Auskultation) und peripher palpiertem Puls.
 - **Neu aufgetretenes diastolisches Strömungsgeräusch** über der Aortenklappe

Laboruntersuchungen

- **D-Dimere** : als Entscheidungshilfe vor Bildgebung bei Patienten mit uneindeutiger klinischer Symptomatik
- Troponin, Blutbild , Kreat, ALT/AST, Laktat, LDH, CK, BGA

EKG

- Ausschluss bzw. Differentialdiagnose eines Myokardinfarktes

Bildgebung

- **CT-Angiographie (Thorax, Abdomen, ggf. Hals)** : In den meisten Fällen Mittel der Wahl
 - Darstellung der gesamten Aorta sowie der Dissektionsmembran
- **Echokardiographie**: Transthorakale Echokardiographie (TTE), transösophageale Echokardiographie (TEE)
- **Röntgen-Thorax**: Ggf. Nachweis eines **verbreiterten Mediastinums**
- **Sonographie des Abdomens**: Darstellung der abdominalen Aorta

Differentialdiagnosen

- Siehe: Differentialdiagnose Thoraxschmerzen

Therapie

Allgemeine Maßnahmen


- **Einstellung von Blutdruck und Herzfrequenz:** Ziel-Blutdruck ca. 120 mmHg systolisch, Ziel-Herzfrequenz nahe 60 Schläge/Minute, vorzugsweise Gabe von Betablockern
- **Schmerztherapie:** Analgesie mit Opioiden, insb. Morphin

Chirurgische Therapie

- **Notfall-Indikation**
 - Aortendissektionen vom Typ A nach Stanford
 - Ggf. Akute komplizierter Aortendissektion Typ B nach Stanford
- **Vorgehen:** Offen chirurgische Implantation einer Kunststoffprothese

Thorakale endovaskuläre Aortenreparatur ((T)EVAR)

- **Indikation:** Aortendissektion Typ B nach Stanford
- **Vorgehen:** Zugang über A. femoralis. Einsatz eines Stentgrafts
- **Alternative:** Konservative Therapie (siehe allgemeine Maßnahmen)



Komplikationen

Perforation bzw. Ruptur

- Schock-Symptomatik → Indikation zur Notfalloperation

Spezifische Komplikationen der Stanford-Typ-A-Dissektion

- **Myokardinfarkt** durch Verlegung der Koronararterien
- **Akute Aortenklappeninsuffizienz** (neu aufgetretenes Diastolikum, Dyspnoe)
- **Herzbeutel tamponade** mit kardiogenem Schock
- **Ischämischer Schlaganfall** durch Verlegung hirnversorgender Gefäße

Gemeinsame Komplikationen Stanford-Typ-A- und B-Dissektion

- **Blutung in Thorax** (Hämatothorax), **Mediastinum** und **Abdomen**
- **Pleuraerguss**
- **Synkope** ← *Obstruktion*
- Verlegung von Arterien mit konsekutiver **Ischämie**
 - Truncus coeliacus, A. mesenterica superior/inferior → **Akute Mesenterialischämie**
 - Nierenarterien → **Niereninsuffizienz** bzw. akutes Nierenversagen
 - Extremitätenarterie → **Akute Extremitätenischämie**

Prognose

- 10-Jahres-Überlebensrate bei akuter Dissektion beträgt 50%
- **30-Tage-Letalität**
 - **Typ-A-Dissektion** : Bei konservativer Therapie 60%. Mit Operation 20%
 - **Typ-B-Dissektion** : Bei endovaskulärer Therapie 10%. Mit Operation aufgrund von Komplikationen 30%

Phlebothrombose (Tiefe Beinvenenthrombose) ++


- TVT ist die Entstehung eines Blutgerinnsel in einer tiefen Vene.
- **Virchow-Trias** (begünstigende Faktoren): Veränderung der Blutzusammensetzung (Hyperkoagulation), der Strömungsgeschwindigkeit (Stase) oder Endothelschädigung.

Risikofaktoren

1. Z.n. Phlebothrombose oder Lungenembolie
 2. Immobilisation oder Bettlägerigkeit (wegen Fraktur, Operation, Schlaganfall, Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz, ...)
 3. Aktive Malignome
 4. Adipositas (BMI >30)
 5. Östrogentherapie
 6. Schwangerschaft und Wochenbett *← Kinderbett = Nachgeburtphase*
 7. Antiphospholipid-Syndrom (erworbene Form der Thrombophilie durch Autoimmungenese)
 8. **Hereditäre Thrombophilie** (autosomal-dominant vererbt): Aktiviertes Protein C (APC)-Resistenz (Faktor-V-Leiden-Mutation), Faktor-VIII-Erhöhung, Prothrombin-Mutation, Protein S-Mangel, Protein C-Mangel, Antithrombin-Mangel.
 - Am häufigsten ist die APC-Resistenz.
 - Sehr hohes Risiko für eine TVT, aber sehr selten: APC-Resistenz homozygot, Prothrombin-Mutation homozygot
 - Protein S ist auch während der Schwangerschaft und bei Einnahme von Kontrazeptiva vermindert.
 - Protein C ist auch bei disseminierter intravasaler Gerinnung (DIC) vermindert.
 - Antithrombin ist auch bei DIC, Leberzirrhose, nephrotischem Syndrom vermindert.
- **NB:** Provozierte Thrombose: klare Ätiologie. unprovozierte Thrombose: unklare Ätiologie

Lokalisation der TVT

- **Proximal:** Beckenvenenthrombose (15%). Oberschenkelvenenthrombose (50%). Popliteavenenthrombose (15%)
 - **Distal:** Unterschenkelvenenthrombose (20%)
- Je proximaler eine Thrombose, desto höher das Embolie- und Rezidivrisiko!
- TVT ist häufiger links wegen Kompression der linken V. iliaca communis durch die rechten A. iliaca communis



Symptome/Klinik

- Schwellung, Schmerz, Überwärmung
- Schweregefühl/Spannungsgefühl
- Livide Verfärbung, Verstärkte Venenzeichnung



Sonderformen

Phlegmasia coerulea dolens

- **Definition:** Verschluss aller Venen einer Extremität mit sekundäre Kompression der Arterien
- **Klinik:** Starke Schmerzen und Schwellung, Kalte Extremität, Zyanose, Pulse nicht tastbar
- **Diagnostik:** Duplexsonographie der Beinvenen
- **Therapie:**
 - **Notfalloperation:** Venöse Thrombektomie mit Fasziotomie
 - Fibrinolysetherapie, bei Versagen der operativen Therapie
- **Komplikationen:** Volumenmangelschock, Gangrän, Rhabdomyolyse mit akutem Nierenversagen
- **Prognose:** Hohe Letalität

Tiefe Armvenenthrombose

- **Ätiologie:** Primär im Rahmen eines Thoracic-Inlet-Syndroms. Sekundär („Thrombose durch extreme Belastung des Arms = Paget-von-Schroetter-Syndrom, ZVK, Schrittmachersonde)

Thrombose in Schwangerschaft und im Wochenbett

- **Diagnostik:** Duplexsonographie der Beinvenen. D-Dimere sind praktisch nutzlos
- **Therapie:** niedermolekulares Heparin - mindestens drei Monate, danach in ggf. reduzierter Dosierung bis sechs Wochen nach der Geburt

Katheter-assoziierte Thrombose

- **Therapie:** Antikoagulation für 6-12 Wochen. Passagere Katheter (ZVK, Shaldon-Katheter für Dialyse) werden entfernt. Permanente Kathetersysteme (z.B. Port) werden bei Okklusion oder Infektion explantiert

Diagnostik

Anamnese

Symptome, Risikofaktoren einer TVT

Körperliche Untersuchung

- Schwellung, Ödem, Überwärmung, Beinumfangsdifferenz >3 cm, Sichtbare Kollateralvenen
- **Meyer-Zeichen**: Wadenkompressionsschmerz ✗
- **Homans-Zeichen**: Wadenschmerz bei Dorsalextension des Fußes
- **Payr-Zeichen**: Fußsohlenschmerz bei Druck auf mediale Fußsohle ✗

Bestimmung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer TVT (mittels Wells-Score)

- **Parameter**: Z.n. TVT, Operation oder Immobilisierung, Malignom, Klinische Zeichen einer TVT (Schmerz, Schwellung, Ödem, Beinumfangsdifferenz >3 cm, Sichtbare Kollateralvenen). Alternative Diagnose mind. ebenso wahrscheinlich wie TVT (-2).
- **Interpretation**: 1 Punkt für jedes Parameter
 - <2: TVT unwahrscheinlich. ≥2: TVT wahrscheinlich

Labor

- **D-Dimere**↑ (siehe Lungenembolie)
- BSG-Erhöhung, Leukozytose

Bildgebende Verfahren

- **(Farbduplex-)Kompressionssonographie der Beinvenen**: Goldstandard
 - Die tiefen Beinvenen werden in Abständen von wenigen Zentimetern durch Ausüben von Druck mit dem Schallkopf auf ihre Komprimierbarkeit geprüft
 - Zur Beurteilung der Beckenvenen und V. cava inferior ist Farbduplex hilfreich
- **Weitere bildgebende Verfahren**: CT-Phlebographie, MRT-Phlebographie, konventionelle Phlebographie

Ursachensuche


Tumorsuche:

- Bei Thrombosen mit unklarer Ätiologie (insb. bei Patienten > 50 Jahre).
- Abdomensonographie, Röntgen-Thorax, gynäkologische Untersuchung bei Frauen, ggf. Abdomen- und Thorax-CT

Thrombophilie-Diagnostik:

- Bei jungen Patienten, ungewöhnlicher Lokalisation oder positiver Familienanamnese.
- Mindestens 2 (4?) Wochen nach Absetzen einer Antikoagulation
- Faktor-V-Leiden-Mutation, Prothrombin-Mutation, Protein C, Protein S, Antithrombin, Faktor VIII, Antiphospholipid-Antikörper (Lupus-Antikoagulans, Cardiolipin-Antikörper, Beta-2-Glycoprotein-I-Antikörper)

Diagnostisches Vorgehen



Wells-Score für die TVT (zweistufig)^[1]

| | Symptom/Beobachtungen | Punkte |
|---|--|--------|
| RF | Aktive Neoplasie | 1 |
| RF | Paralyse, Parese oder Immobilisation der verdächtigen Extremität | 1 |
| RF | Kürzliche Bettruhe >3 Tagen und/oder schwerwiegender chirurgischer Eingriff vor <4 Wochen | 1 |
| | Schmerzen/Verhärtung entlang der tiefen Beinvenen | 1 |
| | Geschwollene Extremität | 1 |
| | Einseitig geschwollener Unterschenkel (>3 cm) Vergleich zur Gegenseite, Messung 10 cm distal der Tuberositas tibiae Beinumfangsdifferenz >3 cm | 1 |
| | Ödem mit Dellenbildung | 1 |
| | Vorhandensein von nicht-varikösen oberflächlichen Kollateralvenen | 1 |
| RF | Frühere, dokumentierte TVT | 1 |
| | Existenz einer Alternativdiagnose, welche mindestens so wahrscheinlich ist wie die TVT | -2 |
| Score < 2: geringe Wahrscheinlichkeit für TVT | | 9 |
| Score ≥ 2: hohe Wahrscheinlichkeit für TVT. | | -2 |

| RF | Klinisch | Anamnese |
|---|-----------------------|---------------|
| Malignom | Schmerzen/Verhärtung | |
| Immobilität/Parese | Schwellung | |
| Kürz. Bettruhe _{3T} OP _{4W} | Ödem | Alt. diagnose |
| Z.n. | Einseitige Schwellung | |
| | Kollateralvenen | |
| 3 | 4 | 2 |

Differentialdiagnosen (Sono zur klaren Abgrenzung)

- **Thrombophlebitis**
 - **Definition:** Thrombose und Entzündung einer **oberflächlichen** Vene bzw. einer varikös veränderten Vene (Varikophlebitis)
 - **Klinik:** Kurzstreckige strangförmige (cordon) Rötung, druckschmerzhafte Verhärtung
 - **Therapie:** NSAR (Ggf. NMH), Kühlen, Anlage eines Kompressionsverbandes, Mobilisation.
- **Rupturierte Baker-Zyste** (popliteale Schwellung, Sono: Flüssigkeitsansammlung)
- **Muskelfaserriss/ Hämatom** (Hinweis auf ein Trauma)
- **Kompartiment-Syndrom** (brettharte Muskulatur, neurologische Defizite)
- **Lymphödem** (keine Schmerzen oder ^{keine} livide Verfärbung. **Stemmer-Zeichen:** Hautfalte über den Zehen nicht erhebbar)
- **Erysipel** (keine livide sondern rote Verfärbung, Fieber)

Das **Stemmer-Zeichen** ist ein klinisches Zeichen für das Vorliegen eines **Lymphödems**. Es ist positiv bei fehlender Abhebbbarkeit der **Haut** an den Vorfüßen als Zeichen für ein Lymphödem.



Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- **Kompressionsbehandlung** für mindestens drei Monate (Initial durch elastischen Wickelverband, im Verlauf Kompressionsstrumpf der Klasse II)
- **Symptomadaptierte Mobilisation** – keine Bettruhe!
- Ggf. **Schmerztherapie**

Medikamentöse Therapie

- **Initiale Antikoagulation:** Gabe von niedermolekularem Heparin (NMH) oder Fondaparinux oder direkten oralen Antikoagulantien (Rivaroxaban, Apixaban)
- **Weiterführung der Antikoagulation für mind. 3–6 Monate:** Mit DOAK (1. Wahl) (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban und Dabigatran) oder Vitamin-K-Antagonisten (Phenprocoumon. Ziel-INR 2,0–3,0) oder niedermolekularen Heparinen (bei Malignomen)
- **Dauer der Antikoagulation:** 3–6 Monate, Ggf. länger, je nach individuellem Rezidivrisiko
 - **Nach erstmalig aufgetretener Thrombose:** mindestens 3 Monate
 - 3 Monate bei: Transientem Risikofaktor. Distalen Thrombosen, Armvenenthrombosen, Thrombosen der Vena jugularis interna
 - Eher 6 Monate oder mehr bei: Proximaler Thrombose, relevanter Thrombophilie, Malignom oder unklarer Ätiologie
 - **Bei rezidivierender Thrombose/Lungenembolie:** Verlängerte Erhaltungstherapie über 6 Monate hinaus bei fortbestehenden Risikofaktoren (Unklare Genese. Schwere Thrombophilie. Malignom)

Rekanalisierung

durch operative oder interventionelle Thrombektomie. Insb. bei Phlegmasia coerulea dolens

Vena-cava-Filter

Interventionelle Anlage eines Filters in die Vena cava inferior. Insb. bei Kontraindikation einer Antikoagulation oder Rezidivierender Lungenembolien trotz ausreichender Antikoagulation

Komplikationen

- Lungenembolie
- Postthrombotisches Syndrom
- Rezidiv
- Ausbreiten der Thrombose (bis in die Beckenvenen oder die V. cava inferior)

Prävention (Thromboseprophylaxe)

Basismaßnahmen

Bewegungsübungen, Frühmobilisation, Ausreichende Flüssigkeitszufuhr

Physikalische Maßnahmen

- **Komprimierende Strümpfe**
 - **Anti-Thrombose-Strümpfe:** Druck ohne Bewegung. Für bettlägerigen Patienten
 - **Kompressionsstrümpfe:** Druck bei Bewegung der Beine
- **Kontraindikationen:** Fortgeschrittene pAVK, Phlegmasia coerulea dolens, Dekompensierte Herzinsuffizienz

Medikamentöse Thromboseprophylaxe

- Niedermolekulares Heparin (NMH): Enoxaparin (0,2 oder 0,4ml/d sc)
- Unfraktioniertes Heparin (UFH) : Thrombozytenkontrolle 2×/Woche, Risiko für eine Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT) Typ II. (7500 IE x2/d sc)
- Fondaparinux
- Direkte orale Antikoagulantien (DOAK) : nach Hüft- und Kniegelenksendoprothesen-OP

Risikoadjustiertes Vorgehen

- **Patienten mit niedrigem Thromboserisiko:** Basismaßnahmen + physikalische Maßnahmen
- **Patienten mit mittlerem oder hohem Thromboserisiko:** Zusätzlich medikamentöse Maßnahmen

Lungenembolie ++

Verschluss einer oder mehrerer Lungenarterien durch Einschwemmen von Thromben, seltener Lipiden oder Fremdmaterial über die Blutbahn

Ätiologie

- **Embolie nach Venenthrombose** (Risikofaktoren : siehe TVT)
 - Embolus über die untere Hohlvene nach Bein- oder Becken-TVT (häufig!)
 - Embolus über die obere Hohlvene bei oder nach Anlage eines zentralen Venenkatheters (selten)
- **Fettembolie** während großer operativer Eingriffe (bei Osteosynthese)
- **Luftembolie**
- **Fruchtwasserembolie** (peripartal) Amniotisches Fluid

Malignom
Z.n. TVT, LE
Immobilisation

Malignom
Östrogenantagonie
Schwangerschaft/nachgelagert

Hämophilie
Heparin
Erythrozyten

Pathophysiologie

Obstruktion

Partielle oder totale Verlegung des Lumens einer Pulmonalarterie führt zu:

- **Druckbelastung des rechten Herzens** → Echo
- **Erhöhung des funktionellen Totraumvolumens** → Hypoxämie ($pO_2 \downarrow$)
- **Hyperventilation** → Hypokapnie ($pCO_2 \downarrow$) → Respiratorische Alkalose
- **Minderung des Herzzeitvolumens** → Schock möglich

Symptome/Klinik

Akutes Einsetzen von Symptomen

- Infolge der Erhöhung des funktionellen Totraumvolumens : **Tachypnoe, Dyspnoe**
- Infolge einer begleitenden Pleuritis oder eines Lungeninfarkts : **Atemabhängige Thoraxschmerzen, Hämoptysen, Husten**
- Infolge der Rechtsherzbelastung: **Tachykardie, Hypotonie, Synkope**
- Ggf. **Zeichen einer TVT** (bleibt asymptomatisch in 50% der Fälle)
 - In Narkose: Herzfrequenz \uparrow , RR \downarrow , $SpO_2 \downarrow$, expiratorischer pCO_2 in der Kapnometrie \downarrow

Schmerzen (akut, atemabhängig)
Tachypnoe
Tachykardie
Hypotonie
Husten
Hämoptyse

Diagnostik

Anamnese

Symptome, Risikofaktoren einer TVT

Körperliche Untersuchung


- **Vitalparameter:** RR \downarrow , Herzfrequenz \uparrow , Atemfrequenz \uparrow und $SpO_2 \downarrow$
- **Inspektion:** Gestaute Halsvenen als Zeichen einer Rechtsherzbelastung? Einseitige Beinschwellung als Hinweis auf eine Beinvenenthrombose? Ggf. **Lippenzyanose**
- **Auskultation:** ggf. **gespaltener 2. Herzton**

Bestimmung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer Lungenembolie (mittels Wells-Score)

- **Parameter:** Z.n. Lungenembolie/TVT. Operation oder Immobilisierung < 1 Monat. Malignom. Klinische Zeichen einer TVT. Herzfrequenz > 100/min. Hämoptysen. Lungenembolie wahrscheinlicher als andere Diagnose.
- **Vereinfachte Version :** 1 Punkt für jedes Parameter
 - 0-1: Lungenembolie unwahrscheinlich
 - ≥ 2 : Lungenembolie wahrscheinlich
- **Originalversion :** niedrige, mittlere oder hohe Wahrscheinlichkeit

EKG

- Häufig **Sinustachykardie**
- **Herzrhythmusstörungen:** besonders **Extrasystolen, VHF, ...**
- **Typische Rechtsherzbelastungszeichen**
 - **Sagittale Herzachse :** S_1Q_{III} -Typ oder $S_1S_{II}S_{III}$ -Typ
 - **P-pulmonale** bzw. **P-dextroatriale**
 - (In)kompletter Rechtsschenkelblock
 - T-Negativierung in III und V1-V3 (Ggf. ST-Streckenhebungen)



$S_1 Q_3$

$S_{I, II, III}$
Tachykardie
RSE

Wells-Score für die Lungenembolie

| | Symptome/Beobachtungen | Punkte | Vereinfachte Version ^[1] |
|---|---|--------|-------------------------------------|
| 1 | Klinische Zeichen oder Symptome einer tiefen Beinvenenthrombose | 3 | 1 Punkt |
| 2 | Es gibt keine andere Diagnose, die wahrscheinlicher ist als eine Lungenembolie. | 3 | 1 Punkt |
| 3 | Herzfrequenz über 100/min | 1,5 | 1 Punkt |
| 4 | Immobilisierung (auch nur wenige Tage) oder chirurgischer Eingriff in den vergangenen vier Wochen | 1,5 | 1 Punkt |
| 5 | Vorherige gesicherte tiefe Beinvenenthrombose bzw. Lungenembolie | 1,5 | 1 Punkt |
| 6 | Bluthusten (Hämoptysen) | 1 | 1 Punkt |
| 7 | Tumorerkrankung (in den letzten 6 Monaten behandelt oder Tumor-Palliativtherapie) | 1 | 1 Punkt |



S₁ Q_{III}

Ätiologie
klinisch


- malignom
- Immobilisation
- 2-n. TWT, LE
- HF > 100
- Hämoptyse
- TWT Zeichen Beinodem

0-1: Lungenembolie unwahrscheinlich

≥2: Lungenembolie wahrscheinlich

Kein andere diagnose
RF
Malignom
Immobilisation
2-n.
3


klinisch
HF 7/100
Hämoptyse
TWT-Zeichen
3




Unter einem **P-dextroatriale** versteht man eine pathologische **P-Welle** im **Elektrokardiogramm** (EKG), die bei einer Belastung des rechten Herzvorhofs auftritt.
siehe auch: P-sinistroatriale, P-bjatriale

2 EKG-Befund

Das P-dextroatriale ist gekennzeichnet durch eine erhöhte **Amplitude** ($> 0,20-0,25$ mV) im Sinne einer spitz-überhöhten P-Welle. Diese Veränderung sieht man vor allem in den Ableitungen **II, III** und **aVF**.



T-de:



Labor

- **D-Dimer**↑: Fibrin-Fibrinogen-Spaltprodukte
 - **Geringe Spezifität**: **Nicht** geeignet zur **Bestätigung** einer Lungenembolie
 - **Hohe Sensitivität** und daher hoher **negativer prädiktiver Wert**: Geeignet zum **Ausschluss einer Lungenembolie**
 - **Bestimmung**: sinnvoll bei niedriger und mittlerer Wahrscheinlichkeit, nicht sinnvoll bei hoher Wahrscheinlichkeit
- **Troponin T und BNP**↑: Hinweis auf vermehrte Rechtsherzbelastung → Prognostisch ungünstig
- **Blutgasanalyse**: pO_2 ↓, pCO_2 ↓ durch Hyperventilation infolge der Dyspnoe

Ggf. Röntgen-Thorax

- Zum Ausschluss anderer Ursachen (**nicht indiziert, wenn eine CT-Angiographie geplant ist**)
- **Mögliche radiologische Zeichen einer Lungenembolie**
 1. Atelektasen
 2. **Hampton's hump** (keilförmige Transparenzminderung) = Zeichen eines Lungeninfarkts →
 - **Westermarck-Zeichen** (Transparenzerhöhung)
 - Zwerchfellhochstand
 - Pleuraerguss
 - Prominente zentrale Pulmonalarterien mit Kalibersprung
 - Kardiomegalie

Bildgebende Verfahren

- **CT-Angiographie (CTA): Mittel der 1. Wahl**
 - Kontrastmittel-Darstellung der Pulmonalarterien
 - **Hohe Sensitivität** und direkter Nachweis der pulmonalarteriellen Verschlüsse
- **Perfusions- und Ventilationsszintigraphie der Lunge**
 - Alternative zur CT-Angiographie bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz und entsprechender Kontraindikation für eine i.v. Kontrastmittelgabe
 - **Perfusionsausfälle bei regelrechter Ventilation** des betroffenen Lungenareals (sog. „Mismatch“)
- **Echokardiographie**
 - Vorteil: Nicht-invasive, schnell verfügbare Untersuchung
 - Detektion von **Rechtsherzbelastungszeichen**: **Dilatation** und **Hypokinesie** des rechten Ventrikels. Systolischer Pulmonalarteriendruck↑
- **Kompressions- und Farbduplexsonographie der Beine (und ggf. Arme)**: Abklärung TVT

Ursachensuche

Thrombophilie-Screening und/oder Malignom-Suche (siehe TVT)

Diagnostisches Vorgehen

Ist der Patient hämodynamisch stabil?

Stabiler Patient (= Stabiler systolischer Blutdruck > 90 mmHg)

Einschätzen der klinischen Wahrscheinlichkeit, dass eine LE vorliegt:

- **Hohe Wahrscheinlichkeit** → Angio-CT → Nachweis/Ausschluss
- **Niedrige/mittlere Wahrscheinlichkeit** → Bestimmung der D-Dimere
 - Negative D-Dimere → Ausschluss
 - Positive D-Dimere → Angio-CT → Nachweis/Ausschluss


Instabiler Patient (= Reanimationspflichtigkeit **oder** Kardiogener Schock **oder** persistierende Hypotonie)

Ist der Patient stabil genug für ein Angio-CT?

- **Stabil genug** → Angio-CT → Nachweis/Ausschluss
- **Nicht stabil genug für CT** → Echokardiographie
 - Keine rechtsventrikuläre Dysfunktion → Ausschluss (andere Ursache der Instabilität suchen)
 - Rechtsventrikuläre Dysfunktion → CT falls doch möglich, sonst → Behandlung wie Nachweis (Lyse)


Faktor V, III
Protein C, S
Antithrombin
Prothrombin
APC

Sono Abd., Do Th., ggf. Gyn., ggf. CT Abd.-Th.



Embolie-Zeichen




nach Konietzki/Fendel




Emboliezeichen (schematische Skizze (modifiziert nach Konietzki/Wendel/Wiesner):

- 1: **Zwerchfellhochstand** oder verminderte Atemexkursionen auf der Embolieseite
- 2: Winkelerguß auf der Embolieseite
- 3: Infiltrate unterschiedlichster Morphologie, zB. rund oder peripher keilförmig. Beim anämischen Lungeninfarkt können bis zu mandarinengroße, scharf berandete Herde entstehen.
- 4: Gefäßverengung durch Oligämie im postokkludierten Bereich (Hilusamputation, Westermarck-Zeichen)
- 5: Hyperämie auf der kontralateralen Seite
- 6: **Rechtsherzvergrößerung**
- 7: dilatierte Cava superior, evtl. auch der V. azygos
- 8: Kugelinfiltrate
- 9: Dystelektasen


Hampton's hump






Lungenembolie


CT-Thorax axial nach KM-Applikation: KM-Aussparung in der rechten Lungenarterie im Sinne eines weitgehend okkludierenden (Thromb-)Embolus (1). Wandständiges Material in einer Lappenarterie links (2).






Lungenembolie (1/3)


CT-Thorax axial nach KM-Applikation: Multiple Kontrastmittel-Aussparungen in den Pulmonalarterien. Diagnose: Lungenembolie.





Lungenembolie (3/3)

CT-Thorax axial nach KM-Applikation: Multiple Kontrastmittel-Aussparungen in den Pulmonalarterien. Diagnose: Lungenembolie.
Zur Orientierung: Aorta ascendens (A), Aorta descendens (D), Truncus pulmonalis (T) und Vena cava superior (V).



Pulmonalisangiographie links


Minderperfusion (schraffierte Fläche) im Bereich des linken Unterlappens (Cave! Das Bild ist invertiert. Folglich zeigen sich mit Kontrastmittel gefüllte Gefäße schwarz, beispielhaft um die Emboliezone verdeutlicht. Die rechte Lunge erscheint komplett weiß, da nur in die linke Pulmonalarterie Kontrastmittel appliziert wurde).

Definition

Das **Westermarck-Zeichen** ist ein **radiologisches Zeichen** im **Röntgen-Thorax**, das auf eine **Lungenembolie** hinweist.

2 Morphologie

Das Westermarck-Zeichen beschreibt ein **fokal hypertransparentes** Lungenareal, das aufgrund einer **Oligämie distal** des Gefäßverschlusses entsteht. Die zentralen Lungengefäße **proximal** des **Embolus** können gleichzeitig **dilatiert** sein.



Dieses Video zeigt einen Patienten mit einer akuten **Lungenembolie**. Bitte beachten Sie, dass der rechte Ventrikel keine Hypertrophie zeigt, da es sich um eine akute Druckbelastung handelt.

Ein **Thrombus** ist nur selten sichtbar, allerdings lassen sich häufig **Rechtsherzbelastungszeichen** im Echo darstellen.

Auf folgende echokardiographischen Zeichen sollte bei V.a. auf eine **Lungenembolie** geachtet werden:

- **Rechtsventrikuläre Dilatation** und rechtsventrikuläre Wanddicke (bei akutem Geschehen ohn vorherige RV- Belastung eher normwertig).
- Rechtsventrikuläre **Dysfunktion**
- D-Shaping bzw. **paradoxe Septumbewegung**
- **Dilatierte Pulmonalarterien**
- **Erhöhte rechtsventrikuläre Drücke**
- **Größe und Atemvariabilität der Vena cava inferior**
- **McConnell Zeichen** (erhaltene Kontraktion apikal)

**Verdacht auf
Lungenembolie (LE)**

Basisuntersuchungen
(Vitalparameter, EKG)

Patient hämodynamisch
stabil?

RR syst.
>90mmHg

ja

Wells-Score

Mittlere/geringe
Wahrscheinlichkeit
für LE

D-Dimere

negativ

**LE
ausgeschlossen**

Weitere
Diagnostik

Hohe
Wahrscheinlichkeit
für LE

Angio-CT

Keine pulmonale
Embolie

Pulmonale
Embolie

**Vorliegen einer
LE**

Therapie
einleiten

RR syst. < 90mmHg oder
RR-Abfall >40mmHg (>15min)

nein

Bildgebung!

Pat. stabil genug
für CT

Pat. nicht
stabil genug
für CT

Echokardiographie

Rechts-
ventrikuläre
Dysfunktion

Keine
rechtsventrikuläre
Dysfunktion

**Fulminante LE
ausgeschlossen**

Weitere
Diagnostik

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Halbsitzende Lagerung
- Sauerstoffgabe *6L unter Pulsoxymetrie-Monitoring*
- Analgesie bei Schmerzen : Bspw. Morphin *1-5 mg iv od. 5mg s.c*
- Ggf. Anxiolyse : Bspw. Diazepam *1-3 mg iv*
- Verlegung auf Intensivstation

Spezifische Therapie

Bei Lungenembolie ohne akute Lebensgefahr: **Therapeutische Antikoagulation**

- **Initiale Antikoagulation:** Gabe von niedermolekularem Heparin (NMH) oder Fondaparinux oder unfractioniertem Heparin (UFH) oder direkten oralen Antikoagulantien (Rivaroxaban, Apixaban)
- **Weiterführung der Antikoagulation für mind. 3–6 Monate:** Mit DOAK (1. Wahl) (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban und Dabigatran) oder Vitamin-K-Antagonisten (Phenprocoumon. Ziel-INR 2,0–3,0) oder niedermolekularen Heparinen (bei Malignomen)
- **Dauer der Antikoagulation:** 3–6 Monate: Ggf. länger, je nach individuellem Rezidivrisiko (siehe TVT) *lebenslang bei rezidivierender TVT od. LE*

UFH
NMH
Fondaparinux
DOAK

3M Thrombot RF
6M Tumor
Hämophilie

Bei massiver Lungenembolie mit Lebensgefahr: **Rekanalisierende Maßnahmen**

- **Thrombolyse** *lRR, Schock, Kammerflimmern*
 - **Indikation:** Bei hämodynamischer Instabilität und Reanimationspflichtigkeit
 - **Durchführung:** Fibrinolyse, vorzugsweise mit Alteplase
 - **Komplikationen:** insb. Blutung
 - **Kontraindikationen:** siehe Schlaganfall (Bei Reanimationspflichtigkeit gibt es keine Kontraindikationen für eine systemische Lysetherapie)
 - **Bei Blutung unter Lyse-Therapie:** Sofortiger Abbruch der Lysetherapie. Gabe von Aprotinin als Antidot. Protamin zur Antagonisierung von Heparin. Ggf. Gabe von Fresh frozen Plasma (FFP)
- **Alternative: Operation/Intervention**
 - **Indikation:** bei Kontraindikation für eine Thrombolyse oder wenn Thrombolyse nicht erfolgreich
 - **Durchführung:**
 - Operative Entfernung unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine
 - Alternativ: Interventionelle, kathetergestützte Embolektomie
- **Antikoagulation**

15 mg Bolus i.v., dann über
30 min 0,75 mg/kgKG (bis
max. 50 mg) i.v., dann über
60 min 0,5 mg/kgKG (bis
max. 35 mg) i.v

Komplikationen

- **Rechtsherzversagen**
- **Hohe Rezidivgefahr** (ohne Antikoagulation ca. 30%)
- **Chronisch-thromboembolische pulmonale Hypertonie** als Folge von Rezidiven bzw. ungenügender Rekanalisation der Lungenarterien
- **Atelektase**
- **Lungeninfarkt** (Ggf. Infarktpneumonie)

Tab. 3.2 Stadieneinteilung der Lungenembolie

| | Schweregrad I | Schweregrad II | Schweregrad III | Schweregrad IV |
|--|---|--|---------------------------------------|---|
| Pathologie | Verschluss peripherer Äste | Verschluss von Segmentarterien | Verschluss eines Pulmonalarterienasts | Verschluss des Pulmonalishauptstamms oder mehrerer Lappenarterien |
| Klinik | diskrete Symptomatik (evtl. Dyspnoe, retrosternale Schmerzen) | akute Dyspnoe, Tachypnoe, Thoraxschmerz, Angst | Thoraxschmerz, Angst | Schock, Herz-Kreislauf-Stillstand |
| pulmonalarterieller Mitteldruck | normal | normal oder leicht erhöht | 25–30 mmHg | > 30 mmHg |
| PaO₂ | normal | evtl. leicht ↓ | < 70 mmHg | < 60 mmHg |
| Therapie | Antikoagulation • niedriges und mäßiges Risiko: niedermolekulares Heparin (z. B. Enoxaparin s. c. 1 mg/kg alle 12 h) oder Fondaparinux (ca. 5–10 mg s. c.) • hohes Risiko: unfractioniertes Heparin 5000–10000 IE als Bolus, dann 400 IE/kg KG/d • danach Umstieg auf orale Antikoagulation; s. auch Gefäße S. 106 | | | symptomatisch: kardiopulmonale Reanimation, Schockbehandlung kausal: systemische Thrombolyse (außer bei absoluter Kontraindikation), Katheterfragmentation, operative Thrombarterienektomie (selten) |

2. Rekanalisation :

- **systemische Fibrinolyse** mit Streptokinase, Urokinase oder rekombinantem Gewebe-Plasminogenaktivator (indiziert bei **massiver LE**)
 - absolute Kontraindikationen: z. B. Insult (hämorrhagisch, ischämisch), Schädel-Hirn-Trauma, hämorrhagische Diathese, Aortendissektion, schweres Trauma innerhalb der letzten 3 Wochen
 - relative Kontraindikationen: z. B. TIA innerhalb der letzten 6 Monate, orale Antikoagulation, Schwangerschaft, aktives gastrointestinales Ulkus
- Thrombusfragmentation über Katheter, evtl. mit lokaler Lyse (indiziert bei massiver LE)
- operative Embolektomie (hohe Letalität, indiziert bei Versagen anderer Maßnahmen).

3.2.1 Sonderformen der Lungenembolie

Fettembolie: Sie tritt als Komplikation bei (multiplen) Frakturen langer Röhrenknochen auf oder ist Folge einer Überlastung des venösen Lipoproteinen-Emulgatorsystems. Zur Fettembolie kann es z. B. auch beim Einbringen einer Endoprothese kommen, wenn durch den mechanischen Druck fetthaltiges Material aus dem Mark in die Blutbahn kommt. In der BAL können fetthaltige Makrophagen nachgewiesen werden. Zusätzlich zur respiratorischen Insuffizienz können **petechiale Hauteinblutungen** oder eine zerebrale Funktionsstörung auftreten (da häufig Fettübertritt in den großen Kreislauf).

Luftembolie: Zur Luftembolie kommt es, wenn Luft in das venöse System eintritt, wie z. B. bei **Verletzungen großer Venen** oder **iatrogen bei einer Infusionstherapie**. Es bildet sich ein Blutschaum, der dann die pulmonale Endstrombahn verstopft. Die Luft kann in der Sonografie oder im CT nachgewiesen werden. Die **Dekompressionskrankheit** bei Tauchern stellt eine Sonderform dar.

Fruchtwasserembolie: Sie entsteht, wenn **während der Geburt** Amnionflüssigkeit ins mütterliche venöse Blut übertritt. Reaktiv wird eine Hyperfibrinolyse mit anschließender Verbrauchskoagulopathie ausgelöst (s. Gynäkologie S. B 402).

Herzinsuffizienz ++

Bei einer Herzinsuffizienz reicht die Pumpleistung des Herzens nicht aus, um den Blutkreislauf normal zu erhalten.

Ätiologie

- ☉ KHK
- ☉ arterieller Hypertonie
- ☉ Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern)
- ☉ Herzklappenfehler : Aortenklappenstenose, Aortenklappeninsuffizienz, Mitralklappeninsuffizienz
 - **Seltenere Ätiologien** : Kardiomyopathien (dilatativ, hypertroph oder restriktiv). Myokarditis. Systemische Erkrankungen (Amyloidose). Medikamente (Anthrazykline, Trastuzumab). Drogen (Kokain, Alkoholabusus)

Klassifikation

Diagnostische Klassifikation der ESC

(European Society of Cardiology)

- **HF_rEF** (Herzinsuffizienz mit reduzierter EF): Linksventrikuläre EF <40% und Symptome der Herzinsuffizienz
- **HF_{mr}EF** (Herzinsuffizienz mit mittelgradiger EF): Linksventrikuläre EF 40–49%
 - **Weitere Kriterien** : Symptome der Herzinsuffizienz. NT-proBNP↑ und/oder BNP↑.
- **HF_pEF** (Herzinsuffizienz mit erhaltener EF): Linksventrikuläre EF ≥50%
 - **Weitere Kriterien** (s.o.)

Weitere Möglichkeiten der Einteilung

- **Nach betroffenem Herzteil** : Linksherzinsuffizienz. Rechtsherzinsuffizienz. Globalinsuffizienz
- **Nach Verlauf/Zustand** : Akut vs. Chronisch. Kompensiert vs. dekompensiert
- **Nach Pathophysiologie**
 - Systolische Herzinsuffizienz → Reduzierte Ejektionsfraktion (HF_rEF)
 - Diastolische Herzinsuffizienz → Relaxationsstörung des Ventrikels (HF_pEF)
 - Kombinierte systolische und diastolische Ventrikelfunktionsstörungen

Symptome/Klinik

Allgemeinsymptome

- Schwächegefühl und Leistungsminderung, Nykturie, Tachykardie

Symptome der Linksherzinsuffizienz

- Dyspnoe (zunehmend von Belastungsdyspnoe bis Ruhedyspnoe mit Orthopnoe); Tachypnoe
- (Nächtliche) Hustenanfälle mit Dyspnoe (= „Asthma cardiale“)
- Pulmonale Stauung / Pleuraergüsse. Lungenödem
- Renale Perfusions- und Funktionsminderung
- Zerebrale Minderperfusion (gestörte Vigilanz und Verwirrtheit)

Symptome der Rechtsherzinsuffizienz

- Beinödeme
- Hepatomegalie, Leberkapselspannungsschmerz. Evtl. Ikterus, Aszites
- Sichtbarer Halsvenenstauung, hepatojugulärer Reflux

Stadien : NYHA-Klassifikation (New York Heart Association)

| | |
|------------|--|
| I | <u>Keine Beschwerden</u> (Herzerkrankung <u>ohne körperliche Limitation</u>) |
| II | Beschwerden bei <u>stärkerer</u> körperlicher Belastung (z.B. <u>zwei Stockwerke</u> Treppensteigen) |
| III | Beschwerden bei <u>leichter</u> körperlicher Belastung (z.B. <u>ein Stockwerk</u> Treppensteigen) |
| IV | Beschwerden <u>in Ruhe</u> |

Als **Hepatojugulärer Reflux** wird die Anstauung der oberflächlichen Halsvene (*Vena jugularis externa*) bei Druck auf **den oberen Bauchraum** (Epigastrium, „auf die Leber“) bezeichnet. Diese Form des venösen Rückstaus (Reflux) ist ein möglicher Hinweis auf eine Rechtsherzinsuffizienz.

Zur Durchführung wird für eine Minute ein kontinuierlicher Druck auf das Epigastrium ausgeübt und dabei das Verhalten der *Vena jugularis externa* beobachtet. Beim Gesunden kommt es durch den Druckanstieg im Bauchraum zu einer kurzzeitigen Anstauung der Halsvene, die jedoch nach wenigen Sekunden wieder verschwindet. Bei Rechtsherzinsuffizienz kann dagegen das Blut nicht vom Herz abtransportiert werden und die Stauung bleibt bestehen.

Diagnostik

Anamnese

- Symptome, Vorerkrankungen (KHK), Familienanamnese, Alkoholkonsum, Medikation

Körperliche Untersuchung

- **Palpation des Herzens:** Ggf. verlagerter und verbreiteter Herzspitzenstoß
- **Auskultation des Herzens:** Herzgeräusche als Hinweis auf ein Klappenvitium, 3. Herzton (Galop-Rhythmus)
- **Auskultation der Lunge:** Feuchte Rasselgeräusche (bei alveolärem Lungenödem), Pleuraerguss
- **Pulsqualität:** Ggf. Pulsus alternans (wechselnde syst. BD von Pulsschlag zu Pulsschlag)
- **Prüfung des hepatojugulären Reflux:** Prolongierte sichtbare Halsvenenstauung durch Druck auf den Bauchraum → Erhöhte ZVD-Werte (bei Rechts- oder Globalherzinsuffizienz)

Apparative Diagnostik

EKG

- Unspezifisch
- Zeichen der linksventrikulären Hypertrophie (positiver Sokolow-Lyon-Index > 3,5 mV).
- Q-Zacken oder R-Verlust als Hinweis auf einen abgelaufenen Infarkt.
- Vorhofflimmern/-flattern, ventrikuläre Arrhythmien, Sinustachykardie
- Linksschenkelblock, AV-Block.
- Niedervoltage (Perikarderguss).

Die jahrelange Hypertonie hat zu einer Linksherzhypertrophie geführt, da der linke Ventrikel gegen einen erhöhten Druck anarbeiten musste. Typische Linksherzhypertrophiezeichen im EKG sind ein Linkslagetyt, Druckhypertrophiezeichen mit T-Negativierungen und positivem Sokolow-Lyon-Index in den linksthorakalen Ableitungen V4-V6 und ischämiebedingte ST-Streckenhebungen linkspräkordial.

$$EF = \frac{SV}{EDV} \times 100$$
$$EF = \frac{(EDV - ESV)}{EDV} \times 100$$

Echokardiographie

- Bestimmung der Linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF) (Normalbefund : ≥54% für Männer; ≥52% für Frauen)
- Bestimmung des enddiastolischen und des endsystolischen Durchmessers und der Ventrikeldicke
- Beurteilung der Herzklappen und der Wandbewegungen (Regionale Wandbewegungsstörungen bei Ischämie)
- Beurteilung der diastolischen Funktion und der Beurteilung der Rechtsherzbelastung: Detektion einer akuten oder chronischen Rechtsherzbelastung
- Füllungszustand der Vena cava inferior

Röntgen-Thorax

- Kardiomegalie : Herz-Thorax-Quotient >0,5
- Pulmonale Stauungszeichen (bei Linksherzinsuffizienz) :
 - Gestaute Hilusgefäße. Basaler Pleuraerguss
 - Lungenödem
 - Alveoläres Lungenödem: Sog. „Schmetterlingsödem“ (perihilär)
 - Interstitielles Lungenödem: Interstitielle Verschattungen, Kerley-B-Linien

Labor

- BB, Harnstoff, Kreatinin (mit geschätzter GFR), Natrium, Kalium, Glucose, HbA1c, Leberfunktionstests (GOT, GPT, GGT, Bilirubin), Lipidprofil, Ferritin, TSH, ± Troponin
- Natriuretische Peptide : BNP oder NT-proBNP :
Differentialdiagnosen bei erhöhtem BNP/NT-proBNP : Herzinsuffizienz, Nieren-/Leberinsuffizienz
Pulmonale Hypertonie, Lungenembolie

Ggf. Kardio-MRT

- Beurteilung der myokardialen Struktur und Funktion
- Charakterisierung des Myokardgewebes bei Verdacht auf Myokarditis, Amyloidose, Sarkoidose, und Hämochromatose

Ggf. Stress-Echokardiographie

Beurteilung der myokardialen Ischämie und Vitalität bei Patienten mit Herzinsuffizienz und KHK vor der Entscheidung zur Revaskularisation

Invasive Diagnostik

- **Koronarangiographie**: um die Diagnose einer KHK zu sichern und ihren Schweregrad zu ermitteln (ggf. Rechtsherzkatheteruntersuchung)
- **Endomyokardbiopsie** (nur wenn eine therapeutische Konsequenz zu erwarten ist)

Therapie

Chronische Herzinsuffizienz

Allgemeine Maßnahmen

- **Kausale Therapie**: Behandlung der aHT, Myokarditis, KHK, Vitien
- **Lebensstiländerungen**:
 - Moderates körperliches Training (Bei stabiler Herzinsuffizienz), Bettruhe
 - (Bei dekompensierter Herzinsuffizienz)
 - Gewichtsreduktion und Gewichtskontrolle (bei Gewichtszunahme von 2 kg innerhalb von 3 Tagen → Arztbesuch)
 - Kochsalzarme Ernährung, **Flüssigkeitsrestriktion** (bei Ödemen)
 - Noxenkarenz (Nikotin, Alkohol, Drogen, **NSAR**)
- **Impfungen**: gegen Pneumokokken und Influenza

- Kausale Tx
- Lebensstiländerungen
- Impfung
- Medik.
- Invasiv

Medikamentöse Therapie (HFrEF)

| Medikament | NYHA-Stadium | | | | Indikationen |
|---|--------------|-----|-----|-----|--|
| | I | II | III | IV | |
| 1 ACE-Hemmer <i>Ramipril 2,5mg 1-0-0 max. 10mg</i> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - Bei EF ≤40%, unabhängig vom NYHA-Stadium - AT ₁ -Blocker, als Alternative wenn ACE-I nicht vertragen / kontraindiziert ist <i>AT 1 -Rezeptorantagonist (Syn.: Angiotensin-II- Rezeptorantagonist, Sartan). z. B. Candesartan, Losartan, Valsartan - 40mg 1-0-1 max. 160mg</i> |
| 2 Beta-Blocker <i>Bisoprolol 1,25g 1-0-0 max. 10mg</i> | (✓) | ✓ | ✓ | ✓ | - Bei EF ≤40% in NYHA-Stadien II-IV indiziert - Bei Z.n. Herzinfarkt oder aHT und EF ≤40% bereits ab Stadium I |
| 3 Aldosteronantagonisten <i>Spironolacton 2,5mg 1-0-0 4-8mal täglich 50mg 1-0-0</i> | | ✓ | ✓ | ✓ | - Bei EF ≤35% in NYHA-Stadien II-IV (symptomatische Patienten) trotz Gabe von ACE-Hemmern und Beta-Blockern indiziert <i>Kt bei Krea. > 2,5, Aht beachten</i> |
| 4 Schleifen- oder Thiazid-Diuretika <i>Furosemid 20mg 1-1-0 immer 2/Tag max. 20mg/1 HCT 12,5mg 1-0-0 im Verlauf 25mg max. 100/Tag</i> | | (✓) | (✓) | (✓) | - Bei Stauungs-Zeichen und/oder -Symptomen <i>↓ Kt beachten</i> |
| 5 If-Kanal-Hemmer (Ivabradin) <i>2,5mg 1-0-1 bei HF 50-60 5mg 1-0-1 max. 7,5mg 1-0-1</i> | | (✓) | (✓) | (✓) | - Bei EF ≤35%, in NYHA-Stadien II-IV, Sinusrhythmus und Ruhe-Herzfrequenz ≥70/min (als Assoziation mit B-Blocker oder als Alternative zu B-Blocker) <i>zur Senkung der Herzfrequenz bei KHK oder Herzinsuffizienz, wenn β-Blocker kontraindiziert sind oder nicht ausreichend wirken</i> |
| 6 Neprilysin-Inhibitoren (ARNI) | (✓) | (✓) | (✓) | (✓) | - Ersatz für ACE-Hemmer bei Patienten, die trotz optimaler Therapie mit einem ACE-I, Betablocker und MRA symptomatisch bleiben und EF ≤35% |

ARNI: Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor; Fixkombination: Valsartan und Sacubitril.

Invasive Therapie (HFrEF)

- **Implantierbarer Kardioverter-Defibrillator (ICD)**:
 - **Primärprophylaxe**: indiziert bei symptomatischer Herzinsuffizienz (NYHA II-III) und EF ≤35% trotz optimaler medikamentöser Therapie (OMT)
 - **Sekundärprophylaxe**: indiziert nach überlebtem plötzlichem Herztod oder nach ventrikulärer Rhythmusstörung, die zur hämodynamischen Instabilität führte
- **Kardiale Resynchronisationstherapie (CRT)**:
 - Bei symptomatischer Herzinsuffizienz (NYHA II-III), im **Sinusrhythmus**, EF ≤35% trotz OMT mit: einer QRS-Dauer ≥ 120 msec mit LSB-QRS-Morphologie oder einer QRS-Dauer ≥ 150 msec mit nicht-LSB-QRS-Morphologie
- **Herztransplantation**: Als Ultima ratio

Sinus Rhythmus
EF < 35% NYHA II-IV
4 QRS Dauer

If-Kanal-Hemmer: Ivabradin

- Wirkung: **Frequenzsenkung** über Blockierung des If-Kanals in den Schrittmacherzellen des Sinusknotens

ACE-Hemmer bei Herzinsuffizienz

- Indikation
 - **Basistherapie in allen Stadien**
- Gebräuchliche Wirkstoffe
 - Ramipril 2.5mg 1-0-0, max 10mg/T
 - Enalapril 2.5mg 1-0-1, max 20mg/T
 - Schrittweise Dosissteigerung alle 2-4 Wochen
- Therapieüberwachung
 - Laborkontrollen: Kreatinin, Harnstoff, Natrium und Kalium vor Therapiebeginn, 1-2 Wochen nach Therapiebeginn und 1-2 Wochen nach Etablierung der individuellen Zieldosis; danach alle 3 Monate oder akut bei Dekompensationszuständen
- Fallstricke bei der ACE-Hemmer-Therapie
 - Umgang mit häufigen Nebenwirkungen

■ Hyperkaliämie

- Tolerabler Bereich: Bis 5,5 mmol/L, bei höheren Werten therapeutische Intervention
 - > 5,5 mmol/L bis < 6 mmol/L: Therapie der Hyperkaliämie
 - > 6 mmol/L: Notfalltherapie der Hyperkaliämie
- Ggf. Absetzen oder Dosisreduktion von
 - Kaliumsparenden Diuretika (Triamteren, Amilorid)
 - Aldosteron-Antagonisten
- Weitere Ursachen bedenken

■ Schwere Niereninsuffizienz

- Asymptomatischer, milder Kreatinin-Anstieg: Keine Therapieänderung
- Kreatinin-Anstieg um 50% des Ursprungswerts bzw. >266 µmol/L (>3 mg/dL): Akzeptabel, sofern Nierenfunktion klinisch ausreichend ist (Diurese prüfen!)
- Maßnahmen bei kritischem Kreatinin-Anstieg
 - Absetzen anderer nephrotoxischer Medikamente wie NSAR
 - Reduktion der Diuretikadosierung, sofern keine Stauungszeichen vorhanden sind
 - Ggf. Halbierung der ACE-Hemmer-Dosis oder absetzen, wenn schlechte Nierenfunktionsparameter persistieren
- Ggf. Neigung zur symptomatischen Hypotonie
 - Dosisreduktion oder versuchsweise abendliche Gabe einer reduzierten Dosis
- Unverträglichkeit von ACE-Hemmern
 - Bei Reizhusten: Wechsel auf ein Sartan (Angiotensin-Rezeptor-Blocker)
 - Valsartan 40mg 1-0-1, max 160 1-0-1
 - Candesartan 4mg 1-0-0 max 32mg 1-0-0
 - Losartan

Betablocker bei Herzinsuffizienz

- Indikation
 - Basistherapie in den Stadien **NYHA II-IV**
 - In allen NYHA-Stadien: Bei z.n. Myokardinfarkt indiziert, bei Hypertonie als Option
- Gebräuchliche Wirkstoffe und Dosierung
 - Individuelle Zieldosierungen: Dosis, die zu einer Ruhe-Herzfrequenz von 60–70/min führt
 - Bisoprolol *1. Dos 1-0-0 max 10 1-0-0*
 - Metoprolol *25-25 ~ ~ 190 ~*
 - Carvedilol
 - Nebivolol
 - Intervall der Dosissteigerung: Alle 1–2 Wochen, sofern eine gute Verträglichkeit besteht
- Fallstricke bei der Betablocker-Therapie
 - **Asthma bronchiale** ist eine Kontraindikation, eine COPD hingegen nicht
 - **Bradykardie-Neigung**: Größte Vorsicht ist bei der Eindosierung geboten!
 - Klinische Verschlechterung möglich: Regelmäßige Kontrollen des Blutdruckes und der Klinik (Ödeme, Gewicht ↑), bei Verschlechterung:
 - Ggf. Stopp der Aufdosierung und Zurücksetzen auf die letzte unkomplizierte Dosis, erneuter Steigerungsversuch kann nach 2 Wochen erwogen werden
 - Bei Zunahme einer Stauungssymptomatik kann versuchsweise die Diuretikadosierung erhöht werden
 - Bei symptomatischer Hypotonie: Versuch der Reduktion von Diuretika, ggf. Reduktion und Absetzen einer vorbestehenden Therapie mit Nitraten und Calciumantagonisten vom Nifedipin-Typ




ABB. 7.3 Pharmakotherapie der chronischen symptomatischen **Herzinsuffizienz** (NYHA II–IV). Als Alternative für einen ACE-Hemmer bei Unverträglichkeit kann als erster Schritt auch ein AT₁-Rezeptorantagonist eingesetzt werden. Abkürzungen: ARNI = Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor, HF = Herzfrequenz, SR = Sinusrhythmus [L231]

Die kardiale Resynchronisationstherapie, kurz CRT

Die im Rahmen der kardialen Resynchronisationstherapie eingesetzten **biventrikulären Schrittmachersysteme** (BVP) bestehen aus einem implantierbaren **Schrittmacher** mit zusätzlichem **3. Elektrodenkabel**, das über den **Koronarvenensinus** in die **Vena cardiaca magna**, zur linken Herzseitenwand hin, platziert wird. Die kardiale Resynchronisationstherapie erlaubt eine genau abgestimmte Stimulation von Vorhof- und Ventrikelkontraktionen sowie der Kontraktionen des **Septums** und der Seitenwand des linken **Ventrikels**.

Das Gerät kann **gleichzeitig** die Funktion eines **implantierbaren Kardioverter-Defibrillators** (ICD) haben.

HFpEF/ HFmrEF

- Bislang konnte keine Therapie eine Senkung der Morbidität oder Mortalität bei Patienten mit HFpEF oder HFmrEF zeigen.
- **Diuretika** bessern die Symptome und Zeichen der Herzinsuffizienz.
- Therapie von Komorbiditäten ++ (Anämie, Adipositas, DM, aHT, COPD,...)

Akute Herzinsuffizienz mit Lungenödem (s.u.)

Komplikationen

- Kardiale **Dekompensation** (Akute Herzinsuffizienz), ggf. mit Lungenödem
- Kardiogener **Schock**
- **Herzrhythmusstörungen**
- **Thrombenbildung** mit Gefahr des ischämischen Schlaganfalls, insb. bei Vorhofflimmern
- **Kardiorenales Syndrom** (Nierenverschlechterung durch renale Minderperfusion bei Herzinsuffizienz)
- **Zentrales Schlafapnoe-Syndrom**
- **Stauungsdermatitis**

Kardiale Dekompensation

Auslösende Faktoren

Akutes Koronarsyndrom und dessen Komplikationen, **Hypertensive Krise**, **Herzrhythmusstörungen** (insb. TAA bi VHF), **Infektionen**, **Anämie**, Exazerbation einer **COPD**, Exzessiver **Alkoholkonsum**

Symptome/Klinik

- Siehe Symptome der Linksherzinsuffizienz, Symptome der Rechtsherzinsuffizienz
- Die bedrohlichste Manifestation einer kardialen Dekompensation ist das **Lungenödem** mit der Gefahr einer respiratorischen Insuffizienz (Alveoläres Lungenödem: meist Giemen. Interstitielles Lungenödem: meist feuchte Rasselgeräusche)

Therapie

- **Kausale Therapie**
- **Allgemeine Maßnahmen:** Sitzende Lagerung, Monitoring der Vitalparameter. O₂-Gabe 4–8 L/min (Ziel SpO₂ >95%)
- **Medikamentöse Therapie :**
 - **Sedierung und Anxiolyse** bei ängstlicher Agitation, z.B. Gabe von Morphin
 - **Nitroglycerin**, sofern syst. BD >100 mmHg (KI bei flüchtiges LE und bei Rechtsherzinsuffizienz)
 - **Furosemid** intravenös zum Volumenentzug durch Steigerung der Diurese. 40mg iv initial - ggf Steigerung
 - **Thromboseprophylaxe**
 - Optimale Einstellung der Kreislaufparameter, evtl. Gabe von positiv inotropen Substanzen (**Dobutamin ± Noradrenalin**)
- **Weitere therapeutische Optionen :**
 - **Punktion und Entlastung von Pleuraergüssen und Aszites**
 - **CPAP-Beatmung** (bei persistierender Hypoxämie).
 - **Ultrafiltration** bei therapierefraktärer, symptomatischer Wasserüberladung
 - **Kreislaufunterstützungs- und Oxygenierungsverfahren**
 - Venovenöse extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO)
 - Venoarterielles extrakorporales Life Support System (ECLS)
 - Intraaortale Ballonpumpe (IABP)


Prognose

- 1-Jahresletalität in Abhängigkeit vom NYHA-Stadium : I <10%, II (15%), III (25%), IV (50%)
- Die Prognose einer unbehandelten manifesten Herzinsuffizienz ist ungünstig, lässt sich aber unter leitliniengerechter Therapie wesentlich verbessern!

AV-Block ++

Erregungsbildungs- und Erregungsleitungssystem des Herzens

Ein physiologischer Erregungszyklus beginnt i.d.R. im **Sinusknoten** und wird über die Vorhöfe zum **AV-Knoten** geleitet. Nach einer Verzögerung im AV-Knoten läuft die Erregung über das **His-Bündel** zu den **Tawara-Schenkeln**. Diese verzweigen sich zu vielen kleinen **Purkinje-Fasern**, über die die Erregung die Herzmuskelzellen der Kammern erreicht und eine Kontraktion initiiert.



Definition und Arten

Überleitungsstörung zwischen Vorhof und Kammer. 3 Stadien :

AV-Block I°

- PQ-Zeit ist auf >200 Millisekunden verlängert
- Sinusknotenfrequenz = Herzfrequenz
- Befund kann auch bei Gesunden auftreten (z.B. Sportler mit erhöhtem Vagotonus) und hat allein genommen keinen pathologischen Wert

AV-Block II°


- **Typ 1 „Wenckebach“**
 - Progressive und periodische Zunahme der PQ-Zeit bis zum vollständigen Fehlen eines QRS-Komplexes nach einer normaler P-Welle (reguläre Vorhoferregung)
 - Sinusknotenfrequenz > Herzfrequenz, meist rhythmisch mit plötzlicher Pause, dadurch häufig Reduktion der Herzfrequenz auf bradykarde Werte
- **Typ 2 „Mobitz“**
 - **Vereinzelter oder regelmäßiger Ausfall eines QRS-Komplexes** nach vorangegangener P-Welle, die PQ-Zeit bleibt dabei konstant
 - **2:1-Überleitung:** Regelmäßige AV-Blockierung, bei der jede zweite Vorhoferregung (P-Welle) auf die Kammer übergeleitet wird → Herzfrequenz = $\frac{1}{2}$ Sinusfrequenz
 - **3:1-Überleitung:** Regelmäßige AV-Blockierung, bei der nur jede dritte Vorhoferregung auf die Kammer übergeleitet wird → Herzfrequenz = $\frac{1}{3}$ Sinusfrequenz
 - Die Pause entspricht einem doppelten PP-Intervall

„Da der AV-Block II° Typ 2 „Mobitz“ in einen AV-Block III° übergehen kann, stellt er einen Notfall dar!“

AV-Block III° („totaler AV-Block“)

- Die Überleitung vom Vorhof zur Kammer ist **komplett unterbrochen**
- P-Wellen und QRS-Komplexe kommen **unabhängig voneinander** aber **regelmäßig** im EKG vor (vollständige Entkopplung = AV-Dissoziation)

First degree AV block



PR Zeit > 200 ms

allein genommen hat
Keinen pathologischen Wert

Second degree AV block (Mobitz I or Wenckebach)

progressive periodische Zunahme der PR Zeit bis zum Fehlen eines QRS Komplexes



Second degree AV block (Mobitz II)

vereinzelter Ausfall eines QRS Komplexes
nicht



Second degree AV block (2:1 block)


regelmäßiger Ausfall eines QRS Komplexes



2:1 Überleitung

Third degree AV block with junctional escape

Überleitung ist komplett unterbrochen



AV-Dissoziation

- Bradykarde Kammerersatzrhythmen durch Erregungsbildungszentren meist im Bereich des AV-Knotens oder des His-Bündels
 - Sekundärer (jonktionaler) Ersatzrhythmus (AV-Knoten): ca. 40–50/min
 - Tertiärer (ventrikulärer) Ersatzrhythmus (His-Bündel oder Tawara-Schenkel): ca. 20–30/min
- Je peripherer das Autonomiezentrum:
 - Desto langsamer der Ersatzrhythmus
 - Desto deformierter (verbreiteter) der QRS-Komplex
 - Desto schlechter die Prognose
- Ein akut auftretender AV-Block III° kann aufgrund einer langen Pause zu einem Adams-Stokes-Anfall führen

Ätiologie

- Idiopathisch (degenerativ)
- Kardiale Grunderkrankung (z.B. KHK, Myokarditis)
- Medikamente (z.B. Digitalis, B-Blocker, Amiodaron,...)
- Hyperkaliämie
- Iatrogen (z.B. nach Ablation,...)

Symptome/Klinik

- Symptomatik abhängig von
 - Länge der Pause
 - Übelkeit, Schwindel (2-5 sek), Synkopen (5-30 sek)
 - Adams-Stokes-Anfall (Synkope, die durch Herzrhythmusstörungen induziert)
 - Kardiogener Schock *Krampfanfälle, Atemstillstand*
 - Geschwindigkeit des Ersatzrhythmus
 - Evtl. Bradykardie (< 40/min) mit zerebraler Minderversorgung (Apathie, Schwindel, kognitive Störungen), Herzinsuffizienz, Dyspnoe

Zerebrale Hypoxie durch akut auftretende Herzrhythmusstörungen (z.B. bei Asystolie, ausgeprägte Bradykardie, Kammerflimmern/-flattern). Symptome sind abhängig von der Länge des Kreislaufstillstandes: 2–4 Sek.: Schwindel, 5–12 Sek.: Synkope (kurze motorische Entäußerungen/ Muskelkrämpfe möglich), 12–30 Sek.: zerebrale Krampfanfälle, 60 Sek.: Atemstillstand, >3–5 Min.: hypoxischer Hirnschaden.

Differentialdiagnosen

- Linksposteriorer Hemiblock (Blockade des hinteren Faszikels am linken Tawara-Schenkel)
- Linksanteriorer Hemiblock (Blockade des vorderen Faszikels am linken Tawara-Schenkel)
- Linksschenkelblock
- Rechtsschenkelblock
- Sinuatrialer Block (Überleitungsstörung im Sinusknoten selbst)

Therapie

- AV-Block I°
 - In der Regel keine Therapie notwendig
 - Ggf. kausale Therapie
 - Behandlung der Grunderkrankung
 - Elektrolytausgleich
 - Absetzen auslösender Medikamente
- AV-Block II°
 - Typ 1 „Wenckebach“: Wie AV-Block I° (Bei symptomatischem AV-Block oder Hinweisen auf intra-/infrasisären AV-Block: Ggf. Implantation eines Herzschrittmachers erwägen)
 - Typ 2 „Mobitz“: Implantation eines permanenten Herzschrittmachers (meist DDD)
 - Ggf. kausale Therapie
- AV-Block III°
 - Ggf. Reanimation
 - Atropin 0,5–1,0mg i.v. (kontraindiziert bei AV-Block unterhalb der His-Bündel). Dann Orciprenalin über Perfusor (Adrenalin als Alternative)
 - Ggf. Anlage eines temporären Herzschrittmachers
 - Ggf. kausale Therapie
 - Nach Stabilisierung: Implantation eines permanenten Herzschrittmachers (meist DDD)

2–10 µg/Min. als Perfusor bzw. Bolusgabe von 10 µg Adrenalin, Monitorbeobachtung und individuelle Dosistitration immer erforderlich, Adrenalin-Zubereitung mit 1 Amp. Adrenalin 1mg/mL ad 100 mL NaCl 0,9% entspricht in der verdünnten Lösung einer Dosis von 10 µg/mL

Auch wenn Atropin eher auf Vorhofebene wirkt und man bei einem totalen AV-Block keine Wirkung auf die Frequenz erwartet, beobachtet man häufig einen Frequenzanstieg. Allerdings ist die Gabe von Atropin kontraindiziert, wenn ein AV-Block unterhalb der His-Bündel (infrasisär) besteht (zu erkennen an einem deformierten und verbreiterten QRS-Komplex). Stattdessen sollte dann direkt die Applikation von Katecholaminen erfolgen.

Vorhofflimmern (VHF) ++

Epidemiologie

- Häufigste relevante Herzrhythmusstörung; nimmt mit dem Alter exponentiell zu.
- Epidemiologische Risikofaktoren : Arterielle Hypertonie, Adipositas, Diabetes mellitus, chronische Niereninsuffizienz

Ursachen

- **primär (idiopathisch)**: ohne erkennbare Grundkrankheit (15 %)
- **sekundär**:
 - **kardial**: Herzinsuffizienz, KHK, Klappenvitien (insb. Mitral), Kardiomyopathien
 - **extrakardial**: Elektrolytstörung (insb. Hypokaliämie), Hyperthyreose, Lungenembolie, COPD, Alkohol

Pathophysiologie

- Atriale Arrhythmie aufgrund multipler atrialer Mikro-Reentry-Kreise mit unregelmäßiger atrioventrikulärer Überleitung. Meist nach einer Extrasystole induziert.
- Darunter ist die Kontraktilität im linken Vorhof/Vorhofohr eingeschränkt. Der verlangsamte Blutfluss begünstigt eine Thrombusbildung mit Gefahr einer arteriellen Embolie.
- Der Verlust des atrialen Beitrags zur Füllung des LV kann zu einer Herzinsuffizienz führen.

Klassifikation

Nach Verlauf

- **Erstmals diagnostiziertes VHF**: erstmalige Dokumentation im EKG
- **Paroxysmales VHF**: endet innerhalb von 7 Tagen spontan oder durch Kardioversion
- **Persistierendes VHF**: > 7 Tage dauernd
- **Lang persistierendes VHF**: > 1 Jahr anhaltend, Rhythmuskontrolle wird angestrebt.
- **Permanentes VHF**: anhaltendes VHF, Rhythmuskontrolle wird nicht mehr angestrebt.

Valvuläres vs. nicht-valvuläres Vorhofflimmern

- **Valvuläres Vorhofflimmern**: bei Mitralstenose bzw. nach mechanischem Klappenersatz
→ Deutlich erhöhtes Risiko für Thromboembolie
- **Nicht-valvuläres Vorhofflimmern**: Alle anderen Formen des Vorhofflimmerns

Klinik

Symptome

- **Asymptomatische Verläufe**: Häufig, $\frac{1}{3}$ der Patienten!
- **Mögliche Symptome**
 - Palpitationen und Herzrasen
 - Unregelmäßiger Puls
 - Schwindel, ggf. Synkope
 - Angst, innere Unruhe
 - Symptome der Herzinsuffizienz bzw. Auftreten einer kardialen Dekompensation
 - Zeichen von abgelaufenen systemischen Embolien, z.B. Hirnfarkte/TIA

EHRA-Klassifikation (European Heart Rhythm Association)

Zur Quantifizierung von Symptomen

- **EHRA I**: keine Symptomatik
- **EHRA II**: leichte Symptomatik ohne Einschränkungen der Alltagsaktivitäten
- **EHRA III**: schwere Symptomatik mit Einschränkungen der Alltagsaktivitäten
- **EHRA IV**: invalidisierende Symptomatik, unfähig zu normalen Alltagsaktivitäten.

Diagnostik

Anamnese

- Beginn des Vorhofflimmerns – sicher oder unsicher?
- Erfragen von Risikofaktoren und Vorerkrankungen?
- Mögliche Auslöser - Alkohol, Infektionen?

- Hinweise auf stattgehabte Embolien?

Körperliche Untersuchung

- Unregelmäßige Herzaktion.
- Pulsdefizit: Differenz zwischen peripher tastbarer Pulsfrequenz und „hörbarer“ Herzfrequenz.
- Wechselnde Lautstärke des 1. Herztons

EKG

- Fehlende P-Wellen, Flimmerwellen (mit Vorhoffrequenz $> 350/\text{min}$) *Schmaler Komplex QRS*
- Unregelmäßige RR-Intervalle (= AV-Überleitung)
- Wenn Kammerfrequenz $> 100/\text{min}$. = Tachyarrhythmie, $< 60/\text{min}$. = Bradyarrhythmie.

Labor

Blutbild, Blutglukose, Kreatinin, Elektrolyte (K+!), Gerinnung (INR, PTT), TSH

Transthorakale Echokardiographie

Strukturelle Herzerkrankung? Größe des linken Vorhofs?

Langzeit-EKG oder Event-Recorder

Bei V.a. VHF mit EKG normal (paroxysmales VHF?)

Transösophageale Echokardiographie (TEE)

Vor geplanter Kardioversion eines VHF $> 48\text{h}$ Dauer, wenn nicht vorher ≥ 3 Wochen effektiv antikoaguliert wurde

Differentialdiagnosen

Vorhofflattern

Formen

- **Typisches Vorhofflattern** (85%): isthmusabhängig.
- **Atypisches Vorhofflattern** (15%): nicht isthmusabhängig

EKG

- Vorhoffrequenz $250 - 350/\text{min}$.
- Sägezahnartige regelmäßige Vorhoferregung.

Therapie

Medikamentös wie beim Vorhofflimmern, bei typischem Vorhofflattern ist jedoch eine

Katheterablation (Isthmusablation) zur Rhythmuskontrolle erfolgversprechend

Andere supraventrikuläre Tachykardien (Atriale Tachykardie, Präexzitationssyndromen ...)

Ventrikuläre Tachykardie (insb. bei Patienten mit einem Schenkelblockbild)

Komplikationen von VHF Der verlangsamte Blutfluss begünstigt eine Thrombusbildung mit Gefahr einer arteriellen Embolie.

- **Thromboembolie**: Durch Thrombenbildung im linken Vorhof: Schlaganfall, Nieren- oder Milzinfarkt, akuter Extremitätenarterienverschluss, Mesenterialinfarkt
- **Kardiale Dekompensation**: Tritt insb. bei Patienten mit bereits eingeschränkter Pumpleistung des Herzens auf, die sich bei einer Tachyarrhythmie noch weiter verstärkt
- **Tachykardiomyopathie**: Tritt als Form der chronischen Herzinsuffizienz bei längerfristig unkontrollierter Tachykardie im Rahmen eines Vorhofflimmerns auf

Therapie

Therapiegrundsätze und Ziele

- **Thromboembolieprophylaxe**
- **Frequenzkontrolle**
- **Rhythmuskontrolle**
- **Kausale Therapie** (Elektrolytstörung, Hyperthyreose, aHT, Infekt, Medikation)

Thromboembolieprophylaxe

- **Indikation**: Nach Evaluation des Schlaganfall-Risikos mithilfe des CHA₂DS₂VASc-Scores
 - Score ≥ 2 bei Männern bzw. Score ≥ 3 bei Frauen: Antikoagulation
 - Score = 1 bei Männern bzw. Score = 2 bei Frauen: Antikoagulation sollte in Erwägung gezogen werden
 - Score = 0 bei Männern bzw. Score = 1 bei Frauen: Keine Therapie

CHA₂DS₂-VASc-Score zur Abschätzung des Schlaganfallrisikos bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern.

| | | Risikofaktor | Punkte |
|----------------|--------------|--|--------|
| C | Congestive | Herzinsuffizienz oder LV-Dysfunktion: EF < 45 % | 1 |
| H | Hypertension | Arterielle Hypertonie (auch behandelte) | 1 |
| A ₂ | Age | Alter ≥ 75 Jahre | 2 |
| D | Diabetes | Diabetes mellitus | 1 |
| S ₂ | Stroke | Schlaganfall, TIA oder andere Thromboembolie in der Anamnese | 2 |
| V | Vascular | Gefäßkrankheit wie pAVK, Herzinfarkt, schwere Aortensklerose | 1 |
| A | Age | Alter 65–74 Jahre | 1 |
| Sc | Sex category | Weibliches Geschlecht | 1 |

• Durchführung (Dauertherapie): Orale Antikoagulation

- Direkte orale Antikoagulanzen
- Vitamin-K-Antagonisten mit einem Ziel-INR von 2–3
- Stationäre Patienten: Ggf. Einleitung der Antikoagulation mit Heparin in therapeutischer Dosierung, insb. wenn Kardioversion oder andere Interventionen geplant

Direkte Orale Antikoagulanzen

| | Vitamin-K-Antagonisten (Phenprocoumon) | Apixaban* Eliquis | Edoxaban* Lixiana | Rivaroxaban* Xarelto | Dabigatran* |
|------------------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Wirkung | Faktoren II, VII, IX, X ↓ | Faktor-Xa-Wirkung ↓ | | | Thrombinwirkung ↓ |
| Dosierung | nach INR-Wert: Ziel: 2,0–3,0 | 2 × 5 mg/d (2 × 2,5 mg/d) | 1 × 60 mg (1 × 30 mg/d) | 1 × 20 mg/d (1 × 15 mg/d) | 2 × 150 mg/d (2 × 110 mg/d) |

* bei elektiven chirurgischen/invasiven Eingriffen mit niedrigem Blutungsrisiko ≥ 24 h, mit hohem Blutungsrisiko ≥ 48 h vorher absetzen.

* Bei GFR < 15 ml/min : kontraindiziert (GFR < 30 ml/min für Dabigatran)

• Blutungsrisiko berücksichtigen: HAS-BLED-Score

- HAS-BLED-Score ≥ 3: Optimierung der Risikofaktoren, engmaschigere

Kontrollen unter Antikoagulation

Score > 2: Optimierung der Risikofaktoren, engmaschigere Kontrollen unter Antikoagulation, alternative Thromboembolie-Prophylaxemaßnahmen erwägen (z.B. interventioneller Vorhofsherschluss)

HAS-BLED-Score zur Einschätzung des Blutungsrisikos

| Parameter | Punkte | Parameter | Punkte |
|---|----------|--|----------|
| Hypertonie (RR _{sys.} > 160 mmHg) | 1 | Blutung vorausgegangen oder -Neigung | 1 |
| Abnormale (↑↑) Nieren- /Leberwerte (je 1 Punkt) | 1 oder 2 | Labile INR-Werte (< 60 % im Zielbereich) | 1 |
| Schlaganfall in der Anamnese | 1 | Elderly (Alter > 65 Jahre) | 1 |
| | | Drugs = Medikamente wie NSAR oder Alkoholabusus (je 1 Punkt) | 1 oder 2 |

• Stellenwert von ASS: zur Thromboembolie-Prophylaxe nicht mehr empfohlen

Vorhofsherschluss Ausschluss

- **Indikation:** Möglichkeit einer Thromboembolie-Prophylaxe für Patienten, bei denen eine Antikoagulationsbehandlung langfristig nicht möglich ist oder abgelehnt wird.
- **Therapieprinzip:** Ausschaltung des Vorhofshers am linken Vorhof, das in den meisten Fällen Bildungsort eines Vorhofthrombus ist

CHA₂DS₂VASc-Score

Schlaganfallrisiko/Jahr

1

ca. 1%

2

ca. 2%

3

ca. 3%

4

ca. 4%

5

ca. 7%

6

ca. 10%

Procedere:

Der **Vorhofverschluss** (Occluder) kommt in Form eines kleinen **Netz-Schirm** aus Polyurethan und Titan mit unterschiedlichen Größen (s. Abb. 1). Vor der Untersuchung erhalten Sie eine Kurznarkose. Dann wird ein Schluck-Ultraschall (**TEE**) durchgeführt, in dem das linke Ohr auf vorliegende Blutgerinnsel untersucht und das Herzohr genau ausgemessen wird. Der Schallkopf wird während des Eingriffs in der Speiseröhre belassen. Der passende Occluder wird danach

über eine Leistenvene mithilfe eines Katheters durch die Scheidenwand in der linken Vorkammer eingebracht. Anschließend wird der Occluder unter Ultraschall-Kontrolle in das Herzohr eingesetzt. Um den Sitz des Occluders zu kontrollieren benötigen wir eine kleine Menge von Kontrastmittel. Nach Prüfung der Lage und Stabilität des Occluders wird das Kathetermaterial entfernt und die Punktionsstelle wird mit einem Verschlussystem abgedichtet. Dazu wird ein Druckverband für 6-8 Stunden angelegt. Die weitere Überwachung erfolgte auf einer Überwachungsstation für 24 Stunden.



Abbildung 1: Der WATCHMANTM Occluder von der Firma Boston Scientific.

Frequenzkontrolle

- **Indikation:** Basistherapie bei jeder Form des tachykarden Vorhofflimmerns
- **Ziel-Herzfrequenz:** I.d.R. reicht eine moderate Frequenzkontrolle ($<110/\text{min}$) zur Symptomkontrolle aus, eine strikte Frequenzkontrolle ($<80/\text{min}$) sollte nur bei fortbestehenden Symptomen durchgeführt werden

Therapeutische Optionen

- 1. Wahl: **Beta-Blocker** (z.B. Metoprolol)
- Bei Scheitern der Monotherapie: Kombination von Beta-Blocker mit **Digitalisglykosid** (z.B. Digoxin)

- **Applikation:** Per os bei Dauertherapie, in der Akutsituation intravenös

Bradyarrhythmia absoluta (Elektronenstörungen ausgelassen)

- **Atropin** 1mg i.v. als Bolus, ggf. Wiederholung bei nicht ausreichender Wirksamkeit
- **Orciprenalin** 0,25–0,5 mg i.v. über 2–3 Minuten
- Anlage eines temporären Herzschrittmachers, ggf. mit Anschluss einer definitiven Herzschrittmacher-Implantation

Rhythmuskontrolle (Kardioversion)

- **Indikation:** Bei Symptompersistenz trotz Frequenzkontrolle bzw. bei Aussicht auf lange Rezidivfreiheit nach Kardioversion
 - **Notfallindikation:** Tachyarrhythmia absoluta mit kardialer Dekompensation und hämodynamischer Instabilität, i.d.R. als elektrische Kardioversion.
 - **Elektive Kardioversion:** Bei hämodynamisch stabilen, aber durch das Vorhofflimmern beeinträchtigten Patienten stellen eine elektrische oder eine medikamentöse Kardioversion therapeutische Optionen dar.
- **TEE zum Thrombenausschluss:** → zum Ausschluss eines Vorhoffthrombus
 - **Vorhofflimmern <48 Stunden:** Eine Rhythmuskontrolle kann i.d.R. ohne TEE erfolgen
 - **Vorhofflimmern >48 Stunden:** Immer TEE vor Rhythmuskontrolle!
 - **Ausnahme:** Vorbestehende und glaubhaft dokumentierte therapeutische Antikoagulation für mindestens 4 Wochen vor dem Auftreten des Vorhofflimmerns
 - **Bei Vorhoffthrombus-Nachweis:** Einleitung einer therapeutischen Antikoagulation für 4 Wochen
- **Nach der Rhythmuskontrolle:** Fortführung der therapeutischen Antikoagulation für mindestens 4 Wochen

Therapeutische Optionen

- **Elektrische Kardioversion:** bei Hämodynamischer Instabilität
 - Kontinuierliches EKG-Monitoring
 - Kurznarkose z. B. mit Propofol i. v. unter Beatmungsbereitschaft
 - Energie einstellen (150 J) Propofol 0,5–1,5 mg/kgKG
 - Elektroden anbringen. Die eine Elektrode wird rechts parasternal im 3. ICR, die andere links im 5. ICR über die Herzspitze aufgesetzt.
 - Laden
 - Kardiovertieren
 - Bei Erfolglosigkeit ggf. Klebeelektroden in anterior-posteriore Position bringen

Energiewahl:

- 1. Versuch: 120–150 J biphasisch
- 2. Versuch: 150–200 J biphasisch
- 3. Versuch: 200 J biphasisch

Medikamentöse Rhythmuskontrolle:

- **Klasse-Ic-Antiarrhythmika:** **Flecainid** (i.v. oder p.o.) → wenn keine strukturelle Herzerkrankung
- **Klasse-III-Antiarrhythmika:** **Amiodaron** (i.v. oder p.o.) → bei schwerer Herzerkrankung

Katheterablation:

- Ziel: Besserung von VHF-Symptomen
- Indikationen: symptomatische VHF-Rezidive unter Antiarrhythmika, oder als Alternative zu Antiarrhythmika bei ausgewählten Patienten mit symptomatischem paroxysmalen VHF, wenn sie in erfahrenen Zentren durchgeführt wird.

Komplikationen Thromboembolie

- Thrombenbildung (insb. im linken Vorhof)ul>- Abgang als Embolus
 - Gehirn (ischämischer Schlaganfall)
 - Zum Notfallmanagement des Schlaganfalls siehe: Schlaganfall - AMBOSS-SOP
 - Nieren- oder Milzinfarkt
 - Verschluss der Beinarterien (akuter arterieller Verschluss)
 - Mesenterialinfarkt

alternativ
Calciumantagonisten
(Verapamil)
 Eskalation 1- Digoxin
2- Amiodaron
Ultima Ratio HSM
Av-Knoten Ablation

langfristig

re

by Hämodynamische Stabilität

50-100mg/d

200mg/ft Spiegelkontrolle
p.o.

Stufenweise Eskalation einer Frequenzkontrolle

Basistherapie

- 1. Wahl: Betablocker *Metoprolol* *Propranolol bei Hypertrophie*
- Alternative: Calciumantagonisten vom Verapamil-Typ

Eskalation Stufe I

- Digitalisglykosid zusätzlich zu Betablocker oder Calciumantagonist

Eskalation Stufe II

- Amiodaron zusätzlich zu Betablocker oder Calciumantagonist
- Digitalisglykoside absetzen, wenn Amiodaron eingesetzt wird

Amiodaron nicht(!) zur Frequenzkontrolle einsetzen, wenn ein Vorhoffthrombus besteht, da durch eine unbeabsichtigte Rhythmisierung thromboembolische Komplikationen ausgelöst werden können!

Akute Frequenzkontrolle bei Tachyarrhythmia absoluta

- Intravenöse Basistherapie mit Betablockern: Betablocker sollten intravenös und langsam injiziert werden; bei Verwendung des sehr kurzwirksamen Esmolol ist eine Perfusortherapie sinnvoll.
 - Metoprolol 2,5–10 mg i.v. fraktioniert über 2–5 Minuten unter Monitorkontrolle
 - Propranolol 0,15 mg/kgKG i.v. über 2 Minuten
 - Esmolol
 - Alternativ bei stabilen Patienten: Bisoprolol p.o. 2,5–5 mg p.o. als Einmalgabe, Abwarten der Wirkung über 30–60 Minuten.
- Intravenöse Basistherapie mit Verapamil 0,0375–0,15 mg/kgKG i.v. über 3 Minuten, in der klinischen Praxis Aufziehen von 10 mg (2 Ampullen) und fraktionierte Gabe nach Wirkung unter Monitorkontrolle
 - Verapamil



- Eskalation Stufe I mit Digitalisglykosiden
 - Digoxin Digoxin 0,5 mg i.v., bei ausbleibendem Effekt erneute Gabe von 0,5 mg i.v. möglich,
 - Digitoxin

Verdünnung mit 10 ml NaCl

- Eskalation Stufe II
 - Amiodaron 300 mg i.v. über 30 Minuten, wenn eine Dauertherapie geplant wird weitere Aufsättigung mit Amiodaron 900 mg/24 h i.v. über Perfusor für 5 weitere Tage
- Bei Unwirksamkeit bzw. Eintreten hämodynamischer Instabilität: Siehe Elektrische Kardioversion - klinische Anwendung


Langfristige Frequenzkontrolle bei Tachyarrhythmia absoluta

- Betablocker (1. Wahl)
 - Metoprolol 25–100 mg p.o. 1-0-1,
 - Bisoprolol 2,5–10 mg p.o. 1-0-0
 - Atenolol
 - Carvedilol
 - Propranolol
 - Calciumantagonisten (Alternative zu Betablockern)
 - Verapamil 40–120 mg unretardiert p.o. 1-1-1 oder 60–240 mg retard 1-0-1
 - Zusätzlich bei nicht ausreichender Basistherapie: Digitalisglykoside zusätzlich zu Betablockern oder Verapamil
 - Digitoxin - vorteilhaft bei vorliegender Niereninsuffizienz
 - Digoxin - vorteilhaft wenn ein schneller Wirkungseintritt gewünscht ist 0,1–0,2 mg p.o. 1-0-0,
-




EKG

- Irreguläre/unregelmäßige RR-Intervalle („Arrhythmia absoluta“)
- Fehlende P-Wellen
- Schmale QRS-Komplexe
- Flimmerwellen (insb. in V1)
- Bei Frequenzen $\geq 100/\text{min}$ spricht man von einer Tachyarrhythmia absoluta (TAA)
- Bei Frequenzen von $<50\text{--}60/\text{min}$ spricht man von einer Bradyarrhythmia absoluta (BAA)




EKG mit Arrhythmia absoluta bei Vorhofflimmern

Befund: Arrhythmia absoluta bei Vorhofflimmern mit Herzfrequenz von ca. 90/min (Papiervorschub 25 mm/s), Übergang Steil- zu Rechtstyp, keine relevanten Erregungsrückbildungsstörungen.



EKG mit Tachyarrhythmia absoluta bei Vorhofflimmern

Befund: Tachyarrhythmia absoluta bei Vorhofflimmern mit Herzfrequenz von ca. 135/min (Papiervorschub 25 mm/s), Steillagetyp, keine relevanten Erregungsrückbildungsstörungen.




Absolute Arrhythmie ohne klar abgrenzbare P-Wellen, Herzfrequenz von 115/min (Angabe aus der elektrischen EKG-Auswertung, Herzfrequenz durch starke Arrhythmie im vorliegenden EKG-Ausschnitt nicht beurteilbar), überdrehter Linkstyp (Ableitung I positiv, Ableitungen II und III negativ), QRS auf 0,14 s verbreitert sowie diskordantes Verhalten von ST-Strecke und T-Welle in allen Ableitungen, R-Verlust in V1 und sehr niedriges R in V2-4, persistierendes S in V6.

Diagnose: Absolute Tachyarrhythmie bei Vorhofflimmern, verzögerte intraventrikuläre Erregungsausbreitung im Sinne eines kompletten Blockbildes (OUP in V6 noch normal, deshalb formal kein Linksschenkelblock), linksanteriorer Hemiblock, einzelne ventrikuläre Extrasystole in V6 (diese Veränderung des QRS-Komplexes stellt jedoch evtl. auch lediglich eine aberrant übergeleitete Aktion dar.).



EKG mit Vorhofflimmern und 2:1 Extrasystolie (1/2)

EKG (12-Kanal-EKG, Papiervorschub 50mm/s): Absolute Arrhythmie bei einer Herzfrequenz von ca. 103/min (Angabe der elektronischen EKG-Auswertung, Herzfrequenz durch Arrhythmie im vorliegenden EKG-Ausschnitt nicht eindeutig beurteilbar), Flimmerwellen (siehe V1 in EKG-Abbildung 2/2), Indifferenztyp (Ableitungen I-III positiv, Ableitung $I > III$), nach zwei normalen QRS-Komplexen folgt jeweils eine ventrikuläre Extrasystole (VES), unspezifisches Q in III; Diagnose: Tachyarrhythmie bei Vorhofflimmern mit 2:1-Extrasystolie.







Abbildung 1
Abwägen der Entscheidung zur
Kardioversion von chronischem
Vorhofflimmern



kardiopulmonaler Reanimation (CPR) ++

Definition

Maßnahmen, die zur Beendigung eines Herz-Kreislaufstillstandes durchgeführt werden
(= Überlebenskette) → Basismaßnahmen und erweiterte Maßnahmen

Ablauf/Durchführung

Basismaßnahmen / Basic-Life-Support (BLS) ABC

Ersthelfermaßnahmen, bei Auffinden einer bewusstlosen Person. Diese Maßnahmen können auch von Laienhelfern (*sauveteurs*) durchgeführt werden.

⇒ **Reaktion prüfen**: laut ansprechen, an den Schultern Schütteln → Keine Reaktion?

→ **Freimachen der Atemwege** durch Überstrecken des Kopfes/Anheben des Kinns HTCL

→ **Atmung überprüfen**: mittels "Hören, Sehen, Fühlen" (max 10 sek) → Keine normale Atmung?
Ggf. Carotis-Puls tasten

→ **Notruf** 112 bzw. Reanimationsteam rufen und **AED** (automatisierter externer Defibrillator) holen lassen. (Bei normaler Atmung: Seitenlage)

→ und **Herzdruckmassage und Beatmung** schnellmöglichst beginnen (Zyklus 30:2)

- 30 Thoraxkompressionen : Platzierung beider Hände übereinander auf dem Sternum. Arme gestreckt halten. Kompressionstiefe 5-6 cm. Kompressionsfrequenz 100-120/min.
- dann 2 Beatmungen : Dauer pro Atemhub 1 sek. Kompression max. 10 sek. unterbrechen. (wenn der Ersthelfer nicht beatmen kann, ist die Herzdruckmassage ohne Beatmung durchzuführen)

→ Sofern **AED** verfügbar: Anbringen der Elektroden und Analyse des Herzrhythmus

- Defibrillierbare Rhythmen : 1 Schock → sofortige Wiederaufnahme der CPR → Nach 2 min erneute Analyse des Herzrhythmus, ggf. Defibrillation (kontinuierliche Wiederholung dieses Zyklus)
- Nicht-defibrillierbare Rhythmen : Sofortige Wiederaufnahme der CPR → Nach 2 min erneute Analyse des Herzrhythmus, ggf. Defibrillation (kontinuierliche Wiederholung dieses Zyklus: alle 2min Rhythmuskontrolle, ggf. Defibrillation)

→ Fortführen der CPR bis professionelle Hilfe kommt, der Patient reagiert oder der Ersthelfer erschöpft ist
„In den ersten Sekunden eines Herz-Kreislaufstillstandes kann ein präkordialer Faustschlag durchgeführt werden,,

Erweiterte Maßnahmen/ Advanced-Life-Support (ALS) ABC DEF

Sie umfassen neben den Basismaßnahmen weiterführende Maßnahmen (durch Fachpersonal) wie Defibrillation, Medikamentengabe und ggf. Intubation.

- **Basismaßnahmen** fortsetzen (ggf. Karotispuls tasten)
- **Atemwege sichern**: Sauerstoff-Gabe (Ziel-SaO₂ > 94%), Intubation, Kapnographie
- **Gefäßzugänge** (venös oder intraossär)
- **Medikamente**
 - **Defibrillierbarer Rhythmus** : **Adrenalin** (1 mg nach der 3. erfolglosen Defibrillation, danach alle 3–5 Minuten). **Amiodaron** (300 mg nach der 3. erfolglosen Defibrillation, danach evtl. nochmals 150 mg)
 - **Nicht-defibrillierbarer Rhythmus**: **Adrenalin** (1 mg, danach alle 3–5 Minuten)
 - Natriumbikarbonat nur bei Hyperkaliämie oder Überdosierung von trizyklischen Antidepressiva
- **Reversible Ursachen** suchen und behandeln (Notfallsonografie ++)
 - 4 „H's“: Hypoxie, Hypovolämie, Hypo-/Hyperkaliämie, Hypothermie
 - 4 „T's“: Tamponade, Toxine, Thrombose (der Lungenarterien oder Herzkranzgefäße), Tension (=Spannungspneumothorax)

Beendigung der CPR


Erfolgreiche Reanimation – Wiedereinsetzen des Spontankreislaufs („return of spontaneous circulation“, ROSC)

- **Zeichen**: Wiedererfühlen des Pulses, Zurückkommen des Blutdrucks
(Bei intubierten Patienten: Anstieg des expiratorischen CO₂ in der Kapnographie)
- Nach Kammerflimmern: milde **Hypothermiebehandlung** für 12–24 h erhalten (32–34 °C Körperkerntemperatur)!

Erfolgreiche Reanimation (i.d.R. nach 30 min)

Interpretation Notfall-EKG

| | EKG | Folge |
|---|--|--|
| Defibrillierbare Rhythmen | | |
| Pulslose ventrikuläre Tachykardie | Schnelle, regelmäßige Kammerfrequenzen bei gleichzeitig fehlendem Puls | Auswurfleistung aufgrund hoher Frequenz nicht ausreichend |
| Kammerflimmern | Arrhythmische, hochfrequente Flimmerwellen | Keine Auswurfleistung |
| Nicht-defibrillierbare Rhythmen | | |
| Asystolie | Null-Linien-EKG | Keine Auswurfleistung |
| Pulslose elektrische Aktivität (PEA) | Rhythmische elektrische Aktivität bei gleichzeitig fehlendem Karotispuls | Zu schwache myokardiale Kontraktionen aufgrund elektromechanischer Entkopplung (<i>dissociation</i>) |



Technik der Defibrillation

- Herzdruckmassage → Klebeelektroden aufbringen → „Hands-Off“ zur Notfall-EKG-Diagnostik → Herzdruckmassage wieder aufnehmen → Aufladen → „Hands-Off“ → 1× Schockabgabe → Sofortige Fortsetzung der Herzdruckmassage
- Position der Elektroden: Sternal-apikal oder anterior-posterior (bei Patienten mit Herzschrittmacher: mind. 8 cm Abstand zum Aggregat einhalten)
- Energiemenge: Monophasisch (360 Joule). Biphasisch (200 Joule bei der ersten Schockabgabe, 360 bei allen weiteren Schockabgaben). Bei Kindern (4 Joule/kgKG)

Komplikationen

- Rippenfrakturen
- Verletzungen von Brust- oder Bauchorganen mit inneren Blutungen → Notfallsonographie
- Posthypoxische Myoklonien (Zeichen für eine hypoxische Enzephalopathie)

Neugeborene und Kinder

Bei Kindern und Neugeborenen steht die Beatmung stärker im Vordergrund als bei Erwachsenen :

- **Neugeborene** : Initial 5 Beatmungen, erneute Überprüfung der Atmung, ggf. erneut 5 Beatmungen, erst anschließend Thoraxkompressionen. Verhältnis Thoraxkompressionen zu Beatmung → 3:1
- **Kinder ab dem 1. Lebensjahr** : Initial 5 Beatmungen, erst anschließend Thoraxkompressionen. Verhältnis Thoraxkompressionen zu Beatmung → 30:2 (Laien Helfer), 15:2 (Professionelle Helfer)

NB: Basismaßnahmen → ABC-Regel. Erweiterte Maßnahmen → ABCDE-Regel

A ("Airway"): Atemwege freimachen. **B** ("Breathing"): Beatmen. **C** ("Circulation"): Herzdruckmassage
D ("Drugs"): Medikamentengabe. **E** ("ECG"): EKG-Diagnose. **F** ("Fibrillation"): Defibrillation bei Kammerflimmern

BLS

1.
2.

Prüfung des Bewusstseins
Prüfung des Atmens

1

Ansprechen, schütteln

reagiert

Pt in seiner Lage belassen

112 anrufen

regelmäßige Kontrolle

ggf Sofortmaßnahmen

reagiert nicht
"Hilfe" rufen

2

sehen
hören
fühlen

atmet

Stabile Seitenlage

112 anrufen

regelmäßige Kontrolle


ggf Sofortmaßnahmen

atmet nicht

Notarzt alarmieren

Beginn mit Reanimation
30:2

Reanimations-Algorithmus



Schock ++

Definition

Lebensbedrohliche Kreislaufstörung, die zu Mikrozirkulationsstörungen und einer Sauerstoffunterversorgung von Gewebe führt

Ätiologie

Hypovolämischer Schock (Volumenmangel-Schock)

- **Hypovolämischer Schock:** Kritische Verminderung des Plasmavolumens
 - Verbrennungen oder Verbrühungen *Verbrennung*
 - Ileus, Erbrechen und Diarrhö *Ileus, Diarrhö, Erbrechen, Stomatitis*
- **Hämorrhagischer Schock:** Kritische Verminderung von Blut
 - Gastrointestinaler Blutung, nach Trauma,... *Trauma, GI Blutung*

Kardiogener Schock

- Myokard-Versagen: Myokardinfarkt, Myokarditis,...
- Arrhythmien: VT,...
- Volumenbelastung: Herzklappeninsuffizienz
- Druckbelastung: Lungenembolie
- Behinderungen der Herzfüllung: Herzbeuteltamponade

Schock durch Verteilungsstörung (distributiver Schock)

- **Anaphylaktischer Schock:** Allergische Erkrankungen
- **Septischer Schock:** Sepsis
- **Neurogener Schock**
 - Schädel-Hirn-Trauma, Trauma von Hirnstamm oder Rückenmark
 - Intrazerebrale Blutung, Subarachnoidalblutung, Schlaganfall *Vergiftung*

Pathophysiologie

- Sauerstoffunterversorgung der Gewebe
- Sympathikusaktivierung: Tachykardie, Vasokonstriktion, Tachypnoe
- Zentralisation (Makrozirkulationsstörung): Sicherung der Blutversorgung von Gehirn und Herz durch verminderte Blutversorgung anderer Organe (Haut, Extremitätenmuskulatur, Nieren, Splanchnikusgebiet)
 - Anaerober Stoffwechsel: mit Anfall von Laktat
 - Azidose
- Mikrozirkulationsstörungen: Präkapilläre Dilatation und postkapilläre Konstriktion der Blutgefäße → Ansammeln des Blutes im Kapillarbett → Verstärkte Hypovolämie
- Gerinnungsstörungen: Bildung von Mikrothromben in den Kapillaren (bis zur Verbrauchskoagulopathie)
- „Schockspirale“ (Circulus vitiosus des Schocks): Hypovolämie → Herzzeitvolumen↓ → Hypoxie mit resultierender Gewebsazidose → Erhöhung der Kapillarpermeabilität mit resultierender Zunahme der Hypovolämie

Im Rahmen des Schocks meist betroffene Organe (Schockorgane)

- **Niere:** Minderperfusion → Anurie/akutes Nierenversagen
- **Myokard:** Verminderte Koronarperfusion → Myokardischämie
- **Leber:** Nekrosen → Bis hin zum Leberversagen
- **Lunge:** ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) → Bis hin zur respiratorischen Globalinsuffizienz
- **Gerinnungssystem:** Gefahr der disseminierten intravasalen Gerinnung
- **Darm:** Darmatonie

Symptome/Klinik

Allgemeine Symptome

- Tachypnoe
- Tachykardie, Hypotonie
- Oligurie bis Anurie
- Marmorierte Haut

Zusätzliche Symptome nach Schockursache

Volumenmangel-Schock

- je nach Ursache : Blutung, Teerstuhl, Hämatemesis, Diarrhö





SCHOCK



Klassifizierung

Volumen

Auswurf

| Verschiebung Distributiver Schock | | Verlust Hypovolämer Schock | | Kardial Kardiogener Schock | | Extrakardial Obstruktiver Schock | |
|---|----------------|--|---------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|
| Septisch | Permeabilität | Hämorrhagisch Traumatisch-hämorrhagisch | Blut (gesamt) | Myokardiales Pumpversagen | Herzmuskel | Rechtsherzbedingt | Kleiner Kreislauf |
| Anaphylaktisch Anaphylaktoid Neurogen | Tonussteuerung | Hypovolämisch i.e.S. | Körperflüssigkeiten | Brady- und Tachyarrhythmien | Rhythmus und Reizleitungssystem | Nachlastbedingt | Großer Kreislauf |
| | | Traumatisch-hypovolämisch | Plasma | Herzklappenvitien | | Vorlastbedingt | Kombination |
|  <p>Vasodilatation</p> | |  <p>Hypovolämie</p> | |  <p>Pumpversagen</p> | |  <p>Perikardtamponade</p> <p>Obstruktion</p> | |

Obstruktiver Schock [1][2]

- Definition: Verminderung des Herzzeitvolumens durch vaskuläre Obstruktion
- Häufige Ursachen
 - Lungenembolie
 - Perikardtamponade
 - Aortendissektion
 - Spannungspneumothorax
 - Kompressives Mediastinalemphysem
 - Vena-cava-Kompressionssyndrom

Gelegentlich wird der obstruktive Schock als Unterform des kardiogenen Schocks gewertet. Da sich die therapeutischen Maßnahmen deutlich unterscheiden, ist eine Differenzierung jedoch sinnvoll! [2][1]
Symptomatisch lassen sich obstruktiver und kardiogener Schock häufig nicht unterscheiden!

Kardiogener Schock

- Dyspnoe (Lungenstauung, Lungenödem)
- Gestaute Halsvenen (ZVD↑/→)

Anaphylaktischer Schock

- Larynxödem
- Bronchospasmus mit bedrohlicher Dyspnoe

Septischer Schock

- Symptome des Sepsisherds
 - Fieber, Desorientiertheit (qSOFA-Score)
 - **Klinische Präsentationsformen**
 - In der Frühphase : Haut warm, rosig und trocken, RR und ZVD normal bis leicht verringert
 - In der Spätphase : Ähnlich dem Volumenmangel-Schock mit Kaltschweißigkeit, Blässe, Hypotonie, ZVD↓
- Atemfrequenz: $\geq 22/\text{min}$
Systolischer Blutdruck: $< 100 \text{ mmHg}$
ZNS: Vigilanzminderung bzw. veränderter mentaler Status
(z.B. 500-1000mg Methylprednisolon i. v.)

Neurogener Schock

- Je nach Ursache: Bewusstseinsstörung
- Evtl. Verlust der spinalen Reflexe und der Sensibilität bei medullärer Schädigung

Diagnostik

Anamnese

- Symptome, Grunderkrankung

Körperliche Untersuchung

- **Ansprechbarkeit prüfen**
- Erfassung der **Vitalparameter**: Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz, Temperatur, Pulsoxymetrie
- **Haut** : Hautkolorit (Blässe, ggf. marmorierte Haut), Rekapillarisationszeit
- Beurteilung der Pupillenreaktion
- **Schockindex** = **Puls/systolischer RR**
 - Ist dieser Quotient > 1 , ist der Schockindex positiv und deutet auf einen Schock hin

Labor

- Blutbild, Kreat, HS, Elektrolyte, BZ, Infektparameter (CRP, PCT), Gerinnungsparameter (aPTT, Quick), Leberwerte (AST, ALT, AP, GGT, BLB), Troponin, CK-MB
- BGA (Laktat)
- Ggf. Blutkulturen

Apparative Diagnostik

- **Basismonitoring** : Herzfrequenz, Atemfrequenz, Temperatur, Pulsoxymetrie, EKG. Invasive Blutdruckmessung. Blasenkatheter (Ein- und Ausfuhr)
- **ZVD-Messung** (Alternative : VCI-Durchmesser mit Sono)
 - Erhöht (bis normal): Bei kardiogenem Schock
 - Erniedrigt (bis normal): Bei allen anderen Schockformen
- **Röntgen-Thorax**: Bspw. Lungenstauung, -ödem, Infiltrate im Rahmen eines ARDS, Herzgröße
- **Sonographie**: Bspw. bei V.a. abdominalen Infektionsherd, Urosepsis, intraabdominelle Blutung
- **EKG, Echokardiographie**: Insb. bei kardialer Ursache
- **Herzkatheteruntersuchung**
 - **Linksherzkatheteruntersuchung**: Zur Diagnostik der Ursache (z.B. Myokardinfarkt) und ggf. interventioneller Therapie per PTCA
 - **Rechtsherzkatheteruntersuchung**: Für das erweiterte hämodynamische Monitoring durch Pulmonalkatheter
- **Zusätzliche Diagnostik** : je nach Ursache

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- **Lagerung**
 - Bei hypovolämischem Schock: Schocklagerung mit angehobenen Beinen um etwa 15°
 - **Ausnahme:** Bei kardiogenem Schock wird die Oberkörperhochlagerung empfohlen
- **O2-Gabe:** Je nach Schweregrad über Nasensonde oder Maske, ggf. Intubation
- **Schutz vor Auskühlung**
- **Überwachung:** Vitalparameter (HF, AF, RR, Temp.), EKG, Diurese, Pulsoxymetrie, BGA
- **Legen mehrerer großlumiger venöser Zugänge:** Volumen- und ggf. Blutsubstitution (außer beim kardiogenen Schock)
 - Bei drei vergeblichen Versuchen, einen peripheren venösen Zugang zu legen → Anlage eines intraossären Zugangs am Tibiakopf (meistens beim Kind, seltener beim Erwachsenen)

Therapie je nach Schockursache

Volumenmangel-Schock (Hämorrhagischer Schock)

- **Akute Blutstillung:** Notfallendoskopie bzw. Notfalloperation
- **Volumensubstitution**
 - Kristalloide Lösungen, z.B. Ringerlösung
 - Kolloidale Lösungen, sollen nicht mehr verwendet werden!
- **Blutprodukte:** Transfusion von Erythrozytenkonzentraten

Kardiogener Schock

- **Je nach Ursache spezifische Therapie,**
 - Myokardinfarkt: Reperfusion anstreben (PTCA, Lyse)
 - Perikardtamponade: Punktion
 - Lungenembolie: Lyse
 - Kardiale Dekompensation :Diuretika-Therapie nach Stabilisierung
- **Medikamentöse Therapie:** **Dobutamin**-Perfusor, bei unzureichendem Effekt **Noradrenalin**-Perfusor, vorsichtige Volumengabe möglich

Anaphylaxie-Notfalltherapie

- **Kreislaufstabilisierung:** **Adrenalin** im oder iv, mit **Volumengabe** (Vollelektrolytlösung)
- **Durchbrechung der allergischen Reaktion**
 - **Glucocorticoid hochdosiert** (z.B. 500-1000mg Methylprednisolon i. v.)
 - **Antihistaminikum** (z.B. Dimetinden)

Septischer Schock

- Siehe: Sepsis-Therapie

Neurogener Schock

- **Schmerztherapie**
- **Kreislaufstabilisierung:** z.B. Noradrenalin i.v. + Volumensubstitution
- **Atemwegssicherung**
- **Maßnahmen zur Hirndrucksenkung**

Komplikationen

- **Kreislaufversagen** → Reanimation
- **Akutes Nierenversagen**
- **Akutes Lungenversagen** (ARDS)
- **Multiorganversagen** (MOV)
- **Gewebsnekrosen, Gangrän**

Prognose

- Stark abhängig von Ursache sowie Zeitpunkt der Behandlung

Maßnahmen zur Hirndrucksenkung

- Therapieindikation [6]
 - Ab ICP ≥ 23 mmHg
 - Oder klinischen Hirndruckzeichen
- Zielwerte von ICP und CPP [6]
 - ICP < 23 mmHg
 - CPP > 60 mmHg
- Bei SAB mit ausgeprägten perfusionsrelevanten Vasospasmen sollten 80–120 mmHg angestrebt werden

Konservative Hirndrucksenkung [6][5]

Neuroprotektive Maßnahmen

- Euthermie
- Normoglykämie
- Normotension: Antihypertensive Therapie nur mit ICP-neutralem Blutdrucksenker
 - Urapidil
 - Betablocker oder zur intensivstationären Dauertherapie ACE-Hemmer
- Normoxie
- Normokapnie
 - Bei beatmeten Patient:innen mit ICP-Krise: Ggf. kurze moderate Hyperventilation mit paCO_2 30–35 mmHg hilfreich
- Ausgeglichener Elektrolyt- und Wasserhaushalt

Oberkörperhochlagerung

- Vermutlich günstig, aber keine generelle Empfehlung
- Testweise Oberkörperhochlagerung auf 15° und 30° unter Monitoring von ICP und CPP zur Feststellung des individuellen Optimums

Atemwegssicherung

- Endotracheale Intubation bei GCS ≤ 8 und/oder respiratorischer Insuffizienz
 - Siehe: Rapid Sequence Induction - AMBOSS-SOP und Maschinelle

Beatmung

Nicht mehr standardmäßig empfohlen

- Glucocorticoid-Gabe (außer zur antiödematösen Therapie bei z.B. perifokalen Ödemen von Hirntumoren, nach einer kraniellen Strahlentherapie oder bei Meningoenzephalitis)
- Therapeutische Hypothermie
 - Hohes Komplikationsrisiko und schlechtes Outcome bei schwerem Schädelhirntrauma nachgewiesen [7][8]
 - Evidenz bei anderen Ursachen der ICP-Erhöhung mangelhaft
 - Mögliche Therapieoption nur bei therapierefraktärer ICP-Erhöhung

Bei erhöhtem ICP aufgrund eines SHT oder ischämischen Schlaganfalls sollte die Gabe von Glucocorticoiden vermieden werden. Nach aktueller Studienlage ergibt sich kein Überlebensvorteil, während die Komplikationsrate erhöht ist!

Viele Blutdrucksenker (z.B. Calciumantagonisten, Dihydralazin, Nitroprussid und Nitroglycerin) bewirken einen ICP-Anstieg! Geeignet zur antihypertensiven Therapie sind insb. Betablocker, ACE-Hemmer und Urapidil.

Osmotherapeutika zur Hirndrucksenkung [6]

- Kontroverses Therapieprinzip!
- Theoretische Wirkweise: Hyperosmolare Lösungen führen durch einen osmotischen Gradienten zum Wasserausstrom über die Blut-Hirn-Schranke und damit zur Abnahme des Hirnödems
- Limitationen
 - Aufbau eines osmotischen Gradienten bei gestörter Blut-Hirn-

Schranke nicht möglich

- Osmotischer Gradient kann zu einer Dehydrierung des

Hirnparenchyms führen

- Mögliche Steigerung der Osmolalität im geschädigten Hirngewebe bei gestörter Blut-Hirn-Schranke, evtl. dadurch sogar weitere Ödemzunahme
- Potentielle Nierenschädigung und Rebound-Effekte
- Mangelnde Evidenzlage
- Empfehlungen zum Einsatz
 - Nur als kurzfristige und titrierte Bolus-Gabe zur Behandlung von ICP-

Spitzen

- Keine prophylaktische Gabe bei normalem oder grenzwertig erhöhtem


ICP

- Dosisbestimmung immer gesteuert durch Kontrollen der Serum-

Osmolalität (Mannitol) bzw. der NaCl-Serumkonzentration

- Langsame Reduktion zur Vermeidung eines Rebound-Effekts

• Substanzen

- Mannitol  20%ige Mannitol-Infusionslösung max. 0,5–1 Flasche (à 250 mL) i.v. als Bolusgabe; danach weitere Gabe unter engmaschiger Kontrolle der Serum-Osmolalität; Maximaldosis: 6x250 mL/Tag (i.d.R. werden aber 2x 250 mL/Tag nicht überschritten); Ziel-Osmolarität: 320 mosmol/L;
- Hypertone Kochsalzlösung 7,5–10%ige NaCl-Infusionslösung 75–150 mL i.v. als Bolus; danach wegen unterschiedlichem Ansprechen vorsichtige Dosis-Titration; Ziel-Natrium: 145 bis max. 155 mmol/L;

Erstmaßnahmen

Anamnese: Beginn und Verlauf, Unfallhergang, auslösendes Ereignis, Vor- und Begleiterkrankungen, Medikamente, Alkohol, Drogen, Gifte, Allergien
Untersuchung: Inspektion (Zyanose, Verletzungen, Insektenstiche, Halsvenen gestaut), Puls, RR, Schockindex (physiol. 0,5), Atemfrequenz, Temperatur, Bewusstseinslage, Inspektion/Palpation/Auskultation d. Thorax und Abdomens

Definition

globales Kreislaufversagen, das infolge eines Missverhältnisses zwischen Herzzeitvolumen u. Durchblutungsbedarf der Organe auftritt

Labor: BB, Quick, PTT, Glu, E'lyte, BGA, CK

Bildgebung/Funktionsdiagnostik: Sono Abdomen, Röntgen Thorax, CT Schädel, Blutzuckerschnelltest

Therapie: Patienten beruhigen, Schocklagerung (Beine hoch, Oberkörper tief, cave: nicht bei kardiogenem Schock!), O₂-Gabe, Intubation/Beatmung, großzügige Flüssigkeitsgabe i.v. (Ringer, cave: nicht bei kardiogenem Schock!), Monitoring von Puls, RR, Atmung, Temperatur und Bewusstsein, Sedierung und Analgesie

Leit- und Begleitsymptome

Blässe, flacher Puls, Tachykardie, Hypotonie, periphere Zyanose

Verdachtsdiagnosen

hypovolämischer Schock

Spezifische Diagnostik

Trauma, Verbrennung, Dehydratation
 Krea, Laktat
 ZVD (erniedrigt)

Spezifische Therapie

Kompression blutender Wunden, Wundversorgung, Bluttransfusion (EKs, FFP)
medikamentös → Katecholamintherapie, Korrektur d. metabolischen Azidose
operativ → Blutstillung

Dyspnoe, Hypotonie, Tachykardie, flacher Puls, gestaute Halsvenen

kardiogener Schock

Z. n. Myokardinfarkt, kardiale Vorerkrankungen
 Myoglobin, Troponin T/I, CK-MB
 ZVD (erhöht)

Oberkörper hoch lagern, zurückhaltend i. v. Flüssigkeitsgabe
medikamentös → Nitro, Nifedipin, Furosemid, Katecholamine
Myokardinfarkt → Akut-PTCA, Fibrinolyse

Tachykardie, Verwirrtheit, Vigilanzstörung, Kaltschweißigkeit, Krampfanfälle

hypoglykämischer Schock

DM, Alkohol, Insulin, Sulfonylharnstoffe, β -Blocker, Salicylate, MAO-Hemmer, Disopyramid, Pentamidin
 Reflexstatus (Hyperreflexie, evtl. patholog. Reflexe)
 BZ <40 mg/dl (2,2 mmol/l), C-Peptid

medikamentös → 50 ml Glukose 40% i. v., Infusion Glukose 5–10%
 stationäre Einstellung des DM, Therapie der Grunderkrankung (z. B. Insulinom)

Pruritus, Urtikaria, Flush, Kopfschmerzen, Tachykardie, Hypotonie, Dyspnoe, Bronchospasmus, Larynxödem

anaphylaktischer Schock

dosisunabhängiges Auftreten nach Zufuhr von allergenen Substanzen, tierischen Antisera

Antigenzufuhr stoppen!
medikamentös → Adrenalin i.m., i. v., Antihistaminika, Kortikoide
 Intensivüberwachung

hohes Fieber, Schüttelfrost, trocken-warme Haut, Tachykardie

septisch-toxischer Schock

Blutkulturen, Antibiogramm
 ZVD (normal)

Entfernen/Wechseln von ZVK/Blasenkatetern, kalkulierte Antibiose

schlaife Para- oder Tetraplegie, Überlaufblase, Hyperthermie, periphere Vasoparalyse, motorische/sensible Ausfälle

neurogener Schock (Hämatom, Abszess, Fraktur)

Auskultation Abdomen (paralytischer Ileus?), neurol. Untersuchung
 Krea, Laktat
 Röntgen Wirbelsäule in 2 Ebenen, CT/MRT Wirbelsäule (Ödem, Höhlenbildung, Nekrose), SEP

waagrechte Lagerung (Vakuummatratze)
medikamentös → Methylprednisolon i.v., Thromboseprophylaxe (Heparin, später Marcumarisierung)
symptomatisch → Krankengymnastik, Blasenkateter oder suprapubische Ableitung
kausal → operative Therapie

Anaphylaxe

Therapie: Sofortmaßnahmen

- **SOFORT: Allergenzufuhr stoppen!**
- **Beruhigung** von Patient (und Eltern)
- **Lagerung** symptomorientiert: Flachlagerung ist präferiert.
 - Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage
 - Bei hämodynamischer Instabilität: Trendelenburg-Lagerung (Beine hoch)
 - Bei Atemnot: sitzende oder halbsitzende Position
- **Beurteilung des Schweregrades:** Erkennen und Behandeln des bedrohlichsten Symptoms
- Gesicherten **Zugang** schaffen
 - Bei Atem- oder Kreislaufbeschwerden sollten schon vorher **Adrenalin i.m.** und **Sauerstoff inh.** gegeben werden!
 - Bei Herz-Kreislauf-Reaktion bzw. -Stillstand evtl. **intraossärer Zugang**

Weiterführende Therapie bei Anaphylaxie

Überwachung

- Bis zur anhaltenden Remission
- Möglichkeit eines biphasischen Verlaufs berücksichtigen
- Bei allen schweren Reaktionen (\geq Grad II): Stationäre Überwachung
- Bei Anaphylaxien mit bedrohlicher Allgemeinreaktion: Intensivmedizinische Überwachung

Schweregradeinteilung in Anlehnung an Ring und Messmer [1]

Die Einteilung erfolgt nach dem jeweils lebensbedrohlichsten Leitsymptom

- **Grad I: Leichte** Allgemeinreaktion
 - Generalisierte **Hautsymptome**
 - Keine weiteren Symptome
- **Grad II: Ausgeprägte** Allgemeinreaktion
 - Generalisierte **Hautsymptome**
 - Abdominelle Symptome: Übelkeit, Bauchschmerzen, Meteorismus
 - **Atemwegssymptome:** Rhinorrhö, Dysphonie, subjektive Dyspnoe
 - **Kardiovaskuläre Symptome:** Tachykardie, Hypotonie, Arrhythmie
- **Grad III: Bedrohliche** Allgemeinreaktion
 - Generalisierte Hautsymptome
 - Abdominelle Symptome: Erbrechen, **Defäkation**
 - Atemwegssymptome: **Giemen**, **Larynxödem** mit inspiratorischem **Stridor**, **Zyanose**
 - Kardiovaskuläre Symptome: **Schock**, **Bewusstlosigkeit**
- **Grad IV: Organversagen**
 - Generalisierte Hautsymptome
 - Abdominelle Symptome: Erbrechen, Defäkation
 - Atemwegssymptome: **Atemstillstand**
 - Kardiovaskuläre Symptome: **Herz-Kreislauf-Stillstand**

Sechs Szenarien in Abhängigkeit des Schweregrades

| Grad | Leitsymptome | Therapie |
|--------|---|--|
| I | <ul style="list-style-type: none"> Systemisch vermittelte, generalisierte Hautmanifestation (Juckreiz, Urtikaria, Flush, Angioödem) <p><i>Dimetinden Prednisolon ± Ranitidin</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> H₁-Antagonist i.v. (bspw. Dimetinden, Clemastin) Glucocorticoid i.v. (bspw. Prednisolon 500–1000 mg i.v. als Bolus) Reevaluation und ggf. symptomorientierte Therapieeskalation bzw. -ergänzung <ul style="list-style-type: none"> H₂-Antagonist i.v. (bspw. Ranitidin) <p><i>0-1mg/Kg (Ranitidin) 1-2 mg/Kg</i></p> |
| II–III | <ul style="list-style-type: none"> Gastrointestinal (Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen) Obstruktion der unteren Atemwege (Dyspnoe, bronchiale Obstruktion, Bronchospasmus) <p><i>Butylscopolamin Diprinyhydrinat</i></p> <p><i>Adrenalin in O₂ Salbutamol</i></p> <p><i>+ Reprotekt + Norflox + Atemversicherung</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> H₁-Antagonist i.v. (bspw. Dimetinden, Clemastin) Glucocorticoid i.v. (bspw. Prednisolon) Reevaluation und ggf. Therapieeskalation <ul style="list-style-type: none"> Spasmolytika i.v. (bspw. Butylscopolamin) Und/oder Antiemetika i.v. (bspw. Dimenhydrinat) H₂-Antagonist i.v. (bspw. Ranitidin) Adrenalin i.m. [2][3][4] <ul style="list-style-type: none"> Dosierung mittels Adrenalinlösung <ul style="list-style-type: none"> Kinder/Erwachsene 30–60 kgKG 300 µg Kinder 15–30 kgKG 150 µg Sauerstoff inhalativ <ul style="list-style-type: none"> β₂-Sympathomimetika inhalativ (bspw. Salbutamol) H₁-Antagonist i.v. (bspw. Dimetinden, Clemastin) Glucocorticoid i.v. (bspw. Prednisolon) Reevaluation und ggf. Therapieeskalation <ul style="list-style-type: none"> Adrenalin [2][3][4] <ul style="list-style-type: none"> Bevorzugt i.m. <ul style="list-style-type: none"> Dosierung mittels Adrenalinlösung <ul style="list-style-type: none"> Kinder/Erwachsene 30–60 kgKG Kinder 15–30 kgKG Ggf. i.v. intraösär <ul style="list-style-type: none"> Erwachsene 50 µL Wiederholung 5–10 min Kinder 1 mg/Kg β₂-Sympathomimetika s.c./i.v. (bspw. Reproterol) H₂-Antagonist i.v. (bspw. Ranitidin) Atemwegssicherung in Narikose bei drohender respiratorischer Insuffizienz <p><i>10 µg/Kg 20-40 µg Kinder 0.3–0.6 mg/Kg Häufig 1-2 mg/Kg Wiederholung x3 2 Hub 18-90 µg/h</i></p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> Obstruktion der oberen Atemwege (Uvulaschwellung, Dysphonie, inspir. Stridor) <p><i>+ Adrenalin inh + Koniotomie</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Adrenalin i.m. [2][3][4] <ul style="list-style-type: none"> Dosierung mittels Adrenalinlösung Dosierung mittels Fertigspritze <ul style="list-style-type: none"> Kinder/Erwachsene 30–60 kgKG Kinder 15–30 kgKG Sauerstoff inhalativ Legen eines i.v. Zugangs Adrenalin inhalativ 2 mg/4 ml (Nalco A/G) H₁-Antagonist i.v. (bspw. Dimetinden, Clemastin) Glucocorticoid i.v. (bspw. Prednisolon) Reevaluation und ggf. Therapieeskalation <ul style="list-style-type: none"> H₂-Antagonist i.v. (bspw. Ranitidin) Koniotomie in Narikose bei persistierendem Larynxödem |
| | <ul style="list-style-type: none"> Herz-Kreislauf-Reaktion (Hypotonie, Bewusstlosigkeit, Anaphylaktischer Schock) <p><i>+ intraösären Zugang + Volumensubstitution + Dopamin od. Noradrenalin als Dauerinfusion</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Adrenalin i.m. [2][3][4] <ul style="list-style-type: none"> Dosierung mittels Adrenalinlösung Dosierung mittels Fertigspritze <ul style="list-style-type: none"> Kinder/Erwachsene 30–60 kgKG Kinder 15–30 kgKG Sauerstoff inhalativ Legen eines i.v. intraösären Zugangs Forcierte Volumensubstitution i.v. intraösär H₁-Antagonist i.v. intraösär (bspw. Dimetinden, Clemastin) Glucocorticoid i.v. intraösär (bspw. Prednisolon) Reevaluation und ggf. Therapieeskalation <ul style="list-style-type: none"> Adrenalin i.v. intraösär (i.m.) [2][3][4] <ul style="list-style-type: none"> Erwachsene Kinder ODER Dopamin i.v. intraösär ODER Noradrenalin i.v. intraösär H₂-Antagonist i.v. (bspw. Ranitidin) <p><i>2-5 µg/Kg/min 0.02–0.15 µg/Kg/Minute Dauerinf. 20-20 ml/Kg NaCl 0.9% Bolus Wiederholung 5-10 min</i></p> |
| IV | <ul style="list-style-type: none"> Herz-Kreislauf-Versagen <p><i>+ Reanimation + ggf. Defibrillation + Intubation</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> Reanimation (Advanced Life Support) <ul style="list-style-type: none"> Legen eines i.v. intraösären Zugangs Adrenalin i.v. intraösär Atemwegssicherung ggf. Intubation Sauerstoff inhalativ Forcierte Volumensubstitution i.v. intraösär Ggf. Defibrillation H₁-Antagonist i.v. (bspw. Dimetinden, Clemastin) Glucocorticoid i.v. (bspw. Prednisolon) Reevaluation und Therapieergänzung entsprechend des Leitsymptoms (s.o.) |

- Dimetinden 0.1 mg/Kg
- Prednisolon $500-1000 \text{ mg}$
- Ranitidin $1-2 \text{ mg/Kg}$
- Butylscopolamin $20-40 \text{ mg}$ $0.3-0.6 \text{ mg/Kg}$ ^{Kinder}
- Dimenhydrinat $1-2 \text{ mg/Kg}$
- Adrenalin $\left\{ \begin{array}{l} \text{Lösung } 10 \mu\text{g/Kg} \quad (1 \text{ ml} = 1 \text{ mg}) \quad 0.1 \text{ ml} = 10 \mu\text{g} \\ \text{Fertigspritze } \left\{ \begin{array}{l} 300 \mu\text{g} \\ 150 \mu\text{g} \end{array} \right. \end{array} \right.$ Wiedeholung $\times 3$ $5-10 \text{ m}$
- O_2 $5-12 \text{ L}$
- Salbutamol 2 Hub
- Reproterol $18-90 \mu\text{g/h}$ $3-4 \text{ T}$
- Adrenalin inh. $2 \text{ mg/4 ml NaCl } 0.9\%$
- Koniotomie
- Volumensubstitution $10-20 \text{ ml/Kg NaCl Boks}$ Wiedeholung $5-10 \text{ min}$
- Dopamin $2-15 \mu\text{g/h}$ Dauerinf.
- Noradrenalin $0.02-0.15 \mu\text{g/h}$ Dauerinfusion
- Reanimation
- Intubation
- Defibrillation

Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) ++

Definition

- systolische BD-Werte ≥ 140 mmHg und/ oder diastolische BD-Werte ≥ 90 mmHg in der Arztpraxis
- Häufigster kardiovaskulärer Risikofaktor. Prävalenz bei Erwachsenen 50%

Einteilung

| | |
|----------------------------------|--|
| Optimal | <120/80 mmHg |
| Normal | <130/85 mmHg |
| Hoch-normal | 130-139/85-89 mmHg |
| Hypertonie Grad I | 140-159/90-99 mmHg |
| Hypertonie Grad II | 160-179/100-109 mmHg |
| Hypertonie Grad III | $\geq 180/110$ mmHg |
| Isolierte systolische Hypertonie | ≥ 140 mmHg systolisch, <90 mmHg diastolisch |

] nur bei ↑ Kardio Risiko ist Therapie indiziert
] Therapie indiziert

Ätiologie

Essentielle (primäre) Hypertonie (90%)

- multifaktoriell
- **Risikofaktoren**: Alter. Rauchen. Alkohol- und/oder Koffeinkonsum. Hohe Kochsalzzufuhr. Adipositas. Bewegungsmangel. Positive Familienanamnese. Stress

Sekundäre Hypertonie (10%)

- Schlafapnoe-Syndrom
- Nierenerkrankungen: Niereninsuffizienz, Nierenarterienstenose, Glomerulonephritis
- Aortenisthmusstenose
- Endokrine Hypertonie: Hyperaldosteronismus (Morbus Conn), Phäochromozytom
- Medikamente (NSAR, Corticosteroide, Sympathomimetika, orale Kontrazeptiva). Drogen
- Lakritze عرق السوة

Symptome/Klinik

- häufig symptomlos
- Mögliche Symptome: Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen, Palpitationen, Epistaxis

Diagnostik

Anamnese

Symptome, frühere Erkrankungen (z. B. der Niere), Familienanamnese, Medikamente, Genussmittel.

Körperliche Untersuchung

- **Blutdruckmessung**:
 - Wiederholte Blutdruckmessung zu verschiedenen Zeitpunkten (Ausnahmen: bei Hypertonie Grad 3 oder Hinweis aus Endorganschaden)
 - Vor der Messung: Patienten im Sitzen ruhen lassen
 - Anlegen der Blutdruckmanschette auf Herzhöhe
 - Bei Erstmessung: an beiden Armen BD messen
 - Durchführung von zwei Messungen im Sitzen, mit einem Abstand von 1–2 min (falls die beiden Messungen um >10 mmHg differieren → weitere Messungen mit Bildung eines Mittelwerts)
 - Bei der Erstmessung den BP eine und 3 Minuten nach Aufstehen aus dem Sitzen messen, um eine orthostatische Hypotonie auszuschließen.
- Puls an beiden Armen und Beinen (Aortenisthmusstenose?)
- Ggf. Pulsus durus (harter Puls)
- Ggf. Strömungsgeräusche im seitlichen Oberbauch (Nierenarterienstenose?)

(Häusliche) Blutdruck-Selbstmessung

- 2 Messungen morgens und 2 abends für 5 Tage. (oder 3 Messungen morgens und 3 abends für 3 Tage = 3-Regel)
- Hypertonie ist definiert als $BD \geq 135/85$
- **Indikationen:** V.a. Weißkittel-Hypertonie (Hypertonie Grad 1 bei der Praxis-BD-Messung, deutliche Praxis-BD-Erhöhung, aber ohne Endorganschäden). V.a. maskierte Hypertonie (Hochnormaler Praxisblutdruckwert, normaler Praxis-BD bei Endorganschäden oder hohem CV-Gesamtrisiko). V.a. resistente Hypertonie. Überprüfung der BD-Kontrolle. V.a. Hypotonie unter Behandlung.

Langzeitblutdruckmessung

- Wiederholte Blutdruckmessung mithilfe eines tragbaren Geräts über 24 h.
- Hypertonie ist definiert als $BD \geq 135/85$ tagsüber, $\geq 120/70$ in der Nacht, $\geq 130/80$ über 24h
- **Indikationen** (s.o.): zusätzlich Bewertung der **nächtlichen BD-Werte** und des Dipping-Status (V.a. nächtliche Hypertonie, Schlafapnoe, CKD, Diabetes). V.a. Schwangerschaftshypertonie.

Labordiagnostik

BB, Kreatinin, Elektrolyte, Harnsäure, Blutzucker, HbA1C, Lipidstatus, Harnstatus (inkl. Test auf Mikroalbuminurie). Ggf. spezielles Labor bei V.a. sekundäre Hypertonie

EKG

Linksherzhypertrophie? Herzrhythmusstörung?

Augenhintergrund (Funduskopie)

Hypertensive Retinopathie?

Ggf. erweiterte Diagnostik

Echokardiographie, Carotis-Sonographie, Abdominelle Sonographie,...

Therapie

Allgemeine Maßnahmen („Lebensstil-Änderungen“)

- Nikotinkarenz
- Reduktion des Alkoholkonsums
- Reduktion des Salzkonsums
- Mediterrane Diät
- Bewegung
- Gewichtsreduktion

Medikamentöse Therapie

Indikation (Grenzwerte für die Behandlung)

$\geq 140/90$ mmHg ($\geq 160/90$ mmHg bei Patienten ≥ 80 Jahren)

Zielblutdruckwerte (in Praxis)

- **Systolischer BD:** $120-130$
 - Patienten zwischen 18–65 J.: <130 mmHg wenn gut vertragen, aber ≥ 120 mmHg (Ausnahme: chronische Nierenerkrankung: <140 , aber ≥ 130) $130-140$
 - Patienten ≥ 65 J. (und auch ≥ 80 J.): <140 mmHg wenn gut vertragen, aber ≥ 130 mmHg $130-140$
- **Diastolischer BD:** <80 mmHg wenn gut vertragen, aber ≥ 70 mmHg $70-80$

Schemata zu Therapiebeginn

- **Zweifachtherapie** : i.d.R. ACE-Hemmer oder Sartane + Calciumantagonist vom Dihydropyridin-Typ oder Thiaziddiuretikum. Mit niedriger Dosis starten und langsam erhöhen.
 od. β -Blocker (wenn indizierte ZB MI, HZ, AP) + Andere Medikament

Ggf. Therapieeskalation

- **Intensivierung der Zweifachkombination:** maximal vertragene Dosis geben, ggf. Wechsel auf eine andere Zweifachkombination
- Bei ausbleibender Wirkung : **Dreifachkombination** (Diuretikum + Calciumantagonist + ACE-Hemmer oder Sartan)

ACE
od.
AT₁ 1

+ Calciumantagonist (Dihydropyridin) 2

od. Thiazid Diuretika
od. β -Blocker
x 1 or 2

- Bei ausbleibender Wirkung → Weitere Eskalation : Aldosteronantagonisten (Spironolacton), zentrale Alpha-2-Agonisten (Moxonidin, Alpha-Methyldopa, Clonidin), Alpha-Blocker (Doxazosin, Urapidil), direkte Vasodilatoren (Dihydralazin)

Antihypertensiva

| | Günstig bei | Ungünstig bei (ggf. KI) |
|---|--|--|
| Thiazide (Hydrochlorothiazid) <i>12.5mg 1-0-0 25mg</i> | .Herzinsuffizienz .Osteoporose (Calciumretention) | .Diabetes mellitus .Hyperurikämie .Hypokaliämie .Schwangerschaft |
| ACE-Hemmer (Ramipril) <i>12.5-10mg</i> AT1-Rezeptorblocker (Candesartan) <i>80-160mg bis 320mg/T</i> | .Herzinsuffizienz .Z.n. Herzinfarkt .Diabetes mellitus (Nephroprotektion) | .Beidseitige Nierenarterienstenose .Hyperkaliämie .Schwangerschaft |
| Betablocker (Metoprolol) <i>has 100mg/T</i> | .stabile Angina pectoris .Z.n. Myokardinfarkt .Herzinsuffizienz .Tachykardie HRST | .Bradykardie HRST (z.B. AV-Block) .schwere pAVK .Asthma bronchiale .Raynaud-Syndrom .Prinzmetal-Angina |
| Calciumantagonist (Amlodipin) <i>5-10mg/T</i> | .stabile Angina pectoris .Prinzmetal-Angina .Raynaud-Syndrom | .Akutes Koronarsyndrom .Gastroösophageale Refluxkrankheit |

2-fach Therapie

intensivierung

3-fach Therapie

+ Aldosteronantagonisten
 od. + zentrale α2-Agonisten
 od. + α-Blocker
 od. + direkte Vasodilatoren

Indikationen für eine stationäre Aufnahme

- V.a. sekundäre Hypertonie
- Refraktäre Hypertonie
- Hypertensiver Notfall (Ggf. hypertensive Krise)

Sonderformen

Weißkittelhypertonie

- Erhöhte BD-Werte in der Arztpraxis, aber normale BD-Werte in der Blutdruck-Selbstmessung oder Langzeitblutdruckmessung
- Therapie:** nur Lebensstil-Änderungen
- Prognose:** Risiko liegt zwischen dem bei Normotonie und manifester Hypertonie

Maskierte Hypertonie

- Normale BD-Werte in der Arztpraxis, aber erhöhte BD-Werte in der Blutdruck-Selbstmessung oder Langzeitblutdruckmessung
- Therapie:** Lebensstil-Änderungen mit medikamentöser Therapie
- Prognose:** gleich dem von Patienten mit manifester Hypertonie

Maligne Hypertonie

- Diastolische Blutdruckwerte >120 mmHg (chronische Erhöhung) mit non-Dipper-Status (nächtlicher Abfall < 10%), hypertensive Retinopathie und Entwicklung einer Niereninsuffizienz
- Ätiologie:** Entstehung bei jeder Hypertonie-Form möglich
- Komplikationen:** Maligne Nephrosklerose, hypertensive Enzephalopathie
- Therapie:** Senkung des Blutdrucks auf unter 110 mmHg diastolisch innerhalb von 24 h
- Prognose:** Ohne Behandlung in bis zu 50% innerhalb eines Jahres letal

Refraktäre Hypertonie

- Nicht ausreichend eingestellte Blutdruckwerte trotz antihypertensiver Dreifachtherapie (unter Einbeziehung eines Diuretikums) in maximaler oder maximal tolerierter Dosis
- Vorgehen:** Ausschluss sekundärer Hypertonieursachen oder Medikation als Ursache der Therapieresistenz. Ausschluss pseudoresistenter Hypertonie (schlechte Compliance, Weißkittelphänomen,...)

- **Medikamente der Reserve:** (siehe weitere Eskalation)
 - Ggf. renale Sympathikusdenervation oder die Baroreflexstimulation

Komplikationen

Herz

- **Hypertensive Kardiomyopathie:** Durch Druckbelastung des linken Ventrikels → Herzinsuffizienz
- **KHK** durch Makro- und Mikroangiopathie

Gefäße

- **Karotisstenose**
- **Aortenaneurysma**
- **Aortendissektion**

Gehirn

- **Hämorrhagische oder ischämischer Schlaganfall**
- **Vaskuläre Demenz**

Niere

- **Hypertensive Nephropathie**
 1. Beginn mit Mikroalbuminurie
 2. Nephrosklerose mit Makroalbuminurie, zunehmende chronische Niereninsuffizienz
 3. Schrumpfniere und terminale Niereninsuffizienz

Auge

- **Hypertensive Retinopathie (Fundus hypertonicus):** Veränderungen der retinalen Gefäße

Hypertensive Entgleisung

Milde hypertensive Entgleisung

- **Definition:** Erhöhte Blutdruckwerte ohne zu rasche und extreme Blutdruckerhöhung wie bei der hypertensiven Krise und ohne Zeichen des hypertensiven Notfalls
- **Symptomatik:** Kopfschmerzen, Schwindel (ohne Auffälligkeiten in der neurologischen Diagnostik), innere Unruhe
- **Therapie:** Beruhigung, hinlegen und entspannen lassen. Ggf. Antihypertensivum-Gabe p.o. (keine Notfalltherapie). Ambulantes Prozedere

Hypertensive Krise und hypertensiver Notfall

Definition

- **Hypertensive Krise:** akuter Blutdruckanstieg mit Werten von >180/110 mmHg, ohne Zeichen von Organschäden
- **Hypertensiver Notfall:** akuter Blutdruckanstieg mit Werten von >180/110 mmHg, bei Zeichen von Organschäden
 - **Herz:** Akute Herzinsuffizienz bzw. kardiale Dekompensation, akutes Koronarsyndrom
 - **Gefäße:** Aortendissektion
 - **Gehirn:** Hypertensive Enzephalopathie, , hämorrhagische oder ischämischer Schlaganfall (Leitsymptom ist jegliches neurologisches Defizit)
 - **Niere:** Nierenversagen
 - **Auge:** Papillenödem, retinale Einblutungen
 - **Bei Schwangeren:** Zeichen der Eklampsie

Therapie

- **Einleitung einer medikamentösen Therapie:** dringlich bei hypertensiver Krise, sofortig bei hypertensiver Notfall

- **Nitrate:** Nitroglycerin: Glyceroltrinitrat (sublingual, ggf. über Perfusor) Glyceroltrinitrat s.l. 1-3 Sprühstöße à 0,4 mg oder 1-2 Zerbeißkapseln zu 0,2 mg bis max. 1,2 mg
 - **Calciumantagonisten** (Nifedipin p.o. als Zerbeißkapsel) 5-10 mg 0,8-1,2 mg
 - **Alpha-Blocker** (Urapidil i.v., ggf. über Perfusor) 10-50 mg iv
 - **Zentrale Alpha-2-Agonisten** (Clonidin i.v., ggf. über Perfusor) 0,075 - 0,15 mg
 - **Dierkte Vasodilatoren** (Dihydralazin i.v., ggf. über Perfusor) Dihydralazin 6,25-12,5 mg langsam i.v. oder 12,5-25 mg i.m., max. Tagesdosis 100 mg
- bei Preklausur*

- Keine RR-Senkung ^{max 25-30%} >30% innerhalb der ersten Stunde
- Stationäre Aufnahme bei hypertensiver Notfall. Die hypertensive Krise kann i.d.R. ambulant behandelt werden

Nierenarterienstenose

- Ätiologie: ¾ der Fälle Arteriosklerose, ¼ der Fälle fibromuskuläre Dysplasie ← Proliferation der Bindegewebe und Muskelgewebe der Gefäßwand ⇒ Stenosen i.d.B. o. Carotis int. und Nierenarterien
- Symptome: arterielle Hypertonie, Nierenfunktionsstörung
- Diagnostik
 - Abdominelles Strömungsgeräusch ^{Arteriosklerose}
 - Labor: Hypokaliämie (Hyperaldosteronismus) **↓K⁺**
 - Duplexsonographie
 - CT- oder MR-Angiographie der Nierenarterien
- Therapie
 - Indikation: Symptomatische Nierenarterienstenose $\geq 60\%$ (insb. bei fibromuskulärer Dysplasie)
 - Medikamentös: ACE-Hemmer, AT1-Rezeptorblocker und Calciumkanalblocker
 - Bei einer bilateralen Stenose sind ACE-Hemmer und AT1-Rezeptorblocker kontraindiziert!
 - Endovaskulär: PTA (Perkutane transluminale Angioplastie) mit oder ohne Stentimplantation.
 - Chirurgisch: bei erfolglosem endovaskulären Eingriff oder bei Patienten, die ohnehin an der Aorta operiert werden müssen

EKG (Elektrokardiographie) ++

Durch Anlage externer Elektroden wird die kardiale Erregungsausbreitung (*propagation de l'excitation*) abgeleitet (*dérivé*) und in Form einer charakteristischen Linie festgehalten.

Ablauf/Durchführung

Ableitungen

- **Standard:** 12-Kanal-EKG
 - 6 Extremitätenableitungen (I, II, III, aVL, aVF, aVR)
 - 6 Brustwandableitungen (V₁–V₆).
- Bei V.a. Hinterwandinfarkt: Linksdorsale Ableitungen V₇₋₉

Projektionen der Extremitätenableitungen

| Ableitungen | Bezeichnung | Projektion |
|---------------------|--------------------------------|---|
| I, aVL | Hohe linkslaterale Ableitungen | (Hohe) Seitenwand des linken Ventrikels |
| II, III, aVF | Inferiore Ableitungen | Hinterwand des linken Ventrikels |

Projektionen der Brustwandableitungen

| Ableitung | Bezeichnung | Projektion | Lokalisation der Brustwandelektroden |
|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| V ₁ | Rechtspräkordiale Ableitungen | Vorderwand beider Ventrikel | 4. ICR parasternal rechts |
| V ₂ | | | 4. ICR parasternal links |
| V ₃ | Apikale Ableitungen | Vorderwand linker Ventrikel | Zwischen V ₂ und V ₄ |
| V ₄ | | | 5. ICR medioclavicular links |
| V ₅ | Tiefe linkslaterale Ableitungen | (Tiefe) Seitenwand linker Ventrikel | Vordere Axillarlinie gleiche waagerechte (horizontal) Höhe wie V ₄ |
| V ₆ | | | Mittlere Axillarlinie gleiche waagerechte Höhe wie V ₄ |
| V ₇ | Linksdorsale (posteriorer) Ableitungen | Hinterwand linker Ventrikel | Hintere Axillarlinie gleiche waagerechte Höhe wie V ₄ |
| V ₈ | | | Scapularlinie gleiche waagerechte Höhe wie V ₄ |
| V ₉ | | | Paravertebrallinie gleiche waagerechte Höhe wie V ₄ |
| V _{3r-6r} | Rechtsthorakale Ableitungen | Rechter Ventrikel | Spiegelbildlich zu V ₃₋₆ |

Papiervorschub (*avancement*)

- **Standard für 12-Kanal-EKGs :** Papiervorschub von 50 mm/s → 1 mm = 0,02 s
- **Standard für Rhythmusstreifen (*bande*) :** Papiervorschub von 25 mm/s. 1 mm = 0,04s
- **Amplitude:** 1 mm entspricht 0,1 mV

Interpretation

1. Rhythmus *ob Sinus (P-Wellen)*
2. Herzfrequenz */min (bei 50 mm/s 600/min, bei 25 mm/s 300/min)*
3. Lagetyp
4. Zeiten *Komplexe*
5. Morphologie

- **EKG-Normalbefund :** Sinusrhythmus mit einer Frequenz von X/Min., Linkstyp, normale P-Wellen, PQ-Zeit nicht verlängert, QRS nicht verbreitert, keine signifikanten ST-Streckenveränderungen, keine Erregungsrückbildungsstörungen

Übersicht über die Bestandteile der EKG-Linie

| | Bedeutung | Normal | Bemerkung |
|--------------------|---|---|--|
| P-Welle | Erregungsausbreitung in den Vorhöfen | Dauer $\leq 0,1$ s Amplitude $< 0,25$ mV | I.d.R. positiv |
| PQ-Zeit | Erregungsausbreitung in den Vorhöfen und atrioventrikuläre Überleitung | Dauer 0,12–0,2 s | isoelektrische Nullniveau des EKGs ? |
| QRS-Komplex | Erregungsausbreitung in den Kammern | Dauer $\leq 0,1$ s | Q ist immer negativ, R immer positiv und S immer negativ |
| J-Punkt | Übergang des QRS-Komplexes in die ST-Strecke | | |
| ST-Strecke | Depolarisation der ganzen Kammer mit nachfolgender Repolarisation (T-Welle) | | |
| T-Welle | Erregungsrückbildung der Kammer | | Meist konkordant zum QRS-Komplex |
| QT-Zeit | Gesamtzeit von Erregungsausbreitung und -rückbildung der Kammer | Dauer 0,35–0,44 s (frequenzabhängig) | |
| U-Welle | Zusätzliche positive Welle nach der T-Welle | | Bis zu halb so groß wie vorangehende T-Welle, meist am deutlichsten in V_{2+3} |

QRS
+ → +
- → -

Bestimmung von Herzfrequenz und Rhythmus

Bestimmung des Rhythmus

Kriterien für das Vorliegen eines Sinusrhythmus

1. Vorliegen normal konfigurierter P-Wellen
2. Auf jede P-Welle folgt regelmäßig ein QRS-Komplex

Sind zudem die PP-Intervalle konstant → Regelmäßiger Sinusrhythmus

Bestimmung der Frequenz


- Normale Herzfrequenz: 50–100/Min.
- Tachykardie: > 100 /Min. • Bradykardie: < 50 –60/Min.

Bestimmung des Lagetyps



wird aus den Extremitätenableitungen bestimmt

- **I +, aVF – :**
 - II – : **Überdrehter Linkstyp**
 - II + : **Linkstyp**
- **I +, aVF + :**
 - III –, aVL + : **Linkstyp**
 - aVL und III + : **Indifferenztyp**
 - aVL –, III + : **Steiltyp**
- **I –, aVF + :**
- **aVR – : Rechtstyp**
- **aVR + : Überdrehter Rechtstyp**

Die physiologische Herzachse liegt im Bereich -30° bis 90° und reicht damit von Links- über Indifferenz- zu Steiltyp.



Schenkelblock

| QRS-Dauer | EKG-Merkmale | Befund |
|------------------|--|--------------------------------------|
| >0,1 und <0,12 s | rSr' in V _{1,2}  | Inkompletter Rechtsschenkelblock |
| | rS in V _{1,2} | Inkompletter Linksschenkelblock |
| ≥0,12 s | rSR' in V _{1,2}  | Kompletter Rechtsschenkelblock (RSB) |
| | rS oder QS in V _{1,2} | Kompletter Linksschenkelblock (LSB) |

| Diagnose | EKG-Merkmale | Ursachen |
|--|---|---|
| Kompletter Rechts-schenkelblock | - rSR' in V _{1,2} - Negatives T in V _{1,2} | - Oft physiologisch - Seltener: rechtsventrikuläre Belastung |
| Kompletter Links-schenkelblock | - QS-Komplexe in V _{1,2} - Diskordantes Verhalten von ST-Strecke und T in allen Ableitungen | - KHK, Kardiomyopathie, ... - Selten ohne fassbare Ursache |
| Linksanteriorer Hemiblock | Überdrehter Linkstyp | - Oft physiologisch - Seltener: KHK, Kardiomyopathie |
| Linksposteriorer Hemiblock | - Überdrehter Rechtslagetyp | Sehr selten |

- **Bifaszikulärer Block:** kompletter Rechtsschenkelblock + linksanteriorer Hemiblock

Beurteilung der QT-Zeit

- Die QT-Zeit ist abhängig von der Herzfrequenz, sodass eine Frequenzkorrektur erforderlich ist → Frequenzkorrigierte QT-Zeit = QT_c
 - Bazett-Formel : $QT_c = \text{Absolute QT-Zeit} / \sqrt{RR}$
- **Verlängerte QT-Zeit** : Hypokalzämie, Hypokaliämie, kongenitales Long-QT-Syndrom, Medikamentennebenwirkung (Antiarrhythmika wie Amiodaron, Antibiotika wie Makrolide oder Fluorchinolone, Antimykotika, Antidepressiva, Antipsychotika)
 - Risiko : Torsades de pointes
- **Verkürzte QT-Zeit** : Hyperkalzämie, Digitalis-Einnahme

Niedervoltage

- Periphere Niedervoltage: Amplitude des QRS-Komplexes ≤0,5 mV (≤ 5 mm) in den Extremitätenableitungen
- Totale Niedervoltage: Zusätzlich Amplitude des QRS-Komplexes ≤0,7 mV (≤ 7 mm) in den Brustwandableitungen
- **Ursachen** : Perikarderguss, Lungenemphysem, Hypothyreose, Adipositas

Hypertrophiezeichen im EKG

EKG-Merkmale für Linksherzhypertrophie

- Verlagerung der Herzachse nach links: Linkstyp oder bei starker Hypertrophie überdrehter Linkstyp
- Große R-Zacke in allen linkslateralen Ableitungen: V₅₊₆ (I, aVL) >1 mV (>10 mm)
- Sokolow-Lyon-Index für Linksherzhypertrophie positiv, wenn S_{V1 oder 2} + R_{V5 oder 6} ≥3,5mV (≥35mm)

EKG-Merkmale für Rechtsherzhypertrophie

- Verlagerung der Herzachse nach rechts: Sagittaltyp, Steiltyp oder Rechtstyp
- Große R-Zacke in allen rechtspräkordialen Ableitungen V₁₊₂
- Sokolow-Lyon-Index für Rechtsherzhypertrophie positiv, wenn R_{V1 oder 2} + S_{V5 oder 6} ≥1,05mV (≥10,5mm)

Aortenklappenstenose +

- In Europa häufigstes behandlungsbedürftiges Vitium

Klassifikation

- **Schweregrad:** Nach echokardiographisch ermittelter Klappenöffnungsfläche und Flussgeschwindigkeit
- **Form:** Nach Pathophysiologie (senil, rheumatisch oder angeboren)

Pathophysiologie

Formen

Senile (kalzifizierte) Aortenklappenstenose (häufigste Form in Deutschland)

- **Entstehung**
 - Beruht auf degenerativen Prozessen ähnlich der Atherosklerose: Beginnt als Aortensklerose, die langsam zur Aortenklappenstenose fortschreiten kann
- **Alter:** Insb. hohes Lebensalter (>65 Jahre)
- **Verlauf:** Chronisch progredient, hohe Sterblichkeit sobald symptomatisch
- **Prävention:** Reduktion kardiovaskulärer Risikofaktoren

Bikuspide Aortenklappe

- **Entstehung:** Aortenklappe besteht nur aus zwei statt der physiologischen drei Taschen/Segeln
- **Komplikationen:** Aortenklappenstenose, Aortenklappeninsuffizienz, Endokarditis

Erworbene (rheumatische) Aortenklappenstenose

- **Entstehung:** Rheumatisches Fieber im Rahmen von Infekten mit β -hämolisierenden Streptokokken (insb. Pharyngotonsillitis)
- **Epidemiologie**
 - Auftreten i.d.R. vor dem 18. Lebensjahr
 - In Entwicklungsländern: Häufigste Ursache für Herzerkrankungen bei Kindern
- **Prävention:** Antibiotische Therapie von Infekten mit β -hämolisierenden Streptokokken

Folgen aller Formen

Chronische Druckbelastung des linken Ventrikels mit den entsprechenden Folgen:

- Linksventrikuläre Hypertrophie
- Linksherzinsuffizienz

Symptome/Klinik

- Insb. leichte und mittelgradige Stenosen bleiben meist lange symptomfrei
- **Leitsymptome**
 - Belastungsdyspnoe
 - Angina pectoris bei Belastung
 - Synkopen (oder Schwindel)
- Auch Präsentation als unklare Herzinsuffizienz möglich

Diagnostik

Anamnese


Körperliche Untersuchung

- **Palpation**
 - Pulsus tardus et parvus weak Puls
 - Hebender Herzspitzenstoß kräftig, länger, meist > 2 Finger breiter HSS, nicht mit dem Finger unterdrückbar durch Aufsetzen eines Stifts kann hebender Charakter deutlich werden bei Hypertonie, hypertensive Herzkrankheit (HOCM), Aortenstenose
- **Auskultation**
 - Spindelförmiges (crescendo-decrescendo), raues Systolikum mit Ausstrahlung in die Carotiden beidseitig
 - Punctum maximum im 2. Interkostalraum rechts parasternal

Apparative Diagnostik

Basisdiagnostik

- **Blutdruck:** Kleine Blutdruckamplitude, evtl. Hypotonie



- **EKG:** Zeichen der Linksherzhypertrophie, z.B. (überdrehter) Linkslagetyp, positiver Sokolow-Lyon-Index möglich
- **Röntgen-Thorax**
 - Poststenotische Dilatation
 - Linksherzverbreiterung

Echokardiographie (transthorakal/transösophageal)

Die Echokardiographie ist die wichtigste Methode zur Diagnosestellung und Bestimmung des Schweregrades einer Aortenklappenstenose.

- **Transthorakale Untersuchung (TTE)**
 - **Indikation:** Jeder Patient mit einem unklaren Herzgeräusch oder anderweitig begründetem Verdacht auf eine Aortenklappenstenose
- **Transösophageale Untersuchung (TEE)**
 - **Indikationen**
 - Wenn kein gutes transthorakales Bild erreichbar ist
 - Bei Verdacht auf Endokarditis

Koronarangiographie

Präoperativ zur Diagnose einer begleitenden KHK, wenn diese nicht unwahrscheinlich ist

Therapie

Medikamentöse Therapie (symptomatisch)

- Therapie einer begleitenden Herzinsuffizienz, bspw. mit ACE-Hemmern, Sartanen, Diuretika
- Blutdruckeinstellung
- Normofrequenten Sinusrhythmus erhalten

Chirurgische und interventionelle Therapie

Die chirurgische Therapie der Aortenklappenstenose kann als kardiochirurgische Operation, als perkutaner Klappenersatz (TAVI) oder als alleinige Ballondilatation (nur bei Kindern ohne Klappenverkalkung oder als Überbrückung) erfolgen.

- **Indikation**
 - Symptomatische Patienten
 - Asymptomatische Patienten mit schwerer Aortenklappenstenose und deutlich eingeschränkter linksventrikulärer Pumpfunktion

TAVI (von engl. „Transcatheter Aortic Valve Implantation“) oder TAVR (von engl. „Transcatheter Aortic Valve Replacement“)

Kardiochirurgischer Aortenklappenersatz

- **Indikation**
 - Jüngere Patienten mit niedrigem Operationsrisiko
 - Begleitende Indikation zur koronaren Bypassoperation
- **Durchführung**
 - Thorakotomie, Operation am offenen Herzen unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine
 - Zugang zur Klappe über die eröffnete Aorta, Resektion der stenosierten Aortenklappe, Einsetzen der Prothese

Perkutaner Aortenklappenersatz (TAVI)

Der perkutane Klappenersatz wird klinisch als TAVI („Transcatheter Aortic Valve Implantation“) bezeichnet und ist ein relativ neues Verfahren, das v.a. bei älteren Patienten mit hohem Operationsrisiko zur Anwendung kommt.

- **Durchführung**
 - Minimalinvasiver Eingriff: Ballondilatation der stenosierten Klappe, kathetergestützter Einsatz einer Kunstklappe
 - Zugang: Transfemorale (1. Wahl) oder transapikale (2. Wahl)

Postoperatives Management

- **Nach TAVI:** Vorübergehend duale Thrombozytenaggregationshemmung mit ASS und Clopidogrel, nach 3–6 Monaten dann ASS-Monotherapie
- **Nach konventionellem Aortenklappenersatz:**
 - Bei mechanischen Aortenklappenprothesen: Lebenslange Antikoagulation erforderlich
 - Bei Bioprothesen: Nur vorübergehende Antikoagulation. Mindestens drei Monate
- **Endokarditisprophylaxe:** Gute Zahnhygiene anstreben. Antibiotische Prophylaxe nur noch Hochrisikopatienten empfohlen



Infektiöse Endokarditis +

Entzündung der Herzinnenhaut (Endokard), die meistens durch Bakterien hervorgerufen ist (selten Pilze) und insb. die Herzklappen betrifft.

Ätiologie

| Erregergruppe | Haupterreger | Charakteristika |
|----------------------------------|------------------------------|--|
| Koagulasepositive Staphylokokken | Staphylococcus aureus (50%) | Häufigster Erreger der Endokarditis acuta |
| α-hämolysierende Streptokokken | Streptococcus viridans (30%) | Häufigster Erreger der Endokarditis lenta |
| Koagulasenegative Staphylokokken | Staphylococcus epidermidis | Häufigster über infizierte Venenverweilkatheter übertragener Keim |
| Enterokokken | Enterococcus faecalis (<10%) | Virulenz liegt zwischen der von Streptokokken und Staphylokokken |

Infektionsweg

- Die bakterielle Endokarditis betrifft meist vorgeschädigte Klappen (Mitralklappe am häufigsten).
- Ausgangspunkt ist dabei das Vorliegen einer Bakteriämie durch : Infizierte Venenverweilkatheter. Unsterile venöse Injektionen : Drogenabusus. Manipulationen an den Zähnen. Operative Eingriffe

Symptome/Klinik

Allgemein


- Fieber, Schüttelfrost
- Leistungsverminderung, Schwäche
- Tachykardie

Kardial

- Herzgeräusche
- Herzinsuffizienz (bei Klappeninsuffizienz).

Extrakardial

- ZNS : Septisch-embolische Enzephalitis. Mykotische Aneurysmen mit Gefahr einer Subarachnoidalblutung
- Kutan (embolisch oder immunologisch)
 - Petechien (vor allem an den Nägeln)
 - Janeway-Läsionen: Schmerzlose Einblutungen an Handflächen und Fußsohlen
 - Osler-Knötchen: Schmerzhaft, knotige Einblutungen an Fingern und Zehen
 - Splinter-Hämorrhagien: Einblutungen im Nagelbett
- Niere : Niereninfarkte. Glomerulonephritis
- Milz: Milzvergrößerung und septische Embolien in die Milz
- Augen : Netzhautembolie. Roth's spots (=Retinablutungen)



Verlaufsformen

- Endocarditis acuta**
 - Erreger : Insb. Staphylococcus aureus (Hohe Virulenz)
 - Klinik: Akuter Verlauf mit Herzinsuffizienz
- Endocarditis lenta**
 - Erreger : Insb. Streptococcus viridans (Geringe Virulenz)
 - Klinik: Subklinische Beschwerden

Diagnostik

Anamnese

Körperliche Untersuchung

Labor

Blutbild, Kreatinin, Harnstoff, Natrium, Kalium, Leberwerte und Entzündungszeichen (CRP, PCT)

Blutkulturen (zum Erregernachweis)

- Die Blutentnahme ist **vor** Beginn einer Antibiotikatherapie durchzuführen
- Beimpfung** (ensemensement) von mind. 3–5 separaten Blutkulturpaaren
- Antibiogramm bei Erregernachweis

Echokardiographie

Transthorakale Echokardiographie TTE+ Transösophageale Echokardiographie TEE

Duke-Kriterien

Die Diagnosestellung erfolgt mithilfe der Duke-Kriterien. Das Vorliegen von **zwei Hauptkriterien**, einem **Hauptkriterium und drei Nebenkriterien** oder **fünf Nebenkriterien** verifiziert die Diagnose.

- Hauptkriterien**
 - Zwei separate positive Blutkulturen mit typischem Erregernachweis**
 - Nachweis einer Endokardbeteiligung in der Echokardiographie oder CT :**
Klappenvegetationen, Abszesse, Fisteln, Perforation, Pseudoaneurysma, Dehiscenz
- Nebenkriterien**
 - Prädisposition** durch kardiale Grunderkrankung oder i.v. Drogenabusus
 - Fieber $>38^{\circ}\text{C}$**
 - Gefäßveränderungen** (z.B. Arterielle Embolien) ^{od.} **Janeway-Läsionen**
 - Immunologische Störung** (z.B. Glomerulonephritis, Osler-Knötchen)
 - Mikrobiologie** : Positive Blutkultur, die nicht unter die Hauptkriterien fällt

Differentialdiagnosen

- Nichtinfektiöse Endokarditis** (Libman-Sacks-Endokarditis bei systemischem Lupus erythematoses)
- Klappenthrombose**
- Herztumoren**
- Sepsis anderer Ursachen**

Therapie

Antibiotikatherapie

- Initial kalkulierte antibiotische Therapie** : z.B. Ampicillin ^{12g/IT (4-6 bis 12)} + Gentamicin ^{3mg/kg Einmalgabe} + Flucloxacillin ^{12g/IT}
- Im Verlauf gemäß Antibiogramm anpassen**
 - Streptokokken- oder Enterokokken-Endokarditis** : Ampicillin i.v. + Gentamicin i.v.
 - Staphylokokken-Endokarditis** : Flucloxacillin i.v. + Daptomycin i.v.
- Behandlungsdauer** : i.d.R. 6 Wochen ^{in der Regel}

nach Klappenprothese
< 12 w
Vanco 300mg/IT
Bifampicin 900/Tag
Gentamycin

Operative Therapie

- Komplette Entfernung von infektiösem Material. Rekonstruktion der betroffenen Klappen
- Indikation** : bei Komplikationen
 - Herzinsuffizienz wegen schwerer Klappeninsuffizienz
 - Unkontrollierte Infektion
 - Bei Embolien bzw. großer Vegetationen

Endokarditis-Prophylaxe


- Allgemeine Maßnahmen** : Zahnärztliche Kontrollen (jährlich). Strikte Zahnhygiene. Bakterielle Infektionen konsequent antibiotisch behandeln

- Hochrisikogruppen** (bei denen eine Antibiotika-Prophylaxe empfohlen wird) : ^① **Patienten mit Klappenersatz** (mechanisch und biologisch, ^② **durchgemachter Endokarditis** und ^③ **angeborenen Herzfehlern**)

durchmachen
عند ما تم إجراء

Aneurysma +

- **Definition :** Ein Aneurysma ist eine Aussackung bzw. ein Defekt der Gefäßwand einer Arterie, wobei unterschiedliche Schichten der Gefäßwand betroffen sein können.
- **Aneurysma-Formen :** Je nach Defekt wird unterschieden in **Aneurysma verum** (Aussackung aller Schichten), **Aneurysma spurium/falsum** (Perforation der Gefäßwand mit Bildung eines extravasalen Hämatoms) und **Aneurysma dissecans** (Einriss der Intima und Spaltung der Gefäßwand mit Ausbildung eines zweiten Lumens).
- **Ursachen :**
 - Arteriosklerose, arterielle Hypertonie (Aneurysma verum, Aneurysma dissecans)
 - Traumata (Aneurysma spurium)



Aortenaneurysma

Es wird unterschieden in thorakale und abdominelle Aortenaneurysmen, wobei die häufigste Lokalisation infrarenal (distal des Abgangs der Aa. renales) ist. Häufig sind Aortenaneurysmen asymptomatisch und fallen erst durch Auftreten von Komplikationen wie Dissektion oder Ruptur als hochakutes, lebensbedrohliches Krankheitsbild auf. Diagnostisch werden je nach Lokalisation zunächst Sonographie, transthorakale oder transösophageale Echokardiographie, aber auch CT und MRT mit Kontrastmittel durchgeführt. Bei kleinen Aneurysmen kann ein konservatives, beobachtendes Prozedere indiziert sein, während ausgeprägte oder schnell voranschreitende Befunde operativ versorgt werden. Bei Dissektion oder frei rupturiertem Aneurysma besteht eine ausgesprochen schlechte Prognose.

Definition

Aussackung aller Schichten der Gefäßwand der Aorta (Intima, Media, Adventitia)

- **Thorakales Aortenaneurysma:** Erweiterung des thorakalen Aortendurchmessers auf $>3,5$ cm
- **Abdominelles Aortenaneurysma:** Erweiterung des infrarenalen Aortendurchmessers auf ≥ 3 cm

Epidemiologie

- **Thorakales Aortenaneurysma :** Selten
- **Abdominelles Aortenaneurysma**
 - Häufigkeitsgipfel 60–70 Jahre
 - Geschlecht: ♂ > ♀ (5:1)
 - Positive Familienanamnese

Ätiologie/Risikofaktoren

- **Arteriosklerose** (Risikofaktoren : insb. **Rauchen** und **arterielle Hypertonie**)
- Chronische Aortendissektion
- **Bindegewebserkrankungen** (z.B. **Marfan-Syndrom**, **Ehlers-Danlos-Syndrom**)
- Seltener: Vaskulitis/Infektionskrankheiten mit Aortenbeteiligung (z.B. Syphilis → Mesoarteritis luica, Mykose, Takayasu-Arteriitis), zystische Medianekrose (Gsell-Erdheim)

Klassifikation (Einteilung nach Lokalisation)

bei Dissektion
Stanford < A Debakey I, II, III

- **Thorakales Aortenaneurysma** : Aorta ascendens. Aortenbogen. Aorta descendens
- **Abdominelles Aortenaneurysma**

- **Oberhalb der A. renalis** (= suprarenales Bauchaortenaneurysma)
- **Unterhalb der A. renalis** (= infrarenales Bauchaortenaneurysma)
 - Häufigste Lokalisation, >90% der Aortenaneurysmen
 - Spindelförmig oder sackförmig (erhöhtes Rupturrisiko)
 - 20% der Aneurysmen breiten sich bis zu den Beckenarterien aus

„Im Falle einer Aortendissektion wird die Klassifikation nach Stanford (Typ A und Typ B) je nach Dissektionsbeginn vorgenommen.“

Pathophysiologie

- Durch Aussackung der Gefäßwand kommt es zur Unterbrechung der laminaren Blutströmung und zu Verwirbelungen (auskultierbares Verwirbelungsgeräusch)
- Ggf. Thrombenbildung im Aneurysma → periphere Thrombembolien

Symptome/Klinik

Aortenaneurysmen sind meist asymptomatisch oder weisen unspezifische Symptome auf. Sie werden daher häufig als Zufallsbefunde im Rahmen von Sonographien oder CT-Untersuchungen diagnostiziert. Erst bei Ruptur oder Aortendissektion kommt es zu einem hochakuten Krankheitsbild.

Unspezifische Beschwerden

- Druckgefühl in der Brust
- Thorakale Rückenschmerzen
- Abdominal- oder Flankenschmerz (kolikartig)

Spezifischere Beschwerden

- Tastbarer pulsierender Tumor
- Periphere Thrombosen als indirektes Zeichen
- Einengung bzw. Irritation mediastinaler Strukturen
 - Stridor (Trachea)
 - Schluckbeschwerden (Ösophagus)
 - Obere Einflusstauung (V. cava superior)
 - Heiserkeit (N. laryngeus recurrens)
 - Horner-Syndrom (Grenzstrang), Ptosis, Miosis, Enophthalmus

Abdominelles Aortenaneurysma

- Tastbarer pulsierender Tumor im Bauchraum
- Seitendifferente oder schlecht tastbare Leistenpulse
- Periphere Thromboembolien im Versorgungsgebiet

Red flags“ des rupturierten Bauchaortenaneurysmas [12]

- „Typischer“ Patient mit Risikofaktoren für thorakoabdominelle Aortenaneurysmen
- Klassische Symptomtrias
 - Plötzlich einsetzende starke Bauch- oder Rückenschmerzen
 - Hypotension bzw. akuter Blutdruckabfall bis hin zum Schock
 - Pulsatile abdominelle Raumforderung

Diagnostik

Körperliche Untersuchung

- Evtl. pulsierender Tumor tastbar
- Auskultation: Strömungsgeräusch über Aneurysma

Apparative Untersuchungen

- **CT / MRT mit Kontrastmittel** (Angio-CT, Angio-MRT) → Wichtig zur Therapieplanung
 - Beurteilung der Weite des Aortenlumens
 - Beurteilung der abgehenden Äste
 - Ggf. randständiges, hypodenses thrombotisches Material
 - Ggf. arteriosklerotische Verkalkungen der Gefäßwand
 - Das MRT ist dem CT in der Darstellung der Wand-Morphologie überlegen und stellt keine Strahlenbelastung für den Patienten dar.
- **Sonographie** (vor allem bei abdominellem Aneurysma)
 - Messung des Außendurchmessers
 - Ggf. Dissektionsmembran zu sehen
- **Weiterhin**
 - **Röntgen-Thorax**: Bei thorakalen Aneurysmen evtl. Verbreiterung der Aorta bzw. des Mediastinums zu erkennen
 - **Transthorakale oder transösophageale Echokardiographie**
 - **Digitale Subtraktionsangiographie (DSA)** (untergeordnete Rolle, lediglich das Aortenlumen wird dargestellt)

„- Regelmäßige Verlaufskontrollen!“


Therapie

Konservativ

- Minimierung kardiovaskulärer Risikofaktoren
 - Blutdruckeinstellung
 - Nikotinabstinenz

Chirurgisch

- **OP-Indikation**
 - **Bauchaortenaneurysma**
 - **Asymptotisch**
 - Durchmesser $>5,5$ cm (Ggf. >5 cm bei Frauen)
 - Zunahme des Durchmessers >1 cm/Jahr
 - **Symptomatische Aneurysmen** (Bspw. Rücken-, Abdomen- und/oder Flankenschmerzen) :
Dringliche Versorgung innerhalb der ersten 24 Stunden nach Auftreten der Symptome empfohlen!
 - **Thorakales Aortenaneurysma**
 - **Asymptotisch**
 - Durchmesser $>5-6$ cm (je nach Lokalisation und Ätiologie)
 - Zunahme des Durchmessers $>0,5$ cm/Jahr
 - OP bei **symptomatischen Aneurysmen** (Z.B. Rückenschmerzen, Heiserkeit) erwägen
 - Ggf. **bei Komplikationen** (Aortendissektion)
- **Maßnahmen**
 - Goldstandard: **Rohr- oder Y-Prothese** (aorto-biiliakal)
 - Ggf. **interventionelle Stentprothese** (T) EVAR



Komplikationen


- **Ruptur / gedeckte Ruptur / Aortendissektion**
 - Klinik
 - Heftigster, ^{plötzlich} schlagartig aufgetretener Rückenschmerz mit abdomineller Ausstrahlung
 - Hypovolämischer Schock (bei freier Ruptur) ↓ RR akut
 - Diagnostik: Sonographie, CT mit KM → Nachweis von Kontrastmittelaustritt
 - Prognose: Hohe Letalität
- **Embolie** aus thrombotischem Material des Aneurysmas

Postoperative Komplikationen

- Protheseninfektion
- Aortointestinale Fistel → massive Blutabgänge über den Gastrointestinaltrakt
- Komplikationen durch Ischämie

Prävention



- Blutdruckeinstellung
- Nikotinkarenz
- Screening des abdominalen Aortenaneurysma durch Ultraschalluntersuchung
 - Männer ab 65 Jahren
 - Verwandten ersten Grades
 - Evtl. Frauen mit Raucheranamnese ab 65 Jahren




Rupturiertes thorakales Aortenaneurysma

CT-Thorax Transversalschnitt, vermutlich auf Höhe BWK 4, mit Kontrastmittel:

Kontrastierter Aortenbogen (A) mit einer gedeckten Perforation (P, Kontrastmittelaustritt verdeutlicht). Weitere Strukturen: Vena cava superior (V), Trachea (T), Ösophagus (O), Brustwirbelkörper (B).



Es zeigt sich eine aneurysmatische Erweiterung der aufsteigenden Aorta (X) (Ao =Aorta descendens, LP =linke Pulmonalarterie, RP =rechte Pulmonalarterie, TP =Truncus pulmonalis, VCS =Vena cava superior).

[illegible]

Röntgen Thorax in p.a.-Strahlengang:
Es zeigt sich eine vom Aortenknopf (A) ausgehende Verbreiterung des oberen Mediastinums (grüne durchgezogene Linie), die am ehesten einer Ektasie der thorakalen Aorta descendens entspricht. Die gestrichelte grüne Linie zeigt den physiologischen Verlauf der Aorta.
Zusätzlich zeigt sich ein Herd in Projektion auf das rechte Oberfeld, von dem eine helle dünne Linie bogenförmig nach apikal zieht. Hierbei handelt es sich um eine Normvariante eines sog. Lobus venae azygos, bei dem die V. azygos (blaue Fläche) durch eine Pleuraduplikatur (graue Linie) von paravertebral nach ventral zieht.

Medikamente In der Kardiologie

Orale Antikoagulantien ++

Vitamin-K-Antagonisten (Cumarine)

Wirkstoffe und Wirkmechanismus

- **Phenprocoumon** : Unselektive Hemmung der Vitamin-K-abhängigen Synthese von Gerinnungsfaktoren in der Leber (II, VII, IX und X) 1972

Nebenwirkung

- Blutung
 - Vorgehen : Absetzen der Cumarine. Gabe von Vitamin K und Prothrombinkonzentrat (PPSB). Blutstillung wenn möglich (interventionnel,...)
- Thromboembolie-Neigung zu Beginn der Therapie: wegen Hemmung von Protein S und C ← kürzer Halbwertszeit

Indikation

- Behandlung und Prophylaxe von TVT oder Lungenembolie
- Thromboembolieprophylaxe nach Vorhofflimmern oder Herzklappenersatz (Standard-Ziel-INR: 2,0–3,0)
↓ bei diesen Vb. induzierten VF

Kontraindikation

Schwere Leberinsuffizienz. Blutung oder Blutungsneigung. Schwangerschaft

Perioperativer Umgang (→Bridging)

- Cumarinabgabe unterbrechen
- Bei INR <2,0: Patient erhält (niedermolekulares) Heparin in therapeutischer Dosis
- Aussetzen der Heparine direkt präoperativ (Heparin 4h, NMH 24h)
- Wiederansetzen der Heparine direkt postoperativ
- Wiedereinstellung auf Phenprocoumon: Überlappend Heparin verabreichen, bis Ziel-INR-Wert erreicht ist

„Bei Eingriffen mit niedrigem Blutungsrisiko : Antikoagulation ohne Bridging fortführen“

Direkte (=Neue) orale Antikoagulantien

Wirkstoffe und Wirkmechanismus

- **Dabigatran** : Selektive Hemmung von Thrombin
- **Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban** : Selektive Hemmung von Faktor Xa
Eligius Xaneto Lixiana

Nebenwirkung

- Blutung
 - Vorgehen : Absetzen der Antikoagulation. Ggf. Aktivkohle-Gabe. Gabe von PPSB. Antagonisierung mit **Idarucizumab** (Dabigatran), **Andexanet alfa** (Apixaban und Rivaroxaban). Blutstillung wenn möglich (interventionnel,...)

Indikation

- Therapie und Sekundärprophylaxe einer TVT oder Lungenembolie
- Thromboembolieprophylaxe nach nicht-valvulärem Vorhofflimmern oder nach Knie- oder Hüftgelenkersatz

Kontraindikation

- Schwere Leberinsuffizienz. Blutung oder Blutungsneigung. Schwangerschaft
- GFR <30 mL/min (Dabigatran) oder GFR <15 mL/min (Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban)

„Vor dem Beginn der Behandlung mit NOAK: Nieren- und Leberfunktion überprüfen“

Perioperativer Umgang


- Absetzen der DOAK :
 - Niedriges Blutungsrisiko : ≥24 h präoperativ
 - Hohes Blutungsrisiko : ≥48 h präoperativ
- kein Bridging empfohlen

Vit K Carboxylierung von Gerinnungsfaktoren

Vit K antagonisten :- ZB Markumar hemmen die

Vit-K abhängige Faktoren :- (1972) X, IX, VIII, und II

weitere Proteine :- auch Proteine C und S
↑
(Gerinnungsinhibitoren)



Heparine ±

Wirkstoffe und Wirkmechanismus

- **Unfraktioniertes Heparin** (Heparin : prophylaktisch s.c., therapeutisch i.v.): **Hemmung von Thrombin** (durch Bindung an Antithrombin und Thrombin). **Zusätzlich Hemmung von Faktor Xa**
- **Niedermolekulares Heparin** (Enoxaparin, Tinzaparin : s.c.) : **Hemmung von Faktor Xa**

Nebenwirkung

- Blutung
 - Vorgehen : Absetzen der Heparine. Antagonisierung mit **Protamin** (nur partiell bei NMH). 50%
Blutstillung wenn möglich (interventionell,...)
- **Heparin-induzierte Thrombozytopenie**: HIT-II-Risiko NMH:UFH = 1:10
- Osteoporose (bei Langzeittherapie) 0,1-1% 1-5%

Indikation

- **Prophylaktisch** : Bei Bettlägerigkeit, peri- und postoperativ,...
 - Heparin: 5.000 IE s.c. x3/Tag oder 7.500 IE s.c. x2/Tag
 - Enoxaparin: 2.000–4.000 IE s.c. x1/Tag
- **Therapeutisch** : Vorhofflimmern. TVT, Lungenembolie. Akutes Koronarsyndrom
 - Heparin: Initial 5.000 IE i.v. als Bolus, dann kontinuierliche Gabe über Perfusor (15 IE/kgKG/h), dann Anpassung nach PTT
 - Enoxaparin 100 IE/kgKG s.c. x2/Tag 1mg/Kg 1-0-1

Monitoring

- **UFH** : Regelmäßige **PTT**-Bestimmung bei therapeutischer Indikation (Zielwert: 1,5–2,5 fache Verlängerung). **Thrombozytenzahl** (HIT?)
- **NMH** : Thrombozytenzahl. Ggf. Bestimmung der **Anti-FXa-Aktivität** (nicht nötig)

Kontraindikation

Blutung oder Blutungsneigung. HIT-II. GFR <15ml/min (NMH). (nicht kontraindiziert bei Schwangerschaft)

Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT)

| | HIT I | HIT II |
|--------------------------------|---|---|
| Beginn der Thrombopenie | In den ersten 5 Tagen nach Therapiebeginn | Ab 5. Tag nach Therapiebeginn |
| Pathophysiologie | Direkte Interaktion zwischen Heparin und Thrombozyten | Antikörperbildung |
| Komplikationen | I.d.R. keine | Thromboembolische Ereignisse |
| Diagnostik | moderate Thrombopenie >100.000/μL (Ausschlussdiagnose) | <ul style="list-style-type: none"> • Kleines Blutbild: Thrombopenie <u><100.000/μL</u> (<50% des Ausgangswertes) • Nachweis thrombozytenspezifischer Antikörper |
| Therapie | Keine (Heparintherapie weiterführen, Normalisierung der Thrombozyten zu erwarten) | <ul style="list-style-type: none"> • Therapieumstellung (auf Danaparoid), ggf. Lyse erforderlich • <u>Keine Gabe von Thrombozytenkonzentraten</u> • Allergie in Patientenausweis dokumentieren |
| Prognose | günstig | ungünstig |

Therapeutische Antikoagulation mit unfractioniertem Heparin (UFH)

| | |
|------------------------------------|--|
| Laborkontrolle vor Therapie | Bestimmung der PTT (Ausgangswert vor der Therapie) |
| Startdosierung | 5000–10000 IE i.v. als Bolus, alternativ Berechnung individuell mit 70–80 IE pro kg Körpergewicht |
| Perfusor-Dosierung | Heparin-Perfusor (500 IE/ml) mit einer Dosis von 15–20 IE pro kg Körpergewicht pro Stunde fortführen |
| Berechnung der Dosierung | Bei 70 kg Körpergewicht beträgt die Erhaltungsdosis demnach zwischen 1050 IE und 1400 IE pro Stunde → Perfusor demnach auf 2,4 mL/h einzustellen (Bereich zwischen 2,1 und 2,8 mL/h) |
| Therapiesteuerung | Steuerung nach PTT → Ziel 60–92 Sekunden (1,5–2,5-fache Verlängerung des Ausgangswertes) |

Anpassung der Perfusor-Infusionsrate nach PTT

| | |
|-----------------------------|--|
| PTT <48 Sekunden | Bolus wie zum Therapiebeginn und Dosissteigerung um 4 IE pro kg Körpergewicht pro Stunde |
| PTT 48–60 Sekunden | Bolus in halber Dosierung wie zum Therapiebeginn und Dosissteigerung um 2 IE pro kg Körpergewicht pro Stunde |
| PTT 60–92 Sekunden | Nichts ändern! |
| PTT 92–120 Sekunden | Dosisreduktion um 2 IE pro kg pro Stunde |
| PTT >120 Sekunden | Perfusor 1 h pausieren, danach Fortführung mit Dosisreduktion um 3 IE pro kg Körpergewicht pro Stunde |

Laborkontrollen unter der Therapie

| | |
|---------------|--|
| PTT | Alle 6 h |
| AT-III | Bestimmen, wenn die PTT keine zu erwartenden Änderungen zeigt. |

Thrombozytenaggregationshemmer (TAH) ±

Wirkstoffe und Wirkmechanismus

COX 1

- **Acetylsalicylsäure (ASS)** : Irreversible Hemmung der Cyclooxygenasen 1 (wenn niedrig dosiert → Hemmung der Thromboxan-Synthese → Thrombozytenaggregationshemmung) und 2 (wenn hochdosiert → Hemmung der Prostazyklin-Synthese → Antipyretische, analgetische und antiphlogistische Wirkung)
- **ADP-Rezeptor-Hemmer** (Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor)
- **Glykoprotein-IIb/IIIa-Antagonisten** (Tirofiban) *nur stationär*

Nebenwirkung


- Blutung
 - Vorgehen : Absetzen des Medikaments. Blutstillung wenn möglich (interventionell,...)
- **ASS**: ASS-Unverträglichkeit = **Morbus Widal** (Trias: ASS- oder NSAR-Unverträglichkeit. Asthmatische Beschwerden. Sinusitis und Polyposis nasi. Therapie : ASS-Desaktivierung). **Reye-Syndrom** (akute Enzephalopathie und Leberfunktionsstörung, insb. bei Kindern)

Indikation


- **Acetylsalicylsäure (ASS)** : Sekundärprophylaxe bei KHK, pAVK und zerebraler Ischämie. In Kombination mit ADP-Rezeptor-Antagonist bei akutem Koronarsyndrom oder nach Stentimplantation
- **ADP-Rezeptor-Hemmer** :
 - Clopidogrel : Als Alternative zu ASS bei ASS-Unverträglichkeit. In Kombination mit ASS bei akutem Koronarsyndrom oder nach Stentimplantation
 - Prasugrel, Ticagrelor : In Kombination mit ASS bei akutem Koronarsyndrom
- **Glykoprotein-IIb/IIIa-Antagonisten** : PCI mit hohem Risiko

Kontraindikation

Blutung oder Blutungsneigung. Schwere **Leberinsuffizienz**



⇒ Weißer Thrombus



Fibrinolytika

Wirkstoffe

Streptokinase, Urokinase, rtPA (Alteplase), Reteplase, Tenecteplase.

Wirkmechanismus

Fibrinolytika sind **Plasminogenaktivatoren**. Sie fördern die Bildung von Plasmin aus Plasminogen (Abb. 4.2). **Plasmin spaltet das Fibrinnetzwerk** in Bruchstücke. Der Thrombus wird abgebaut (**Thrombolyse**). Außerdem hemmt Plasmin die Blutgerinnung u. a. durch Inaktivierung von Fibrinogen.

- Streptokinase und Urokinase weisen keine Fibrinspezifität auf, d. h., sie aktivieren auch zirkulierendes Plasminogen und sind **systemisch wirksam**. Die anderen Fibrinolytika aktivieren vorzugsweise fibrin gebundenes Plasminogen. Sie wirken also **theoretisch nur im Thrombus**.
- Streptokinase wirkt indirekt, also erst nach Komplexbildung mit Plasminogen. Die anderen Substanzen sind **direkte Plasminogenaktivatoren**.

Indikation

Thrombolyse bei:

- Frischem Myokardinfarkt
- Schwerer Lungenembolie
- Mehrfachen-Phlebothrombose
- Akuter Verschluss peripherer Arterien
- Ischämischen Schlaganfall

MI
LE
isch. Schlaganfall
mehrfachen-TVT
aAVK

Unerwünschte Wirkungen

- Blutung**: Die gefährlichste Komplikation ist die **intrakranielle Blutung**.
- Bei Streptokinase: **allergisch-anaphylaktische Reaktion** durch Bildung von Antikörpern

Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen:

- Schlaganfall in den letzten 6 Monaten: Bei Z. n. **hämorrhagischer Schlaganfall** immer kontraindiziert
- Trauma, Operation, Kopfverletzung** in den letzten 3 Wochen
- Neoplasma oder neurologische ZNS-Erkrankung
- Magen-Darm-Blutung innerhalb des letzten Monats
- Bekannte Blutungsdiathese
- Dissezierendes Aortenaneurysma

- 1 = Schlaganfall < Ischämisch 6m
Hämorrhagisch 3m
- 2 = OP, Trauma, SHT 3w
- 3 = Neoplasma
- 4 = GI Blutung 1monat
- 5 = Blutungsdiathese
- 6 = Aortenaneurysma

Kein KE bei
Reanimationspflichtig Pt.

Relative Kontraindikationen:

- TIA in den letzten 6 Monaten
- Orale Antikoagulation
- Schwangerschaft
- Nicht komprimierbare Gefäßpunktionen
- Therapieresistente Hypertonie (> 180 mmHg)
- Aktives Ulkusleiden, floride Endokarditis, fortgeschrittene Lebererkrankung
- Traumatische Reanimationsmaßnahmen

Cumarine
vit K
PPSB
UFH
Protamin

Antidot

Die Antifibrinolytika **Aprotinin**, p-Aminomethylbenzoesäure (PAMBA) und **Tranexamsäure** hemmen die plasminvermittelte Fibrinolyse. Sie können bei überschießender Fibrinolyse, z. B. durch Überdosierung von Fibrinolytika oder bei Karzinomen, die Gefahr schwerer Blutungen vermindern.

Unerwünschte Wirkungen: Allergische Reaktionen, Bildung von Mikrothromben.

CHECK-UP

- Nennen Sie Kontraindikationen von Fibrinolytika.
- Womit können Blutungen im Rahmen einer überschießenden Fibrinolyse behandelt werden?

Aprotinin, PAMBA, Tranexamsäure

Antithrombotische und thrombolitische Therapie

Diuretika ±

Wirkstoffe und Wirkmechanismus

- **Thiaziddiuretika** (Hydrochlorothiazid): Verminderte Natrium- und Kaliumresorption im distalen Tubulus (Moderater diuretischer Effekt)
- **Schleifendiuretika** (Furosemid, Torasemid): Verminderte Natrium- und Kaliumresorption im aufsteigenden Ast der Henle-Schleife (starker diuretischer Effekt)
- **Kaliumsparende Diuretika**: Verminderte Natriumresorption und Kaliumsekretion im distalen Tubulus und Sammelrohr (Moderater diuretischer Effekt)
 - **Aldosteronantagonisten** (Spironolacton, Eplerenon)
 - **Kaliumsparende aldosteronunabhängige Diuretika** (Amilorid)
- **Andere**: Osmodiuretika, Carboanhydrasehemmer, Acetazolamid

Nebenwirkung

- **Thiaziddiuretika**: Exsikkose. $\text{Na}^+ \downarrow$, $\text{K}^+ \downarrow$, $\text{Ca}^{2+} \uparrow$. Harnsäure \uparrow . BZ \uparrow . LDL \uparrow . Risiko für Basaliome und Spinaliome
- **Schleifendiuretika**: Exsikkose. $\text{Na}^+ \downarrow$, $\text{K}^+ \downarrow$, $\text{Ca}^{2+} \downarrow$. Harnsäure \uparrow . BZ \uparrow . Ototoxizität
- **Kaliumsparende Diuretika**: Exsikkose. $\text{Na}^+ \downarrow$, $\text{K}^+ \uparrow$. Gynäkomastie (Spironolacton)

Indikation

- **Thiaziddiuretika**: Arterielle Hypertonie. Ödeme (Herzinsuffizienz)
 - **Schleifendiuretika**: Ödeme (Herzinsuffizienz, Leberzirrhose) Hyperkalzämie
 - **Aldosteronantagonisten**: Arterielle Hypertonie. Ödeme (Herzinsuffizienz, Leberzirrhose)
- „Sequentielle Nephronblockade: Kombination aus Schleifendiuretikum und Thiazid bei Diuretika-Resistenz“

Kontraindikation

- Exsikkose, Hyponatriämie
- Hypokaliämie (Thiaziddiuretika und Schleifendiuretika), Hyperkaliämie (Kaliumsparende Diuretika)
- Hyperkalzämie (Thiaziddiuretika), Hypokalzämie (Schleifendiuretika)
- GFR < 30 mL/min (Thiaziddiuretika, Kaliumsparende Diuretika)

RAAS-Inhibitoren ±

Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS)

Blutdruckabfall führt zu einer verminderten Nierenperfusion → Das führt wiederum zu Freisetzung von Renin (durch den juxtaglomerulären Apparat der Niere) → Renin führt zu Umwandlung von Angiotensinogen (Synthese in der Leber) zu Angiotensin I → Angiotensin-Converting-Enzym (Synthese in der Lunge) führt zu Umwandlung von Angiotensin I zu Angiotensin II → Angiotensin II führt zu einer Vasokonstriktion und zu einer Freisetzung von Aldosteron (durch die Nebenniere) → Aldosteron führt zu einer vermehrten Retention von Wasser und Natrium → Beide Mechanismen (Vasokonstriktion, Wasserretention) führen zu einem Anstieg des Blutdrucks.

Wirkstoffe und Wirkmechanismus

- **ACE-Hemmer** (Ramipril, Enalapril): Hemmung des Angiotensin-Converting-Enzym (ACE) → Angiotensin II und Aldosteron \downarrow → RR \downarrow . Nephroprotektion bei renalen Erkrankungen (durch Proteinurie \downarrow)
- **AT₁-Rezeptor blocker** = **Sartane** (Valsartan, Candesartan): Antagonismus am AT₁-Rezeptor → Vasokonstriktion durch Angiotensin II \downarrow und Aldosteron \downarrow → RR \downarrow . Nephroprotektion bei renalen Erkrankungen (durch Proteinurie \downarrow)
- **Direkte Renin-Inhibitoren** (Aliskiren): Direkte Hemmung des Renins → Angiotensin I \downarrow → RR \downarrow

Nebenwirkung (ACE-Hemmer und Sartane)

- Hypotonie
- Anstieg der Retentionsparameter (bis Niereninsuffizienz und Nierenversagen)
- Hyperkaliämie (durch Verminderte Aldosteronsekretion)
- Angioneurotisches Ödem (häufiger mit ACE-Hemmern)
- ACE-Hemmer: Reizhusten (Bradykinin-bedingt)

Diuretika

Diuretika steigern über unterschiedliche Mechanismen die renale Natriumausscheidung, daher werden sie auch Saluretika genannt. Wasser wird osmotisch gebunden und mit ausgeschieden. Ausnahme: Mannitol ist ein osmotisches Diuretikum – und wirkt nicht natriuretisch.

- Carboanhydrasehemmer hemmen die Carboanhydrase im proximalen Tubulus. Sie sind nur schwach diuretisch wirksam (5–8 % des Glomerulumfiltrats).
- Schleifendiuretika hemmen den $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$ -Cotransporter im dicken aufsteigenden Ast der Henle-Schleife. Sie sind die stärksten Diuretika (30–40 %).
- Thiaziddiuretika hemmen den $\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$ -Cotransporter im frühdistalen Tubulus. Sie sind mäßig diuretisch wirksam (10–15 %).
- Amilorid und Triamteren sind kaliumsparende Diuretika und hemmen den Na^+ -Kanal im spätdistalen Tubulus und Sammelrohr. Sie sind schwach diuretisch wirksam (2–4 %).
- Aldosteronrezeptorantagonisten sind kaliumsparende Diuretika und wirken im spätdistalen Tubulus und Sammelrohr. Sie sind schwach diuretisch wirksam (2–4 %).




ABB. 7.1 Angriffspunkte der Diuretika im Nephron [V492]




ABB. 5.1 Angriffspunkte von Hemmstoffen des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems. Es ist zu beachten, dass die aufgelisteten Effekte von Angiotensin II (unten) durch einen Hemmstoff von Renin, ACE oder einem AT₁-Rezeptorblocker aufgehoben werden bzw. die Effekte von Bradykinin und natriuretischen Peptiden durch Hemmung von ACE und Neprilysin verstärkt werden. [V485]

Mannitol

Osmotisches Diuretikum. Durch Erhöhung des osmotischen Drucks im Tubuluslumen bindet es Wasser, das ausgeschieden wird.

Außerdem bindet Mannitol intravasal Wasser und wird daher zum Abschwellen eines Hirnödems angewandt.

Weitere Indikationen sind:

- Forcierte Diurese
- Glaukomanfall
- Drohendes akutes Nierenversagen

Die Anwendung erfolgt intravenös.

Amilorid und Triamteren dürfen nicht mit anderen kaliumsparenden Diuretika wie den Aldosteronrezeptorantagonisten kombiniert werden: Hyperkaliämiegefahr.

Mannitol eignet sich nicht zur Therapie peripherer Ödeme und darf wegen der Volumenverschiebung in den intravasalen Raum nicht bei einer Herzinsuffizienz, akutem Lungenödem und wegen der fehlenden renalen Ausscheidung nicht bei einer Anurie eingesetzt werden.

Aldosteronrezeptorantagonisten

Wirkstoffe

Spironolacton, Eplerenon.

Wirkmechanismus

Aldosteronrezeptorantagonisten sind kompetitive Antagonisten am intrazellulären Aldosteronrezeptor in Zellen des spätdistalen Tubulus und Sammelrohr. Über diesen Rezeptor bewirkt Aldosteron u. a. die Na⁺-Resorption und K⁺-Sekretion.

Folge der Rezeptorhemmung:

- Die Ausscheidung von Na⁺ steigt, die von K⁺ nimmt ab! Deshalb sind es „kaliumsparende“ Diuretika.
- Schwache Diurese (2–4 % des Glomerulumfiltrats).

Indikationen

- Conn-Syndrom (primärer Hyperaldosteronismus)
- Aszites bei Leberinsuffizienz u. a. aufgrund des sekundären Hyperaldosteronismus
- Symptomatische Herzinsuffizienz

Unerwünschte Wirkungen

- **Hyperkaliämie**, insbesondere bei Kombination mit ACE-Hemmern oder bei Niereninsuffizienz.
- **Gynäkomastie** bei Spironolacton. Eplerenon wirkt spezifischer und hat daher weniger antiandrogene Nebenwirkungen.

Kontraindikationen

- **Hyperkaliämie** ($> 5,0 \text{ mmol/l}$) und **schwere Niereninsuffizienz** (Kreatinin $> 2,5 \text{ mg/dl}$ [$> 220 \text{ } \mu\text{mol/l}$])
- **Keine Kombination mit anderen kaliumsparenden Diuretika**; Gefahr der Hyperkaliämie

Therapie der lebensbedrohlichen Hyperkaliämie:

- **Forcierte Diurese**: **Furosemid** + 0,9-prozentige NaCl-Lösung \rightarrow renale Kaliumausscheidung \uparrow .
- **Glukose und Insulin i. v.** \rightarrow intrazelluläre Kaliumaufnahme \uparrow .
- **NaHCO₃ i. v.** \rightarrow Ausgleich einer gleichzeitig bestehenden Azidose und Förderung der Kaliumaufnahme in die Zelle im Austausch mit H⁺.
- **β_2 -Mimetika**: **Salbutamol** i. v. oder inhalativ \rightarrow intrazelluläre Kaliumaufnahme \uparrow .
- **Kationenaustauscher** \rightarrow intestinaler Austausch von Na⁺ gegen K⁺. Langsamer Wirkungseintritt.
- **Hämodialyse**.
- **Kalziumglukonat i. v.** \rightarrow beseitigt die kardiotoxischen Wirkungen von Kalium als funktioneller Antagonist; wirkt quasi sofort. Die Wirkung hält nur ca. 30 min an. Am Gesamtkaliumspiegel ändert sich jedoch nichts.

Indikation (ACE-Hemmer und Sartane)

- Arterieller Hypertonus
- Chronische Herzinsuffizienz
- Myokardinfarkt
- Diabetische Nephropathie

Kontraindikation (ACE-Hemmer und Sartane)

- Angioödem
- Schwangerschaft: Teratogen
- Beidseitige Nierenarterienstenose

Calciumantagonisten ±

Wirkstoffe und Wirkmechanismus (Blockade von Calciumkanälen)

↓ Calciumstrom in die Zellen
⇒ Vasodilatation

- Dihydropyridine (Nifedipin, Amlodipin) : periphere Vasodilatation
- Verapamil : negativ inotrop, chronotrop und dromotrop
- Diltiazem : negativ inotrop, chronotrop und dromotrop + periphere Vasodilatation

Nebenwirkung

- Dihydropyridine: Hypotonie, Kopfschmerzen, Flush, Knöchelödeme, Reflextachykardie
- Verapamil : Bradykardie, Verschlechterung einer Herzinsuffizienz
- Diltiazem : Nebenwirkungen von Dihydropyridine und Verapamil

Indikation

- Arterielle Hypertonie
- Stabile Angina pectoris
- Supraventrikuläre Tachykardie (Verapamil)
- Raynaud-Syndrom (Nifedipin)

• Prinzmetal-Angina

Kontraindikation

- Alle Calciumantagonisten : Hypotonie, Akutes Koronarsyndrom
- Verapamil und Diltiazem : Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpfunktion. AV-Block (Grad II und III). Kombination mit Betablockern → Gefahr des AV-Blocks

Beta-Blocker ±

Wirkstoffe und Wirkmechanismus

- Kardioselektive Beta-Blocker (Metoprolol, Bisoprolol) : Hemmung der β_1 -Rezeptoren (negativ inotrop, chronotrop, dromotrop und bathmotrop)
- Unselektive Beta-Blocker (Propranolol) : Hemmung der β_1 - und β_2 -Rezeptoren (Glykogenolyse↓, Insulinsekretion↓, Lipolyse↓)

Nebenwirkung

- Kardioselektive Beta-Blocker : Bradykardie, Hypotonie, Verschlechterung einer Herzinsuffizienz
- Unselektive Beta-Blocker: zusätzlich Bronchokonstriktion, Hypoglykämie, Hyperglykämie

Indikation

- Kardioselektive Beta-Blocker : Koronare Herzkrankheit, Akutes Koronarsyndrom. Arterieller Hypertonie. Chronische Herzinsuffizienz. Tachykardie Herzrhythmusstörungen. Migräne
 - Unselektive Beta-Blocker: Portale Hypertension. Hyperthyreose, Migräne
- “Beta-Blocker müssen ein- und ausgeschlichen werden!”

→ Propranolol $T_{1/2} \approx 7h$

Kontraindikation

- Bradykardie, Hypotonie, Kardiale Dekompensation
- Asthma bronchiale
- Kombination mit Diltiazem oder Verapamil → Gefahr des AV-Blocks
- Raynaud-Syndrom, schwere pAVK

• Prinzmetal-Angina, Psoriasis, AV-Block II & III

Die eigentliche Blockade der β -Adrenozeptoren führt eher zur Vasokonstriktion, sodass zunächst der periphere Widerstand zunimmt. Deshalb Vorsicht bei der Anwendung von β -Blockern bei der pAVK. Erst später kommt es zur Abnahme des peripheren Widerstands und des Blutdrucks.

Kalziumantagonisten

Wirkstoffe

Dihydropyridine

- z. B. Nifedipin, Nitrendipin, Felodipin, Amlodipin.
- Dihydropyridine enden typischerweise auf **-dipin**.

Nicht-Dihydropyridine

- Verapamil, Gallopamil
- Diltiazem

Wirkmechanismus

Kalziumantagonisten **hemmen den Kalziumeinstrom in die Zelle über L-Typ-Kalziumkanäle**, die in den Gefäßen und im Myokard vorkommen. Korrekterweise werden Sie daher als Kalziumkanalblocker bezeichnet. Folge:

- In den Gefäßen: arterielle Vasodilatation, auch in Koronargefäßen

- Im Myokard: **negativ** chronotrop, inotrop, dromotrop

Die Wirkstoffe unterscheiden sich in der Selektivität für diese Kanäle:

- **Dihydropyridine** sind **peripher** wirksame Kalziumantagonisten. Sie **wirken also nur in den Gefäßen** → Blutdrucksenkung. Durch die Senkung des peripheren Widerstands fällt der Blutdruck, es kommt aber **reflektorisch zur Aktivierung des Sympathikus** und zum **Anstieg der Herzfrequenz** i. S. einer **Reflex tachykardie**.
- **Nicht-Dihydropyridine** sind in Gefäßen und im Myokard wirksam → **Blutdrucksenkung + Abnahme der Herzfrequenz + Verzögerung der AV-Überleitung**. Es tritt **keine Reflex tachykardie** auf. *Sondern Bradykardie*

Indikationen

- Arterielle Hypertonie.
- Hypertensiver Notfall: Nifedipin.
- Vasospastische Erkrankungen wie Prinzmetal-Angina und Raynaud-Syndrom.
- Chronisch stabile Angina pectoris, z. B. als Alternative zu β -Blockern, wenn diese kontraindiziert sind wie bei Asthma bronchiale.
- Supraventrikuläre Tachykardie, Vorhofflimmern. **Nur Nichtdihydropyridine** wie Verapamil besitzen diese Indikation!

Das kurz wirksame Nifedipin erhöht die Mortalität bei KHK vermutlich durch die Reflex tachykardie mit konsekutiv erhöhtem O_2 -Verbrauch. Deshalb darf es nicht beim akuten Koronarsyndrom angewandt werden! Nifedipin wird hauptsächlich zur raschen RR-Senkung bei der hypertensiven Krise eingesetzt. Lang wirksame Dihydropyridine sind für die Dauertherapie der Hypertonie indiziert. Sie haben geringere Auswirkungen auf die Herzfrequenz.

Pharmakokinetik

Unerwünschte Wirkungen und Kontraindikationen von Kalziumantagonisten

| | Dihydropyridine | Nicht-Dihydropyridine |
|------------------------|--|---|
| Unerwünschte Wirkungen | <ul style="list-style-type: none">• Reflex tachykardie. Gefahr von Angina-pectoris-Anfall wegen gesteigertem O_2-Verbrauch• Knöchelödeme• Orthostatische Hypotonie• Kopfschmerzen, Flush | <ul style="list-style-type: none">• AV-Block• Bradykardie• Herzinsuffizienz |
| Kontraindikation | <ul style="list-style-type: none">• Akutes Koronarsyndrom• Tachykardie | <ul style="list-style-type: none">• Therapie mit β-Blockern• AV-Block, Bradykardie, Herzinsuffizienz• WPW-Syndrom mit Vorhofflimmern: Gefahr, eine Kammer tachykardie auszulösen |

Amiodaron ±

Wirkmechanismus

Kaliumkanalblocker

Blockade von K^+ -Kanälen (Lange Wirkdauer: ein paar Monate)

14-100 T

Nebenwirkung

- Hyperthyreose oder Hypothyreose
- Verlängerung der QT-Zeit
- Lungenfibrose
- Leberfunktionsstörungen (Erhöhung der Transaminasen)
- Einlagerung in die Kornea (→ reversible Beeinträchtigung des Sehvermögens)
- Photosensibilität der Haut

Indikation

Therapie und sekundäre Prophylaxe von ventrikulären Tachykardien und Vorhofflimmern

Kontraindikation

- Hyperthyreose
- Bradykardie, QT-Verlängerung
- Iodallergie
- Schwangerschaft, Stillzeit

Herzglykoside ±

Wirkstoffe und Wirkmechanismus

- Digoxin, Digitoxin : positiv inotrop, negativ chronotrop und dromotrop (durch Hemmung der $Na^+/K^+-ATPase$)

Nebenwirkung

 (insb. bei Überdosierung)

- Gastrointestinale Nebenwirkungen (Erbrechen, Durchfälle)
- Herzrhythmusstörungen
- Sehstörungen (Neurotoxizität)

Indikation

Frequenzkontrolle einer Tachyarrhythmia absoluta

Kontraindikation

- AV-Block $\geq II^\circ$
- Hypokaliämie, Hyperkalzämie
- Niereninsuffizienz (Digoxin = relative KI)

Digitalis-Intoxikation

- Ätiologie : Überdosierung, Niereninsuffizienz (Digoxin)
- Begünstigende Faktoren: Hypokaliämie, Hyperkalzämie
- Symptome/Klinik: Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall, Sehstörungen
- EKG: Muldenförmige ST-Senkung, Herzrhythmusstörungen jeglicher Art (Extrasystolen bis totaler AV-Block oder Kammerflimmern)
- Therapie : Digitalis-Antitoxin, Magenspülung, Aktivkohlegabe, Kaliumwert hochnormal einstellen.
- * Colestyramin (Digitoxin)

Digitalisglykoside hemmen die $Na^+ - K^+ - ATPase$ (Abb. 7.2). Dadurch steigt intrazellulär die Na^+ -Konzentration an und in der Folge die Ca^{2+} -

Sympathomimetika ±

Wirkstoffe und Wirkmechanismus

- Noradrenalin : α_1 - und β_1 -Agonismus.
- Adrenalin : α_1 -, β_1 - und β_2 -Agonismus.
- Dobutamin : insb. β_1 -Agonismus
- Dopamin : β_1 -Agonismus (in mittlerer Dosierung), α_1 -Agonismus (in hoher Dosierung)
„ β_1 - Agonismus : positiv inotrop, chronotrop und dromotrop. β_2 - Agonismus : Bronchodilatation.
 α_1 - Agonismus : Vasokonstriktion“

Nebenwirkung

- Hypertensive Episoden
- Tachykardie Herzrhythmusstörungen
- Wirkungsverlust bei dauerhafter Gabe

Indikation

- Kardiopulmonale Reanimation, Anaphylaxie : Adrenalin
- Kardiogener Schock : Dobutamin ± Noradrenalin
- Sepsis: Noradrenalin

Parasympatholytika
Auch
Muskarinrezeptorantagonisten genannt.

Atropin ±

Wirkmechanismus

Parasympatholytikum (Anticholinergikum) = kompetitiver Antagonist von Acetylcholin

heben als kompetitive Antagonisten von Acetylcholin an Muskarinrezeptoren die Acetylcholinwirkung auf.

Nebenwirkungen

- Tachykardie
- Unruhe, Mundtrockenheit

Obstipation, Harnverhalt, Mydriasis, AP-Anfälle

→ Antidot : Physostigmin

Indikation

bradykarde Herzrhythmusstörungen : 0,5mg i.v., Wiederholung bis max. 3 mg

Kontraindikation

- Tachykardie
- Paralytischer Ileus

hemmen die HMG-CoA-Reduktase (3-Hydroxy-3-Methyl-Glutaryl-Coenzym-A-Reduktase), das Schrittmacherenzym der zellulären Cholesterinsynthese.

Statine ±

Wirkstoffe und Wirkmechanismus

- Simvastatin, Atorvastatin : Kompetitive Hemmung der HMG-CoA-Reduktase (Schlüsselenzym der Cholesterinbiosynthese) → LDL-Cholesterin↓↓, HDL-Cholesterin↑

Nebenwirkungen

- Myalgie
- Myositis (mit Gefahr einer Rhabdomyolyse)
- Transaminasen↑
- Gastrointestinale Beschwerden

Indikationen

- Sekundärprävention: KHK, pAVK, ischämischer Schlaganfall
- Primärprävention: Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko

Kontraindikationen

- Myopathie
- Schwere Lebererkrankung
- Schwangerschaft

Synkope +/-

Definition

- **Synkope:** Plötzlicher Verlust von Bewusstsein und Muskeltonus mit rascher, spontaner und kompletter Erholung aufgrund einer transienten globalen zerebralen Minderperfusion
- **Präsynkope:** Prodromalstadium der Synkope mit Schwarzwerden vor den Augen, Schwindel und Kaltschweißigkeit

Ätiologie

| | Pathomechanismus | Unterformen | Ursachen und Auslöser |
|--------------------------------|---|--|--|
| Kardiale Synkope | Akute, transiente Verminderung des Herzzeitvolumens → Zerebrale Minderperfusion | Arrhythmogene Synkope | Bradykarde oder tachykarde Herzrhythmusstörung |
| | | Synkope infolge struktureller Herz-erkrankung | Herzklappenstenose, hypertroph-obstruktive Kardiomyopathie (HOCM) |
| | | Synkope infolge primär extrakardialer Erkrankung | Lungenembolie, Aortendissektion |
| Reflex-synkope | Überaktivität des Parasympathikus und Unteraktivität des Sympathikus → Hypotension und/oder Bradykardie → Zerebrale Minderperfusion | Neurokardiogene (vasovagale) Synkope | Angst, Schmerz, längeres Stehen |
| | | Situative Synkope | Miktion, Defäkation, Husten, Niesen, Lachen |
| | | Karotissinussyndrom | Gesteigerte Empfindlichkeit des Karotissinus → systolische Hypotension bei mechanischer Reizung des Karotissinus |
| Ortho-statische Synkope | „Versacken“ von Blut in die untere Extremität beim Aufstehen → Unzureichende Gegenregulation → Akute systolische Hypotension → Zerebrale Minderperfusion | Neurogene orthostatische Hypotension | Autonome Dysfunktion bei Morbus Parkinson, Multipler Sklerose oder Diabetes mellitus |
| | | Nicht neurogene orthostatische Hypotension | Einnahme von Vasodilantien, Volumenmangel durch Blutung oder Diarrhö |

Symptome/Klinik

- Plötzlicher Verlust von Bewusstsein und Muskeltonus mit rascher, spontaner und kompletter Erholung. Dauer <15 Sekunden
- Blasses Hautkolorit.
- Ggf. **Konvulsive Synkope** : Beginn erst nach Bewusstseinsverlust (Unterschied zum zerebralen Krampfanfall)

Diagnostik

Basisdiagnostik bei Synkope

- **Anamnese** : Ruhe/Belastung, Emotionen, **Prodromi**? Erst- oder Rezidivereignis?
Vorerkrankungen, insb. kardiovaskulär/neurologisch? **Familiäre** Herzerkrankungen/
plötzlicher Herztod in der Familie? **Medikamente**, insb. Antihypertensiva, Antidepressiva?
- **Körperliche Untersuchung** : **Herz**, Vitalparameter, Sturzverletzungen
- **EKG** : **Arrhythmien**? Zeichen einer strukturellen Herzerkrankung?
- **Labor** : Blutbild, Natrium, Kalium, Calcium, Glucose, TSH, Kreatinin
- **Schellong-Test** : Wiederholte Messung von Blutdruck und Herzfrequenz, beim Liegen und dann 1, 3, 5 und 10 min nach dem Aufstehen. Hinweisend auf eine orthostatische Hypotonie sind Abfall des systolischen Blutdrucks um ≥ 20 mmHg oder Abfall des diastolischen Blutdrucks um ≥ 10 mmHg

Risikomarker

- Synkope im Liegen oder bei körperlicher Belastung. Plötzliches Herzrasen vor der Synkope. Auffälliger bzw. suspekter EKG-Befund. Herzinsuffizienz oder schwere strukturelle Herzerkrankung. Plötzlicher Herztod in der Familie
- **Bei mind. einem Risikomarker: Sofortige stationäre Aufnahme, EKG-Überwachung und erweiterte Diagnostik!**

Erweiterte Diagnostik bei Synkopen

Bei Unklaren Synkopenursache nach Basisdiagnostik

- **Langzeit-EKG** : Bei Verdacht auf intermittierende Herzrhythmusstörungen
- **Belastungs-EKG (Ergometrie)** : wenn Synkope während oder kurz nach körperlicher Belastung
- **Echokardiogramm** : Bei Verdacht auf strukturelle Herzerkrankung
- **Kipptisch-Test** : Bei Verdacht auf Reflexsynkope
- **Karotissinus-Massage (CSM)** : Bei Verdacht auf Karotissinussyndrom
- **Elektrophysiologische Untersuchung (EPU)** : Bei Verdacht auf Herzrhythmusstörungen



Differentialdiagnosen

- Epileptischer Krampfanfall
- Hypoglykämie
- Herzstillstand
- Psychogener Bewusstseinsverlust

Therapie

Kardiale Synkope

- Therapie der ursächlichen Erkrankung
- **Bei bradykarden Arrhythmien**: Schrittmacherimplantation
- **Bei tachykarden Arrhythmien**: Antiarrhythmika, Katheterablation, ICD-Implantation

Reflexsynkope

- **Allgemeinmaßnahmen** : Aufklärung über Diagnose und präventive Maßnahmen (Meiden auslösender Umstände, Erkennen von Prodromi und Ausüben von Gegenmaßnahmen)
- **Ggf. medikamentöser Therapieversuch**: Midodrin (α_1 -Rezeptor-Agonist)

Synkope bei orthostatischer Hypotonie

- **Allgemeinmaßnahmen** : Aufklärung über Diagnose und präventive Maßnahmen (Meiden von begünstigenden Medikamenten, Trinkmenge mind. 2 L/Tag und ausreichende Kochsalzzufuhr, langsam Aufstehen)
- **Ggf. medikamentöser Therapieversuch** : Midodrin (α_1 -Rezeptor-Agonist)


Komplikationen


- Plötzlicher Herztod bei Kardialen Ursachen.
- Verletzungen

Prognose

- **Rezidivrisiko**
- **Lebenserwartung** : normal Bei Patienten mit Reflexsynkope, aber erhöhte Mortalität bei Kardialen Ursachen.

Schwindel





Verdacht auf vestibuläre Störung (mit Bewegungsillusion)

- 1 Hypothesenbildung anhand der weiteren anamnestischen Angaben
 - Attackenartiger Schwindel
 - Kurze Attacken
 - Ohne Hörstörung: BPLS , Vestibularisparoxysmie
 - Mit Hörstörung: Perilymphfistel
 - Lange Attacken
 - Ohne Hörstörung: Vertebrobasiläre TIAs
 - Mit Hörstörung: Morbus Menière-Attacke
 - Anhaltender Schwindel
 - Apoplektiformer Beginn
 - Ohne Hörstörung: Vertebrobasilärer Infarkt
 - Mit Hörstörung: Labyrinthinfarkt
 - Progredienter Beginn
 - Ohne Hörstörung: Neuropathia vestibularis , verschiedene zentral-vestibuläre Ursachen
 - Mit Hörstörung: Akustikusneurinom


Schwindel – Fokussierte neurologische Untersuchung

| | Untersuchung | Pathologische Befunde |
|--|---|---|
| Quantitative Bewusstseinsstörung | <ul style="list-style-type: none"> Beurteilung der Vigilanz | <ul style="list-style-type: none"> Somnolenz |
| Sehen | <ul style="list-style-type: none"> Fingerperimetrie im Seitenvergleich der Augen und der Gesichtsfeldhälften | <ul style="list-style-type: none"> Monokulärer Visusausfall Homonyme Hemianopsie oder Quadrantenanopsie |
| Okulomotorik | <ul style="list-style-type: none"> Inspektion: Pupillengröße, spontane Bulbusstellung, Blickstellung Willkürliche Blickbewegungen in alle Richtungen Konvergenzreaktion Blickfolge im Seitenvergleich Willkürsakkaden im Seitenvergleich | <ul style="list-style-type: none"> Beidseitige Miosis oder Mydriasis, Anisokorie Abweichende Blickstellung, insb. Skew Deviation Blicklähmung Konvergenzstörung Sakkadierte Blickfolge Verlangsamte oder dysmetrische Willkürsakkaden |
| Nystagmus | <ul style="list-style-type: none"> Beurteilung in der Nullposition und bei horizontaler Auslenkung des Blicks um jeweils etwa 20° Identifikation der schnellen Phase mit Angabe der Schlagrichtung Beschreibung von Geschwindigkeit, Amplitude und Regelmäßigkeit Beurteilung der Modifizierbarkeit durch Aufhebung der Fixation mittels Frenzelbrille Ggf. Provokation durch Kopfschütteln und/oder Kopfhängelage | <ul style="list-style-type: none"> Jeder Nystagmus mit Ausnahme des Endstellnystagmus oder optokinetischen Nystagmus Genaue Beschreibung des Nystagmus wichtig! |
| Vestibulo-okulärer Reflex | <ul style="list-style-type: none"> Schnelle passive Kopfdrehung um 20° aus der Nullposition unter Fixation <p>Oder</p> <ul style="list-style-type: none"> Schnelle passive Kopfdrehung aus 20° Auslenkung auf die Nullposition unter Fixation Prüfung der Fixationssuppression des vestibulo-okulären Reflexes | <ul style="list-style-type: none"> Einstellsakkade auf den Fixationspunkt nach Kopfpuls Gestörte Fixationssuppression des vestibulo-okulären Reflexes mit reflektorischen Sakkaden während der Kopfdrehung |
| Diagnostische Lagerungsproben | <ul style="list-style-type: none"> Lagerungsprüfung für die posterioren und anterioren Bogengänge links und rechts Lagerungsprüfung für die horizontalen Bogengänge links und rechts | <ul style="list-style-type: none"> Durch Reizung eines Bogengangs induzierter, an- und abscwelliger Nystagmus Genaue Beschreibung des Nystagmus wichtig! |
| Zerebelläre Funktion im Seitenvergleich | <ul style="list-style-type: none"> Finger-Nase-Versuch oder Finger-Folge-Versuch Knie-Hacke-Versuch Beurteilung des freien Sitzens, wenn durchführbar | <ul style="list-style-type: none"> Dysmetrische zielgerichtete Bewegung Ataktischer Bewegungsablauf Freies Sitzen nicht möglich |
| Gang- und Standprüfung | <ul style="list-style-type: none"> Romberg-Stehversuch Unterberger-Tretversuch | <ul style="list-style-type: none"> Gerichtetes Schwanken oder gerichtete Fallneigung Drehung um >45° |

HINTS-Protokoll

| Untersuchungen | Pathologische Befunde | Zusammenfassung |
|-----------------|--|--------------------------|
| HI Head Impulse | Normaler horizontaler Kopfpulstest (vestibulo-okulärer Reflex in der Horizontalen) trotz Schwindels mit Bewegungssillusion | Impulse Normal |
| N Nystagmus | Blickrichtungsabhängigen, alternierender horizontaler Nystagmus (schnelle Phase) | Fast-Phase Alternating |
| TS Test of Skew | Skew Deviation mit Einstellsakkade nach Aufdecken im Abdecktest | Refixation on Cover Test |



Latente Skew Deviation (Vertikales Schielen)



Romberg Stehversuch

Sicherer Stand

△ AMBOSS



Störung

Vestibulär/peripher

Befund



Romberg positiv



Kleinhirnstörungen können im Gegensatz dazu

Sicherer Stand

△ AMBOSS



Störung

Kleinhirn



eventuell nur noch etwas mehr,

Dyspnoe +-

Diagnostik

Anamnese

Körperliche Untersuchung

- Vitalparameter : Atemfrequenz, Puls, Blutdruck
- Auskultation des Herzens
- Untersuchung der Lunge

Weitere Diagnostik

- Pulsoxymetrie
- Blutgasanalyse
- EKG *HRS*
- Labor
 - *Bei akuter Dyspnoe:* ^{MI}Herzenzyme, ^{LE}D-Dimere, Entzündungsparameter, BNP
 - *Bei chronischer Dyspnoe:* Blutbild (^{Anämie}Hämoglobin), Entzündungsparameter, BNP
- Bildgebung
 - *Röntgen-Thorax* *Cirradiomegalie, Stauung, Infiltrate, Erguss, Ödem, Pneumothorax, Mediastinum* *↑*
 - CT
 - Echokardiographie
- Lungenfunktionstest (z.B. Spirometrie, Diffusionskapazität)

Differentialdiagnosen

Ursachen für **akute Dyspnoe**

| Ursachen | Erkrankung | Begleitsymptome/Charakteristika | Wegweisende Diagnostik |
|-----------------|--|--|--|
| Kardial | 1 Akutes Koronarsyndrom <i>MI</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Retrosternale Schmerzen • Vegetative Begleitreaktion • Ggf. Schock | <ul style="list-style-type: none"> • EKG • Herzenzyme |
| | 2 Akute Dekompensation einer Herzinsuffizienz <i>HI</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsminderung • Ödeme • Zyanose • Palpitationen/Tachykardie • Ggf. Husten | <ul style="list-style-type: none"> • Auskultation der Lunge • Röntgen-Thorax • <u>Echokardiographie</u> <i>EF</i> |
| | 3 Herzrhythmusstörungen <i>HRS</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Palpitationen • Schwindel | <ul style="list-style-type: none"> • EKG |
| | 4 <u>Perikardtamponade</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Blässe, Kaltschweißigkeit • Ggf. retrosternale Schmerzen • Pulsus paradoxus • Ggf. Schock, obere Einflusstauung | <ul style="list-style-type: none"> • Echokardiographie |
| Pulmonal | 1 Asthma bronchiale | <ul style="list-style-type: none"> • Rezidivierende, anfallsartige Dyspnoe • Trockener Husten, insb. nachts | <ul style="list-style-type: none"> • Auskultation der Lunge • Lungenfunktionsuntersuchung |
| | 2 Fremdkörperaspiration | <ul style="list-style-type: none"> • Besonders ältere Menschen und Kinder betroffen • <u>Hochakutes</u> Auftreten • Häufig Husten | <ul style="list-style-type: none"> • Anamnese • Auskultation • Ggf. Bildgebung |
| | 3 Lungenembolie | <ul style="list-style-type: none"> • Atemabhängige Thoraxschmerzen • Husten, ggf. Hämoptysen • Tachykardie | <ul style="list-style-type: none"> • D-Dimere • BGA • Angio-CT |

| Ursachen | Erkrankung | Begleitsymptome/Charakteristika | Wegweisende Diagnostik |
|----------------------------------|---|--|--|
| 4 5 6 7 | | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. Schock Ggf. Hinweise auf TVT | <ul style="list-style-type: none"> Echokardiographie |
| | Pneumonie | <ul style="list-style-type: none"> Fieber, allgemeines Krankheitsgefühl Husten | <ul style="list-style-type: none"> Auskultation der Lunge Labor Röntgen-Thorax |
| | Pneumothorax | <ul style="list-style-type: none"> Plötzlich einsetzende, atemabhängige Thoraxschmerzen | <ul style="list-style-type: none"> Klinische Untersuchung Röntgen-Thorax |
| | Hämatothorax | <ul style="list-style-type: none"> Thorakale Schmerzen Hämodynamische Instabilität | <ul style="list-style-type: none"> Trauma in der Anamnese Sonographie Röntgen-Thorax |
| | Pleuraerguss | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. Symptome einer Grunderkrankung (Herzinsuffizienz, maligne Erkrankung) | <ul style="list-style-type: none"> Sonographie Röntgen-Thorax |
| Erkrankungen der oberen Atemwege | Infekte der oberen Atemwege (z.B. Laryngitis, Pharyngitis) | <ul style="list-style-type: none"> Heiserkeit, Halsschmerzen Ggf. Rhinitis | <ul style="list-style-type: none"> Anamnese Racheninspektion |
| | Obstruktionen der oberen Atemwege (z.B. Polypen, Tracheomalazie, Reinke-Ödem) | <ul style="list-style-type: none"> Je nach Erkrankung, z.B. behinderte Nasenatmung bei Polypen | <ul style="list-style-type: none"> HNO-ärztliche Diagnostik (Rhinoskopie, Laryngoskopie u.a.) |
| | Angioödem | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. Schwellung des Gesichts und/oder der Zunge | <ul style="list-style-type: none"> Klinische Diagnose Anamnese Ggf. Allergietest, Bestimmung der C₁-Esterase-Inhibitor-Konzentration im Blut |
| Metabolisch | Metabolische Azidose | <ul style="list-style-type: none"> Hyperventilation mit vertiefter Atmung (Kußmaul-Atmung) Apathie bis hin zum Koma | <ul style="list-style-type: none"> Blutgasanalyse (pH↓, pCO₂↓, HCO₃⁻↓) |
| Psychogen | Hyperventilation (z.B. im Rahmen von Angst-/Panikstörungen) | <ul style="list-style-type: none"> Angst Vegetative Begleitreaktion (Tachykardie, Schwitzen etc.) | <ul style="list-style-type: none"> Anamnese Unauffällige Diagnostik (u.a. normale Sauerstoffsättigung) |
| Neurogen | Akute, beidseitige Zwerchfellparese | <ul style="list-style-type: none"> Paradoxe Atemexkursionen | <ul style="list-style-type: none"> Sonographie Röntgen-Thorax |
| Weitere | Vergiftungen (z.B. mit Blausäure, Kohlenmonoxid) | <ul style="list-style-type: none"> Abhängig von der Substanz Ggf. toxisches Lungenödem | <ul style="list-style-type: none"> Anamnese Weitere Diagnostik abhängig von der vermuteten Substanz |
| | Medikamentenüberdosierung (z.B. Ticagrelor, Salicylate) | <ul style="list-style-type: none"> Abhängig von der Substanz | <ul style="list-style-type: none"> Anamnese |
| | Anaphylaxie | <ul style="list-style-type: none"> Weitere allergische Symptome wie Flush, Urtikaria, Ödeme Ggf. hämodynamische Instabilität | <ul style="list-style-type: none"> Anamnese Klinische Diagnose |
| | Sepsis | <ul style="list-style-type: none"> Fieber | <ul style="list-style-type: none"> Entzündungsparameter |


| Ursachen | Erkrankung | Begleitsymptome/Charakteristika | Wegweisende Diagnostik |
|----------|------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. hämodynamische Instabilität | <ul style="list-style-type: none"> Fokussuche |

Ursachen für chronische Dyspnoe


| Ursachen | Erkrankung | Begleitsymptome/Charakteristika | Wegweisende Befunde |
|------------------|--|---|---|
| Kardial | Herzinsuffizienz <i>AKut & chronisch</i> | <ul style="list-style-type: none"> Leistungsminderung Palpitationen/Tachykardie Zyanose Ödeme Ggf. Husten | <ul style="list-style-type: none"> Auskultation von Herz und Lunge Röntgen-Thorax Echokardiographie BNP |
| Pulmonal | COPD | <ul style="list-style-type: none"> Husten | <ul style="list-style-type: none"> Raucheranamnese Auskultation Lungenfunktionstest |
| | Asthma bronchiale <i>AKut & chronisch</i> | <ul style="list-style-type: none"> Rezidivierende, anfallsartige Dyspnoe Trockener Husten, insb. nachts | <ul style="list-style-type: none"> Auskultation Lungenfunktionstest |
| | Interstitielle Lungenerkrankungen | <ul style="list-style-type: none"> Trockener Husten Im Verlauf Trommelschlägelfinger und Uhrglasnägel | <ul style="list-style-type: none"> Auskultation Lungenfunktionstest Bildgebung |
| | Chronisch rezidivierende Lungenembolien <i>AKut & chronisch</i> | <ul style="list-style-type: none"> Häufig keine weiteren Symptome | <ul style="list-style-type: none"> Angio-CT, ggf. Perfusions- und Ventilationsszintigraphie, ggf. „Quellensuche“ (z.B. Farbduplex-Sonographie) |
| | Pulmonale Hypertonie | <ul style="list-style-type: none"> Klinik häufig unspezifisch Sinustachykardie Schwindel, Müdigkeit Zyanose Brustschmerzen | <ul style="list-style-type: none"> EKG Echokardiographie Rechtsherzkatheteruntersuchung |
| | Mukoviszidose | <ul style="list-style-type: none"> Chronischer, produktiver Husten Rezidivierende Infekte der Luftwege | <ul style="list-style-type: none"> Pilocarpin-Iontophorese (Schweißtest) Nachweis eines Defekts des CFTR-Gens |
| Psychogen | Angststörung <i>AKut & chronisch</i> | <ul style="list-style-type: none"> Weitere vegetative Symptome wie z.B. Tachykardie, Schwitzen | <ul style="list-style-type: none"> Anamnese |
| Neurogen | Myasthenia gravis | <ul style="list-style-type: none"> Rasche Ermüdbarkeit der Muskulatur, v.a. okulobulbär | <ul style="list-style-type: none"> Tensilon-Test <i>Cholinesterasehemmer inj. → Verbesserung (+)</i> Serologie |
| | Zwerchfellparese <i>AKut & chronisch</i> | <ul style="list-style-type: none"> Symptome häufig erst, wenn beide Zwerchfellhälften betroffen Ggf. weitere Symptome der Grunderkrankung (z.B. Muskeldystrophien, Guillain-Barré-Sd, Amyotrophe Lateralsklerose) | <ul style="list-style-type: none"> Sonographie Röntgen-Thorax Neurologische Diagnostik |
| Weitere | Fehlende Kondition | <ul style="list-style-type: none"> Rasche Ermüdbarkeit | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. äußere Hinweise (z.B. Adipositas) |

| Ursachen | Erkrankung | Begleitsymptome/Charakteristika | Wegweisende Befunde |
|----------|--------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. Ergometrie |
| | Anämie | <ul style="list-style-type: none"> Blässe, Leistungsminderung | <ul style="list-style-type: none"> Blutbild |
| | Thoraxdeformitäten | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. muskuloskelettale Beschwerden | <ul style="list-style-type: none"> Klinische Untersuchung Ggf. Röntgen |


Akute Dyspnoe



Chronische Dyspnoe



Akute Dyspnoe



Ödeme +/-

Allgemein

- **Definition:** Flüssigkeitseinlagerung im interstitiellen Raum unterschiedlicher Genese.
- **Formen**
 - Periphere Ödeme
 - Innere Ödeme : Lungenödem. Hirnödem. Aszites, Pleuraerguss

Ursachen

1. „**Wasserretention**“ → Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz
2. **Eiweißmangel** (Hypalbuminämie) → Nephrotisches Syndrom, Leberzirrhose, Malnutrition, enterales Eiweißverlust-Syndrom
3. **Hydrostatisch** → Chronisch venöse Insuffizienz, Thrombose, postthrombotisches Syndrom
4. **Erhöhte Kapillarpermeabilität** → Entzündung, Verbrennung, allergische Reaktion, Trauma
5. **Lymphabflussstörung** → Lymphödem
6. **Myxödem** → Hypothyreose (generalisiert), Hyperthyreose (typischerweise prätibial)

Fettstoffwechselerkrankungen +-

Definition

- **Hyperlipidämie:** Erhöhung der Konzentration des Cholesterins, der Triglyzeride oder beider Lipide im Serum:

- **Hypercholesterinämie:** Serum-Gesamtcholesterin $> 250 \text{ mg/dl}$
- **Hypertriglyzeridämie:** Serum-Triglyzeride $> 150 \text{ mg/dl}$

„Die Normwerte schwanken in Abhängigkeit vom Alter, die therapeutischen Zielwerte in Abhängigkeit vom Arterioskleroserisiko“

Physiologie

- Klinisch bedeutsame Lipide sind die Triglyzeride als Energieträger und das Cholesterin als Zellmembranbaustein und Ausgangsmolekül der Steroidhormon- sowie der Gallensäurensynthese.
- Die Lipide werden im Blut aufgrund ihrer Wasserunlöslichkeit in Form von Lipoproteinen transportiert, welche aus Lipiden und Apolipoproteinen bestehen und nach ihrer Zusammensetzung und Dichteklasse in Chylomikronen, VLDL, LDL und HDL eingeteilt werden, was für die Abschätzung des kardiovaskulären Risikos von besonderer Bedeutung ist.
- Entsprechend der physiologischen Funktion stehen erhöhte LDL-Cholesterinwerte in direktem Zusammenhang mit einer *beschleunigten Arteriosklerose-Entwicklung*. Hohe HDL-Cholesterinwerte korrelieren mit einem *verminderten Arteriosklerose-Risiko* und umgekehrt.

Ursachen

- **physiologisch-reaktive Formen** mit leichter, durch Nahrungsaufnahme induzierter Erhöhung von Triglyzeriden und/oder Cholesterin
- **sekundäre Hyperlipoproteinämien** : Diabetes mellitus Typ II, metabolisches Syndrom, Alkohol, Medikamente: z. B. Thiazide, β -Blocker, Cortison, Hypothyreose, nephrotisches Syndrom, Cholestase (Cholesterinerhöhung), Hepatitis
- **primäre Hyperlipoproteinämien**

Klinik

Hauterscheinungen

- **Sehnexanthome:** Knotige Schwellungen über den Achilles- und Fingerstrecksehnen
- **planare Xanthome:** An den Fingerzwischenfalten
- **Xanthelasmen:** Hellgelbe flache Knötchen an den Augenlidern
- **Arcus lipoides corneae:** Ringförmige, weißliche Trübung der Hornhautperipherie bei Hypercholesterinämie

Fettleber

Bei Hypertriglyzeridämie.

Komplikationen

- **Arteriosklerose** mit erhöhtem Risiko für koronare Herzkrankheit, Myokardinfarkt, pAVK und Schlaganfall besonders bei Hypercholesterinämie mit erhöhtem LDL-Cholesterin, erniedrigtem HDL-Cholesterin und bei Lipoprotein(a)-Hyperlipidämie.
- **Pankreatitis** bei Hypertriglyzeridämie $> 500 \text{ mg/dl}$.

Diagnostik

- **Anamnese:**
 - **Abschätzung des kardiovaskulären Risikos:** Hinweise für KHK?, aHT?, Diabetes mellitus?, Nikotingenuss?, familiäre Hyperlipidämien?
 - **Hinweise für sekundäre Hyperlipoproteinämie**
- **Bestimmung von Cholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyzeriden** nach $> 12 \text{ h}$ Nahrungs- und $> 72 \text{ h}$ Alkoholkarenz. **Bestimmung oder Berechnung des LDL-Cholesterin**

Therapieziele

- Triglyzeride: $< 150 \text{ mg/dl}$
- HDL-Cholesterin: $> 40 \text{ mg/dl}$
- Die LDL-Cholesterin-Zielwerte sind abhängig von anderen vorhandenen Risikofaktoren für die Entstehung einer Arteriosklerose.
 - **sehr hohes Risiko:** LDL-C.-Ziel $< 55 \text{ mg/dl}$
 - **hohes Risiko:** LDL-C.-Ziel $< 70 \text{ mg/dl}$
 - **moderates Risiko :** LDL-C.-Ziel $< 100 \text{ mg/dl}$
 - **niedriges Risiko :** LDL-C.-Ziel $< 115 \text{ mg/dl}$

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Therapie der Ursachen einer sekundären Hyperlipoproteinämie und Behandlung bzw. Beseitigung von begleitenden anderen Risikofaktoren (s.o.).
- **Diät:** Gewichtsnormalisierung, Fettreduktion
- **Regelmäßige körperliche Bewegung**

Medikamentöse Therapie

- **Cholesterinsyntheseenzym (= CSE)-Hemmer = HMG-CoA-Reduktasehemmer (Statine):**
Bewirken eine LDL-Cholesterin-Senkung: Atorvastatin 10–80 mg/d, Pravastatin 5 – 40 mg/d, Simvastatin 5 – 40 mg/d. Einnahme abends.
- **Fibrate:** Senkung des Cholesterins und der Triglyzeride: z.B. Fenofibrat
- **Azetidinone:** LDL-Cholesterin-Senkung. Z. B. Ezetimib
- **PCSK9-Inhibitoren** : LDL-Cholesterin-Senkung
- **LDL-Apherese:** bei schweren familiären Hypercholesterinämien

Praktisches Vorgehen

- *Basis:* Diät, körperliches Training und Therapie der Grunderkrankung
- *Hypercholesterinämie:* Statine (Ggf. + Ezetimib, Ggf. + PCSK9-Inhibitoren)
- *Hypertriglyzeridämie:* Statine (Ggf. + Fibrate)

Metabolisches Syndrom +-

Das metabolische Syndrom besteht aus stammbetonter Adipositas und zusätzlichen Faktoren wie Dyslipoproteinämie, Hypertonie und Glucosetoleranzstörung bzw. Diabetes mellitus Typ 2. Bei der Entstehung eines metabolischen Syndroms spielen hyperkalorische Ernährung und Bewegungsmangel eine wichtige Rolle und sind daher auch primärer therapeutischer Angriffspunkt. Sekundär werden Einzelkomponenten medikamentös behandelt.

Definition

1. Zentrale (stammbetonte) Adipositas mit Taillenumfang von ≥ 80 cm (Frauen) bzw. ≥ 94 cm (Männer) *Bauchumfang*
2. Zusätzlich zwei der vier folgenden Faktoren
 - Erhöhte Triglyceride: ≥ 150 mg/dL
 - Erniedrigtes HDL-Cholesterin: < 40 mg/dL (Männer), < 50 mg/dL (Frauen)
 - Erhöhter Blutdruck: systolisch ≥ 130 mmHg oder diastolisch ≥ 85 mmHg
 - Nüchternblutzucker ≥ 100 mg/dL ($\geq 5,6$ mmol/L) oder Diabetes mellitus Typ 2

Übergewicht und Adipositas

| Bezeichnung | Body-Mass-Index (BMI) |
|--|-----------------------|
| Untergewicht | $< 18,5$ |
| Normalgewicht | 18,5–24,9 |
| Übergewicht (Präadipositas) | 25,0–29,9 |
| Adipositas Grad I | 30,0–34,9 |
| Adipositas Grad II | 35,0–39,9 |
| Adipositas Grad III (sog. Adipositas permagna) | ≥ 40 |

$$\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

$$\frac{\text{lb}}{\text{in}} \times 703$$

- Abdominale Adipositas: Taillenumfang von ≥ 88 cm (Frauen) bzw. ≥ 102 cm (Männer)

Therapie

- Allgemeine Maßnahmen
 - Kalorienrestriktion, Ernährungsumstellung, körperliche Bewegung
 - Eventuell Verhaltenstherapie oder Gruppentherapie
- Medikamentöse Behandlung
 - Therapie der arteriellen Hypertonie
 - Therapie des Diabetes mellitus
 - Therapie der Dyslipidämie (z.B. Statine)
- Leitliniengerechte Therapie der Adipositas
 - Konservative Therapie
 - Basisprogramm: Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie
 - Ggf. ergänzend medikamentöse Therapie: Orlistat (Hemmung der Absorption von Fetten)
 - Chirurgische Therapie: Bariatrische Chirurgie
 - Operative Verfahren mit dem Ziel, die Nahrungsaufnahme des Körpers zu reduzieren
 - Häufige Verfahren: Magenband, Magenteilresektion, Magenbypass
 - Indikation: Versagen der konservativen Therapiemaßnahmen bei Vorliegen einer Adipositas per magna
 - Ziel: Verbesserung von Komorbiditäten und Steigerung der Lebensqualität

Prävention

- Schulungen für Eltern und Kinder zur ausgewogenen Ernährung

Perikarditis +/-

Definition

Eine Perikarditis ist eine Entzündung der äußeren Herzhaut (Perikard). Häufig gleichzeitiger Befall des Herzmuskels (Perimyokarditis).

Formen

- **Trockene Perikarditis (fibrinös)** → Perikarditis ohne Erguss
- **Feuchte Perikarditis (exsudativ)** → Perikarditis mit Erguss
- **Pericarditis constrictiva** (selten)

Ätiologie

- **Infektiös**: Viren (Coxsackie B,...) ^{Fibrinöse}, Bakterien (Tuberkulose) ^{Exsudativ}, ...
- **Immunologisch**: rheumatisches Fieber, Dressler-Syndrom, ...
- **Pericarditis epistenocardica**: in den ersten Tagen nach Myokardinfarkt
- **Urämische, Strahlen- und Tumorperikarditis**. ^{Granulomatöse}

Klinik

- **Trockene Perikarditis**: ^{Schmerzhaft} Stechender retrosternaler, auskultatorisch Perikardreiben
- **Feuchte Perikarditis**: ^{weniger schmerz} Schmerzen und Perikardreiben verschwinden und die Herztöne werden leiser.

Bei Perikardtamponade: prall gefüllte Jugularvenen, Leberkapselschmerz, Tachykardie, Dyspnoe, Schocksymptomatik.

Diagnostik

- **Klinik**.
- **EKG**: Konkavbogige ST-Hebungen meist in allen Ableitungen, bei Ergussbildung Niedervoltage und elektrischer Alternans.
- **Echokardiografie**: Perikarderguss?
- **Röntgen-Thorax**: Verbreiteter Herzschatten bei Erguss.
- **kardiales MRT (= CMR)**
- **Diagnostische Perikardpunktion**: bei unklarer Ursache (Tbc?). ^{Tuberkulose}





Abb. 11.63 Elektrischer Alternans. Abwechselnd folgen aufeinander nieder- und höheramplittudige QRS-Komplexe. Der Wechsel erfolgt von Aktion zu Aktion und nicht allmählich (zunehmend und abnehmend) über mehrere Aktionen, wie man häufig bei atembedingten Achsendrehungen beobachtet.

Therapie

- **kausale Therapie**: z. B. antibiotische Behandlung
- **Symptomatische Therapie**: NSAR: z. B. ASS (+ PPI); zusätzlich **Colchicin**
- **Perikardpunktion**: therapeutisch (bei Herzbeuteltamponade) oder diagnostisch
- **Operative Behandlung**: bei konstriktiver Perikarditis

Perikardpunktion

- **Indikationen**: (drohende) Perikardtamponade, diagnostisch. ^{Ursache Abklärung bei v.a. TB, oder Tumore Ursache}
- **Komplikationen**: lebensbedrohliche kardiale Arrhythmien, Pneumothorax, Myokardperforation, Verletzungen von Oberbauchorganen.
- **Durchführung**:
 - Reanimationsbereitschaft, EKG-Monitor
 - Lagerung: halbsitzend (30 – 60°)
 - Hautdesinfektion, sterile Handschuhe anziehen, Abdecken
 - Lokalanästhesie
 - **Punktion**:
 - echokardiografische Bestimmung von Punktionsrichtung und -tiefe
 - Einstichstelle: zwischen Xiphoid und linkem Rippenbogen
 - Punktionsrichtung: linkes Schulterblatt
 - wiederholte Aspirationen während der Punktion; lässt sich Perikarderguss aspirieren, Stahlkanüle etwas zurückziehen und Plastikkanüle vorschieben.
 - Dreiwegehahn, Spritze und Ableitungsschlauch anschließen und Erguss entweder passiv oder durch wiederholte Aspirationen mit der Spritze ablassen.






Abb. 8.1 EKG bei akuter Perikarditis. Typische konkave ST-Streckenhebungen in allen Ableitungen (bis auf aVR). [aus: Baenkler et al., Duale Reihe Innere Medizin, Thieme, 2009]

Myokarditis +/-

Definition

Akute oder chronische Herzmuskelentzündung

Ätiologie

Infektiös

- **Viren** : Coxsackie B1-B5, Parvovirus B19, humanes Herpesvirus (HHV-6), Adenoviren, ...
- **Bakterien** : Corynebacterium diphtheriae, Borrelia burgdorferi, Streptokokken,...
- Pilze, Parasiten

Nicht-infektiös

- Rheumatisches Fieber
- Kollagenosen (z.B. Sklerodermie), Vaskulitiden
- Toxische Myokarditis : Bestrahlungsfolgen, Chemotherapeutika (z.B. Anthrazykline), Alkohol

Symptome/Klinik

- Oft asymptomatisch
- Unspezifische Symptome wie Müdigkeit, Leistungsverminderung, Palpitationen, Symptome eines grippalen Infektes
- Thorakale, inspirationsabhängige Schmerzen vor allem bei Perikardbeteiligung (Perimyokarditis)
- Herzinsuffizienz

„Die klinische Symptomatik der Myokarditis ist unspezifisch und sehr heterogen - sie reicht von asymptomatischen bis hin zu fulminanten Verläufen!“

Diagnostik

Anamnese

- vorausgegangener Infekt?

Klinische Untersuchung

- Siehe Symptome der Linksherzinsuffizienz und der Rechtsherzinsuffizienz

EKG/Langzeit-EKG

Nicht spezifisch

- Sinustachykardie
- Arrhythmie (insbesondere Extrasystolen)
- Erregungsrückbildungsstörungen → Typischerweise über mehreren Ableitungen
 - ST-Strecken-Senkungen, T-Negativierungen
 - Evtl. ST-Hebungen mit konkavböigem Abgang aus der aufsteigenden S-Zacke
- Abgrenzung zum Myokardinfarkt: Kein R-Verlust oder Ausbildung von Q-Zacken
- Perikarderguss: Niedervoltage

Labor

- Entzündungszeichen (BSG-, CRP-Erhöhung, Leukozytose)
- Herzenzyme↑ (CK, CK-MB, Troponin-T). BNP↑
- Virus-Serologie
- Auto-Antikörper (positive antinukleäre AK)

Bildgebung

- Röntgen-Thorax : Evtl. Herzverbreiterung und Lungenstauung; häufig Normalbefund.
- Echokardiographie
 - Regionale Wandbewegungsstörungen. Eingeschränkte linksventrikuläre Funktion
 - Ggf. Perikarderguss
 - Oft unauffälliger Befund
- Kardiale Magnetresonanztomographie : Goldstandard Zur Diagnostik und Verlaufskontrolle

Invasive Diagnostik

- Myokardbiopsie zur Diagnosesicherung. kein Routineverfahren

Differentialdiagnosen

- Siehe Differentialdiagnose Thoraxschmerzen

Komplikationen

- Herzrhythmusstörungen
- Herzversagen/plötzlicher Herztod
- Übergang in dilatative Kardiomyopathie (ca. 15%)
- Herzbeuteltamponade (bei großem Perikarderguss)

Therapie

- Symptomatische Therapie
 - Körperliche Schonung, Sportverzicht
- Kausale Therapie
- Therapie von Komplikationen

Prognose

- Virusmyokarditis: Zumeist vollständige Ausheilung, aber auch Übergang in dilatative Kardiomyopathie möglich

Herzschrittmacher +-

Der Herzschrittmacher dient der Behandlung von bradykarden oder tachykarden Herzrhythmusstörungen. Bei bradykarden Herzrhythmusstörungen übernimmt er durch elektrische Stimulation des Myokards eine Schrittmacherfunktion. Tachykarde Herzrhythmusstörungen hingegen können durch Überstimulation/Defibrillation in einen normalen Rhythmus überführt werden (implantierbarer Cardioverter-Defibrillator, ICD). Neue Herzschrittmacher ermöglichen eine Resynchronisation (kardiale Resynchronisationstherapie, CRT) der Herzkontraktion bei Herzinsuffizienz und nachgewiesener Asynchronie (Linksschenkelblock).

Indikation

- **Antibradykarde Schrittmachertherapie**
 - Symptomatische Bradykardie (Synkopen, Adams-Stokes-Anfälle, Herzinsuffizienz)
 - Sick-Sinus-Syndrom
 - AV-Block III°, AV-Block II° Typ Mobitz + Bradyarrhythmische Vorhofflimmern
- **Antitachykarde Schrittmachertherapie**
 - Primärprophylaxe: Bei erhöhtem Risiko für einen plötzlichen Herztod (z.B. Herzinsuffizienz mit EF $\leq 35\%$)
 - Sekundärprophylaxe: Nach überlebtem Kammerflattern/-flimmern
- **Kardiale Resynchronisationstherapie (CRT)**
 - Siehe Herzinsuffizienz

Antibradykarde Schrittmacher

Gängige Typen

Einkammerschrittmacher

- **VVI-Schrittmacher/Modus** = „Ventrikelbedarfsschrittmacher“
- **AAI-Schrittmacher/Modus** = „Vorhofbedarfsschrittmacher“

Zweikammerschrittmacher



- **DDD-Schrittmacher/Modus** : AV-sequentieller Schrittmacher mit Frequenzanpassung

Dreikammerschrittmacher

Bei einem Dreikammerschrittmacher liegt eine Sonde im rechten Vorhof, eine im rechten Ventrikel und eine im linken Ventrikel, um die synchrone Kontraktion von beiden Ventrikeln zu gewährleisten.

1. Angiotensin-Rezeptor-Nephrilysin-Inhibitor; Fixkombination: Valsartan und Sacubitril.

Invasive Therapie (HFrEF)

- **Implantierbarer Cardioverter-Defibrillator (ICD)** : 
 - Primärprophylaxe : indiziert bei symptomatischer Herzinsuffizienz (NYHA II–III) und EF $\leq 35\%$ trotz optimaler medikamentöser Therapie (OMT)
 - Sekundärprophylaxe : indiziert nach überlebtem plötzlichem Herztod oder nach ventrikulärer Rhythmusstörung, die zur hämodynamischen Instabilität führte
- **Kardiale Resynchronisationstherapie (CRT)** : 
 - Bei symptomatischer Herzinsuffizienz (NYHA II–III), im Sinusrhythmus, EF $\leq 35\%$ trotz OMT mit : einer QRS-Dauer ≥ 120 msec mit LSB-QRS-Morphologie oder einer QRS-Dauer ≥ 150 msec mit nicht-LSB-QRS-Morphologie
- ~~Herztransplantation : Als Ultima ratio~~

Sonstiges +-

Herzkatheteruntersuchung

- **Komplikationen** : Kontrastmittelallergie. Kardial (Rhythmusstörungen. Myokardinfarkt. Perforation des Herzmuskels). Gefäße (Blutung an Punktionsstelle, evtl. mit Ausbildung eines Aneurysma spurium. Extremitätenischämie. Spasmus der A. radialis. Radialisverschluss).

falsum

Subclavian-Steal-Syndrom

- Hypoperfusion der hirnversorgenden Arterien, durch eine Stenose bzw. einen Verschluss der A. subclavia proximal des Abgangs der A. vertebralis (Ggf. Truncus brachiocephalicus), meist durch Arteriosklerose bedingt.
- Durch diesen Kollateralkreislauf wird zwar die Durchblutung des Armes verbessert, jedoch entsteht eine zentrale Minderdurchblutung, die insbesondere bei körperlicher Aktivität neben Schwindel auch zu drop attacks führen kann.
- Diagnostisch ist eine Blutdruckdifferenz der Arme von >20 mmHg charakteristisch.

Nitrate (Nitroglycerin, Isosorbiddinitrat) und Molsidomin

- Wirkung : Periphere Vasodilatation, Koronardilatation
- Nebenwirkung : Hypotonie, reflektorische Tachykardie. Kopfschmerzen. Gastroösophagealer Reflux. Toleranzentwicklung

Antiphospholipid-Syndrom (APS)

erworbene Thrombophilie

- Thrombophilie, versucht durch die Bildung von Autoantikörpern (z.B. Lupus-Antikoagulans, Anticardiolipin, Anti- β_2 -Glykoprotein-I) gegen an Phospholipide gebundene Proteine ist.
- Es kommt zu einem erhöhten Thrombose-Risiko mit etwaigen ischämischen Folgen.
- In etwa der Hälfte der Fälle tritt das APS sekundär neben einer anderen Grunderkrankung (z.B. Lupus erythematoses) auf.
- Behandlungsziele sind die Akutbehandlung einer Thromboembolie, v.a. aber die Sekundärprophylaxe zur Verhinderung weiterer schwerer thromboembolischer Ereignisse (Phenprocoumon) und die Senkung des Abortrisikos bei Frauen mit Kinderwunsch (NMH + ASS).

Kardiomyopathie

- Erkrankung des Herzmuskels. Sie kann primär (z.B. genetisch) bedingt sein oder sekundär (z.B. als Folge von Virusinfekten, toxischen Einflüssen) auftreten.
- Die dilatative Kardiomyopathie (häufigste Form) kann idiopathisch oder sekundär (vor allem nach viraler Myokarditis) sein und zeichnet sich durch einen Kontraktionsverlust des Myokards aus. Dies führt zu einer Herzinsuffizienzsymptomatik. Rück- und Vorwärtserregung
- Die hypertrophe (obstruktive) Kardiomyopathie stellt eine der häufigsten kardial bedingten Todesursachen beim jungen Menschen dar. Hierbei kommt es zu einer Hypertrophie des Myokards sowie eine verminderte diastolische Dehnbarkeit. Je nachdem, ob die linksventrikuläre Ausflussbahn durch die Hypertrophie eingeengt wird oder nicht, unterscheidet man die obstruktive von der nicht-obstruktiven Form.
- Die restriktive Kardiomyopathie, auszeichnet sich durch eine verminderte diastolische Erschlaffung der Herzkammern und führt somit zu einem Rückstau des Blutes in die Vorhöfe und vor dem Herzen.
- Die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie Autosomal-Dominant stellt eine weitere mögliche Ursache eines plötzlichen Herztodes bei jungen Erwachsenen dar. Hier kommt es zu einem Zelluntergang des rechtsventrikulären Myokards, woraus eine Herzmuskelschwäche und eine Dilatation des rechten Ventrikels folgen.


apoptose

- **Tako-Tsubo-Kardiomyopathie** ist eine akute, reversible Dysfunktion des linken Ventrikels bedingt durch intensiven emotionalen oder physischen Stress. Symptome wie bei akutem Koronarsyndrom und kardialer Dekompensation. (ältere postmenopausalen Frauen) EKG: ST Hebung, Trop T: leicht erhöht, Koronarangiographie u. Ventrikulographie +- Broken Heart
- **Non-compaction-Kardiomyopathie** : angeborene Kardiomyopathie, die mit einer gestörten Morphologie des linksventrikulären Myokards (prominente Trabekularisierung) einhergeht. Klinisch : Herzinsuffizienz, Arrhythmien, Thromboembolien

2. Arteria und Vena subclavia^{3, 4}

Subclavian-Steal-Syndrom und belastungsabhängige Armschmerzen (Armclaudication)⁵

- Häufigste Indikation zur endovaskulären bzw. operativen Versorgung der A. subclavia sind Stenosen oder Verschlüsse direkt am Abgang (S1- oder S2-Segment)⁶.
- Aufgrund des Druckabfalls distal des Verschlusses des A. subclavia kann es zu einer Strömungsumkehr der ipsilaterale A. vertebralis kommen, folglich Symptome einer vertebrobasiliären Insuffizienz (Schwindel, Ataxie, Seh- und Schluckstörungen).
- Zudem oft Zeichen einer Armclaudication mit fehlendem oder schwachem Radialis puls sowie Blutdruckdifferenz (ca. 40 – 50 mmHg) zur Gegenseite.



Anatomie und Segmente der A. subclavia

³ Debus, Gross-Fengels, 2012, Operative und interventionelle Gefäßmedizin. Berlin- Heidelberg, Springer Verlag

⁴ Moore, Lawrence, Oderich, 2019, Vascular and Endovascular Review, a comprehensive review. Philadelphia, Elsevier






⁵ Luther, 2014, Techniken der offenen Gefäßchirurgie. Berlin – Heidelberg, Springer Verlag



Technische Universität München
Fakultät für Medizin
Klinik und Poliklinik für Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie



- Behandlung:
 - Endovaskuläre Versorgung mittels Dilatation und Stentversorgung der Stenose bzw. des Verschlusses;
 - Operative Versorgung mittels Subclaviatransposition auf ipsilaterale A. carotis communis oder Anlage eines Bypasses (alloplastisch) von der A. carotis communis auf die A. subclavia.

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| Verschluss linke A. subclavia | Späte Phase mit Auf-füllung distal des Verschlusses über die linke A. vertebralis | Höchstgradige Stenose der A. subclavia links | Stenting der A. subclavia links | Kurzer Bypass von A. carotis communis auf A. subclavia |

Pneumologie

Spirometrie


Lungenvolumina

Die Lungenvolumina sind abhängig von Geschlecht, Körpergröße und Alter. Angegeben sind näherungsweise die Messwerte eines jungen, gesunden Erwachsenen.

- **Totalkapazität/Totale Lungenkapazität (TC/TLC):** Volumen in der Lunge nach maximaler Inspiration; Normwert: ca. 6,0–6,5 L
- **Vitalkapazität (VC):** Volumendifferenz zwischen maximaler Ein- und Ausatmung; maximale Kapazität der Lunge, die ausgeschöpft werden kann (z.B. bei körperlicher Aktivität); Normwert: ca. 4,5–5,0 L $TLC - RV = VC = IRV + ERV + TV$
- **Residualvolumen (RV):** Volumen, das nach maximaler Expiration in der Lunge verbleibt; Normwert: ca. 1,0–1,5 L
- **Atemzugvolumen (AZV bzw. Tidalvolumen VT):** Volumen, das während eines Atemzyklus ein- und wieder ausgeatmet wird; Normwert ca. 0,5 L
- **Inspiratorisches Reservevolumen (IRV):** Volumen, das nach normaler Inspiration zusätzlich maximal inspiriert werden kann; Normwert: ca. 3,0–3,5 L
 - Inspiratorische Reservekapazität (IRC): Volumen, das nach normaler Expiration maximal inspiriert werden kann (IRV + Tidalvolumen); Normwert: ca. 3,5–4,0 L $IRC = IRV + TV$
- **Expiratorisches Reservevolumen (ERV):** Volumen, das nach normaler Expiration zusätzlich maximal expiriert werden kann; Normwert: ca. 1,5 L
 - Expiratorische Reservekapazität (ERC): Volumen, das nach normaler Inspiration maximal expiriert werden kann (ERV + Tidalvolumen); Normwert: ca. 2 L $ERC = ERV + TV$
- **Funktionelle Residualkapazität (FRC):** Summe aus Residualvolumen und expiratorischem Reservevolumen; d.h. Volumen, das nach normaler Ausatmung noch in der Lunge verbleibt; Normwert: ca. 2,5–3,0 L



$$TLC = RV + VC$$




3 Volumen
IRV
ERV
TV

Spirometrie (Ruhe spirometrie)


Routineuntersuchung mit einem handlichen Pneumotachografen zur Bestimmung der Atemvolumina und Luftflussgeschwindigkeiten

| Diagnostisch relevante Werte der Spirometrie | | | |
|--|--|--|---|
| Parameter | Abkürzung | Definition der Atemvolumina | Normwerte |
| Peak expiratory flow | PEF | Maximale Atemstromstärke bei forcierter Expiration (in L/s) | ≥90% des alters- und geschlechtsspezifischen Normwertes |
| Einsekundenkapazität | FEV ₁ | Das Atemvolumen, das nach maximaler Inspiration mit voller Kraft innerhalb der ersten Sekunde ausgeatmet werden kann | ≥90% des alters- und geschlechtsspezifischen Normwertes |
| Vitalkapazität <ul style="list-style-type: none"> Inspiratorisch Expiratorisch Forciert | VC <ul style="list-style-type: none"> IVC EVC FVC | Volumendifferenz zwischen maximaler Ein- und Ausatmung; Messung als: <ul style="list-style-type: none"> Inspiratorische Vitalkapazität Expiratorische Vitalkapazität Forcierte Vitalkapazität | Alters- und geschlechtsabhängig; bei jungen, gesunden Erwachsenen ca. 4,5–5,0 L |
| Tiffeneau-Index | FEV ₁ /VC | Verhältnis von Einsekundenkapazität zu Vitalkapazität = $(FEV_1 : VC) \times 100\%$ | ≥70% |
| Mean expiratory flow 75/50/25% | MEF 75/50/25% | Mittlere Atemstromstärke, wenn noch 75/50/25% der Vitalkapazität in der Lunge sind. | ≥90% des alters- und geschlechtsspezifischen Normwertes |







- PEF = Peak expiratory flow; Maximale Atemstromstärke bei forcierter Expiration (in l/s)
- MEF = Mean expiratory flow 75/50/25%; Mittlere Atemstromstärke, wenn noch 75/50/25% der Vitalkapazität in der Lunge sind.
- FEV1 = Einsekundenkapazität
- IRV = Inspiratorisches Reservevolumen
- VT = Tidalvolumen
- ERV = Exspiratorisches Reservevolumen
- IRC = Inspiratorische Residualkapazität
- VC = Vitalkapazität
- RV = Residualvolumen




1 Physiologisch



2 Restriktion durch Adipositas





3 Restriktion durch verminderte Muskelkraft




4 Restriktion durch Fibrose


Obstruktion



1 Physiologisch



2 Obstruktion durch akuten Asthmaanfall



3 Obstruktion durch Emphysem

Restriktive Ventilationsstörungen

eingeschränkte Dehnbarkeit der Lunge od. Thoraxwand.
TLC (TC)


- Definition: **Verminderung der totalen Lungenkapazität**
- Beispiele
 - Pulmonal: **Lungenfibrose**
 - Pleural: **Pneumothorax, pleurale Verwachsungen**
 - Thoraxdeformation/mechanische Behinderung**: Skoliose, Adipositas
 - Neuromuskuläre Störungen**: Lähmungen der Atemmuskulatur
- Befunde in der Spirometrie
 - Vitalkapazität ↓**
 - FEV₁ n/ ↓**
 - Tiffeneau-Index normal

Trichterbrust
(*Pectus excavatum sive infundibulum*)

Restriktive Ventilationsstörungen führen erst spät zu Blutgasveränderungen!


Restriktion

Fluss-Volumen-Kurve



Restriktion

Fluss-Volumen-Kurve



Obstruktive Ventilationsstörungen

schwere Ausatemung

- Definition: Durch intra- und/oder extrathorakale **Einengung der Atemwege** bedingte Erhöhung der Strömungswiderstände mit Verminderung der Einsekundenkapazität und des Tiffeneau-Index

Beispiele

- Intrathorakale Atemwegsstenosen: **Asthma bronchiale, COPD, Tumoren**
- Extrathorakale Atemwegsstenosen: **Larynxtumor, Stimmbandparese**

Befunde in der Spirometrie

- Vitalkapazität normal oder ↓

- FEV₁ ↓**


- Tiffeneau-Index ↓**

- MEF75/50/25%: Eine Verringerung von MEF50% und MEF25% spricht für eine Obstruktion der peripheren kleinen Atemwege (z.B. bei Asthma bronchiale)
- Air trapping: Treppenartiger Anstieg der Atemmittellage in der Spirometrie durch einen expiratorischen Bronchiolenkollaps, der zu eingefangener Luft in den Alveolen führt (bspw. nach Pneumektomie) = relative Lungenüberblähung

Der Tiffeneau-Index ist der entscheidende Wert für obstruktive Ventilationsstörungen!


Obstruktion

Fluss-Volumen-Kurve




gemischte

Restriktion und Obstruktion




Ganzkörperplethysmografie (Bodyplethysmografie)

- Definition: Routineverfahren zum Ausschluss einer pulmonalen Funktionseinschränkung
- Mögliche Indikationen
 - Bei **mangelnder Kooperation**/Mitarbeit des Patienten bzw. zur Objektivierung der spirometrischen Befunde
 - **Verdacht auf ein Emphysem**
- Bestimmung von
 - **Alle** Parameter der Ruhespirometrie + **nicht mobilisbare Volumen (RV) \Rightarrow TLC**
 - **Resistance (R, Atemwegswiderstand)**
 - **Residualvolumen RV**
 - **Totale Lungenkapazität**
 - **Intrathorakales Gasvolumen (ITGV)**
 - **Mit einer zusätzlichen Ösophagusdrucksonde: Compliance**
- Interpretation der Atemschleife
 - Normalbefund: Gerade, schmale und homogene Schleifen
 - Restriktive Ventilationsstörungen: Weitestgehend normwertige Form bei reduzierter Vitalkapazität
 - Obstruktive Ventilationsstörungen: Abgeflachte Schleife durch erhöhten Atemwiderstand




Lungenüberblähung

Fluss-Volumen-Kurve




Lungenüberblähung


Fluss-Volumen-Kurve



Atemschleife



Interpretationsschema



Pneumonie (Lungenentzündung) +++

Entzündung des Alveolarraums und/oder des interstitiellen Lungengewebes, die v.a. durch Bakterien verursacht wird.

Ätiologie

Erreger

- **Ambulant erworbene Pneumonie:** Pneumokokken (häufigster Erreger bei jungen Erwachsenen), Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae und Chlamydia pneumoniae
- **Nosokomial erworbene Pneumonie:** gramnegative Erreger (Pseudomonas aeruginosa und Enterobacteriaceae) und Staphylokokken
- **Neugeborenenpneumonie:** Escherichia coli, Streptokokken der Gruppe B, Pneumokokken, Haemophilus influenzae

Handwritten notes on pathogens:

- Typisch:** Pneu, HI, Myg, Chl
- atypisch:** S. aureus, Klebsella, E. coli
- Legionella**
- Virien:** Influenza, Adeno
- Pseud. isoph**
- Enterobacter**
- MRSA**
- E. coli**
- Strept**
- Pneum**
- HI**
- atypisch:** Mycobakteria, Chlamidien, Legionellen, Coronaviren

Infektionsweg

- Tröpfcheninfektion, aerogen, Mikroaspiration
- „Echte“ Aspiration (Mendelson-Syndrom)

Risikofaktoren

- Hohes Alter und Immobilität
- Schlechter Immunstatus
- Chronische Erkrankungen: Asthma bronchiale, COPD, Herzinsuffizienz

Klassifikation

Einteilung nach Entstehungsort

Nach Röntgenbefund: alveoläre und interstitielle Pneumonien.

- **Ambulant erworbene Pneumonie:** Community-acquired Pneumonia (CAP)
- **Nosokomial erworbene Pneumonie:** Hospital-acquired Pneumonia (HAP). Auftreten frühestens 48 h nach Hospitalisierung bzw. bei Patienten, die in den letzten drei Monaten hospitalisiert waren.

Einteilung nach Klinik

Verlaufsform

- **Typische Pneumonie:** Lungenentzündung mit klassischen Symptomen und typischen Untersuchungsbefunden (auskultatorisch und perkutorisch). v.a. Pneumokokken
- **Atypische Pneumonie:** Lungenentzündung mit schwächeren klassischen Symptomen und unauffälligen klinischen Untersuchungsbefunden (auskultatorisch und perkutorisch). v.a. Mykoplasmen, Chlamydien, Legionellen, Viren (Drona)

Primäre und sekundäre Pneumonien

nach begleitende Vorerkrankungen

- **Primäre Pneumonie:** Ohne erkennbare Vorerkrankungen
- **Sekundäre Pneumonie:** Aufgrund einer Prädisposition bei Komorbidität (Asthma bronchiale, COPD, Herzinsuffizienz), anatomischen Veränderungen (Tuberkulose-Kavernen) oder Schluckstörungen mit Aspiration (Aspirationspneumonie)

Pathophysiologie

- **Lobärpneumonie (klassische Lappenpneumonie):** v.a. Pneumokokken
- **Lobuläre Pneumonie (Bronchopneumonie):** v.a. Pneumokokken und andere Streptokokken
- **Interstitielle Pneumonie:** v.a. Viren und Mykoplasmen, Legionellen od. Chlamidien (atypisch)
- **Miliarpneumonie:** hämatogen (z.B. bei Tuberkulose)

Symptome/Klinik

Typische Pneumonie

Akuter Plötzlicher Beginn mit starkem Krankheitsgefühl und hohes Fieber

Schüttelfrost

- Produktiver Husten mit eitrigem Auswurf (gelblich-grünlich)
- Tachypnoe und Dyspnoe
- Schmerzen beim Atmen durch Begleitpleuritis
- Besonderheit: Oft begleitend Herpes labialis, fortgeleitete Schmerzen in Ober- bis Unterbauch (insb. bei Kindern)

Pneumokokken

CAP Ambulant erworbene Pne

Typische Pne.

Lobärpnev. (Klassische Lappennnev.)

Lobulär pnev. (+ andere Staphylokokken)

Atypische Pneumonie

- Schleichender Beginn mit Leichtem Fieber
- Trockenem Husten
- Dyspnoe
- Kopf- und Gliederschmerzen

„Insbesondere bei älteren Patienten kann eine Bewusstseinsminderung oder Orientierungslosigkeit das einzige Symptom einer Pneumonie sein!“

Verlaufs- und Sonderformen

- Nosokomiale Pneumonie
- **Aspirationspneumonie** : Risikofaktoren (Schluckstörungen, PPI-Therapie, Bettlägerige Patienten). Häufig polymikrobielle Mischinfektion.
- **Pneumonien, die durch spezielle Erreger ausgelöst** : Legionellen, Tuberkulose.
Bei immunsupprimierten Patienten (Pneumocystis-jirovecii, CMV) Opportunistische Erreger

Diagnostik

Anamnese

Alter und Komorbiditäten. Immunsuppression. Pflegeheim. Antibiotische Vorbehandlungen.

Reiseanamnese. Tierkontakte

Klinische Untersuchung

- **Erfassung der Vitalzeichen** : Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz, Körpertemperatur, Pulsoxymetrie
- **Inspektion und Palpation** : Verstärkter Stimmfremitus. V.a. Bei Kindern : thorakale Einziehungen (jugular, subcostal, intercostal), Nasenflügeln
- **Auskultation** : Feinblasige, klingende Rasselgeräusche. Verstärkte Bronchophonie ± Bronchialatmen
- **Perkussion** : gedämpfter Klopfschall

Labordiagnostik

- **Blut** : Entzündungszeichen (Leukozytose, CRP↑, BSG↑, PCT↑). Ggf. BGA. Basislabor
- **Erregerdiagnostik** : bei stationärer Aufnahme
 - **Blutkulturen** : Mindestens jeweils zwei aerobe und anaerobe Kulturen
 - **Sputum-Diagnostik** : Mit Sputumkultur
 - **Pleurapunktion** : Bei Vorliegen eines Pleuraergusses
 - **Urinuntersuchung** : Bei Verdacht auf Legionellen-Pneumonie (Bestimmung des Legionellenantigens)
 - Ggf. Bronchoalveoläre Lavage

Apparative Diagnostik

- **Röntgen-Thorax**
 - **Lobärpneumonie** : Verschattung, auf den Lungenlappen begrenzt mit positivem Aerobronchogramm ± Pleuraerguss
 - **Bronchopneumonie** : Unscharf begrenzte Infiltrate, Bronchopneumogramm nicht typisch
 - **Interstitielle Pneumonie** : retikuläre Verschattung Milchglassartig
- Ggf. CT-Thorax, bei unklaren Befunden im Röntgen-Thorax

Sicherung der Diagnose Pneumonie

- **1 Haupt- und 2 Nebenkriterien**
- **Hauptkriterium** : Neu aufgetretenes Infiltrat im Röntgen-Thorax in zwei Ebenen
- **Nebenkriterien** :

- **Fieber** ($\geq 38,5^\circ\text{C}$) oder Hypothermie ($\leq 36,5^\circ\text{C}$)
- **Leukozytose** ($> 10.000/\mu\text{L}$) oder Leukopenie ($< 4.000/\mu\text{L}$)
- **Eitriger Auswurf** (gelblich-grün)
- **Bronchophonie oder Stimmfremitus**
- **Nachweis eines Erregers** (Blutkultur, Sputum, Bronchialsekret)

renien.

Röntgen-Thorax-Aufnahme: Das pneumonische Infiltrat kann je nach Lokalisation und Ausbreitung ein recht heterogenes Erscheinungsbild aufweisen. Die **Lobärpneumonie** (Abb. 2.12 a) zeigt sich mit flächenhaften homogenen Verschattungen auf Segment- bzw. Lappenebene. Das Bronchopneumogramm ist charakteristischerweise positiv (d. h., die dunklen, luftgefüllten Atemwege heben sich vom hellen, infiltrierten Lungengewebe ab). Eventuell besteht begleitend ein Pleuraerguss. Bei einer **Bronchopneumonie** (Abb. 2.12 c) finden sich im Röntgen-Thorax hingegen multilokuläre Fleckschatten, die zur Konfluenz neigen. Die **interstitielle Pneumonie** (Abb. 2.12 b) weist milchglasartige Infiltrate sowie eine netzartige oder streifige Zeichnungsvermehrung des Lungenparenchyms auf.

Therapie

Kriterien für eine stationäre Aufnahme

• CRB-65-Score

- C = Confusion → Bewusstseinseintrübung
- R = Respiratory Rate → Atemfrequenz $\geq 30/\text{min}$
- B = Blood pressure → Diastolischer Blutdruck ≤ 60 mmHg oder systolischer Blutdruck ≤ 90 mmHg
- 65 = Age ≥ 65 → Alter ≥ 65 Jahre
- 0 = Ambulante Behandlung. ≥ 1 = Stationäre Behandlung. ≥ 3 = Aufnahme auf die Intensivstation erwägen

$$U = \text{Urea} = \text{Serumharnstoff} > 7 \text{ mmol/L}$$

- Jeder ambulant behandelte Patient mit Pneumonie sollte nach 48–72 Stunden erneut untersucht werden, um die Wirksamkeit des verschriebenen Antibiotikums zu prüfen!

Allgemeine Maßnahmen

- Körperliche Schonung
- Hohe Flüssigkeitsaufnahme
- Bei Hypoxie: Sauerstoffgabe über Nasensonde
- Antipyretika, Analgetika (Paracetamol)
- Ggf. Expektoranzien und Mukolytika (ACC)
- Physiotherapie: Frühmobilisierung und Atemtherapie

ggf Thrombozytopenie

Medikamentöse Therapie der ambulant-erworbenen Pneumonie

Leichte Pneumonie → Ambulante Behandlung

- Definition: CRB-65 = 0 und $\text{SaO}_2 \geq 90\%$
- Patienten ohne Risikofaktoren: Aminopenicillin (Amoxicillin p.o. 1g 1-1-1 für 5–7 Tage, Dosisanpassung bei GFR < 30 mL/min).
 - Bei Penicillin-Allergie: Makrolid (Clarithromycin 500 mg p.o. 1-0-1 für 5–7 Tage, Dosisanpassung bei GFR < 30 mL/min 250 mg p.o. 1-0-1)
- Patienten mit Risikofaktoren (Herzinsuffizienz, COPD, neurologische Erkrankungen mit Schluckstörungen, Bettlägrigkeit): Aminopenicillin + Betalaktamaseinhibitor (Amoxicillin/Clavulansäure p.o. 875/125 mg 1-0-1 für 5–7 Tage, bei GFR < 30 mL/min Anwendung nicht empfohlen) Ggf. Makrolid zusätzlich bei V.a. atypische Erreger (Clarithromycin)
 - Bei Penicillin-Allergie: Fluorchinolone (Levofloxacin 500 mg p.o. 1-0-0 für 5–7 Tage, Dosisanpassung bei GFR < 50 mL/min)

Mittelschwere Pneumonie → Stationäre Behandlung

- Definition: Zwischen leichter und schwerer Pneumonie
- Aminopenicillin + Betalaktamaseinhibitor (z.B. Ampicillin/Sulbactam i.v. 2/1 g i.v. 1-1-1 für 5–7 Tage, bei GFR < 30 mL/min Dosisanpassung). Ggf. Makrolid zusätzlich bei V.a. atypische Erreger (Clarithromycin)
 - Bei Penicillin-Allergie: Fluorchinolone (Levofloxacin: 500 mg i.v. als Kurzinfusion 1-0-0 über mindestens 60 Minuten für 5–7 Tage; bei schwerer Erkrankung i.v. 1-0-1 für 8–10 Tage; bei GFR < 50 mL/min Dosisanpassung)

Wie bei leichter Pneu mit RF aber iv

Schwere Pneumonie → Stationäre Behandlung

- Definition: Akute respiratorische Insuffizienz und/oder septischer Schock und/oder dekompensierte Komorbidität (kardiale Dekompensation, exazerbierte COPD, akutes Nierenversagen)
- Piperacillin/Tazobactam (4/0,5 g i.v. 1-1-1 für 8–15 Tage, bei GFR < 20 mL/min Dosisanpassung) und immer zusätzlich Makrolid (Clarithromycin)
 - Bei Penicillin-Allergie: Cephalosporine der 3. Generation (z.B. Ceftriaxon: 2 g i.v. 1-0-0 für 5–7 Tage, keine DANI) und immer zusätzlich ein Makrolid (z.B. Clarithromycin)

„Die antibiotische Medikation kann 2–3 Tage nach Entfieberung beendet werden. Bei einer ambulant erworbenen Pneumonie, die ambulant behandelt werden kann, ist eine antibiotische Medikation von 7 Tagen ausreichend!“

Nosokomialen Pneumonie

- Patienten ohne Risikofaktoren für multiresistente Erreger : Aminopenicilline mit Betalaktamaseinhibitoren (z.B. Ampicillin + Sulbactam) *4.5g 1-1-1 BIST od. 3. Generation Cephalosporin Ceftriaxon 2g 1-0-0 15-7T*
- Patienten mit Risikofaktoren für multiresistente Erreger : Acylaminopenicilline + Beta-Laktamase-Inhibitor (z.B. Piperacillin + Tazobactam)

Komplikationen

- Begleitpleuritis. Begleiterguss. Pleuraempyem
- Lungenabszess (entsteht v.a. bei Aspiration)
- Sepsis
- Respiratorische Insuffizienz

Prognose

- Die Prognose hängt vom Schweregrad (CRB-65-Score), Entstehungsort (erworben oder nosokomial), und Komorbiditäten ab.

Prävention

- Nikotinkarenz
- Pneumokokken-Impfung
- Grippe-Impfung

Risikofaktoren einer Infektion mit MRE


Es bestehen allgemein anerkannte Risikofaktoren für eine Infektion durch multiresistente Erreger. Die Risikofaktoren gelten gruppenübergreifend.

- **Behandlungsfaktoren [1]**
 - Hospitalisierung >4 Tage
 - Invasive Beatmung >4–6 Tage
 - Aufenthalt auf der Intensivstation
 - Antimikrobielle Therapie in den letzten 90 Tagen
 - Medizinische Versorgung in Regionen mit hoher MRE-Prävalenz
 - Chronische Dialyse
 - Tracheostoma
- **Patientenfaktoren**
 - Aufnahme aus Langzeitpflegebereichen
 - Bekannte Kolonisation durch multiresistente Erreger
 - Strukturelle Lungenerkrankung (insb. *Pseudomonas aeruginosa*)
 - Malnutrition
 - Offene Hautwunden

Pneumocystis-jirovecii- Pneumonie (einst *Pneumocystis carinii*): Co-trimoxazol hoch dosiert; initial häufig begleitend Prednisolon für 10 Tage wegen Verschlechterung der Respiration. Alternativen, z. B. Pentamidin, Atovaquon

Antibiotische Therapie der nosokomialen Pneumonie [4][1]

| | Erregerspektrum | Kalkulierte Therapie |
|---|---|---|
| <p>Patienten ohne Risikofaktoren für multiresistente Erreger</p> | <ul style="list-style-type: none"> Gramnegative Stäbchen <ul style="list-style-type: none"> Enterobacteriaceae <ul style="list-style-type: none"> Escherichia coli Klebsiella spp. Enterobacter spp. Haemophilus influenzae Grampositive Kokken <ul style="list-style-type: none"> Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae | <ul style="list-style-type: none"> Aminopenicilline mit β-Lactamase-Inhibitoren (z.B. Ampicillin + Sulbactam) oder Unacid 2/1g 1-1-1 8 Tage Cephalosporine der Gruppe 3a (z.B. Ceftriaxon) oder 2g 1-0-0 8 Tage Fluorchinolone der Gruppe 3 oder 4 (z.B. Levofloxacin oder Moxifloxacin) 500mg 1-0-1 8 Tage |
| <p>Patienten mit Risikofaktoren für multiresistente Erreger + Patienten mit septischem Schock</p> | <ul style="list-style-type: none"> Zusätzlich <ul style="list-style-type: none"> Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) MRGN inklusive ESBL-bildende Enterobacteriaceae <ul style="list-style-type: none"> Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii Stenotrophomonas maltophilia | <ul style="list-style-type: none"> Pseudomonaswirksames β-Lactam als Monotherapie oder in Kombination <ul style="list-style-type: none"> Acylaminopenicilline + β-Lactamase-Inhibitor (z.B. Piperacillin + Tazobactam) oder 4,5g 1-1-1 8 Tage Pseudomonaswirksame Carbapeneme (z.B. Imipenem oder Meropenem) oder 1g 1-1-1 3b Pseudomonaswirksame Cephalosporine (z.B. Cefepim oder Cefepim) 2g 1-1-1 8 Tage Kombinationspartner bei lebensbedrohlicher Pneumonie <ul style="list-style-type: none"> Bei Pseudomonasverdacht bzw. Risiko für gramnegative MRE <ul style="list-style-type: none"> Fluorchinolon der Gruppe 2 (z.B. Ciprofloxacin) oder Gruppe 3 (z.B. Levofloxacin) oder 500mg 1-0-1 8 Tage Aminoglykosid (z.B. Gentamicin, Tobramycin oder Amikacin) 3-7mg/Kg 1-0-0 Bei Verdacht auf MRSA ggf. auch zusätzliche Kombination mit <ul style="list-style-type: none"> Linezolid oder 600mg 1-0-0 10-14 Tage Vancomycin 25-50mg/Kg Bolus, dann 15-20mg/Kg 1-0-1 Ziel 15-20mg/L |



Pneumothorax ++

Definition

- **Pneumothorax**: Luftansammlung im Pleuraspalt zwischen Lunge (Pleura visceralis) und Brustwand (Pleura parietalis)
- **Spannungspneumothorax**: Pneumothorax mit Ventilmechanismus, wodurch sich im Pleuraraum ein Überdruck ausbildet und es zu Kreislaufversagen kommen kann.
= absoluter Notfall (muss sofort behandelt werden).

Einteilung

1. Nach Lokalisation/Anatomie

- **Geschlossener Pneumothorax**: Keine direkte Verbindung zur Außenluft, bspw. durch Ruptur einer Emphysemlase
- **Offener Pneumothorax**: Direkte Verbindung zur Außenluft, bspw. durch Läsion der Thoraxwand

2. Nach Ätiologie

- **Spontanpneumothorax**: ohne erkennbare äußere Ursache
 - **Primärer Spontanpneumothorax (PSP)** bei lungengesunden Patienten
 - **Sekundärer Spontanpneumothorax (SSP)** bei Patienten mit Vorerkrankungen der Lunge
- **Traumatischer Pneumothorax**: nach Trauma
- **Iatrogener Pneumothorax**: nach medizinischem Eingriff

3. Nach Erscheinungsbild

- **Spitzenpneumothorax**: Apikale Ansammlung von Luft
- **Mantelpneumothorax**: Luftsaum (ourlet) um das Lungengewebe
- **Pneumothorax mit Mediastinalflattern**: Pneumothorax mit atemabhängiger Bewegung des Mediastinums (Lufteinstrom in den Pleuraspalt während Inspiration, Austritt von Luft während der Expiration). Auftreten bei offenem Pneumothorax

Ätiologie

Spontanpneumothorax

Primärer Spontanpneumothorax (PSP)

- Junge und schlanke Patienten
- Rauchen ++

Sekundärer Spontanpneumothorax (SSP):

Bei pulmonal vorerkrankten Patienten: COPD, schweres Asthma bronchiale, Neoplasie,...

Traumatischer Pneumothorax

- Stumpfe (contondant) Gewalteinwirkung (z.B. Autounfall)
- Scharfe Gewalteinwirkung (z.B. Messerstichverletzung)

Iatrogener Pneumothorax

- Perkutane (Lungen-)Biopsie, Punktion, ORIF (Klavikula)
- Anlage eines Subklaviakatheters (ZVK, Shaldon-Katheter)

Symptome/Klinik

- **Allgemein**
 - Plötzlich einsetzende, stechende, atemabhängige thorakale Schmerzen
 - Dyspnoe, Tachypnoe, Tachykardie, ggf. Zyanose
- **Bei traumatischem Pneumothorax**
 - Begleitverletzungen (z.B. Rippenfrakturen)
 - Ggf. Hautemphysem

- Bei Spannungspneumothorax
 - Starke Dyspnoe, Zyanose
 - Zeichen der (Rechts-)Herzinsuffizienz mit gestauten Halsvenen
 - Schocksymptomatik

„Die Klinik des sekundären Spontanpneumothorax (bei zugrundeliegender Lungenerkrankung) ist meist ausgeprägter als die des primären Spontanpneumothorax.“

Hämatothorax (ggf. Hämatopneumothorax)

- **Definition** : Ansammlung von Blut ("Hämatothorax") und ggf. auch Luft ("Hämatopneumothorax") im Pleuraspalt.
- **Ätiologie** : traumatisch, iatrogen (bspw. durch Pleurapunktion, ZVK-Anlage)
- **Symptome/Klinik** : thorakale Schmerzen, Dyspnoe, Schocksymptomatik
- **Diagnostik**
 - Körperliche Untersuchung: Abgeschwächtes/fehlendes Atemgeräusch, gedämpfter Klopfschall
 - Sonographie: Nachweis von (blutigem) Pleuraerguss
 - Röntgen-Thorax: Verschattung, ggf. Pneumothorax, Rippenfraktur
- **Therapie** : Thoraxdrainage. Ggf. operative Blutungsstillung

Diagnostik Pneumothorax

Klinische Untersuchung und Anamnese

- **Anamnese**:
 - Junge, schlanke Patienten → V.a. PSP
 - Nikotinabusus oder pulmonale Vorerkrankungen → V.a. SSP
 - Z.n. medizinischer Intervention oder thoraxchirurgischem Eingriff → V.a. iatrogenen Pneumothorax
 - Z.n. Thoraxtrauma → V.a. traumatischen Pneumothorax
 - Starke Dyspnoe und Thoraxschmerzen → V.a. Spannungspneumothorax
- **Inspektion**: Asymmetrische Thoraxexkursion
- **Palpation** : Kein Stimmfremitus
- **Perkussion** : Hypersonorer Klopfschall
- **Auskultation** : Fehlendes oder abgeschwächtes Atemgeräusch

Apparative Diagnostik

Pulsoxymetrie, ggf. BGA

Hypoxämie, ggf. Hyperkapnie

Röntgen


- **Thorax p.a. im Stehen und in Inspiration.** Ggf. Seitliche Aufnahme im Stehen (bei SSP)
 - Abbruch der Gefäßzeichnung
 - Vermehrte Strahlentransparenz
 - „Pneulinie“ (Pleura visceralis als feine Linie sichtbar)
 - Ggf. subkutanes Emphysem und/oder Pneumomediastinum (insb. nach Trauma oder Intervention)
- **Spannungspneumothorax** : Lunge meist komplett kollabiert. Zwerchfelltiefstand. Erweiterung der Interkostalräume. Verlagerung des Mediastinums nach kontralateral
- **Bei Liegendaufnahme (a.p.)**: „Tiefer Randsinus“/„Deep Sulcus Sign“ (die Luft sammelt sich in den vorderen Bereichen der Pleura, z.B. im Recessus phrenicocostalis)

Sonographie

- **Indikation** : als Alternative zum Röntgen in der Akutdiagnostik, insb. nach Thoraxtrauma oder nach Intervention
- **Befunde** : Fehlende „Pleuragleiten“ (Atemverschieblichkeit der Lunge) = sensibles aber nicht spezifisches Zeichen. *Barcode sign*

Computertomographie (Ohne Kontrastmittel)

- Bei : Unklarem Befund im Röntgenthorax. V.a. sekundären Pneumothorax. Hämatopneumothorax, Klärung einer OP-Indikation. Beurteilung der Rezidivwahrscheinlichkeit eines Pneumothorax.



Differentialdiagnosen

- ACS. Aortendissektion. Lungenembolie
- Pleuritis. Pneumonie
- Ösophageale oder abdominelle Ursachen (z.B. Magenperforation)

Therapie

Erstmaßnahmen

- ⑥ Oberkörperhochlagerung
- ⑥ O₂-Gabe (4–6 L/min)

Thoraxdrainage

- **Zugangswege**
 - **Bülau-Drainage**: 4. ICR zwischen vorderer und mittlerer Axillarlinie
 - **Monaldi-Drainage**: 2. ICR auf Medioklavikularlinie
- **Durchführung**
 - Lokalanästhesie
 - Hautinzision und stumpfe Präparation mit Schere am Oberrand der unteren Rippe → Tunnelung nach kranial → Eröffnung der Pleura parietalis (ca. 1–2 ICR höher als Hautinzision)
 - Einführung der Drainage (ca. 20 cm). Platzierung apikal bei Luftansammlung, kaudal bei Flüssigkeitsansammlung
 - Fixierung des Drainageschlauches an der Thoraxwand (Durch Tabaksbeutelnaht)
 - Sogtherapie: Anlage eines Unterdrucks von -10 bis -25 cmH₂O über 3–5 Tage bzw. bis Sistieren der Luftleckage
- **Komplikationen**: Verletzung von Interkostalnerven und –gefäßen, Blutung, Infektion, Reexpansionsödem
- **Alternative**: Therapieversuch mittels Nadelaspiration bei kleinem PSP.
„Nach Anlage einer Thoraxdrainage sowie nach Drainage-Zug sollte eine Röntgen-Kontrolle erfolgen“

Konservativer Therapieversuch

- **Indikation**: Nur bei kleinem PSP zu erwägen
- **Durchführung**: Symptomatische Therapie (Ggf. Sauerstoffgabe mit hoher Flussrate)

Operative Versorgung

- **Indikation**: Rezidiv. Spannungspneumothorax. Persistierender Luftleck
- **Zugangswege**: videoassistierte Thorakoskopie = VATS (Alternativ: Offene Thorakotomie)
- **Durchführung**:
 - Versorgen der Undichtigkeit der viszeralen Pleura
 - Rezidivprophylaxe mittels Pleurodese (mechanisch oder chemisch)

Präklinische Versorgung des Spannungspneumothorax

- ⑥ **Dringliche Notentlastung durch Pleurapunktion**
- **Durchführung**: 2.–3. ICR, Medioklavikularlinie, Rippenoberrand. Verwendung einer großlumigen Kanüle mit Ventilmechanismus (Alternative: Braunüle)

Komplikationen



- Respiratorische Insuffizienz
- Rechtskardiale Insuffizienz
- Hämodynamische Instabilität
- Rezidive



Prognose



- Rezidivrisiko bei Spontanpneumothorax : 20–30%
- Rezidivprophylaxe : Rauchstopp


Pathophysiologie: Tritt Luft in den Pleuraspalt ein, wird der physiologische Unterdruck aufgehoben. Dabei kollabiert die Lunge entweder komplett oder nur teilweise (Mantelpneumothorax, Abb. 4.1). Es kommt zur einer restriktiven Ventilationsstörung mit Hypoxämie und Abnahme der verschiedenen Lungenvolumina, insbesondere der Vitalkapazität. Darüber hinaus erhöht sich der Widerstand in den pulmonalen Gefäßen, der durch die reflektorische Vasokonstriktion in den hypoventilierten Regionen noch verstärkt wird.

Die größte Gefahr besteht in der Ausbildung eines Spannungspneumothorax. Dabei bildet sich ein Ventilmechanismus, sodass zwar Luft in den Pleuraraum eindringen, aber nicht entweichen kann. Durch den zunehmenden Druckanstieg wird das Mediastinum zur Gegenseite gedrängt, wodurch auch die Funktion der gesunden Lunge beeinträchtigt wird. Durch die Kompression der Vv. cavae ist der Blutrückfluss zum rechten Herzen vermindert. Aus dem reduzierten Herzzeitvolumen kann sich eine Schocksymptomatik entwickeln.









Berechnung des Pneumothorax-Volumens nach Collins


Grundlage der Berechnung ist die p.a. Röntgenaufnahme in Inspiration. Gemessen wird der interpleurale Abstand an drei Stellen:

- A = interpleuraler Abstand am Apex
- B = interpleuraler Abstand mittig im Bereich der oberen Lungenhälfte
- C = interpleuraler Abstand mittig im Bereich der unteren Lungenhälfte

(Die Größe des Pneumothorax (X) in % ergibt sich dann aus der Formel $X = 4,2 + 4,7 \times (A + B + C)$)

V.a. Pneumothorax

1. Anamnese



2. Fokussierte klinische Untersuchung

Fehlendes Atemgeräusch, hypersonorer Klopfeschall und fehlender Stimmfremitus.
Erheben der Vitalparameter: U.a. Zyanose und Tachykardie.

U.a. schwere Zyanose, gestaute Halsvenen, Hautemphysem

3. Blutgasanalyse

pO₂ leicht erniedrigt (ausgeprägter bei sekundärer Ursache)

Deutliche Hypoxie u/o. Hyperkapnie

4. Bildgebung

Röntgen-Aufnahme des Thorax

Sonographie: Mit Darstellung des Pleuraspaltes

Primär (Idiopathisch):

Häufig blasige Veränderungen im apikalen Bereich der Pleura

Sekundär:

Hinweise auf strukturelle Lungenerkrankung (z.B. Emphyse (Aspekt))

Iatrogen:

U.a. Nachweis der Fehllage von Fremdmaterial (z.B. ZVK, Shaldon oder Drainagen)

Traumatisch:

U.a. subkutanes Emphysem, Frakturen, Pneumomediastinum

Fehlendes Pleuragleiten

im Röntg.: U.a. Zwerchfelltiefstand, erweiterte ICR, Mediastinalverlagerung

unklarer Befund

Abklärung sek. Ursache

CT-Thorax

Unklarer Befund in der Bildgebung

Gesicherte Diagnose

5. Differentialdiagnostische Abklärung des Thoraxschmerzes

Bei Patienten >45 Jahre und/oder bei Vorerkrankungen stationäre Aufnahme erwägen

Notfallmäßige Thoraxdrainage

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) +

Definition

- **Chronische Bronchitis**: produktiver Husten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren für jeweils mindestens drei Monate
- **COPD** (chronisch obstruktive Lungenerkrankung): irreversible Verengung der Bronchien bei assoziierter inflammatorischer Reaktion; meist progredienter Verlauf
- **Lungenemphysem**: Irreversible Erweiterung der Lufträume

Ätiologie

irreversible Überblähung der kleinsten luftgefüllten Strukturen (Lungenbläschen, Alveolen) der Lunge

Exogene Faktoren

- Rauchen jeglicher Art
- Rezidivierende bronchopulmonale Infekte
- Luftverschmutzung

Endogene Faktoren

- α_1 -Antitrypsin-Mangel

Klassifikation

Einteilung nach GOLD

| Patientengruppe nach GOLD | Exazerbationen/Jahr | Klinische Symptomatik |
|---------------------------|---|---|
| GOLD A | ≤ 1 (Ambulant behandelt) | Wenig symptomatisch mMRC < 2. CAT® < 10 |
| GOLD B | | Stark symptomatisch mMRC ≥ 2 . CAT® ≥ 10 |
| GOLD C | ≥ 2 (oder 1 Exazerbation mit stationärer Behandlung) | Wenig symptomatisch mMRC < 2. CAT® < 10 |
| GOLD D | | Stark symptomatisch mMRC ≥ 2 . CAT® ≥ 10 |

mMRC
→
CAT

Einteilung nach Schweregrad der Obstruktion in der Spirometrie

| Schweregrad der Obstruktion | Tiffeneau-Index (FEV ₁ /VC) | FEV ₁ % vom Soll |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| COPD Grad I | < 70% | $\geq 80\%$ |
| COPD Grad II | | 50–79% |
| COPD Grad III | | 30–49% |
| COPD Grad IV | | < 30% * |

* bzw. < 50% und pO₂ < 60 mmHg und/oder pCO₂ > 50 mmHg bei Raumluft

„Der Schweregrad der Obstruktion wird nach inhalativer Bronchodilatation bestimmt! Die Bestimmung sollte nicht während einer akuten Exazerbation erfolgen!“

Symptome/Klinik

Leitsymptome

- Chronischer Husten und Auswurf
- Dyspnoe

Leitsymptome: „AHA“ = Auswurf, Husten, Atemnot

Weitere Symptome

- Ggf. Zyanose, Uhrglasnägel und Trommelschlägelfinger
- Ggf. Zeichen der Rechtsherzdekompensation
 - Unterschenkelödeme
 - Gestaute Halsvenen
- Bei langjähriger COPD (insb. im Emphysemstadium): „Fassthorax“

- Standardisierte Befragungsinstrumente: Zum Einsatz kommen der mMRC und der CAT (COPD Assessment Test)

- mMRC-Dyspnoe-Skala (Modified medical Research Council)

- Graduierung anhand der **Schwere der Dyspnoe** (nach Belastungstoleranz) und **des Einflusses auf die Alltagsaktivitäten**

- 0 – Atemnot nur bei starker körperlicher Belastung
- 1 – Atemnot bei schnellem Gehen und leichtem Bergaufgehen
- 2 – Vermeidungsverhalten, geht langsamer als Gleichaltrige ohne Erkrankung bzw. benötigt beim Gehen Pausen zur Erholung
- 3 – Benötigt beim Gehen nach 100 m Strecke oder wenigen Minuten eine Pause zur Erholung
- 4 – Verlässt das Haus nicht mehr und ist wegen Dyspnoe kaum noch in der Lage, sich selbstständig zu versorgen

- Interpretation: mMRC ≥ 2 spricht für das Vorliegen einer schweren Symptomatik

- CAT (COPD Assessment Test)

- Beantwortung von 8 Fragen über Beschwerden und deren Schweregrad durch den Patienten (numerische Skala, siehe: Tipps & Links)

- Interpretation

- 0–10 Punkte: Geringe individuelle Symptomatik
- 11–20 Punkte: Mittelgradige individuelle Symptomatik
- ≥ 20 Punkte: Ausgeprägte individuelle Symptomatik

Umfasst Fragen zu Hustenfrequenz, Verschleimung, Engegefühl in der Brust, Belastbarkeit, Alltagskompetenz, Schlafqualität und Wohlbefinden. Für jede Frage können nach Schweregrad der Beschwerden 0–5 Punkte vergeben werden, die in der Auswertung addiert werden. Mind. können 0, max. 40 Punkte erzielt werden.

- Uhrglasnägel = Vergrößerte, rundlich geformte Nägel mit starker Wölbung nach außen
- Trommelschlägelfinger = Kolbenförmig aufgetriebene Fingerendglieder

عصب الطير بطل ماردة شقوق



Diagnostik

Anamnese

↓ Trepsin
Pawchen
Chronische Bronchitis

Körperliche Untersuchung :-

- **Inspektion** : Fassthorax, ...
- **Perkussion** : Hypersonorer Klopfschall
- **Auskultation** : Verlängertes Expirium, Giemen, Brummen

(Silent chest, Feuchte RG bei Infiltrat)

Blutuntersuchung

- **Entzündungsparameter**
- **Blutgasanalyse:** BGA
 - $pO_2 \downarrow$ = Respiratorische Partialinsuffizienz
 - $pO_2 \downarrow$ und $pCO_2 \uparrow$ = Respiratorische Globalinsuffizienz

+ ↓ Antitrypsin bei 1. Diagnose
↳ 50 J

Apparative Diagnostik

FEV₁ = Einsekundenkapazität

Pulsoxymetrie

Lungenfunktionsdiagnostik

- FEV₁ und FEV₁/VC (Tiffeneau-Index) ↓, Residualvolumen ↑, Diffusionskapazität ↓
- **Differenzierung COPD/ Asthma bronchiale**: **Bronchospasmolyse-Test** (Kein wesentlicher Anstieg von FEV₁ bei COPD)
Therapieversuch: Salbutamol bis zu 400 µg in 4 separaten Hüben, alternativ SAMA: z.B. Ipratropiumbromid 160 µg oder Kombination aus Salbutamol und SAMA

Röntgen-Thorax

- Zeichen eines Lungenemphysems : Lungenüberblähung = Fassthorax
- Zeichen eines Cor pulmonale : Erweiterte Pulmonalarterien

Differentialdiagnosen

- * Asthma bronchiale
- * Asthma cardiale
- * (Spannungs-)Pneumothorax
- * Lungenembolie
- * Bronchialkarzinom

| | Asthma bronchiale | COPD |
|---------------------------------------|---|--|
| 1 Erstdiagnose | Häufig im <u>Kindes- und Jugendalter</u> | Meist in der <u>2. Lebenshälfte (ab 50)</u> |
| 2 Ätiologie | Häufig <u>allergische Genese</u> | Fast ausschließlich <u>Raucher</u> |
| 3 Klinik | . Häufig <u>episodisch</u> mit symptomfreien Phasen . <u>Anfallsartige Dyspnoe</u> | . <u>Schleichender Beginn</u> und <u>chronische Progredienz</u> über Jahre . <u>Dyspnoe bei Belastung</u> |
| 4 Lungenfunktion | Episodische <u>reversible Obstruktion</u> | <u>Persistierende Obstruktion</u> ohne Reversibilität |
| 5 Medikamentöse Besonderheiten | . Langzeittherapie: <u>Gutes Ansprechen auf inhalative Glucocorticoide</u> | . Langzeittherapie : Gutes Ansprechen auf <u>LABA</u> und <u>LAMA</u> |

Giemen (Schwingungen höherer Frequenz in den kleineren Atemwegen – auch pfeifender Rhonchus genannt) oder **Brummen** (Schwingungen niedrigerer Frequenz in den größeren Atemwegen – auch volltönender Rhonchus genannt)

↑
↓
خيشمة
اهزاز

Therapie


Allgemein

- Nikotinkarenz
- Impfungen: Influenzaviren (jährlich), Pneumokokken-Impfung
- Patientenschulung *Atemtherapie*

Medikamentös

Leitsubstanzen

- **SABA** – Inhalative kurzwirksame β_2 -Agonisten : **Salbutamol**
- **SAMA** – Inhalative kurzwirksame Anticholinergika: **Ipratropiumbromid**
- **LABA** – Inhalative langwirksame β_2 -Agonisten : **Formoterol**
- **LAMA** – Inhalative langwirksame Anticholinergika: **Tiotropiumbromid**
- **ICS** – Inhalative Glucocorticoide: **Budesonid**
- **PDE-4-Hemmer** – Phosphodiesterase-4-Hemmer : **Roflumilast**
- **Schema** : LAMA oder LABA → 2er-Kombination LAMA und LABA → 3er-Kombination LABA + LAMA + ICS → Zusätzliche Gabe von PDE-4-Hemmer



Komplikationen

Akute Exazerbationen (AECOPD)

Ätiologie


Ca. 80% infektbedingt

Klinik

Zunehmende Atemnot mit respiratorischer Insuffizienz

Therapie

- Sitzende Lagerung. **Sauerstoffgabe** (1-2 L/min)
- Inhalative Therapie : **SABA, SAMA**
- Intravenöse Therapie : **Glucocorticoide (Prednisolon)**
- Antibiotische Therapie: Bei Hinweisen auf eine bakterielle Infektion
- Ggf. **Beatmung**



nicht mehr sonst Suppression der "Respiratory Center" by Hypokapnie ↓ CO₂
SABA Salbutamol od. Reprotezel 0.09 mg 1x wiederholung 15 min

Chronische respiratorische Insuffizienz

Kriterien

Dauerhafte respiratorische Partial- (pO₂ in Ruhe <60 mmHg) bis Globalinsuffizienz (zusätzlich pCO₂ >45 mmHg)

Therapie

- **Langzeit-Sauerstofftherapie (LTOT)**: Mindestens 16 Stunden täglich (Indikation bei pO₂ <55 mmHg)
- **Heimbeatmung**: nichtinvasive Beatmung über Nacht
- **Lungenvolumenreduzierende Verfahren**
- **Lungentransplantation**: Als Ultima ratio

pCO₂ >50%

| COPD-Stufentherapie gemäß Einteilung in ABCDE-Gruppen | | | |
|---|--|---|--|
| COPD-Einteilung in ABCD-Gruppen | Therapie der 1. Wahl | Alternative (bei nicht ausreichendem Ansprechen) | Bedarfsmedikation |
| Gruppe A | <ul style="list-style-type: none"> • Dauertherapie nicht unbedingt erforderlich • Ggf. SAMA und SABA (initial) • Ggf. Monotherapie LAMA oder LABA | <ul style="list-style-type: none"> • Wechsel der Substanzklasse auf bisher nicht verwendete Substanzklasse bzw. Kombination | <ul style="list-style-type: none"> • SABA und/oder SAMA |
| Gruppe B | <ul style="list-style-type: none"> • Monotherapie LAMA oder LABA | <ul style="list-style-type: none"> • 2er-Kombination LAMA und LABA | |
| Gruppe C | <ul style="list-style-type: none"> • Monotherapie, vorzugsweise mit LAMA | <ul style="list-style-type: none"> • Bei Initialtherapie mit LAMA: Zusätzlich LABA • Bei Initialtherapie mit LABA und LAMA: Eskalation auf 2er-Kombination LABA und ICS | |
| Gruppe D | <ul style="list-style-type: none"> • 2er-Kombination LABA und LAMA • Bei COPD mit asthmatischer Komponente und/oder Eosinophilie in Blut/Sputum: Initialtherapie mit <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2er-Kombination LABA und ICS oder ◦ 3er-Kombination LABA + LAMA + ICS | <ul style="list-style-type: none"> • Bei Initialtherapie mit LABA und LAMA: Eskalation auf <ul style="list-style-type: none"> ◦ 3er-Kombination (sog. „Triple Therapie“ der COPD) LABA + LAMA + ICS oder ◦ 2er-Kombination LABA und ICS • Bei Initialtherapie mit LABA und ICS: Zusätzlich LAMA • Bei schwerer therapierefraktärer Symptomatik und FEV₁ <50% <ul style="list-style-type: none"> ◦ Zusätzliche Gabe von PDE-4-Hemmer (Roflumilast) oder ◦ Theophyllin (die Substanzen dürfen nicht kombiniert werden) • Bei rezidivierenden Exazerbationen ≥2 pro Jahr und Nachweis von P. aeruginosa: Antibiotische Dauerprophylaxe mit Makrolid-Antibiotikum erwägen | |

Therapie der AECOPD

Je nach klinischer Ausprägung

- **Sitzende Lagerung**
- **Inhalative Therapie**
 - **β2-Sympathikomimetika** (z.B. Salbutamol) *SABA*
 - **Parasympathikolytika** (z.B. Ipratropiumbromid) *SAMA*
 - Anwendungshinweise für die Akutsituation
 - Kombination beider Substanzen sinnvoll
 - Inhalative Anwendung über Vernebler sinnvoll, ggf. über die aufsitzende Sauerstoffmaske
- **Intravenöse Applikation**
 - Ausreichende Flüssigkeitsgabe
 - Bei Herzinsuffizienz als Komorbidität kann jedoch im Rahmen einer begleitenden kardialen Dekompensation auch ein Flüssigkeitsentzug notwendig sein, z.B. durch Gabe des Schleifendiuretikums **Furosemid** *20mg Bolus dann 1-1-0*
 - **Glucocorticoide** (in der Akutsituation für 5–14 Tage) *Prednisolon 50-100mg*
 - **Morphin** in individuell adaptierter Dosierung zur Beruhigung bei starker Dyspnoe *2mg iv od s.c. Wiederholung 15-30 min*
 - **β2-Sympathikomimetika**, wenn auf die inhalative Therapie kein gutes Ansprechen feststellbar ist: z.B. **Reproterol** i.v. oder alternativ bei fehlendem Venenzugang Terbutalin s.c. *0.09mg Kurzinfusion Wiederholung 15 min*
 - **Theophyllin**: Bei nicht ausreichendem Effekt der anderen Therapiemaßnahmen *200mg iv Kurzinfusion*
 - **Medikationskonflikte: Koinzidenz von Tachyarrhythmia absoluta und COPD-Exazerbation**
 - Frequenzkontrolle
 - ~~Verapamil statt Betablocker einsetzen~~ *5mg iv/monitoring Wiederholung nach 10m*
 - ~~Digoxin~~ *0.5mg iv Bolus*
 - Ggf. dennoch Einsatz von **β1-selektiven Betablockern**, auch wenn dadurch eine Abschwächung der β2-Sympathomimetika-Wirkung möglich ist
 - Begleitend bei tachyarrhythmisch bedingter kardialer Dekompensation: **Furosemid**

AE(COPD) Antibiotika

- Standardtherapie: **Aminopenicillin** (ggf. + β -Lactamase-Inhibitor), z.B. Amoxicillin oder Ampicillin/Sulbactam *2g 1-1-1 / 5-7T*
- Bei mittelgradiger Exazerbation: **Makrolid** (z.B. Clarithromycin) oder Doxycyclin *500mg 1-0-1 / 5-7T*
- Bei schwerer Exazerbation: **Chinolone** (z.B. Levofloxacin) [6] *500mg 1-0-0 / 5T*
- Bei Pseudomonasrisiko (siehe Infektionen durch Pseudomonas aeruginosa): Eine kalkulierte antibiotische Therapie ist nicht per se indiziert! Es gilt individuell unter Berücksichtigung des Patienten und der lokalen Gegebenheiten zu entscheiden. [2]
 - **Piperacillin + Tazobactam** *4.5g 1-1-1 / 8T*
 - Alternativ: Standardtherapie um Ciprofloxacin erweitern [6]

Intubationskriterien

- Hauptkriterien: **Apnoe, Schnappatmung, Bewusstseinsverlust**, nicht beherrschbare Agitation und Kooperationsmangel, anhaltende Bradykardie $<50/\text{min}$, hämodynamische Instabilität (RR syst. $<70 \text{ mmHg}$)
- Nebenkriterien: **Atemfrequenz $>35/\text{min}$** bzw. im Verlauf ansteigend, pH $<7,3$ bzw. Abfall unter NIV, **pO₂ $<40 \text{ mmHg}$** trotz Sauerstoffgabe und NIV, fortschreitende Bewusstseinsstrübung

SABA

Therapievorschlag: Salbutamol Dosieraerosol 200 µg/Hub inhalativ 2 Hufe bei Bedarf bis 4x/Tag; alternativ über Vernebler 1,25–2,5 mg inhalativ bis 4x/Tag

LABA

Therapievorschlag: Formoterol (z.B. Forair®) 12 µg/Hub inhalativ 1-0-1; Tagesmaximaldosis 48 µg (4 Hufe), Wirkdauer ca. 12 h

Therapievorschlag: Formoterol (z.B. Formatis® Novolizer) 6–12 µg/Hub inhalativ 1-0-1; Tagesmaximaldosis 48 µg, Wirkdauer ca. 12 h

SAMA

Therapievorschlag: Ipratropiumbromid (z.B. Atrovent®) 0,25–0,5 mg inhalativ zur Vernebelung, bei Bedarf bis 3x/Tag

LAMA

Therapievorschlag: Tiotropiumbromid (z.B. Spiriva® Respimat®) 2,5 µg 2-0-0, Tagesmaximaldosis 5 µg, zur Dauertherapie geeignet, bei Patienten mit Niereninsuffizienz nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung, Anwendung in Schwangerschaft/Stillzeit nicht empfohlen, Wirkdauer ca. 24 h

Therapievorschlag: Tiotropiumbromid (z.B. Spiriva® Hartkapseln) 18 µg 1-0-0, Tagesmaximaldosis 18 µg, zur Dauertherapie geeignet, bei Patienten mit Niereninsuffizienz nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung, Anwendung in Schwangerschaft/Stillzeit nicht empfohlen, Wirkdauer ca. 24 h

ICS

Therapievorschlag: Budesonid (z.B. Budair®) 200–400 µg inhalativ 1-0-1, Tagesmaximaldosis 800 µg, Daueranwendung möglich

Therapievorschlag: Prednisolon 20–40 mg p.o. 1-0-0 über 5–14 Tage, keine Dosisreduktion bei Niereninsuffizienz erforderlich

ACCORD iv als Bolus 50–100 mg

Gängige Kombinationen aus ICS und LABA

- Budesonid + Formoterol als Pulverinhalator

- z.B. Symbicort® Turbuhaler®

- z.B. DuoResp® Spiromax®

β2-Sympathomimetika (SABA & LABA)

- Indikation: Als Basistherapie jeder COPD symptomlindernd, beugen Exazerbationen vor, akut bei COPD bedingter Dyspnoe
- Wirkstoffe
 - Inhalativ und kurzwirksam (SABA)
 - Leitsubstanz: Salbutamol *200 µg, 2 Hb bB max 4 Hb/T*
 - Alternativ: Fenoterol
 - Auch als Kombinationspräparat verfügbar: Fenoterol + Ipratropiumbromid
 - Wirkdauer: 3-6 h
 - Inhalativ und langwirksam (LABA)
 - Leitsubstanz: Formoterol *12 µg, 1-0-1 max 48 µg*
 - Als Dosieraerosol
 - Als Pulverinhalator
 - Alternativ
 - Salmeterol
 - Als Dosieraerosol
 - Als Pulverinhalator
 - Indacaterol als Pulverinhalator
 - Wirkdauer: 12 h
 - Intravenöse Gabe im Notfall *SABA*
 - Leitsubstanz: Reproterol i.v. *0.09 mg iv + 15 Minuten Wiederholung*
 - Bolusinjektion: Dosierung ab 18 Jahren
 - Dauerinfusion: Dosierung ab 18 Jahren
 - Subkutane Gabe
 - Leitsubstanz: Terbutalin s.c.
 - Wenn Gabe p.o. erforderlich
 - Leitsubstanz: Bambuterol p.o.
 - Alternativ: Salbutamol

Anticholinergika (SAMA & LAMA)

- Indikation und Einsatzmöglichkeiten
 - Ab Gruppe A (gemäß COPD-Einteilung in ABCD-Gruppen) einsetzbar
 - In kurzwirksamer Form als Inhalation über den Vernebler zur symptomatischen Therapie
 - In langwirksamer Form als Dauertherapie zur Symptomkontrolle und Vorbeugung von Exazerbationen
- Wirkstoffe
 - Inhalativ und kurzwirksam (Short Acting Muscarinic Antagonist, SAMA): Ipratropiumbromid
 - Standardsubstanz zur Inhalation über Vernebler, auch als Kombinationspräparation mit Salbutamol erhältlich
 - Wirkdauer: Ca. 6 Stunden
 - Inhalativ und langwirksam (Long Acting Muscarinic Antagonist, LAMA)
 - Leitsubstanz: Tiotropiumbromid
 - Als Inhalationslösung (z.B. Spiriva® Respimat®)
 - Als Pulverinhalator (z.B. Spiriva® Hartkapseln)
 - Alternativ
 - Acridinium als Pulverinhalator (z.B. Bretaris® Genuair® bzw. Eklira® Genuair®)
 - Glycopyrroniumbromid als Pulverinhalator (z.B. Seebri® Breezhaler®)
 - Wirkdauer: Ca. 24 Stunden

β2-Sympathomimetika und Anticholinergika können bei nicht ausreichender Wirksamkeit einer Monotherapie oder bei Nebenwirkungen unter Dosiserhöhung auch miteinander kombiniert werden. Es besteht eine synergistische Wirkung

Inhalative Glucocorticoide (ICS)

- Wirkung: Entzündungshemmend, beugt Exazerbationen vor, allenfalls geringe Bronchodilatation
- Indikation: Nur in Kombinationstherapie zu Bronchodilatoren, nie als Monotherapie
 - Ab Gruppe C (gemäß COPD-Einteilung in ABCD-Gruppen) einsetzbar
 - Bei häufigen Exazerbationen
- Anwendung
 - Bevorzugt inhalativ
 - Systemisch so selten und so kurz wie möglich
- Gängige Wirkstoffe bei inhalativer Therapie
 - Budesonid inhalativ (Standardsubstanz)
 - Budesonid als Dosieraerosol (z.B. Budair®) 200-400 µg inh 1-0-1
 - Budesonid als Pulverinhalator (z.B. Novopulmon® Novolizer)
 - Fluticason inhalativ : Dosierungen von 25–500 µg werden vertrieben, für die COPD sind Dosierungen von 250–500 µg relevant.
 - Fluticason als Dosieraerosol (z.B. Flutide® Dosieraerosol)
 - Fluticason als Pulverinhalator (z.B. Flutide® Diskus®)
 - Beclometason inhalativ (z.B. Junik® Dosieraerosol)
- Auswahl eines geeigneten Corticoids: Grundsätzlich sollten die Anwendungspraktikabilität eines Präparats beim Patienten und die persönliche Erfahrung des Verordners in die Entscheidung zugunsten eines Wirkstoffes einfließen
- Hinweise für den Patienten
 - Mundspülung nach Anwendung immer empfehlen, da dies Pilzinfektionen (Soor) der Mundschleimhaut vorbeugt
 - Aufklärung des Patienten über einen/den allenfalls mittelfristig zu erwartenden symptomatischen Effekt
- Absetzen bei fehlender Wirkung: ICS sollten wieder abgesetzt werden, wenn sie weder einen symptomatischen noch einen spirometrisch nachweisbaren Effekt haben, um die Gefahr einer Pneumonie nicht unnötig zu erhöhen

Die systemische Anwendung sollte nur bei Exazerbation erfolgen und immer so kurz wie möglich gehalten werden. Nach aktuellen Erkenntnissen ist eine Therapiedauer von 5 Tagen einer 10–14-tägigen Therapie nicht unterlegen (s.u.)!

Systemische Glucocorticoid-Therapie bei COPD

- Indikation: Akut bei exazerbierter COPD, Anwendung so kurz wie möglich, keine Dauertherapie empfohlen
- Wirkstoffe
 - Prednisolon (Standardsubstanz) 20-40 mg 1-0-0
 - Dexamethason bei AECOPD 50-100 mg i.v.
 - Einsatz: Häufig in der intravenösen Akuttherapie als Alternative angewendet
 - Zur Therapie per os ebenfalls verfügbar
- Nachteile einer langfristigen Anwendung
 - Alle systemischen unerwünschten Wirkungen bis hin zum Cushing-Syndrom
 - Speziell die Steroidmyopathie kann auch bei niedrigen Dosierungen unter 10 mg Prednisolon täglich auftreten

Kombinationspräparate LABA+ICS

Für die ab Gruppe C anwendbare Kombination aus LABA+ICS gibt es Kombinationspräparate, sodass der Patient mit einer Inhalation beide Wirkstoffe aufnehmen kann und die Compliance deutlich erleichtert ist. Die Kombinationspräparate stehen in verschiedenen Inhalations-Applikatoren und Dosierungsstufen zur Verfügung.

- Indikation: Ab Gruppe C (gemäß COPD-Einteilung in ABCD-Gruppen) einsetzbar
- Eigenschaften
 - Verschiedene Applikationssysteme (z.B. Diskus-Inhalator mit Pulver, Dosieraerosole)
 - Vereinfachung der Compliance → Mit einer Inhalation werden beide Wirkstoffe aufgenommen
- Gängige Kombinationen aus ICS und LABA
 - Budesonid + Formoterol als Pulverinhalator
 - z.B. Symbicort® Turbohaler®
 - z.B. DuoResp® Spiromax®
 - Beclometason + Formoterol als Dosieraerosol (z.B. Foster® Dosieraerosol)
 - Fluticason + Salmeterol inhalativ
 - Fluticason + Salmeterol als Dosieraerosol (z.B. Viani® Dosieraerosol)
 - Fluticason + Salmeterol als Pulverinhalator (z.B. Viani® Diskus)
 - Fluticason + Vilanterol als Pulverinhalator (z.B. Relvar® Ellipta® 92/22)

Kombinationspräparate LABA+LAMA

Kombinationspräparate verschiedener Hersteller stehen zur Verfügung, die Dosierungsfrequenz beträgt 1 oder 2x täglich.

- Indikation: Ab Gruppe C (gemäß COPD-Einteilung in ABCD-Gruppen) einsetzbar
- Gängige Kombinationen aus LABA und LAMA
 - Indacaterol + Glycopyrronium (z.B. Ultibro® Breezhaler® bzw. Xoterna® Breezhaler® bzw. Ulunar® Breezhaler®)
 - Vilanterol + Umeclidinium (z.B. Anoro®)
 - Formoterol + Acridiniumbromid (z.B. Duaklir® Genuair® bzw. Brimica® Genuair®)
 - Olodaterol + Tiotropium (z.B. Spiolto® Respimat®)

Kombinationspräparate ICS+LAMA+LABA (sog. „Triple Therapie“ der COPD)

Die Dreifach-Kombination aus ICS+LAMA+LABA kann bei der Gruppe D (gemäß COPD-Einteilung in ABCD-Gruppen) eingesetzt werden, wenn unter LAMA+LABA-Therapie keine ausreichende Kontrolle der COPD erreicht werden kann.

- Beclometason + Formoterol + Glycopyrronium als Dosieraerosol (z.B. Trimbow® Druckgasinhalation)
- Fluticason + Umeclidinium + Vilanterol als Pulverinhalator (z.B. Trelegy® Ellipta®)

Roflumilast

- Wirkung: Hemmung der entzündlichen Aktivität **keine** bronchodilatatorische Wirkung
- Indikation
 - Bei Gruppe D (gemäß COPD-Einteilung in ABCD-Gruppen) einsetzbar
 - Zur Senkung der Exazerbationsrate
- Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung
 - Keine Anwendung bei Kachexie
 - Keine Anwendung bei Depression und Suizidalität
 - Es ist nicht eindeutig geklärt, ob mit ICS + LABA behandelte Patienten tatsächlich von einer

zusätzlichen Gabe von Roflumilast profitieren

Sonstige medikamentöse Therapieoptionen

- Mukolytika
 - Indikation
 - Anwendung möglich bei Patienten, die symptomatisch profitieren
 - Therapieversuch bei häufigen Exazerbationen gerechtfertigt
 - Wirkstoffe
 - Leitsubstanz: N-Acetylcystein (NAC)
 - Alternativen: Ambroxol, Cineol und Myrtol

Bei der Verordnung von N-Acetylcystein ist „NAC“ als Kürzel gegenüber dem bekannten Handelsnamen „ACC®“ zu bevorzugen. Möglicherweise wird durch unordentliche Arztschrift und Übertragungsfehler fälschlicherweise ASS statt N-Acetylcystein verabreicht. Dies kann zu schwerwiegenden Medikationskomplikationen führen. Die Dunkelziffer von Falschverabreichungen in diesem Zusammenhang ist sehr hoch einzuschätzen!

- Antitussiva
 - Indikation
 - Kritische Indikationsstellung!
 - Kurzfristig zur symptomatischen Linderung (bspw. bei gestörter Nachtruhe durch Reizhusten)
 - Kontraindikation: Chronische respiratorische Insuffizienz
 - Bei dringlichem Patientenwunsch: Antitussive Therapie mit dem nicht atemdepressiven Noscamin
 - Therapiehinweis: Effektive Dosierung einsetzen
 - Wirkstoffe
 - Nicht atemdepressive Antitussiva: Leitsubstanz Noscamin
 - Potentiell atemdepressive Antitussiva
 - Codein
 - Dihydrocodein
 - Opioide zur symptomatischen Linderung der Luftnot
 - Wirkung: Keine Verbesserung der respiratorischen Parameter, jedoch des Empfindens, der

Belastungstoleranz und somit auch der Lebensqualität

- Indikation: Palliative Therapie
 - Leitsubstanz: Retardiertes Morphin
 - Alternative: Transdermales Fentanyl
 - Risiko: Hyperkapnie
 - BGA zur Prüfung auf Hyperkapnie 2–3 Tage nach Therapiebeginn
 - Therapie absetzen, wenn klinisch negative Effekte oder bei massiver Zunahme der Hyperkapnie

Lungenkarzinom +-

Definition

Nicht-kleinzellige Lungenkarzinome 85% *Non Small Cell Lung Cancer NSCLC*

- **Histologische Subtypen:** Plattenepithelkarzinom (Meist zentral gelegen), Adenokarzinom (Meist peripher gelegen)
- **Zellteilungsrate:** Niedriger als SCLC
- **Therapieansatz:** Öfter auch kurativ
- **Prognose:** Besser als beim SCLC

Kleinzelliges Lungenkarzinom 15% *SCLC*

- **Histologie:** Gehört zu der Gruppe der neuroendokrinen Tumore. Meist zentral gelegen
- **Zellteilungsrate:** Hoch, somit schnelles Wachstum und frühere Metastasierung
- **Therapieansatz:** Selten kurativ
- **Prognose:** Schlecht

Ätiologie

Berufliche Karzogene, Umweltbedingte

- **Rauchen** ++ : Dauer und Menge des Konsums bestimmen das Krebsrisiko

Symptome/Klinik

Symptome (erst in fortgeschrittenem Tumorstadium)

- **B-Symptomatik** (Fieber, Nachtschweiß und Gewichtsverlust)
- Chronischer Husten, Hämoptysen, Dyspnoe

Metastasierung

- **Lymphogen** : Lunge, Mediastinallymphknoten, Supraklavikuläre Lymphknoten
- **Hämatogen** : Leber, Gehirn, Nebennieren, Knochen

Paraneoplastische Syndrome bei Lungenkarzinom (Insb. bei SCLC)

- Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion
- **Hyperkalzämie** *Parathormon ähnliches Peptid*
- **Cushing-Syndrom** *ACTH Hypoglykämie - ILGF insulin-like-GF*

Pancoast-Tumor

- **Peripheres Karzinom der Lungenspitze** mit Symptomen eines **Pancoast-Syndroms** : Horner-Syndrom (Ptosis, Miosis, Enophthalmus), Obere Extremitätenstauung,...

Klassifikation (TNM)

Stadien (nach UICC)

Diagnostik

Anamnese und körperliche Untersuchung

Labor

Bildgebende Untersuchungen

- Röntgenthorax
- CT-Thorax mit Kontrastmittel

Biopsisch-histologische Untersuchung : Sicherung der Diagnose

- Bronchoskopie mit transbronchialer Biopsie: Bei zentraler Raumforderung
- Transthorakale, CT-gesteuerte Biopsie: Bei peripheren Raumforderungen

Staging

- CT-Abdomen, MRT des Schädels, Knochenszintigraphie

Lungenfunktionsdiagnostik

Vor thoraxchirurgischem Eingriff

Metastasen:-
Gehirn — MRT-Schädel
Leber, Nebennieren } CT Abdomen
Knochen — Szintigraphie

Therapie

Therapie des NSCLC

- **Kurativ :** (bei begrenzten Tumoren)
 - **Operative Resektion:** Lobektomie (ggf. Bilobektomie, Pneumonektomie) mit Lymphadenektomie
 - Ggf. adjuvante Chemotherapie. Ggf. konsolidierende Radio
- **Palliativ :** (bei fortgeschrittenen Tumoren) Definitive Radiochemotherapie

Therapie des SCLC

Meist Palliativ : Radiochemotherapie. Prophylaktische Schädelbestrahlung

Prognose

- **Mittlere 5-Jahres-Überlebensrate:** Etwa 10–20%
- **Schlechteste Prognose:** Kleinzelliges Lungenkarzinom

Prävention

- Nichtrauchen bzw. Rauchstopp ++

| TNM | Eigenschaften |
|---------------|---|
| T Tis | Carcinoma in situ |
| I T1 | <p>Größter Durchmesser <3 cm, umgeben von Lungengewebe oder viszeraler Pleura, Hauptbronchus <u>nicht beteiligt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> T1a(mi): Minimal invasives Adenokarzinom T1a: Größter Durchmesser ≤ 1 cm T1b: Größter Durchmesser > 1 bis ≤ 2 cm T1c: Größter Durchmesser > 2 bis ≤ 3 cm |
| II T2 | <p>Größter Durchmesser >3 bis ≤5 cm und/oder</p> <ul style="list-style-type: none"> Infiltration des Hauptbronchus oder Infiltration der viszeralen Pleura oder Tumorbedingte partielle Atelektase oder obstruktive Pneumonie bis in den Hilusbereich, Teile der Lunge oder die gesamte Lunge umfassend <p>T2a: Größter Durchmesser > 3 bis ≤ 4 cm T2b: Größter Durchmesser > 4 bis ≤ 5 cm</p> |
| III T3 | <p>Größter Durchmesser >5 bis ≤7 cm und/oder</p> <ul style="list-style-type: none"> Infiltration von Thoraxwand (inkl. parietaler Pleura und Tumoren des „Superior Sulcus“), N. phrenicus oder parietalem Perikard Zusätzlicher Tumor im selben Lungenlappen |
| IV T4 | <p>Größter Durchmesser >7 cm und/oder</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit direkter Infiltration von Diaphragma, Mediastinum, Herz, großen Gefäßen, Trachea, N. laryngeus recurrens, Ösophagus, Wirbelkörper oder Carina Zusätzlicher Tumor in anderem (ipsilateralen) Lungenlappen |
| N N1 | Lymphknotenmetastase ipsilateral: Peribronchial, hilär und/oder intrapulmonal |
| N2 | Lymphknotenmetastase ipsilateral: Mediastinal und/oder subcarinal |
| N3 | <p>Lymphknotenmetastase kontralateral: Mediastinal, hilär oder tief zervikal, und/oder</p> <p>Lymphknotenmetastase ipsilateral: Tief zervikal und/oder supraklavikulär</p> |
| M M1 | <p>Fernmetastasen</p> <ul style="list-style-type: none"> M1a: Separater Tumorknoten in einem kontralateralen Lungenlappen, Pleura mit knotigem Befall, maligner Pleuraerguss, maligner Perikarderguss M1b: Isolierte Fernmetastase in einem extrathorakalen Organ M1c: Mehrere Fernmetastasen (> 1) in einem oder mehreren Organen |

T0

T1

<3 cm
umgeben
nicht beteiligt

T2

3-5 cm

Hauptbronchus

v. Pleura
obstr. od. Atelektase

T3

5-7 cm
P. Pleura, Thorax wand
Perikard
N. Phrenicus

T4

>7 cm

Direkter
Infiltration

| <div> <div>✖</div> <div>Stadien nach UICC8</div> </div> | TNM |
|---|--|
| <div>Stadium 0</div> | <div>Tis (Carcinoma in situ)</div> <div>0 Tis</div> |
| <div> <div>Stadium I</div> <div>very limited disease</div> </div> | <div> <div>Geringe Tumorausbreitung</div> <div> <div>• IA: T1, N0</div> <div>• IB: T2, N0</div> </div> </div> <div>I T_{1,2} - N₀</div> |
| <div> <div>Stadium II</div> <div>limited disease</div> </div> | <div> <div>Tumorausbreitung auf Lunge begrenzt</div> <div> <div>• IIA: T2_b, N0</div> <div>• IIB: T1-T2, N1 oder T3, N0</div> </div> </div> <div>II T_{1,2} - N₁ T₃ - N₀</div> |
| <div> <div>Stadium III</div> <div>limited disease</div> </div> | <div> <div> <div>Tumorausbreitung über Lunge hinaus, aber noch auf den Hemithorax beschränkt</div> <div> <div>• IIIA: T1-T2, N2 oder T3, N1 oder T4, N0-N1</div> </div> </div> <div> <div>Tumorausbreitung über Lunge hinaus und nicht mehr auf den Hemithorax beschränkt</div> <div> <div>• IIIB: T1-T2, N3 oder T3-T4, N2</div> <div>• IIIC: T3-T4, N3</div> </div> </div> </div> <div>III T_{1,2} - N₂ T₃ - N_{1,2,3} T₄ - N_x</div> |
| <div> <div>Stadium IV</div> <div>Extensive Disease</div> </div> | <div> <div>Fernmetastasierung bzw. Tumorausbreitung über Lunge hinaus (jedes M+ unabhängig von N)</div> <div> <div>• IVA: Einzelne Fernmetastase</div> <div> <div>◦ M1a: Separater Tumorknoten in einem kontralateralen Lungenlappen, Pleura mit knotigem Befall, maligner Pleuraerguss, maligner Perikarderguss.</div> <div>◦ M1b: Isolierte Fernmetastase in einem extrathorakalen Organ</div> </div> </div> <div>• IVB: Mehrere Fernmetastasen</div> </div> <div>IV T_x, N_x, M₁</div> |

UICC

Union for International Cancer Control

Lungenkarzinom

TNM

Tis

T1

<3cm
umgeben
nicht beteiligt

T2

3-5cm

kl. Bronchus

v. Pleura
abw. od. Atelektase

T3

5-7cm

P. Pleura, Thorax Wand
Zentral od. N. Phrenicus

T4

>7cm

Direkte
Infiltration

N1 ipsilat. peribronchial
hilär

N2 ipsilat. mediastinal
subcarinal

N3 ipsilat. suboklavikulär
zervikal

Kontralat.

M Fernmetastase

UICC

0

Tis

I

T_{1,2} - N₀

II

T_{1,2} - N₁

T₃ - N₀

III

T_{1,2} - N₂

T₃ - N_{1,2,3}

T₄ - N_x

IV

T_x, N_x, M₁

TNM

UICC Stadium

T₀

0

T₁

N₀

I

T₂

N₁

II

N₂

III

T₃

N₀

II

N_{1,2,3}

III

T₄

III

M₁

IV

Pleuraerguss +/-

Grundlagen

Definitionen:

- **Pleuraerguss:** Flüssigkeitsansammlung in der Pleurahöhle
- **Pleuraempyem:** Eitriger Pleuraerguss ($> 15\,000/\mu\text{l}$ Leukozyten, $\text{pH} < 7,2$, Nachweis einer bakteriellen Besiedelung)
- **Chylothorax:** Lymphflüssigkeit (milchig, Fettanteil $> 4\text{ g/l}$) in der Pleurahöhle
- **Hämatothorax:** Blutansammlung in der Pleurahöhle (Hämatokrit $> 50\%$ des peripheren Blutes) meist nach Thoraxtrauma oder iatrogen.
- **Beachte:** Im Röntgenbild sind Ergussmengen erst ab ca. 200 ml erkennbar, empfindlicher ist die Sonografie, bei der bereits sehr geringe Mengen erkennbar sind. $> 20\text{ ml}$
- Differenzialdiagnostisch wegweisend ist die Differenzierung zwischen Transsudat und Exsudat im Pleurapunktat:

| Parameter | Transsudat <i>HL, Leber, Niere</i> | Exsudat <i>Infekt, Malignom</i> |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| spezifisches Gewicht | < 1015 | > 1015 |
| Gesamteiweiß (GE) | $< 30\text{ g/l}$ | $> 30\text{ g/l}$ |
| GE-Punktat/GE-Serum | $< 0,5$ | $> 0,5$ |
| LDH | $< 200\text{ U/l}$ | $> 200\text{ U/l}$ |
| LDH-Punktat/LDH-Serum | $< 0,6$ | $> 0,6$ |
| Glukose | wie im Blut | bei Infektionen niedriger als im Blut, sehr niedrige Werte bei Kollagenosen |
| Leukozyten | $< 1000/\mu\text{l}$ | meist $> 1000/\mu\text{l}$ |
| Erythrozyten | $< 10\,000/\mu\text{l}$ | bei Malignom, Trauma, Lungenembolie oft $> 100\,000/\mu\text{l}$ |

SG 1015 g/L
 Eiweiß 30 g/L 0.5
 LDH 200 U/L 0.6
 Glukose —
 Leukos 1000 / μl
 Erythrozyten 10000 / μl
 Cholest. 60 mmol/L

Häufigste Ursachen

- **Transsudat:** Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, chronische Nierenerkrankung.
- **Exsudat:** bakterielle Infektionen, Malignome, Lungenembolie.

Vorgehen

- **Anamnese:** Vorerkrankungen, Verletzungen, begleitende Symptome: Dyspnoe, Husten, Auswurf (blutig? eitrig?), Fieber, Gewichtsabnahme, Thoraxschmerzen.
- **Körperliche Untersuchung:** Allgemeinzustand, Ödeme, Zyanose, Aszites, Herzauskultation, Auskultation und Perkussion der Lunge.
- **Basisdiagnostik:**
 - **Labor:** BSG/CRP, Blutbild, Differenzialblutbild, Blutglukose, Quick/INR, PTT, GOT, GPT, γGT , LDH, Kreatinin, Elektrolyte, Lipase, Gesamteiweiß, Urinstatus
 - **Röntgen-Thorax** in 2 Ebenen, ggf. **CT-Thorax**
 - **Sonografie:** Ermöglicht auch eine einfache Unterscheidung zwischen Erguss (meist echofrei, bei blutigem Erguss oder Pleuraempyem mit Binnenechos) und soliden Pleuraprozessen (echoreicher).
- **Pleurapunktion :**
 - Jeder Pleuraerguss unklarer Genese erfordert eine diagnostische (und ggf. gleichzeitig therapeutische) Punktion
 - Finden sich im Punktat vor allem Lymphozyten, so sind insbesondere Malignome oder eine Tuberkulose auszuschließen.
 - Untersuchungen bei der diagnostischen Pleurapunktion :
 - spezifisches Gewicht, pH, Gesamteiweiß (GE), LDH, Glukose, Leukozyten und Erythrozyten, Triglyzeride, Lipase
 - bakteriologische Diagnostik: Blutkulturflasche beimpfen
 - Tbc-Diagnostik
 - zytologische Diagnostik.

Ätiologie

Je nach Beschaffenheit des Ergusses lassen sich Transsudat und Exsudat mit jeweils typischen Ursachen unterscheiden.

Transsudat

- Pathophysiologie: Austritt von Flüssigkeit mit wenigen Zellen und Proteinen über die intakte Pleura aufgrund pathologischer Druckunterschiede, bspw.
 - Hydrostatischer Druck \uparrow in den Pleurakapillaren
 - Interstitieller Flüssigkeitsdruck \uparrow in der Lunge
 - Intrapleuraler Druck \downarrow
 - Onkotischer Druck
 - In Blutgefäßen \downarrow
 - Im Pleuraspalt \uparrow
 - Intraabdominaler Druck \uparrow
- Häufige Ursachen
 - Herzinsuffizienz
 - Leberzirrhose
 - Nephrotisches Syndrom
 - Peritonealdialyse
 - Obere Einflusstauung
 - Lungenembolie


Exsudat

- Pathophysiologie: Austritt von Flüssigkeit mit reichlich Zellen und Proteinen in den Pleuraspalt aufgrund erhöhter Durchlässigkeit der Kapillarwände im Rahmen einer Entzündung oder Tumorerkrankung, bspw. durch
 - Vermehrte Durchblutung (Hyperämie)
 - Abflussbehinderung über Lymphbahnen
- Häufige Ursachen
 - Pneumonie (parapneumonischer Erguss)
 - Malignom
 - Viruserkrankungen (virale Pleuritis)
 - Lungenembolie
 - Tuberkulose

Beiden Formen gemeinsam ist, dass die erhöhte Produktion von Lymphe die maximale Lymphrückresorption der Pleura (pleurale Lymphstromgeschwindigkeit) übersteigt! [1]

Konventionelles Röntgen-Thorax

- Röntgen in 2 Ebenen: p.a.-Aufnahme in Seitenlage oder im Stehen , Seitenaufnahme im Stehen [2]
- Befund: **Homogene Verschattung in den am tiefsten stehenden Randwinkeln** der Pleurahöhle (Recessus costodiaphragmaticus)
 - **Zwerchfellkontur aufgehoben**
 - Verschattung steigt nach lateral an (**Meniskuszeichen**); die von medial betrachtet konvexe Begrenzungslinie zwischen Lunge und Erguss wird dabei als Ellis-Damoiseau-Linie bezeichnet
 - Verschattung steigt mit Ergussmenge nach kranial an
 - Totale Verschattung der Lunge mit **Verdrängung des Mediastinums** nach kontralateral möglich



Verschattung

Homogen

Zwerchfellkontur aufgehoben

Meniskus-Zeichen

- Das **weitere diagnostische Vorgehen** orientiert sich an der Klinik und an der Differenzierung zwischen Transsudat und Exsudat. Ein blutiger Erguss ist bis zum Beweis des Gegenteils tumorverdächtig (Indikation zur video-assistierte Thorakoskopie).

Differenzialdiagnose

| Verdachtsdiagnose | wegweisende Untersuchungen (diagnostische Punktion +) |
|---|---|
| meist Transsudat | |
| <i>Herzinsuffizienz</i> | Echokardiografie |
| <i>Hypoproteinämie:</i> | <i>Albumin</i> |
| ▪ Leberzirrhose | Transaminasen, Quick/INR, Sono |
| ▪ nephrotisches Syndrom, Urämie | Urinstatus, Kreatinin |
| ▪ Mangelernährung, Malassimilation | Klinik |
| meist Exsudat | |
| <i>Malignome</i> | <i>Punktat: Zytologie</i> |
| ▪ Metastasen (v. a. Mamma- und Bronchialkarzinom) | Tumorsuche |
| ▪ maligne Lymphome | Lymphomsuche, Sono, CT |
| ▪ Pleuramesotheliom (z. B. bei Asbestose) | Röntgen-Thorax, Sono, CT, Biopsie |
| <i>Infektionen</i> (bei bakterieller Genese häufig Pleuraempyem) | <i>Punktat: Kultur</i> |
| ▪ Tbc | Röntgen-Thorax, Sputumuntersuchung |
| ▪ Pneumonie | Röntgen-Thorax |
| ▪ iatrogen nach Pleurapunktion | Anamnese |
| <i>Lungenembolie</i> | Thorax-CT oder Lungenszintigrafie |
| <i>andere Ursachen:</i> <ul style="list-style-type: none"> • rheumatoide Arthritis • Kollagenosen • Pankreatitis | |
| Chylothorax | |
| • Verletzung des Ductus thoracicus, z. B. durch Trauma oder Operationen | Anamnese |
| • Störung des Lymphabflusses durch maligne Prozesse | CT |

Pleurapunktion

- Kontraindikationen (relativ):** Gerinnungsstörungen (INR > 1,5, PTT > 50 Sek., Thrombozyten < 50 000/μl).
- Komplikationen:** Pneumothorax, Hämatothorax, Infektion, Leber- oder Milzverletzung, Lungenödem bei zu schneller oder ausgedehnter (> 1000 ml) Punktion infolge eines zu starken intrathorakalen Druckabfalls (= Reexpansionsödem).
- Durchführung:**
 - Lagerung: **Sitzend**
 - Markierung der Punktionsstelle in der **hinteren Axillarlinie** oder **Skapularlinie am entsprechenden Rippenoberrand** (Interkostalgefäße und -nerven befinden sich am Rippenunterrand) unter sonografischer Kontrolle
 - Hautdesinfektion, sterile Handschuhe anziehen, Abdecken**

- **Lokalanästhesie:** Wechsel zwischen Injektion und Aspiration
- **Punktion:** unter **Aspiration** mit aufgesetzter Spritze punktieren, lässt sich Pleuraerguss aspirieren, Stahlkanüle etwas zurückziehen und Plastikkanüle vorschieben
- während Expirationsphase rasch Stahlkanüle entfernen und Dreiwegehahn befestigen
- ggf. Material für die Diagnostik entnehmen, dann Ableitungsschlauch anschließen und **Resterguss ablassen**, bei großem Erguss wegen Gefahr des Lungenödems ggf. mehrmals punktieren
- **1 – 2 Std. nach Punktion Röntgen-Thorax-Kontrolle in Expiration** (Pneumothorax?)
- **Erfolgskontrolle am besten durch Sonografie.**

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Transsudat versus Exsudat [4][5]

| | Transsudat bei Pleuraerguss | Exsudat bei Pleuraerguss |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| Gesamteiweißgehalt | • <30 g/L | • >30 g/L |
| Verhältnis Gesamteiweiß Pleuraerguss/Serum | • <0,5 | • >0,5 |
| LDH | • <200 U/L | • >200 U/L |
| LDH-Pleuraerguss/LDH-Serum | • <0,6 | • >0,6 (bei malignem Erguss oft >1) |
| Dichte bzw. spezifisches Gewicht | • <1016 g/L | • >1016 g/L |
| Cholesterin | • <60 mg/dL | • >60 mg/dL |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Charakteristische Befunde bei Pleurapunktion

| | Makroskopische Befunde | Mikroskopische Befunde/Zytologie | Laborchemische Befunde |
|--|---|--|---|
| Unkomplizierter Pleuraerguss | <ul style="list-style-type: none"> Klar, leicht gelblich Serös dünnflüssig | <ul style="list-style-type: none"> Steriles Punktat | <ul style="list-style-type: none"> pH > 7,3 LDH < 500 U/L Glucose > 60 mg/dL |
| Komplizierter parapneumonischer Pleuraerguss | <ul style="list-style-type: none"> Trüb | <ul style="list-style-type: none"> Gelegentlich positiver Bakteriennachweis | <ul style="list-style-type: none"> pH 7,1–7,2 LDH > 1000 U/L Glucose < 40 mg/dL |
| Pleuraempyem | <ul style="list-style-type: none"> Trüb, gelblich bis grünlich Dickflüssig, rahmig-eitrig | <ul style="list-style-type: none"> Bakterielle Besiedelung Polymorphkernige Granulozyten | <ul style="list-style-type: none"> pH < 7,1 LDH > 1.000 U/L Glucose < 40 mg/dL Leukozyten > 15.000/μL Proteine > 3 g/dL |
| Hämatothorax | <ul style="list-style-type: none"> Trüb, rötlich bis rot Ggf. mit Koageln | <ul style="list-style-type: none"> Zellen des Blutes | <ul style="list-style-type: none"> Erythrozyten ↑ Hämatokrit > 50% |
| Maligner Pleuraerguss | <ul style="list-style-type: none"> Klar bis trüb, gelb bis rötlich (häufig auch blutig) Dünnflüssig | <ul style="list-style-type: none"> Zellreiches Exsudat Malignitätskriterien: Verschobene Kern-Plasma-Relation, prominente Nucleoli, mehrkernige Zellen, zahlreiche Mitosefiguren Nachweis von Tumorzellen | <ul style="list-style-type: none"> Erythrozyten ↑ i.d.R. leichte Hämorrhagie von 30.000–50.000/μL Leukozyten 1.500–4.000/μL Proteine 1,5–8 g/dL Hinweise auf hohe Tumormast <ul style="list-style-type: none"> pH-Wert < 7,2 Glucosekonzentration < 60 mg/dL LDH > 1.000 U/L |
| Chylothorax | <ul style="list-style-type: none"> Milchig, weiß, geruchlos Dünnflüssig | <ul style="list-style-type: none"> Fettzellen Steriles Punktat | <ul style="list-style-type: none"> pH 7,4–7,8 Triglyceride > Plasmakonzentration Cholesterin ≤ Plasmakonzentration Proteine < 6 g/dL Lymphozyten |
| Tuberkulose | <ul style="list-style-type: none"> Teilweise blutig | <ul style="list-style-type: none"> Mykobakterien (säurefeste Stäbchen) Leukozytose Lymphozyten/Neutrophile > 0,75 | <ul style="list-style-type: none"> pH < 7,2 Glucose < 50 mg/dL Leukozyten > 10.000/μL Adenosinaminase > 70 U/L |
| Fistel zum Gastrointestinaltrakt | <ul style="list-style-type: none"> Trüb, grün bis bräunlich Dickflüssig | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. Nahrungsreste | <ul style="list-style-type: none"> pH-Wert je nach Lokalisation der Fistel |

Transudat

Exudat

Exudat

Exudat

Exudat

Dickflüssig = Infekt
Fistel

Blutig = malignom
Tbc

Trüb = Infekt
Empyem
Hämatothorax
malignom
Fistel

Klar = Unkompliziert
malignom

Tuberkulose (Tbc) +/-

Definition

- Infektionskrankheit durch Mycobacterium tuberculosis
- Übertragung: Tröpfcheninfektion

Klinik - Verlauf

- **Primärtuberkulose:** ca. 6 Wochen nach erstem Kontakt mit dem Mykobakterium
 - meist symptomloser Primärkomplex (Primärherd + Hiluslymphknoten) später röntgenologisch häufig als verkalkter Rundherd (Tuberkulom) sichtbar.
 - **Bei symptomatischem Verlauf: B-Symptomatik** (Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust), Husten
 - **Bei schwerem Verlauf:** Miliartuberkulose = hämatogene Generalisation
- **Postprimäre Tuberkulose:**
 - Endogene Reaktivierung eines abgeheilten Primärinfekts infolge gestörter Immunität.
 - Symptome (s.o.)
 - Meistens kommt es zu einer zur Bildung einer Kaverne. *كحلة*
- **Extrapulmonale Tuberkulose** (i.d.R. bei postprimärer Tuberkulose): tuberkulöse Meningitis, tuberkulöse Spondylitis, Urogenitaltuberkulose, Tuberkulose des Gastrointestinaltraktes

Diagnostik – Differenzialdiagnose

- **Anamnese und körperliche Untersuchung**
- **Suchdiagnostik**, bei Risikogruppen
 - **Interferon-Gamma Release Assays (IGRA):** hohe Sensitivität und Spezifität. Durchführung v.a. bei Erwachsenen.
 - **Tuberkulin-Hauttest (THT):** niedrige Sensitivität und Spezifität. Durchführung v.a. bei Kleinkindern. Eine positive Reaktion beweist eine Infektion oder BCG-Impfung. Eine negative Reaktion spricht gegen Tbc
- **Untersuchungen bei V.a. aktive Tuberkulose:**
 - **Mikrobiologische Diagnostik bei offener Tuberkulose:** Erregernachweis meist aus Sputum, Bronchial- oder Trachealsekret.
 - **Histologie:** bioptischer Nachweis von verkäsenden Granulomen (hohe Spezifität).
 - **Röntgen-Thorax:** Infiltrate besonders im Spitzenbereich, Hiluslymphknoten, Rundherd, Ringschatten als Hinweis für eine Kaverne.
- **Zusatzdiagnostik bei V. a. extrapulmonale Tuberkulose:**
 - Tuberkulöse Meningitis: Lumbalpunktion
 - Tuberkulöse Spondylitis: CT, besser MRT
 - Urogenitaltuberkulose: Urinkultur, Sono, evtl. CT
 - Tuberkulose des Gastrointestinaltraktes: Stuhlkultur, Endoskopie, Biopsie

Therapie - Prävention





- **Stationäre Therapie** unter **Isolierung** bei offener Tuberkulose
- **Medikamentöse Therapie:** INH + RMP + PZA + EMB über 2 Monate, dann INH + RMP über 4 Monate



| Substanz | Nebenwirkungen |
|--------------------------|---|
| Isoniazid (INH) 200mg | Hepatotoxizität, Neurotoxizität (Polyneuropathie) |
| Rifampicin (RMP) 450mg | Hepatotoxizität, Rotfärbung des Urins und anderer Körperflüssigkeiten |
| Pyrazinamid (PZA) 1500mg | Hepatotoxizität |
| Ethambutol (EMB) 800mg | Optikusneuritis |

IRPE


alle 1x/Tag

- **Meldepflicht**
- Untersuchung unmittelbarer Kontaktpersonen
- Die aktive Impfung mit dem BCG-Impfstoff wird nicht mehr empfohlen.






1. Nov
kulose
11/20
67%



11/20
67%



Säure-Basen-Haushalt +-

Regulation des Säure-Base-Haushalts durch Puffersysteme

Der Mensch besitzt mehrere Puffersysteme, die akute pH-Wert-Schwankungen des Bluts ausgleichen und seinen pH-Wert konstant um 7,4 halten.

Offene Puffersysteme (z.B. über die Lunge oder über die Nieren)

Bicarbonat-Puffersystem und Ammonium-Puffersystem.

Geschlossene Puffersysteme

Proteinpuffersystem, Phosphatpuffersystem

Regulation des Säure-Basen-Haushalts in den Organen

Lungen

Hyperventilation führt durch Abatmen der schwachen Säure CO_2 zu einem pH-Anstieg (Alkalose), während bei Hypoventilation vermehrt CO_2 im Körper verbleibt und es so zu einem pH-Abfall kommt (Azidose)

Nieren

Einerseits scheiden sie überschüssige H^+ -Ionen aus. Andererseits halten sie die HCO_3^- -Konzentration im Blut aufrecht.

Leber

durch NH_3 -Entgiftungsfunktion.

Störungen des Säure-Base-Haushalts

Folgen bei pH-Abweichung

| pH-Abweichung | Stoffwechsel | Elektrolyte | | Durchblutung | O_2 -Affinität des Hämoglobins |
|---------------|--|-----------------|--|------------------|---|
| | | Kalium | Sonstige | | |
| Azidose | Glykolyse: Wird gehemmt | ↑ Hyperkaliämie | Hemmung der Na^+ - K^+ -ATPase | Vasodilatation | Vermindert |
| Alkalose | . Glykolyse: Wird stimuliert . Gluconeogenese: Wird gehemmt | ↓ Hypokaliämie | ↓ Hypokalzämie Ca^{2+} | Vasokonstriktion | Gesteigert |

„Ein pH-Wert des Bluts von $< 7,0$ bzw. $> 7,8$ ist nicht mit dem Leben vereinbar!“

Respiratorisch und metabolisch bedingte Störungen

Für eine pH-Wertstörung ist meist nur eines der zwei Regulationssysteme verantwortlich: die Lunge (respiratorische Störung) oder der Stoffwechsel (metabolische Störung). Das intakt gebliebene System versucht in der Folge, die pH-Abweichung zu kompensieren.

Charakterisierung von Störungen im Säure-Basen-Haushalt

- **Nach Art der pH-Abweichung**
 - **Azidose:** $\text{pH} < 7,35$
 - **Alkalose:** $\text{pH} > 7,45$
- **Nach Auslöser**
 - **Respiratorisch:** Ursächlich ist eine Ventilationsstörung
 - **Repräsentativer Parameter:** PaCO_2 (= CO_2 -Partialdruck im arteriellen Blut)
 - **Metabolisch:** Ursächlich ist eine Stoffwechselstörung
 - **Repräsentative Parameter:** Standard- HCO_3^- und Base Excess (= BE)
- **Nach Verlauf**
 - **Akut:** pH-Wert verändert, pCO_2 **oder** Standard- HCO_3^- verändert
 - **Teilkompensiert:** pH-Wert verändert, pCO_2 **und** Standard- HCO_3^- verändert
 - **Kompensiert:** pH-Wert normal, pCO_2 und Standard- HCO_3^- verändert

Parameter und Ursachen von Störungen im Säure-Basen-Haushalt

| Störung | | pH | PaCO ₂ | HCO ₃ ⁻ | BE | Ursachen | Klinik |
|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------------|----|--|--|
| Resp Azido | Akut | ↓ | ↑ | ↔ | ↔ | Hypoventilation: Asthmaanfall, Lungenödem, Sedativa/Opioide | Dyspnoe, Zyanose |
| | (Teil)kom pensiert | ↓ / ↔ | ↑ | ↑ | + | | |
| Meta Azido | Akut | ↓ | ↔ | ↓ | - | Ketoazidose, Laktatazidose (z.B. bei schwerer körperlicher Arbeit) | Kussmaul-Atmung (tief und beschleunigt), Bewusstseinsstörung |
| | (Teil)kom pensiert | ↓ / ↔ | ↓ | ↓ | - | Niereninsuffizienz, Hyperkaliämie Diarrhö | |
| Respi Alka | Akut | ↑ | ↓ | ↔ | ↔ | Hyperventilation: psychogen, Hypoxämie (z.B. durch Lungenembolie) | Hyperventilation, Tetanie |
| | (Teil)kom pensiert | ↑ / ↔ | ↓ | ↓ | - | | |
| Meta Alka | Akut | ↑ | ↔ | ↑ | + | Hyperaldosteronismus, Hypokaliämie | Bewusstseinsstörung, <u>Hypoventilation</u> |
| | (Teil)kom pensiert | ↑ / ↔ | ↑ | ↑ | + | Erbrechen Medikamentös (Antazida, Schleifendiuretika) | |
| Kombinierte Azidose | | ↓ | ↑ | ↓ | - | Multiorganversagen (Leber- und Nierenversagen) | |

- pH (N: 7,35-7,45), PaCO₂ (N: 32-45 mmHg), HCO₃⁻ (N: 22-26 mmol/L), BE (N: -2 bis +3 mmol/L)

- PaCO₂ und Bicarbonat ändern sich in die gleiche Richtung (außer bei kombinierter Azidose)




Hyperventilation: Extreme Stresssituationen können zu Hyperventilation führen. Das führt zu einer respiratorischen Alkalose (den Betroffenen wird „schwarz vor Augen“). Therapie: Ein- und Ausatmen in eine Plastiktüte.

Anionenlücke

- Errechneter Parameter zur weiteren Abklärung einer metabolischen Azidose.
- **Berechnung**
 - **Anionenlücke = $[Na^+] - ([HCO_3^-] + [Cl^-])$**
 - Normbereich: 12 ± 4 mmol/L
 - Alternativ: **$([Na^+] + [K^+]) - ([HCO_3^-] + [Cl^-])$**
 - Normbereich: 16 ± 4 mmol/L
- **Interpretation:**
 - **Azidose bei normaler Anionenlücke = „Bicarbonatverlust“** (Diarrhö,...)
 - **Azidose bei vergrößerter Anionenlücke = „Additionsazidose“** (Laktatazidose, Ketoazidose, Niereninsuffizienz)

Therapie


- Die Basis der Therapie einer Azidose oder Alkalose ist die **kausale Therapie**
- Ggf. Bikarbonat-Gabe bei pH < 7,20

| Orientierende Normwerte der Blutgasanalyse  | | |
|--|---|--|
| | Arterielle Blutgasanalyse | Venöse Blutgasanalyse |
| <u>pO₂</u> | <ul style="list-style-type: none"> • 65–100 mmHg (8,7–13,3 kPa)  <ul style="list-style-type: none"> ◦ ♂ : 100–0,33 × Alter ± 10 in mmHg ◦ ♀ : 98–0,32 × Alter ± 10 in mmHg | <ul style="list-style-type: none"> • 36–44 mmHg (4,8–5,9 kPa) |
| <u>pCO₂</u> | <ul style="list-style-type: none"> • 32–45 mmHg (4,3–6,0 kPa) | <ul style="list-style-type: none"> • 37–50 mmHg (4,9–6,7 kPa) |
| <u>pH</u> | <ul style="list-style-type: none"> • 7,35–7,45 | |
| <u>Aktuelles Bicarbonat (HCO₃[−])</u> | <ul style="list-style-type: none"> • 22–26 mmol/L | |
| <u>Standardbicarbonat (HCO₃[−])</u> | <ul style="list-style-type: none"> • 22–26 mmol/L | |
| <u>Base Excess (BE)</u> | <ul style="list-style-type: none"> • −2 bis +3 mmol/L | |
| <u>Sauerstoffsättigung</u> | <ul style="list-style-type: none"> • 95–98,5% | <ul style="list-style-type: none"> • 70–80% |
| <u>Sauerstoffgehalt</u> | <ul style="list-style-type: none"> • 180–230 mL/L | <ul style="list-style-type: none"> • 130–180 mL/L |
| <u>Elektrolyte</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Natrium: 135–145 mmol/L • Kalium: 3,6–5,2 mmol/L • Chlorid: 98–106 mmol/L • Calcium (ionisiert): 1,15–1,35 mmol/L | |
| <u>Blutzucker</u> | <ul style="list-style-type: none"> • 55–100 mg/dL (3,1–5,6 mmol/L) | |
| <u>Lactat</u> | <ul style="list-style-type: none"> • 0,6–1,7 mmol/L (5–15 mg/dL) | |
| <u>Hämoglobin</u>  | <ul style="list-style-type: none"> • ♀ : 12–15 g/dL (7,45–9,31 mmol/L) • ♂ : 13,6–17,2 g/dL (8,44–10,68 mmol/L) | |
| <u>Hämatokrit</u> | <ul style="list-style-type: none"> • ♀ : 0,33–0,43 • ♂ : 0,39–0,49 | |
| <u>Osmolalität</u> | <ul style="list-style-type: none"> • 280–300 mosmol/kg H₂O | |

Verschiebungen des Säure-Basen-Haushaltes

| | Respiratorische Azidose | Respiratorische Alkalose | Metabolische Azidose | Metabolische Alkalose |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|
| pH* | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |
| pCO ₂ | ↑ | ↓ | n/ ↓ (Kompensation) | n/ ↑ (Kompensation) |
| HCO ₃ ⁻ | n/ ↑ (Kompensation) | n/ ↓ (Kompensation) | ↓ | ↑ |
| Ursachen | Hypoventilation | Hyperventilation | Hypoxämie, Niereninsuffizienz, Hypovolämie (z.B. durch Blutverlust) u.a. | Erbrechen (Magensaftverlust), Hyperaldosteronismus u.a. |

*Bei einer kompletten Kompensation kann der pH auch normwertig sein. Man spricht dennoch von einer kompensierten Alkalose bzw. Azidose.



CAVE: In dieser vereinfachten Darstellung bleiben gemischte Störungen (kombiniert respiratorisch und metabolisch) unberücksichtigt (z.B. Azidose mit pCO₂↑ und HCO₃⁻↓)!

Pulsoxymetrie +-

Indikation

- Monitoring der Atmung
- Schnelle, nicht-invasive Überprüfung der Sauerstoffversorgung

Interpretation

- **Normwerte:** $saO_2 = 95-99\%$
- **Pathologische Werte :**
 - $saO_2 90-94\%$: Mäßige Hypoxämie → PaO_2 von ca. 80 mmHg
 - $saO_2 85-89\%$: Mittelgradige Hypoxämie → PaO_2 von ca. 60 mmHg
 - saO_2 unter 85%: Hochgradige Hypoxämie → PaO_2 von unter 50 mmHg

„Bei Kohlenmonoxidvergiftung zeigt das Pulsoxymeter falsch-hohe Werte an, da das CO-Hämoglobin nicht vom oxygenierten Hämoglobin unterschieden werden kann!“

Blutgasanalyse +-

BGA

Indikation

- Sauerstoffsättigung $<94\%$
- Verdacht auf Hyperkapnie ↑ CO_2
- Bei Hyperventilation (z.B. als Hinweis auf Lungenembolie)
- Bestimmung, Abklärung und Monitoring des pH-Werts
- Schnelle Hämoglobinbestimmung

Durchführung

- **Arteriell:** Bspw. aus der A. radialis
- **Kapillär:** Einreiben des Ohr läppchens mit hyperämisierender Salbe → 10 min später Punktion mit einer Lanzette
- **Venös:** Gewöhnliche venöse Blutentnahme

Interpretation

- **Normalwerte**
 - pO_2 : 65–100 mmHg : Altersabhängig!
 - pCO_2 : 32–45 mmHg : Altersunabhängig!
 - pH: 7,35–7,45
 - HCO_3^- : 22–26 mmol/L
 - Base Excess: -2 bis +2 mmol/L (bzw. abhängig von der Messmethode auch ± 3 mmol/L).
- **Pathologische Werte**
 - Unter Belastung erniedrigte pO_2 -Werte → **Latente respiratorische Insuffizienz**
 - $pO_2 \downarrow$ = **Respiratorische Partialinsuffizienz**
 - $pO_2 \downarrow$ und $pCO_2 \uparrow$ = **Respiratorische Globalinsuffizienz**
 - **Verschiebungen des Säure-Basen-Haushaltes** (siehe Kurs)

Der **arterielle Sauerstoff-Partialdruck** (paO_2) ist der Teildruck (Partialdruck) des im arteriellen Blut gelösten Sauerstoffs als Anteil am Gesamtdruck aller im Blut gelösten Gase.

Normalwerte (bei 21 % Sauerstoff in der Einatemluft) sind arteriell gemessen etwa 70 bis 90 mm Hg (9,3–12 kPa), gemischtvenös ca. 35–40 mm Hg (4,6–5,3 kPa)

Die **Sauerstoffsättigung** (sO_2) (des Hämoglobins) gibt an, wie viel Prozent des gesamten Hämoglobins im Blut mit Sauerstoff beladen sind.

| Normwerte | | |
|----------------|--------------|---------|
| | pO_2 | sO_2 |
| arteriell: | 71–100 mm Hg | 94–97 % |
| gemischtvenös: | 36–44 mm Hg | 65–82 % |

Befundung eines Röntgen-Thorax +/-

Beschreiben einer Pathologie

- Seite
- **Lokalisation** : Silhouettenphänomen
- **Anzahl** : Einzelne Läsion? Multiple Läsionen?
- **Verteilung** : Fokal? Diffus?
- **Dichte** : Aufhellung? Verschattung?
- **Größe**
- **Abgrenzbarkeit** : Scharf abgrenzbar? Unscharf abgrenzbar?
- **Form** : Oval. Rund. Spiculiert
- **Muster** : Alveolär. Interstitiell. Homogen

Prüfung der Patientendaten und der Qualität (SIRI : Strahlengang, Inklusion, Rotation, Inspiration)

Strahlengang

- **Posterior-anteriorer Strahlengang** (kurz: **p.a.-Strahlengang**) → Standardaufnahme
- **Anterior-posteriorer Strahlengang** (kurz: **a.p.-Strahlengang** = „Liegendaufnahme“)
 - Nachteil: das Herz wirkt es vergrößert und die Herzhänder sind unscharf begrenzt
- **Lateraler Strahlengang** = Seitenaufnahme : Ergänzung zu einer p.a.- oder a.p.-Aufnahme

Inklusion (Vollständigkeit der Aufnahme)

Rotation (Zentrierung einer Aufnahme)

- **Zentrierte Aufnahme**
 - Die sternalen Klavikula-Enden sollten den gleichen Abstand zu einer gedachten Linie durch die Processus spinosi der Wirbelkörper haben
 - Eine gedachte Linie durch die Processus spinosi sollte sich mittig auf die Trachea projizieren
- **Fehlrotierte Aufnahme**

Inspiration

- Die rechte Zwerchfellkuppel sollte sich in der Medioklavikularlinie auf die **dorsalen Anteile der 10./11. Rippe** oder die **ventralen Anteile der 5./6. Rippe** projizieren
- Projiziert sich die Zwerchfellkuppel weiter oberhalb → Hinweis auf eine mangelhafte Inspiration, einen Zwerchfelldruckstand oder einen subpleuralen Erguss
- Projiziert sich die Zwerchfellkuppel weiter unterhalb → Ggf. V.a. eine Überblähung der Lunge (Asthma, Emphysem)
- Bei mangelhafter Inspiration können bspw. Rundherde maskiert werden.

Artefakte

- Adipositas → Vortäuschung eines Pleuraergusses
- Haare in Projektion auf die obere Thoraxapertur → Vortäuschung eines Weichteilemphysems
- Kraniokaudal verlaufende Hautfalten → Vortäuschen einer Pleuralinie und damit eines Pneumothorax
- Außen aufliegende Knöpfe an der Kleidung des Patienten → Vortäuschung intrapulmonaler Raumforderungen

Penetration (Belichtung des Röntgenbildes)

- Bei einem optimal belichteten Röntgenbild sollte hinter dem Mediastinum die Kontur der Wirbelkörper sichtbar sein

„Röntgen-Aufnahme des Thorax im p.a.-Strahlengang vom 30.03.2015 von Frau Mustermann, geb. am 29.06.1988. Es liegen keine Voraufnahmen zum Vergleich vor. Alle relevanten Strukturen sind abgebildet, die Aufnahme ist nicht fehlrotiert und es wurde ausreichend inspiriert.“

Fremdkörper

- **Magensonde** : Korrekte Lage >10 cm distal des ösophagogastralen Übergangs

- **Tubus**
 - Korrekte Lage : In der Trachea, 5 cm (± 2 cm) oberhalb der Karina
- **Zentraler Venenkatheter**
 - Korrekte Lage : Die Katheterspitze sollte im unteren Drittel der Vena cava superior liegen. Die Spitze des Katheters sollte sich etwa auf Höhe der Carina tracheae projizieren
- **Thoraxdrainage**
 - Korrekte Lage : Drainage-Löcher innerhalb des Thorax
 - Pleuraerguss \rightarrow posteroinferiore Lage
 - Pneumothorax \rightarrow anterosuperiore Lage
- **Herzschrittmacher** : 2 Elemente: Aggregat und Elektroden
- **Sonstige Fremdkörper** : EKG-Elektroden, Stents, Klappenersatzmaterial, Osteosynthesematerial, Drahtcerclage, Gefäßclips

„Rechts jugulär wurde ein ZVK eingebracht, dessen Spitze sich auf den kavoatrialen Übergang projiziert.“

Thoraxwand

Weichteile (Haut, Unterhautfettgewebe und Muskulatur, Mammæ und Mamillen)

- **Hals- und Thoraxweichteile**
 - Umschriebene Verdichtungen \rightarrow Hinweis auf Weichteiltumor, Weichteilhämatom
 - Streifige Aufhellung \rightarrow Hinweis auf Weichteilemphysen
- **Mammæ und Mamillen**
 - Mammascatten beidseits abgrenzbar?
 - Anamnestisch Z.n. Mastektomie?

Knochen (Humeri, Scapulae, Claviculae, Rippen, Wirbelkörper, Sternum)

- **Vollständigkeit** des Thoraxskeletts
- Vorliegen **kongenitaler Veränderungen** : Halsrippe, Trichterbrust (Seitenaufnahme), Skoliose, Rippenusuren bei Aortenisthmusstenose

„Die abgebildeten knöchernen Anteile weisen - soweit bei Hartstrahltechnik beurteilbar - keine Pathologien auf. Die Weichteile stellen sich ebenfalls unauffällig dar.“

Zwerchfell und Oberbauch

Zwerchfell

- Die rechte Zwerchfellkuppel steht aufgrund der darunterliegenden Leber etwa 2–4 cm höher als die linke Zwerchfellkuppel

Oberbauch

- **Magenblase**
 - Transparente Fläche mit Luft-Flüssigkeits-Spiegel unter der linken Zwerchfellkuppel
 - Abstand zwischen oberer Zwerchfellbegrenzung und Mageninnenwand sollte maximal 1 cm betragen
 - **Darmanteile**: transparente Areale in Projektion auf das gesamte Abdomen
 - **Leber**: Homogene, dichte Fläche unter der rechten Zwerchfellkuppel
- „Das Zwerchfell ist scharf abgrenzbar und die beiden Zwerchfelloberflächen nach oben hin konvex. Es ist keine freie Luft unter den Zwerchfelloberflächen erkennbar.“*

Pleura

- Die Pleura sollte allseits der Thoraxwand anliegen
 - Die Pleura sollte an keiner Stelle sichtbar werden
 - Ausnahme: Fissura horizontalis in p.a.- und Seitenaufnahme und Fissurae obliquae in Seitenaufnahme
 - Die Randwinkel sollten spitz sein
- „Die Pleura liegt allseits der Thoraxwand an. Es ist kein Pneumothorax oder Pleuraerguss erkennbar.“*

Atemwege und Lunge

Atemwege

- **Trachea**
 - Schlauchförmige Aufhellung
 - Mittelständig, im unteren Bereich evtl. minimal nach rechts verschoben

- Frei einsehbar ohne Stenosen
- **Bronchien** : Der rechte Hauptbronchus verläuft steiler nach kaudal als der linke Hauptbronchus

Lunge

Anatomische Strukturen


- Rechte Lunge
 - Drei Lungenlappen: Oberlappen, Mittellappen, Unterlappen
 - Fissura obliqua trennt Ober- und Mittellappen vom Unterlappen
 - Fissura horizontalis trennt Oberlappen und Mittellappen
- Linke Lunge
 - Zwei Lungenlappen: Oberlappen mit Lingula-Segment, Unterlappen
 - Fissura obliqua trennt Oberlappen und Unterlappen
- Lungengefäße



Oberlappen



Unterlappen



Mittellappen

Beurteilung

- **Lunge**
 - **1. Schritt:** Pathologien erkennen → Liegen Verschattungen oder Aufhellungen vor?
 - **2. Schritt:** Pathologien lokalisieren → Abgrenzen der vier Silhouetten : Rechter Herzrand. Linker Herzrand. Rechte Zwerchfellhälfte. Linke Zwerchfellhälfte
 - **3. Schritt:** Pathologien beschreiben → siehe dazu Beschreiben einer Pathologie
- **Lungengefäße**
 - Physiologischerweise verjüngen sich die Lungengefäße zunehmend von zentral nach peripher (=hilifugale Kaliberreduktion), so dass 2 cm subpleural keine Gefäße mehr erkennbar sind.
 - Im Stehen sind die kaudalen Lungenabschnitte aufgrund der Schwerkraft in der Regel stärker perfundiert als die kranialen Lungenabschnitte, daher haben die Gefäße der kaudalen Lungenabschnitte einen größeren Durchmesser als die Gefäße der kranialen Lungenabschnitte.
 - Liegt der Patient, kommt es zu einer Umverteilung der Lungendurchblutung: Die kranialen Gefäße sind stärker durchblutet und ihr Durchmesser vergrößert sich.

„Die Trachea ist mittelständig und die Bronchien sind frei einsehbar. Die Lungen sind seitengleich frei belüftet.“

Hilusregion

Rein anatomisch gesehen gehören zu den Strukturen des Hilus die Lungengefäße, die Hauptbronchien und Lymphknoten. In einem Röntgen-Normalbefund sind jedoch hauptsächlich die Pulmonalarterien sowie die Oberlappenvenen an der Formgebung des Hilus beteiligt.

- **Position**
 - In der Regel steht der linke Hilus 2 cm höher als der rechte Hilus
 - In seltenen Fällen stehen beide Hili gleich hoch
 - Steht jedoch der rechte Hilus höher als der linke, sollte an einen pathologischen Prozess gedacht werden, der die Lage des Hilus auf einer Seite verändert
 - Ist die Position eines Hilus verändert, stellt sich die Frage, wodurch die Lageänderung zustande gekommen ist
- **Abgrenzbarkeit** : Beide Hili sollten mit ihren Gefäßen scharf abgrenzbar sein

- **Dichte und Größe**

- Beide Hili sollten eine ähnliche Dichte aufweisen
- Beide Hili sollten in etwa gleich groß sein
- Größenbestimmung der Interlobärarterie rechts: physiologischerweise <16 mm (Männer) bzw. <15 mm (Frauen)
- Die Größe der linken Pulmonalarterie kann vor allem im Seitbild beurteilt werden, Grenzwerte existieren hier jedoch nicht

„Die Hili sind beidseits regelrecht konfiguriert.“

Mediastinum

Das Mediastinum projiziert sich mittelständig auf den Thorax und besteht aus einer Vielzahl von anatomischen Strukturen, die jedoch nicht alle für die Röntgenanatomie relevant sind. Kommt es durch eine Raumforderung zu einer Konturveränderung des Mediastinums, ist heutzutage in der Regel ein CT zur weiteren Abklärung indiziert.

Anatomische Strukturen

- Im Röntgenbild sichtbare Strukturen : Herz, Aorta, Gefäße, Trachea und Hauptbronchien
- Normalerweise nicht im Röntgenbild sichtbar : Ösophagus. Beim Kind: Thymus

Radiologische Darstellung

- **p.a.-Aufnahme**

| Rechter Mediastinalrand (von kranial nach kaudal) | Linker Mediastinalrand (von kranial nach kaudal) |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Vena brachiocephalica - Vena cava superior - Rechter Vorhof | <ul style="list-style-type: none"> - A. subclavia sinistra - Aortenbogen - Truncus pulmonalis - Linkes Herzohr - Linker Ventrikel |

- **Seitliche Aufnahme**

| Ventraler Mediastinalrand (von kranial nach kaudal) | Dorsaler Mediastinalrand (von kranial nach kaudal) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Prätrachealer Streifen - Aufsteigende Aorta - Rechtsventrikulärer Ausflusstrakt - Rechter Ventrikel | <ul style="list-style-type: none"> - Trachea - Linker Vorhof - Linker Ventrikel - Vena cava inferior (= "Cava-Dreieck") |

Beurteilung

- **Oberes Mediastinum**

- Trachea mittelständig und nicht stenosierte
- Normale Breite des oberen Mediastinums
- Normale Konfiguration der mediastinalen Silhouette

- **Unteres Mediastinum**

- Scharfe Abgrenzbarkeit der Mediastinalränder
- Normale Konfiguration der mediastinalen Silhouette

- **Herzgröße**

- **HTQ** (=Herz-Thorax-Quotient) = **CTR** (= „cardio thoracic ratio“)
- Maximaler horizontaler Herzdurchmesser wird in Relation zum maximalen horizontalen Innendurchmesser des Thorax gesetzt (Herzdurchmesser/Thoraxdurchmesser)
- Wert sollte unter 0,5 liegen
- Sonderfall: Liegendaufnahme (Artifizielle Vergrößerung des Herzens)

- **Vorgehen**

- **1. Schritt:** Mediastinalränder in der p.a.-Aufnahme abgrenzen
- **2. Schritt:** Mediastinalränder in der Seitenaufnahme abgrenzen
- **3. Schritt:** In der Seitenaufnahme Zuordnung von Pathologien zu den mediastinalen Kompartimenten

„Das Mediastinum ist mittelständig und die Konturen des Mediastinums sind scharf abgrenzbar. Es gibt keine Hinweise auf eine Raumforderung. Die Herzgröße ist physiologisch.“

Klinische Untersuchung der Lunge +- ^{nach}

Inspektion und Palpation

Perkussion (Klopfschall)

- **Physiologisch: Sonorer Klopfschall**
- **Pathologisch**
 - **Hypersonorer Klopfschall**: Lungenemphysem, Asthma bronchiale, Pneumothorax
 - **Gedämpfter Klopfschall** (bzw. hyposonorer Klopfschall): Pneumonie, Pleuraerguss

Auskultation

Atemgeräusche

- **Physiologisch**
 - **Zentrales Atemgeräusch = Bronchialatmen** (über der Trachea) <https://youtu.be/sGh-3DBBX2k>
 - pathologisch wenn auch in der Peripherie auskultierbar, z.B. bei Pneumonie
 - **Peripheres Atemgeräusch = Vesikuläres Atemgeräusch** (über die Bronchiolen)
- **Pathologisch**
 - **Abgeschwächtes Atemgeräusch** ^{od. aufgehobene}: Pleuraerguss, Pneumothorax, Lungenemphysem, Asthma bronchiale <https://youtu.be/2t-RqGOqQ7s>
 - **Silent lung** („silent chest“)

Nebengeräusche

- **Feuchte Geräusche**
 - **Feinblasig, klingend**: Bei Pneumonie <https://youtu.be/WkyObszjHn0>
 - **Grobblasig**: Bei Lungenödem, Bronchiektasen <https://youtu.be/2kd-m1yrHhI>
- **Trockene Geräusche (Stridor)** <https://youtu.be/aRlc578x4hU>
 - **Expiratorischer** Stridor oder expiratorisches Giemen und Brummen bei Obstruktionen der intrathorakalen Atemwege: **Asthma bronchiale, COPD**
 - **Inspiratorischer** Stridor durch Verengung der extrathorakalen Atemwege: **Epiglottitis, Pseudokrapp, Fremdkörperaspiration**
- Beidseitiges, basales, **inspiratorisches Knisterrasseln** bei Lungenfibrose
- **Pleurareiben** bei Pleuritis sicca <https://youtu.be/uYgEgJRDTfw>

Auswurf

- **Weiß-glasig**: Virale Infektion
- **Weiß-schaumig**: Lungenstauung/-ödem
- **Gelb-grün**: Bakterielle Infektion
- **Blutig**: Schwerer Infekt, Malignom

Giemen <https://youtu.be/i8QGs6xAyMk>
Brummen <https://youtu.be/-rUXOV0US3M>

Die **paradoxe Atmung** ist eine **pathologische** Form der **Atmung**, bei der sich die beteiligten Strukturen aufgrund **intrathorakaler** Druckverhältnisse entgegen ihrer **physiologischen** Richtung beim Atmen bewegen, d.h. die **Inspiration** geht mit einer Einziehung des **Thorax** und die **Expiration** mit einer Auswärtsbewegung des Thorax einher.

Differentialdiagnostik auf der Basis der pulmonalen Untersuchungsbefunde

| | Leitsymptome | Palpation | | Perkussion | Auskultation | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| | | Atem exkursion | Stimm fremitus | | Bronchophonie | Atmung |
| Physiologisch | - | symmetrisch | normal | sonor | normal | vesikulär |
| Pleuraerguss | ggf. Dyspnoe | asymmetrisch | vermindert | gedämpft | vermindert | abgeschwächt |
| Lungenödem | schwere Dyspnoe | symmetrisch | evtl. verstärkt | gedämpft | evtl. verstärkt | feuchte (grobblasige) RGs |
| Pneumothorax | akute Dyspnoe | asymmetrisch | aufgehoben/ vermindert | hypersonor | aufgehoben/ vermindert | aufgehobenes/ abgeschwächtes Atemgeräusch |
| Asthma bronchiale¹ | anfallsartige Dyspnoe, Giemen | symmetrisch | je nach Zustand | hypersonor | je nach Zustand | Giemen, verlängertes Expirium, ggf. abgeschwächt |
| COPD¹ | chronischer Husten | symmetrisch | | ggf. hypersonor | | Giemen, verlängertes Expirium bei Obstruktion, abgeschwächt bei Emphysem |
| Pneumonie² | Fieber, Dyspnoe | symmetrisch | verstärkt | ggf. gedämpft | verstärkt | feuchte (feinblasige) RGs, Bronchialatmen in der Lungenperipherie |
| Lungen emphysem | chronische Dyspnoe | symmetrisch, gering | vermindert | hypersonor | vermindert | abgeschwächt |
| Lungenfibrose | Schwäche, Dyspnoe | symmetrisch | normal, tlw. verstärkt | gedämpft | normal, tlw. verstärkt | basales inspiratorisches Knisterrasseln |
| Atelektase | ggf. Schmerzen | asymmetrisch | vermindert | gedämpft | vermindert | abgeschwächt |
| Lungenembolie¹ | akute Dyspnoe, Tachykardie | symmetrisch | normal | normal | normal | normal |
| Tumor^{1,2,3} | unspezifisch, Hämoptyse, B-Symptome | ggf. asymmetrisch | ggf. vermindert | ggf. gedämpft | ggf. vermindert | ggf. abgeschwächt |

Im Rahmen der Erkrankung häufiges Auftreten von: ¹Pneumonie, ²Pleuraerguss, ³Atelektase

Sonstiges +/-

Asthma bronchiale

- Chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, die mit einer **reversiblen** bronchialen Obstruktion und/oder mit einem hyperreagiblen Bronchialsystem einhergeht.
- Das **klinische Bild** ist variabel: Es reicht von leichten Verläufen mit nur rezidivierendem Husten oder Räsperzwang bis hin zu intermittierend (ggf. anfallsartig) auftretender Luftnot mit pfeifender Atmung und auskultatorischem Giemen und Brummen.
- **Diagnostisch** wegweisend sind v.a. die **Anamnese** sowie die Befunde von **Lungenfunktionsdiagnostik** (Spirometrie: $FEV1 \downarrow$, Tiffeneau-Index ($FEV1/FVC$) \downarrow = Obstruktive Ventilationsstörung. Bronchospasmodysmetest) und **Allergiediagnostik** (Prick-Test, IgE im Serum).
- Die **Genese** ist multifaktoriell, sodass es diverse **Einteilungen** gibt. Die wichtigste Unterform ist das **allergische Asthma bronchiale** (Meist im Kindesalter), das neben der rein symptomatischen Therapie auch kausal mittels Allergenkarrenz und spezifischer Immuntherapie (sog. „Hyposensibilisierung“) behandelt werden kann. Andere Formen : **Belastungsasthma**, **Analgetika-Asthma** (Samter-Trias : Asthma bronchiale. Chronische Sinusitis und Polyposis nasi. Intoleranz gegenüber COX-1-Hemmern wie Aspirin)
- **Dauertherapie** : inhalative Corticosteroide (ICS : Budesonid). Ggf. langwirksame β_2 -Agonisten (LABA : Formoterol). Ggf. zusätzlich Langwirksame Anticholinergika (LAMA). Eine gute Patientenschulung ist essentiell, insb. zur richtigen Applikation der Substanzen und zum Vorgehen im Notfall. Je nach Verlauf ist eine Eskalation oder Deeskalation der Medikation anhand des Stufenschemas sinnvoll.
- **Akuttherapie bei Exazerbation und Asthmaanfall** : Sitzende Position, Lippenbremse, O₂-Gabe, SABA inhalativ (Salbutamol), Glucocorticoide p.o. oder i.v. (Prednisolon). Ggf. Anticholinergika. Ggf. Intubation und invasive Beatmung

Mediastinalverbreiterung

- **obere Thoraxapertur**: Lymphome, Struma
- **vorderes Mediastinum**: Thymom, Lymphome, Magenhernie, Struma
- **mittleres Mediastinum**: Ösophaguskarzinom, Lymphome, Hiatushernie, entzündliche Adenopathie
- **hinteres Mediastinum**: neurogene Tumoren, Wirbelmetastasen, Lymphome



Sarkoidose (Morbus Boeck)

- Multisystemerkrankung mit der Lunge als Hauptmanifestationsort. Sie kann jedoch auch zahlreiche andere Organe befallen.
- Das sog. **Löfgren-Syndrom**, eine akute, meist selbstlimitierende Form der Sarkoidose, geht mit Fieber und der Trias aus Gelenkschmerzen, Erythema nodosum sowie bilateraler Lymphadenopathie einher und betrifft hauptsächlich junge Frauen.
- Die häufigere **chronische Sarkoidose** verläuft anfangs häufig symptomarm (ggf. **Reizhusten**, **Belastungsdyspnoe**). Schon früh zeigen sich jedoch radiologisch Veränderungen in der Lunge sowie eine Verschlechterung der Vital- und Diffusionskapazität. **Im Verlauf kann es zu einer Lungenfibrose kommen.**
- **Diagnostisch** stehen die **histologische** Sicherung von betroffenem Gewebe (Nachweis von **nicht-verkäsenden Granulomen mit mehrkernigen Riesenzellen**) sowie eine **bronchoalveoläre Lavage** (typischerweise erhöhter CD4/CD8-Quotient) im Vordergrund.
- **Therapie**: Bei akuter Sarkoidose kann aufgrund der hohen Spontanheilungsrate eine **symptomatische Therapie** mit NSAR ausreichend sein. Chronische Sarkoidose wird ebenso wie extrapulmonale Manifestationen **immunsuppressiv** (Glucocorticoide, andere Immunsuppressiva) behandelt.

Als Lippenbremse (auch dosierte Lippenbremse) wird eine spezielle Atemtechnik bei Erkrankung des Bronchialsystems (Asthma bronchiale, Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)) bezeichnet. Hierbei wird gegen die locker aufeinanderliegenden Lippen ausgeatmet. Der dadurch erhöhte Widerstand bei der Ausatmung sorgt für einen Luftrückstau, welcher den Luftdruck in den Bronchien erhöht und einen Kollaps der Atemwege verhindert.^[1] Dies ermöglicht zusätzlich einen vermehrten Schleimabtransport.

| Ablauf | Schwere der Exazerbation | | |
|---|--|---|---|
| | Leichte bis mittelschwere Exazerbation | Schwere Exazerbation | Lebensbedrohlicher Asthmaanfall |
| Klinische Zeichen und diagnostische Parameter | <ul style="list-style-type: none">• Sprechen unbeeinträchtigt• Atemfrequenz (AF) <25/min• Herzfrequenz (HF) <110/min• PEF ≥50% des PBW | <ul style="list-style-type: none">• Sprechen durch Dyspnoe beeinträchtigt• AF ≥25/min• HF ≥110/min• PEF <50% des PBW | <ul style="list-style-type: none">• Kein Atemgeräusch („Silent Lung“)• Frustrane Atemarbeit• Zyanose• Bradykardie/Hypotension• Erschöpfung, Verwirrtheit, Koma• PEF <33% des PBW• SaO₂ <92%• PaCO₂ >45 mmHg |
| Initialtherapie | <ul style="list-style-type: none">• Atemerleichternde Manöver (bspw. Lippenbremse) und Körperposition (sitzende Position mit aufgestützten Armen für den Einsatz der Atemhilfsmuskulatur)• Inhalative kurzwirksame β₂-Sympathomimetika, bspw. Salbutamol 100 µg/Hub inhalativ 2–4 Hübe bei Bedarf (am besten über Spacer), Wiederholung nach 10 min möglich; alternativ über Vernebler 1,25–2,5 mg• Ziel: Normalisierung von AF und HF sowie PEF >70% | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Glucocorticoide p.o. Prednisolon 20–25 mg p.o., einmalig | <ul style="list-style-type: none">• Glucocorticoide p.o. oder i.v. (bei Kindern ggf. rektal)• Sauerstoffgabe• Ggf. Ipratropiumbromid inhalativ 0,5 mg inhalativ zur Vernebelung oder 4 Hübe (80 µg) aus Dosieraerosol | <ul style="list-style-type: none">• Prednisolon 1–2 mg/kgKG p.o., i. oder rektal (bei Erwachsenen bspw. 50–100 mg i.v.) alle 4–6 Stunden |
| Zusätzliche Maßnahmen | | | <ul style="list-style-type: none">• β₂-Sympathomimetika parenteral<ul style="list-style-type: none">◦ Terbutalin s.c.◦ oder Reproterol i.v.• Magnesiumsulfat i.v.• Bei metabolischer Azidose mit pH <7,2: Bicarbonat^[14]• Im Ausnahmefall: Theophyllin i.v. (CAVE: Intoxikation!)• Je nach Klinik: Intubation und invasive Beatmung<ul style="list-style-type: none">◦ Verschlechterung des PEF◦ Hypoxämie◦ Hyperkapnie◦ Azidose◦ Erschöpfung/Verwirrtheit◦ Koma/Atemstillstand |
| Versorgung | <ul style="list-style-type: none">• Ambulante Versorgung | <ul style="list-style-type: none">• Stationäre Aufnahme erwägen | <ul style="list-style-type: none">• Umgehend stationäre Aufnahme und intensivmedizinische Betreuung! |
| | <ul style="list-style-type: none">• Bei unzureichendem Therapieansprechen nach 30–60 min: Stationäre Aufnahme, ggf. mit intensivmedizinischer Betreuung | | |

The Mediastinum



Mediastinalverbreiterung

- **obere Thoraxapertur:** Lymphome, Struma
- **vorderes Mediastinum:** Thymom, Lymphome, Magenhernie, Struma
- **mittleres Mediastinum:** Ösophaguskarzinom, Lymphome, Hiatushernie, entzündliche Adenopathie
- **hinteres Mediastinum:** neurogene Tumoren, Wirbelmetastasen, Lymphome


Aspergillose








- Sammelbezeichnung für Erkrankungen, die von der Gruppe der Aspergillen-Schimmelpilze (Insb. *Aspergillus flavus* und *fumigatus*) ausgehen.
- Die Pilze verfügen über ein hohes allergenes Potenzial und können eine **allergische bronchopulmonale Aspergillose** mit **asthmatischen Beschwerden** auslösen. Eine weitere Pathologie in der Lunge stellt das **Aspergillom** dar, bei dem sich der Pilz in bereits bestehenden Höhlen – meistens Emphyseme oder Kavernen (Tuberkulose!) – ausbreitet. Bei Immunsuppression kann es zur **Aspergilluspneumonie** und septischer Streuung mit einem disseminierten Organbefall kommen.
- **Therapie:** Medikamentös wird meist mit **Voriconazol** oder **Amphotericin B** therapiert, ein Aspergillom ist in der Regel operativ zu entfernen.


Gastrologie - Viszeralchirurgie


Aufbau

- Abschnitte des Magens
 - **Pars cardiaca (Mageneingang)**: Einmündung des Ösophagus in den Magen (= Ostium cardiacum)
 - **Z-Linie** (gastrooesophagealer Übergang): Makroskopisch sichtbarer Übergang vom mehrschichtigen Plattenepithel des Ösophagus zum einschichtigen hochprismatischen Epithel des Magens
 - **Fundus gastricus (Magenkuppel)**: Kuppelförmige Vorwölbung als höchste Stelle des Magens (berührt das Zwerchfell); im Stehen sammelt sich dort Luft an, die im Röntgenbild als sog. Magenblase sichtbar ist
 - **Corpus gastricum (Magenkörper)**: Hauptabschnitt des Magens
 - **Pars pylorica (Magenausgang)**: Gliedert sich in drei Abschnitte
 - **Antrum pyloricum**
 - **Canalis pyloricus**
 - **Pylorus**
- Krümmungen
 - Große Kurvatur (Curvatura gastrica major): Großer konvex geformter Rand des Korpus
 - Kleine Kurvatur (Curvatura gastrica minor): Kleiner konkav geformter Rand des Korpus
 - Im unteren Drittel befindet sich ein Knick (Incisura angularis), der den Übergang vom Korpus in die Pars pylorica darstellt
- Flächen: Vorderwand (= Paries anterior) und Hinterwand (= Paries posterior)
- Form
 - Hakenmagen: Häufigste Form ("J"-förmig)
 - Langmagen: Weit nach kaudal reichend
 - Stierhornmagen: Annähernd horizontal liegend



| | Kleine Kurvatur | Große Kurvatur | Fundus | Hinterwand |
|---|--|---|---|--|
| | Gefäßversorgung | | | |
| Arteriell  | <ul style="list-style-type: none">• A. gastrica sinistra direkt aus dem Truncus coeliacus• A. gastrica dextra aus der A. hepatica propria oder aus der A. hepatica communis | <ul style="list-style-type: none">• A. gastroenteralis dextra aus der A. gastroduodenalis• A. gastroenteralis sinistra aus der A. splenica | <ul style="list-style-type: none">• Aa. gastricae breves aus der A. splenica | <ul style="list-style-type: none">• A. gastrica posterior aus der A. splenica  |
| Venös  | <ul style="list-style-type: none">• V. gastrica sinistra in die V. portae• V. gastrica dextra in die V. portae | <ul style="list-style-type: none">• V. gastroenteralis dextra in die V. mesenterica superior• V. gastroenteralis sinistra in die V. splenica | <ul style="list-style-type: none">• Vv. gastricae breves in die V. splenica | <ul style="list-style-type: none">• V. gastrica posterior |
| Innervation | | | | |
| Sympathisch | <ul style="list-style-type: none">• Ganglion coeliacum (Fasern aus dem N. splanchnicus major und N. splanchnicus minor) | | | |
| Parasympathisch  | <ul style="list-style-type: none">• Truncus vagalis anterior und posterior aus dem rechten und linken N. vagus  | | | |
| Sensibel | <ul style="list-style-type: none">• Afferente Fasern, die gemeinsam mit den efferenten sympathischen Fasern ziehen  | | | |
| Lymphabfluss | | | | |
| Lymphstationen  | <ul style="list-style-type: none">• Nll. gastrici dextri und sinistri• Nll. splenici• Nll. gastroenterales dextri und sinistri• Nll. hepatici• Nl. cardiacus• Nll. pylorici | | | |





| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Zelltypen des Magens

| | Magen-Hauptzellen | Nebenzellen | Parietalzellen (= Belegzellen) <i>(in Magenfundus)</i> | Gastritis Typ A |
|-------------|--|---|---|-----------------|
| Zytoplasma | <ul style="list-style-type: none"> Basophil | <ul style="list-style-type: none"> Blass | <ul style="list-style-type: none"> Azidophil | |
| Aktivierung | <ul style="list-style-type: none"> Durch Acetylcholin (über muscarinerge Cholinozeptoren) und Gastrin | <ul style="list-style-type: none"> Kontinuierliche Produktion | <ul style="list-style-type: none"> Durch Acetylcholin (über muscarinerge Cholinozeptoren), Histamin und Gastrin | |
| Sekret | <ul style="list-style-type: none"> Pepsinogene | <ul style="list-style-type: none"> Mucine (Glykoproteine) | <ul style="list-style-type: none"> Protonen und Chlorid-Ionen (Salzsäure bzw. HCl) Intrinsic-Faktor (IF) | |
| Funktion | <ul style="list-style-type: none"> Spaltung der mit der Nahrung aufgenommenen Proteine | <ul style="list-style-type: none"> Bildung eines Schleimteppichs | <ul style="list-style-type: none"> Ermöglicht Resorption von Vitamin B₁₂ HCl-Sekretion in das Magenlumen | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Magenkarzinom +++

Epidemiologie


- **Geschlecht:** ♂ = ♀
- **Alter:** Häufigkeitsgipfel jenseits (*au-delà*) des 50. Lebensjahres, mittleres Erkrankungsalter bei 70–75 Jahren
- **Verbreitung:** Erhebliche regionale Unterschiede: Gehäuftes Vorkommen in Teilen Südamerikas sowie Asiens. Inzidenz **nimmt** in den USA und **Westeuropa ab**

Ätiologie (Risikofaktoren)

- **Exogene Risikofaktoren**
 - Hoher Nitratgehalt in der Nahrung (getrocknete, gesalzene, geräucherte Speisen) *fumé*
 - Alkohol- und Nikotinabusus
 - Niedriger sozioökonomischer Status
- **Endogene Risikofaktoren**
 - Typ-B-Gastritis (*Helicobacter-pylori*-Infektion)
 - Typ-A-Gastritis
 - Ulcus ventriculi
 - Morbus Ménétrier
 - Z.n. Magenteilresektion
 - Positive Familienanamnese
 - Blutgruppe A
- **Abweichende Risikofaktoren für Karzinome des gastroösophagealen Überganges**
 - Übergewicht
 - Gastroösophageale Refluxkrankheit

Klassifikation (TNM-Klassifikation des Magenkarzinoms)

| TNM | Ausdehnung |
|---|------------|
| Tis: Carcinoma <u>in situ</u> : Basalmembran wird nicht überschritten. Keine Metastasierung! | |
| T1: Auf Mukosa (a) und Submukosa (b) begrenzt (Metastasierung möglich!) | |
| T2: Infiltration der Muscularis | |
| T3: Infiltration der Subserosa | |
| T4: Durchbruch Serosa (a) mit Infiltration benachbarter Strukturen (b) | |
| N1: 1–2 regionäre Lymphknoten | |
| N2: 3–6 regionäre Lymphknoten | |
| N3: > 7 regionäre Lymphknoten | |
| M1: Fernmetastasen, Peritonealkarzinose | |



Adenokarzinome des gastroösophagealen Übergangs (AEG-Karzinome)

- Siewert-Klassifikation


Symptome/Klinik

Das Magenkarzinom ist meist ein „stummer“ Tumor. Die Beschwerden sind oft diskret und unspezifisch. In späteren Stadien sind folgende Symptome am ehesten hinweisend:

- **Allgemeinsymptome**
 - Gewichtsabnahme
 - Chronische Eisenmangelanämie *Blutung*
 - Abneigung (*aversion*) gegen Fleisch *نفور/القيء*
- **Gastrointestinale Symptome**
 - Oberbauchbeschwerden (Völlegefühl, Nüchternschmerz)
 - Blutungszeichen (ggf. Teerstuhl, Hämatemesis)
- **Bei weit fortgeschrittenem Tumor**
 - Evtl. fastbarer Tumor im Oberbauch
 - Hepatomegalie, Aszites
 - Tast- oder sichtbare Virchow-Drüse (= **Virchow-Lymphknoten**: Links supraklavikulär)

| Typ | Lokalisation | Hinweise |
|-----------------|---|---|
| Siewert Typ I | Zentrum der Raumforderung 1–5 cm oberhalb der Z-Linie (meistens aus Barrett-Situationen hervorgehend) | <ul style="list-style-type: none"> • Lymphabfluss mediastinal • Tumoren infiltrieren die Kardia von oral • OP-Prinzip: transthorakale subtotale Ösophagektomie |
| Siewert Typ II | Zentrum der Raumforderung 1 cm über bis 2 cm unter der Z-Linie („klassisches Kardiakarzinom“) | <ul style="list-style-type: none"> • OP-Prinzip: Transhiatal erweiterte Gastrektomie |
| Siewert Typ III | Zentrum der Raumforderung 2–5 cm unterhalb der Z-Linie | <ul style="list-style-type: none"> • Tumoren infiltrieren die Kardia von aboral • OP-Prinzip: Gastrektomie |

AEG
Adenokarzinomen
des
Ösophagogastrinalen
Übergangs



- Kompartiment I : perigastrische Lymphknoten entlang der großen und kleinen Kurvatur
- Kompartiment II: Lymphknoten entlang des Truncus coeliacus
- Kompartiment III : paraaortale und mesenteriale Lymphknoten

Verlaufs- und Sonderformen

Metastasierung

- **Lymphogen**
 - Alle lokalen Lymphknoten (große/kleine Kurvatur)
 - Lymphknoten im Bereich des Truncus coeliacus, paraaortal, mesenterial
- **Hämatogen**: Leber, Lunge, Skelettsystem, Gehirn
- **Infiltration von Nachbarstrukturen** *per Contiguitatem*
 - Peritonealkarzinose
 - Ösophagus, Colon transversum, Pankreas etc.

Ein Krukenberg-Tumor ist eine Metastase eines gastrointestinalen Karzinoms in den Ovarien oder im Douglas-Raum.

intra cava • **Abtropfmetastasen** : In den Ovarien (**Krukenberg-Tumor**) , *Peritonealkarzinose*

Ca. 70% der Patienten mit Magenkarzinom haben zum Zeitpunkt der Diagnose bereits Lymphknotenmetastasen!

Stadien (Stadieneinteilung der UICC (Union for International Cancer Control))

Stadium 0 : Tis (Carcinoma in situ). Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV : T4 oder N3 oder M1

Diagnostik

Labor

- **Eisenmangelanämie**
- **Tumormarker** zur Primärdiagnostik nicht geeignet; aber zur Verlaufskontrolle verwertbar, wenn bei Erstdiagnose Erhöhungen bestanden: **CA 72-4, CA 19-9, CEA**

Apparative Diagnostik

- **Gastroskopie** (Mittel der Wahl)
 - Makroskopische Beurteilung der Tumorausdehnung
 - Mehrfachbiopsien tumorverdächtiger Areale

Staging des Magenkarzinoms

- **Abdomen-Sonographie** (Ggf. Kontrastmittel-Sonographie): **Lebermetastasen?** **Aszites** als Hinweis auf Peritonealkarzinose ?
- **Endosonographie**
 - Einschätzung der **Tiefenausdehnung des Tumors** und Beurteilung lokaler **Lymphknoten**
 - Erlaubt **keinen** sicheren Ausschluss von Lymphknotenmetastasen
- **CT-Abdomen und -Becken** mit Kontrastmittel-Gabe iv und oral: **Peritonealkarzinose?** Lokoregional- und Fernmetastasen?
- **CT-Thorax** : **Lungenmetastasen?**
- Ggf. **Laparoskopie** : bei unklarem Lymphknotenstatus oder fraglicher Peritonealkarzinose

Staging
Abd. Sono
Endosono
CT- TAP

Pathologie

Grading nach Laurén

- **Intestinaler Typ** (50%): Polypöses, drüsig differenziertes Wachstum, klar begrenzt
- **Diffuser Typ** (40%): Infiltratives Wachstum mit diffuser Ausbreitung in der Magenwand, schlecht begrenzt
- **Mischtyp** (10%)

Histologisch (WHO)

- **Adenokarzinome** (90%), aus Drüsenepithel
 - **Siegelringzellkarzinom** : Diffuses Wachstum

Krukenberg-Tumor

Differentialdiagnosen

- Magenulkus
- Chronische Gastritis
- Morbus Ménétrier (Riesenfaltengastritis)
- Andere Magentumoren (**MALT- Lymphome**, **Sarkome**)
- **Gastrointestinaler Stromatumor (GIST)** : Semimaligner Tumor des Gastrointestinaltrakts (insb. Magen und Dünndarm), aus Mesenchym (embryonales Bindegewebe)
- Funktionelle Dyspepsie : Ausschlussdiagnose



| UICC-Stadium | TNM-Klassifikation des Magenkarzinoms | | |
|--------------|---------------------------------------|--|--|
| Stadium 0 | Tis (Carcinoma in situ) | Lamina epithelialis- | Basismembran nicht überschritten |
| Stadium IA | T1 N0 M0 | T1 Mukosa und Submukosa | T _{1,2} , N ₀ |
| Stadium IB | T1 N1 M0 | T2 Muskularis infiltration | T _{1,1} , N ₁ |
| | T2 N0 M0 | N ₁ <2 Regionale Lymphknoten | |
| Stadium II | T1 N2 M0 | | T ₁ , N ₂ |
| | T2 N1 M0 | T3 Infiltration Subserosa | T ₂ , N ₁ |
| | T3 N0 M0 | N ₂ 3-6 regionale LN | T ₃ , N ₀ |
| Stadium IIIA | T2 N2 M0 | | |
| | T3 N1 M0 | T ₄ Durchbruch der Subserosa(a) Infiltration benachbarter Strukturen(b) | T ₂ , N ₂ |
| | T4 N0 M0 | | T ₃ , N ₁ , N ₂ |
| Stadium IIIB | T3 N2 M0 | | T ₄ , N ₀ |
| | | | |
| Stadium IV | T1-T3 N3 M0 | N ₃ ≥ 7 LN | N ₃ |
| | T4 N1-3 M0 | M ₁ Fernmetastasen, Peritonealkarzinose | M ₁ |
| | Tx Nx M1 (jede Fernmetastasierung) | | T ₄ , N ₁ |

Staging

Intraepitheliale Neoplasien (früher Dysplasien) des Magens und gastroösophagealen Übergangs werden nach WHO in Low-Grade und High-Grade unterschieden.

Histopathologisches Grading (Differenzierungsgrad): Untersuchung in wieweit sich die Tumorzellen von normalem Magengewebe unterscheiden:

| Grading | Beschreibung und Prognose |
|---------|--|
| G1 | Schleimhaut ist gut differenziert oder ausgereift (low grade, niedriges Risiko) |
| G2 | Schleimhaut ist mäßig differenziert |
| G3 | Schleimhaut ist schlecht differenziert (high grade, hohes Risiko) |
| G4 | Schleimhaut ist undifferenziert (keine Ähnlichkeit mit ausgereiften gesunden Körperzellen) |

Laurén-Klassifikation

| Typ | Beschreibung | Prognose |
|-------------------------|--|--|
| Intestinaler Typ (40 %) | häufig Adenokarzinom; der Tumor wächst polypös (pilzförmig) in den Magen vor und ist gut begrenzt; erst spät Lymphknotenmetastasen. | günstig, da häufig heilbar |
| Diffuser Typ (50 %) | häufig undifferenziertes Karzinom; der Tumor infiltriert (dringt ein) diffus die Magenwand und ist schlecht begrenzt; früh Lymphknotenmetastasen | ungünstig wegen früher Metastasierung, selten heilbar |
| Mischtyp (10 %) | Mischtyp | je infiltrativer das Wachstum, desto schlechter die Prognose |

Tis lamina epithelialis
 Peritoneumbrone wird
 nicht überschritten

T1 auf
 a Mucosa und
 b submucosa
 begrenzt

T2
 Infiltration
 der Muskularis

T3
 Infiltration
 der Serosa

T4
 Durchbruch der
 a Serosa und
 b Infiltration
 benachbarter
 Strukturen

TNM

Magen GA

N1

1-2
 Regional-LK

N2

3-6
 Regional-LK

N3 ⇒ IV

≥ 7
 Regional-LK

M

Fremdmetastasen

Primäres Karzinom

UICC

0

Tis

I

T1, N0,1

T2, N0

II

T1, N2

T2, N1

T3, N0

III

T2, N2

T3, N1,2

T4, N0

IV

T1, N3

T2, N3

T3, N3

T4, N1,2,3

Tx, Nx, M1

Tis → 0

T1

N0

N1

N2

N3

T2

N0

N1

N2

N3

T3

N0

N1

N2

N3

T4

N0

N1,2,3

D2

die radikale Entfernung aller Lymphknoten im Bereich der großen und kleinen Kurvatur, der Kardia, des Omentum majus, des Pankreaskopfes und Duodenums, des Truncus coeliacus, des Lig. hepatoduodenale und der Milz.

Therapie

Endoskopische Resektion (in kurativer Intention)

- **Bis T1a** (N0M0) *nicht metastatisierten intramukosalen Magenfrühkarzinomen*

Chirurgische Resektion (in kurativer Intention)


- **Ab T1b (NxM0) bis T3**: sofern Operabilität und Resektabilität gegeben
 - **Radikale Gastrektomie mit D2-Lymphadenektomie** (Kompartimente I und II)
 - **Mitresektion von Omentum minus und majus**
 - **Passagewiederherstellung i.d.R. durch Roux-Y-Anastomose** (mit Ösophagojejunostomie und Duodenojejunostomie)
 - **Alternativ: Subtotale Gastrektomie** *4/5 vier Fünftel CA der unteren Drittel des Magens → Kleinen Antrumkarzinomen*
- **Keine R0-Resektion**: Kurative Nachresektion mit dem Ziel R0 ist anzustreben, ggf. unter neoadjuvanter Therapiestrategie

Perioperative Therapie (in kurativer Intention)


- **Ab T3**
- Kombination aus neoadjuvanter und adjuvanter (Radio-)Chemotherapie

Palliative Therapie

- **Bei nicht resektablem Tumor** (T4, insb. T4b, M1, N3) *73% Infiltration benachbarter Strukturen* oder inoperablem Patienten
- **Mögliche Maßnahmen:**
 - Analgetische Therapie
 - Chemotherapie
 - **Endoskopische Passagewiederherstellung** (durch PEG-Sonde oder Stenteinlage)
 - *Palliative Resektion*
 - *Umgehung Anastomose*




D1



entlang der

- Kleine Kurvatur
- Große Kurvatur


D2




entlang des

- Tr. coeliacus
- A. hepatica
- A. lienalis
- A. gastrica sinistra

D3




- Paraaortal
- retroduodenal
- retroperitoneal
- Mesenterialachse
- interaortocaval
- Nierenstiel links




Regeleingriff bei Magenkarzinom

Gastrektomie mit D1 / D2 Lymphadenektomie



entlang der großen
und kleinen Krümmungen



entlang des Truncus celiacus

Gastrektomie und Lymphadenektomie

Die Operation des Primärtumors ist zentrales Element der kurativen Therapie. Ziel der Operation ist das Erreichen einer R0-Situation. Betreffend der Lymphadenektomie wurde in der westlichen Welt ein Konsens erzielt, dass Patient*innen mit normalen operativen Risiken eine D2 Lymphadenektomie erhalten sollten. D1-Resektion beinhaltet die Entfernung der perigastrischen Lymphknoten; bei D2-Lymphadenektomie werden zusätzlich die Lymphknoten entlang der Arteria gastrica sinistra, Arteria hepatica communis, Arteria splenica und der zöliakalen Achse entfernt [52]. Langzeitergebnisse einer randomisierten Studie aus den Niederlanden zeigten eine niedrigere lokale Rezidivrate und ein besseres Krebs-spezifisches Überleben nach D2- versus D1-Lymphadenektomie [96]. Die aktuelle UICC/AJCC TNM (8. Edition) Klassifikation empfiehlt die Entfernung und Untersuchung von mindestens 15 Lymphknoten für ein verlässliches Staging [105]. In der aktuellen S3 Leitlinie zum Magenkarzinom wird die Entfernung von mindestens 25 Lymphknoten als adäquat betrachtet [10].

Die Operation sollte an einem spezialisierten high-volume Zentrum mit ausreichender chirurgischer Expertise und perioperativer Betreuung durchgeführt werden soll [10].

Zahlreiche Studien belegen eine bessere kurzfristige Überlebenschance für Patient*innen, die an Zentren mit ausgewiesener Expertise behandelt werden. Auch die Langzeitüberlebenschancen sind signifikant besser [15, 16, 17, 27]. Die perioperative Morbidität und Letalität soll nicht über 15% bzw. 3% liegen [26]. Das Konzept der „enhanced recovery“ wird in den Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society Guidelines dargestellt und umfasst alle Aspekte einer optimierten perioperativen Betreuung [69].

Bei Patient*innen nach Gastrektomie ist lebenslang eine regelmäßige parenterale Substitution von Vitamin B12 erforderlich

Komplikationen

Komplikationen nach Magen(teil-)resektion

- **Rezidiv-Karzinom** → Tumornachsorge!
- **Anastomoseninsuffizienz, Abszess**
- **Postgastrektomie-Syndrom**
 - **Maldigestion** nach Magenresektion mit funktionellem Ausfall des Duodenums
 - **Folgen und Therapie**
 - Eiweiß- und Kohlenhydratmangel : Gabe von Pankreasenzymen zu den Mahlzeiten
 - Fettstühle bei Malabsorption von Fetten → Gabe von Pankreasenzymen zu den Mahlzeiten
 - Eisenmangel → Gabe von Eisen
 - Perniziöse Anämie → Gabe von Vitamin B₁₂
- **Dumping-Syndrome**

Abdominelle Beschwerden und Kreislaufstörungen durch fehlende Pylorusfunktion (Prävention : Konstruktion eines Pouches bei Ösophagojejunostomie)

 - **Frühdumping**
 - Auftreten **ca. 20 min** nach Nahrungsaufnahme : Abdominelle Schmerzen, Übelkeit, Diarrhö, **Hypovolämie** mit Schocksymptomatik
 - **Ursache**: Schnelle, unverdünnte Nahrungspassage in den Dünndarm → **Hyperosmolalität im Dünndarm**
 - **Therapie**
 - Kleine Mahlzeiten
 - Nach dem Essen eine halbe Stunde bis Stunde hinlegen
 - Meist nach einigen Monaten spontane Besserung
 - **Spätdumping**
 - Auftreten **ca. 1-3 h** nach Nahrungsaufnahme : Kaltschweißigkeit, Übelkeit, Schock
 - **Ursache**: Glucose wird schnell resorbiert → Hyperglykämie → überschießende Insulinfreisetzung → **Hypoglykämie**
- **Schlingen-Syndrome** (Loop-Syndrome) *effektiv*
 - **Syndrom der abführenden Schlinge** : durch Abknickung oder Einengung
 - Erbrechen, Völlegefühl
 - Abwarten, ggf. operative Therapie
 - **Syndrom der blinden Schlinge** : durch bakterielle Fehlsiedlung
 - Diarrhö, Steatorrhö
 - **Antibiotische Therapie**, ggf. operative Therapie *alternativ*
 - **Syndrom der zuführenden Schlinge** : durch Abknickung oder Einengung
 - **Galliges Erbrechen** mit Besserung danach
 - Operative Therapie

Prognose

- Da das Magenkarzinom häufig keine Frühsymptome aufweist, erfolgt die Diagnosestellung in 60% der Fälle erst in einem fortgeschritteneren Stadium, in dem eine kurative Therapie nicht mehr möglich ist → **insgesamt schlechte Prognose**

Cholelithiasis, Cholezystitis und Cholangitis +++

Die häufigsten Komplikationen der Cholezystolithiasis sind die Cholezystitis und, bei Steinabgang in die Gallenwege, die Choledocholithiasis. Die akute Cholezystitis erfordert neben einer antibiotischen Therapie die Durchführung einer Cholezystektomie binnen 24 Stunden. Bei einer Choledocholithiasis liegt infolge einer Obstruktion und Stase begleitend fast immer eine eitrige Cholangitis vor, sodass neben einer Steinextraktion und Restitution des Galleflusses per ERCP eine antibiotische Therapie erforderlich ist. Als weitere schwere Komplikation der Choledocholithiasis kann eine biliäre Pankreatitis auftreten.

Definition

- **Cholelithiasis** = Gallensteine (unabhängig von der Lokalisation)
Wenn symptomatisch = Gallensteinleiden
 - **Cholezystolithiasis** = Steine in der Gallenblase
 - **Choledocholithiasis** = Steine im Ductus choledochus (Hauptgallengang)
- **Cholezystitis** = Entzündung der Gallenblase
- **Cholangitis** = Entzündung der Gallenwege

Epidemiologie

- **Cholelithiasis** :
 - Prävalenz: Etwa 15–20% in der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland
 - Geschlecht: ♀ > ♂ (2:1)

„Ein Fünftel der erwachsenen Deutschen hat eine Cholelithiasis – ein Fünftel dieser Gallensteinträger werden im Laufe des Lebens symptomatisch oder erleiden eine Komplikation!“

Ätiologie (Pathogenese)

Cholelithiasis

- **Substanzen in der Gallenflüssigkeit** ^{علم المرز} **Lösungsungleichgewicht** der in der Gallenflüssigkeit enthaltenen Substanzen
 - Steinbildend: Cholesterin, Calciumcarbonat, Bilirubin
 - Lösend: Gallensäuren, Lecithin
- **Steinarten**
 - Cholesterinsteine und gemischte Steine (80%), hoher Cholesterinanteil, weich
 - Bilirubinstein (10%), sehr hart
 - Calciumcarbonatstein (10%)
- **Risikofaktoren**
 - **6 x F-Regel** (insb. für Cholesterinsteine)
 - Fat (Adipositas)
 - Female (weiblich)
 - Fertile (Fruchtbarkeit)
 - Forty (Alter >40 Jahre)
 - Fair (hellhäutig)
 - Family (Familienanamnese, genetische Prädisposition)
 - **Grunderkrankungen mit vermehrter Gallensteinbildung**
 - Gallensäureverlust-Syndrom z.B. bei Morbus Crohn oder nach Resektionen des terminalen Ileums (*Cholesterinsteine*)
 - Hämolytische Anämien (Bilirubinsteine)
 - Hyperparathyreoidismus (Calciumcarbonatsteine)

Cholezystitis

- **Erreger (bakteriell)**: gramnegative Stäbchen (E. coli, Klebsiella, Enterobacter), Anaerobier
- **Akute kalkulöse Cholezystitis**: 90% durch Steinbildung mit Stase und Obstruktion
- **Akalkulöse Cholezystitis** (Stressgallenblase): Bei schweren Krankheiten, Operationen und Traumata
 - **Chronische Cholezystitis**: Folgezustand von (wiederholten) akuten Cholezystitiden, die narbig verheilen
 - Extremformen: Schrumpfgallenblase (narbig atrophiert) und Porzellangallenblase (narbig verkalkt)

Cholangitis

- **Aszendierende bakterielle Infektion**: Durch aufsteigende Bakterien aus dem Duodenum
- **Risikofaktoren**: Steine, Strikturen, Stenosen (z.B. tumorbedingt), ERCP

iatrogenisch

Symptome/Klinik

Symptomatische Cholezystolithiasis

Kein einzelnes Symptom ist alleine spezifisch genug, um die Art des Gallensteinleidens definitiv zu bestimmen. Geleitet von Wahrscheinlichkeiten und der Zusammenschau mit bildgebenden und labormedizinischen Befunden sind Symptomatik und Verlauf jedoch für jede Therapieentscheidung relevant.

- **Leitsymptom : Gallenkolik**
 - Starke, kolikartige Schmerzen im rechten Oberbauch oder Epigastrium
 - Ausstrahlung : Rechte Schulter und Rücken
 - Triggerfaktor : Oft nach fettreichen Mahlzeiten
 - Dauer : 15 min – 5 h
 - Ggf. Druckschmerz
- Übelkeit, Erbrechen. Ggf. Völlegefühl

„- Gallenkoliken mit einer Dauer von >5 Stunden sprechen für ein kompliziertes Gallensteinleiden!“

- Die Hälfte aller symptomatischen Patienten entwickelt binnen eines Jahres nach der ersten Gallenkolik ein Rezidiv oder eine Komplikation!“

Cholezystitis

- Schmerzen im rechten Oberbauch (> 5 h). Ggf. Druckschmerz
- Übelkeit, Erbrechen
- **Fieber**
- **Murphy-Zeichen**

„Große Konkrement begünstigen eher eine Cholezystitis, kleinere Konkrement verursachen hingegen eher eine Choledocholithiasis und/oder Pankreatitis!“

Choledocholithiasis

- Schmerzen tendenziell stark und kolikartig. Druckschmerz eher diffus
- Ggf. gürtelförmige Ausstrahlung als Hinweis auf eine biliäre Pankreatitis
- **Ikterus** bei extrahepatischer Cholestase
- Heller Stuhl, dunkler Urin
- Pruritus bei längerem Bestehen
- Ggf. **Fieber** (bei Cholangitis)

„Eine Choledocholithiasis und eine Cholangitis liegen häufig gemeinsam vor!“

Cholangitis

- **Charcot-Trias II**
 - Rechtsseitige Oberbauchschmerzen
 - Ikterus
 - Fieber
- **Ggf. Biliäre Sepsis:** (siehe Sepsis)

„Die voll ausgeprägte Charcot-Trias zeigt sich höchstens bei einem Drittel der Patienten – durch Sonographie und Laborwerte kann die diagnostische Sicherheit erheblich gesteigert werden!“




Verlaufs- und Sonderformen


Gallenblasenhydrops

- **Definition:** Prall-elastische Vergrößerung der Gallenblase (Transversaldurchmesser >5 cm)
- **Ursachen**
 - **Zystikus-Obstruktion:** Durch Sludge, Konkrement oder Strikturen
 - **Obstruktion durch externe Kompression:** Korrelat des **Courvoisier-Zeichens**, bspw. durch Malignome (Pankreaskarzinom, cholangiozelluläres Karzinom)
- **Therapie:** Bei Zeichen der Cholezystitis entsprechende Therapie, bei asymptomatischen Formen ohne Auffälligkeiten der Wandung Ursachenabklärung

Mirizzi-Syndrom

- **Definition:** Kompression des Ductus hepaticus communis (= Lebergang) durch Steine im Gallenblasenhals oder im Ductus cysticus (= Gallenblasengang). Durch eine Penetration des Steines sind Fistelungen zwischen Gallenblase und Hauptgallengang möglich (Komplikation : Gallensteinileus)





Gallenblasenhydrops

- Definition: Prall-elastische Vergrößerung der Gallenblase (Transversaldurchmesser >5 cm)
- Ursachen
 - Zystikus-Obstruktion: Durch Sludge, Konkrement oder Strikturen, hierbei i.d.R. symptomatisch und mit fließendem Übergang in eine Cholezystitis
 - Obstruktion durch externe Kompression: Korrelat des Courvoisier-Zeichens, bspw. durch Malignome (Pankreaskarzinom, Cholangiokarzinom)
- Differenzialdiagnose: Atonie Gallenblase, bspw. nach parenteraler Ernährung oder bei diabetischer Neuropathie
- Therapie: Bei Zeichen der Cholezystitis entsprechende Therapie, bei asymptomatischen Formen ohne Auffälligkeiten der Wandung Ursachenabklärung

- **Klinik:** Symptome wie bei Choledocholithiasis
- **Diagnostik**
 - **Abdomensonographie:** Konkrement im Ductus cysticus bzw. Gallenblasenhals, **Dilatation der intrahepatischen Gallenwege**
 - **Endosonographie oder MRCP, ERCP**
- **Therapie:** **Cholezystektomie**, laparoskopisches Vorgehen möglich, bei schwierigen Präparationsverhältnissen Wechsel auf offenes Verfahren häufig
- Ggf. kombiniertes Vorgehen mit Gangsanierung per ERCP bei Nachweis von residualen Gangsteinen nach der Cholezystektomie

Diagnostik

Anamnese

- **Schmerzen:** (OPQRST-Schema)
- **Auffälligkeiten von Stuhlgang oder Miktio:** Insb. heller, acholischer Stuhl oder dunkler, rostroter Urin
- **Begleitsymptome:** Völlegefühl, Fieber, Übelkeit, Erbrechen

Untersuchung des Abdomens

- Inspektion, Auskultation, Perkussion, Palpation
- **Murphy-Zeichen:** (Leitsymptom der Cholezystitis!) schmerzbedingter Abbruch der Inspiration bei Palpation des rechten Oberbauchs.
- **Druckschmerz über Epigastrium bzw. rechtem Oberbauch:** Bei allen Formen möglich
- **Abwehrspannung und Resistenzen:** Hinweis auf eine Peritonitis (bei Cholezystitis oder Cholangitis) → dringliche OP

Abdomensonographie

- Mittel der 1. Wahl
- Augenmerk auf intra- und extrahepatische Gallenwege, Gallenblase und ggf. darstellbare Konkreme
- Sensitivität bei Cholezystolithiasis: Nahezu 100%
- Sensitivität bei Choledocholithiasis: Ca. 50%
- **Ausschluss von DD**

Labor

- Blutbild, Kreatinin, Harnstoff, Natrium, Kalium, (Calcium, Phosphat)
- **Leberwerte und Cholestasezeichen:** AST, ALT, GGT, AP, Bilirubin, Lipase
- **Hämolyseparameter:** LDH
- **Entzündungszeichen:** CRP, (PCT)
- **Gerinnungsstatus:** Quick, PTT

Differentialdiagnostische Einordnung

- **Zusammenschau der Befunde aus Klinik, Sonographie und Labor erlaubt fast immer die richtige Diagnosestellung!**
- „Cholezystitis, Choledocholithiasis und Cholangitis können auch gleichzeitig vorliegen“

Erweiterte Diagnostik

- **Endosonographie**
 - **Indikationen**
 - V.a. **Choledocholithiasis** und uneindeutigen Befunden in Sonographie und Labor
 - V.a. **Raumforderungen im pankreatikobiliären System**
 - **Therapeutische Konsequenz**
 - Bei Mikrolithiasis: ERCP mit **Papillotomie** und **Gangsanierung** durch Steinextraktion, Cholezystektomie im Anschluss
 - Bei Cholezystitis: ERCP, auch nach OP zur **Sanierung residualer Mikrolithen** in den Gallenwegen
- **Oder MRT bzw. MRCP**
 - **Indikation:**
 - V.a. **Choledocholithiasis** und uneindeutigen Befunden in Sonographie und Labor
 - V.a. **papillenferne Pathologien** (z.B. auch Mirizzi-Syndrom)

- **Therapeutische Konsequenz:** Bei Mikrolithiasis im Gangsystem → ERCP zur Papillotomie und Gangsanierung

„Ob eine Endosonographie oder MRCP bei Verdacht auf eine Mikrolithiasis zum Einsatz kommt, hängt im Wesentlichen von der lokal verfügbaren Expertise ab!“

- **ERCP: Kein Primärdiagnostikum**, eher zur therapeutischen Intervention bei Nachweis einer Gallengangsobstruktion

„Bei gleichzeitigem Fehlen von klinischen (Ikterus), laborchemischen **und** sonographischen (DHC-Erweiterung) Zeichen einer Choledocholithiasis ist die diagnostische Sicherheit in etwa gleich hoch wie bei Nachweis der Steinfreiheit per ERCP“

- **Ggf. Röntgen-Abdomen oder CT-Abdomen** : bei V.a. Gallensteinileus

Befundkonstellationen bei biliären Erkrankungen

| | Klinik | Sonographie | Labor |
|----------------------------|--|--|--|
| Cholezystolithiasis | - Kolik - ggf. Druckschmerz | Konkremente in Gallenblase mit dorsalem Schallschatten, ggf. Sludge | Blande |
| Cholezystitis | - Schmerz - Fieber - Murphy-Zeichen | Gallenblase auffällig! - Wandverdickung > 3mm (postprandial > 5mm) - Dreischichtung der Wand, ggf. mit umgebender freier Flüssigkeit - Konkremente | - Entzündungszeichen : Leukozytose, CRP↑, PCT↑ - Ggf. leichter Anstieg der Transaminasen - Keine Cholestase! |
| Choledocholithiasis | - Koliken - diffuser Druckschmerz - Ikterus - Ggf. gürtelförmiger Oberbauschmerz | Gallenwege auffällig! - DHC-Durchmesser erweitert ≥ 7 mm - Intrahepatische Gallenwege erweitert - Ggf. Gangkonkremente 50% Sensitivität | - Cholestasezeichen : AP↑, GGT↑, Bilirubin↑. - I.d.R. Transaminasen↑ - Ggf. Lipase↑ bei biliärer Pankreatitis - Entzündungswerte normal |
| Cholangitis | - Charcot-Trias : Fieber, Ikterus, Rechtsseitiger Oberbauschmerz - Zeichen der Sepsis | Gallenwege auffällig: Wie bei Choledocholithiasis | - Cholestase: Wie bei Choledocholithiasis - I.d.R. Transaminasen↑ - Entzündungszeichen : Leukozytose, CRP↑, PCT↑ - Ggf. Lipase↑ bei biliärer Pankreatitis |

Wahrscheinlichkeit einer simultanen Choledocholithiasis bei Cholezystolithiasis

- **Hohe Wahrscheinlichkeit:** Klinik, Labor und Gallenwege auffällig! → **ERCP**
- **Mittlere Wahrscheinlichkeit:** Nur teilweise auffällige Befunde → **Endosono oder MRCP**
- **Niedrige Wahrscheinlichkeit:** Klinik, Labor und Gallenwege unauffällig → **keine weitere Diagnostik**

Differentialdiagnosen (außerhalb der biliären Organe)

- **Abdominell**
 - Akute Leberkapselschwellung (z.B. bei akuter Hepatitis, Stauungsleber)
 - Gastroösophagealer Reflux, Gastritis, Ulcus ventriculi/duodeni
 - Appendizitis
 - Akute Pankreatitis
 - Gallenblasenpolyp
- **Extraabdominell**
 - Insb. Nephrolithiasis
 - Hinterwandinfarkt
 - Pneumonie

Therapie

Allgemeine Maßnahmen (für alle Formen)

- Nahrungskarenz
- Parenterale Volumenzufuhr (ggf. parenterale Ernährung)
- Spasmolytika (Butylscopolamin)
- Analgetika (z.B. Metamizol)
- Ggf. Thromboseprophylaxe

Asymptomatische Cholezystolithiasis (Zufallsbefund)

- **I.d.R. keine Indikation zur Cholezystektomie!**
- Ausnahme-Indikationen:

- **Chronische Cholezystitisformen** mit Ausbildung einer Porzellangallenblase bzw. Schrumpfgallenblase

- **Gallenblasenpolypen >1 cm Durchmesser**

- **Gallensteine ≥3 cm Durchmesser**

„Gallenblasensteine, die den Patienten nicht stören, sollten bei Fehlen von Risikofaktoren für Malignität (große Polypen, chronische Cholezystitis) auch den behandelnden Arzt nicht stören!“

Symptomatische Cholezystolithiasis

- **Frühzeitige, elektive Cholezystektomie**
- **Medikamentöse Litholyse bzw. Steinprophylaxe:** In der Akutsituation und auch zur generellen Prophylaxe nicht empfohlen, da häufig nutzlos!

Cholezystitis und Cholangitis

- **Bei jeder akuten Cholezystitis oder Cholangitis:** Antibiotische Therapie und Intervention durch Operation (Cholezystitis) bzw. ERCP (Choledocholithiasis)
 - **Kombinationstherapie:** Ceftriaxon + Metronidazol
 - **Bei Zeichen der Sepsis:** Piperacillin/Tazobactam (breiteres Spektrum)
- **Bei akuter Cholezystitis**
 - **Frühzeitige Cholezystektomie binnen 24 Stunden**
 - **Nur noch in Ausnahmefällen:** konservative Therapie (insb. bei schwer kranken Patienten mit hohem Operationsrisiko zu erwägen)
 - **Vorgehen:** Analgesie und Nahrungskarenz gefolgt von einer Cholezystektomie im entzündungsfreien Intervall binnen sechs Wochen

Choledocholithiasis



- **Antibiotische Therapie** bei begleitender Cholangitis
- **Primäre Endoskopische Intervention: ERCP** (endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie)
 - Zur Darstellung und Extraktion von Gallensteinen (Diagnostik und Therapie in einer Sitzung!)
 - **Prinzip**
 - Kontrastmitteldarstellung der Gallenwege und/oder Pankreasgänge nach Sondieren der Vaterschen Papille
 - Nach Kontrastmittelgabe: Röntgen-Durchleuchtung
 - **Leitbefund bei Choledocholithiasis:** Gangkonkremente zeigen sich als Kontrastmittelaussparung *filling defect*
 - **Therapeutisches Vorgehen**
 - **Papillotomie**
 - **Steinextraktion**
 - **Ultima ratio:** Chirurgisches Vorgehen mit Cholezystektomie und Gallengangsrevision
 - **Komplikationen:** 10%
 - 1% Perforation (insb. nach Papillotomie)
 - 3% Blutung (insb. nach Papillotomie)
 - 3% Cholangitis
 - 5% Pankreatitis

- Bei **asymptomatischer Choledocholithiasis (Zufallsbefund)**: Individuelle Entscheidung zur endoskopischen Intervention (ERCP)
- Bei **symptomatischer Choledocholithiasis und gleichzeitig vorliegender Cholezystolithiasis**
 - Zunächst: Endoskopische Intervention (ERCP)
 - Folgend: Cholezystektomie innerhalb **von 72 Stunden**

Cholezystektomie

Laparoskopische Cholezystektomie (Standardverfahren)

- **Kontraindikationen**
 - **Absolut:** Gallenblasenkarzinom
 - **Relativ:** Blutgerinnungsstörung, Mirizzi-Syndrom, intraperitoneale Verwachsungen nach Voroperationen
- **Durchführung**
 - **Rückenlage** des Patienten in **Allgemeinnarkose** (Intubationsnarkose)
 - Einbringen der **Trokare** zunächst durch Insufflation von **Kohlendioxid** aufgefüllt. Dies führt zur Anhebung der Bauchdecke und schafft ausreichend Platz für die Übersicht mit der endoskopischen Optik und das Einführen und Hantieren der Instrumente.
 - **Anheben der Leber und Darstellung der Gallenblase**
 - **Präparation des Calot-Dreiecks** = Anatomischer Raum gebildet aus Ductus cysticus, Ductus hepaticus communis und Leberunterfläche
 - **Unterbindung des Ductus cysticus sowie der A. cystica**
 - **Absetzung und Bergung der Gallenblase**
 - Bauchdeckenverschluss
 - Steriler Verband
- **Vorteile:** kleine Narbe, wenige Narbenbrüchen
- **Nachteile:** keine Möglichkeit der Gallengangsrevision



Konventionelle bzw. „offene“ Cholezystektomie

- Der häufigste Grund für ein offenes Operationsverfahren ist der Wechsel (Konversion) von der laparoskopischen Cholezystektomie (in 5% der Fälle)

| Absolute Indikationen | Relative Indikationen |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Intoleranz eines Pneumoperitoneums • Gallenblasenkarzinom | <ul style="list-style-type: none"> • Ausgeprägte intraabdominelle Adhäsionen • Blutgerinnungsstörung • Mirizzi-Syndrom |

- **Zugangsweg:** Rippenbogenrandschnitt rechts
- **Vorteile:** Möglichkeit der Gallengangsrevision und Drainageneinlage
- **Nachteile:** größere Narbe, größere Inzidenz von Narbenbrüchen

Komplikationen der Cholezystektomie

- **Verletzung des Ductus hepatocholedochus oder eines Ductus hepaticus oder der A. hepatica**
- **Galleleck:** Sekretion von Gallenflüssigkeit in die Bauchhöhle (Biliom)
- **Blutung**
- **Verletzung umliegender Organe** (Darm, Leber)
- **Perforation der Gallenblase**
- **Peritonitis**
- Wundheilungsstörung, Abszess
- Thrombose, Embolie

Postcholezystektomiesyndrom

- Anhaltende oder neu aufgetretene Oberbauchbeschwerden nach Cholezystektomie (Bis zu 50%)
- **Ätiologie**
 - Operationsbedingt (als Komplikationen der Cholezystektomie)
 - Residuale Choledocholithiasis nach Cholezystektomie
 - Sphincter-Oddi-Dysfunktion, Papillenstenose
- **Therapie:** Befundabhängig

„Die beste Prävention eines Postcholezystektomie-Syndroms ist die richtige Indikationsstellung zur Cholezystektomie.“

Komplikationen

- **Entzündlich**

- **Extremformen der akuten Cholezystitis** (hohe Gefahr der Perforation, dringliche Cholezystektomie-Indikation)

- Gallenblasenempyem = Eiteransammlung mit Ausfüllung der Gallenblase
- Gallenblasengangrän

- **Nach Jahren mit wiederholten akuten Cholezystitiden (Chronische Cholezystitis)**

- Porzellangallenblase
- Schrumpfgallenblase

- Leberabszess

- Cholangitis und Choledocholithiasis

- **„Mechanisch“**

- Gallenblasenperforation → Peritonitis

- Gallensteinileus

- Mechanischer Ileus bei Obstruktion durch abgegangenen Gallenstein
- Typisches Zeichen: Aerobilie

- Akute Pankreatitis biliärer Genese

- Gallenstein-Rezidiv



Laparoskopische Cholezystektomie

Die laparoskopische Entfernung der Gallenblase geht mit geringeren postoperativen Schmerzen, einem besseren kosmetischen Ergebnis (kleinere Narben), einer schnelleren Erholung für den Patienten, einem kürzeren stationären Aufenthalt und früherer Arbeitsfähigkeit einher. Daher werden heutzutage 8 von 10 Cholezystektomien in dieser Technik durchgeführt.

Absolut kontraindiziert sind laparoskopische Operationen allerdings bei Gallenblasenperforationen in die freie Bauchhöhle, Karzinomverdacht, schweren Begleiterkrankungen (z. B. Herz- und Lungenerkrankungen, die eine Erhöhung des intraabdominellen Drucks durch das Pneumoperitoneum nicht zulassen) und begleitender Pancreatitis.

Relative Kontraindikationen sind ein Gallenblasenempyem, Vernarbungen nach chronischer Entzündung, eine Schrumpfgallenblase, endoskopisch nicht entfernbare Gallengangskonkremente sowie Rezidiveingriffen im Oberbauch (evtl. narbige Strukturen).

Vorbereitung: Neben den allgemeinen Operationsvorbereitungen (entsprechend der konventionellen Cholezystektomie) müssen insbesondere die o. g. Kontraindikationen ausgeschlossen werden. Der Patient muss des Weiteren darüber aufgeklärt werden, dass intraoperativ u. U. eine Laparotomie notwendig werden kann.

Vorgehen: Wie bei allen laparoskopischen Operationen (S. 84) werden ein Pneumoperitoneum angelegt sowie Optik und Arbeitstrokare unter Sicht platziert (im Oberbauch und unterhalb des rechten Rippenbogens). Anschließend fasst man den Gallenblasenfundus und spannt

r:--- Ductus hepatocholedochus

Treitz-Band

- "'-- proximales Jejunum

::;--:: -- Y-Roux Anastomose

das Calot-Dreieck (Ductus cysticus, Ductus choledochus und A. cystica) auf.

A. cystica und Ductus cysticus werden dargestellt und geklippt, die Gallenblase danach freipariert und mittels Begebeutel aus dem Abdomen entfernt. Bei schwierigen Verhältnissen oder Komplikationen muss der Eingriff zur Laparotomie konvertiert werden (präoperative Aufklärung).

Das postoperative Vorgehen entspricht der konventionellen Operation.

Komplikationen und Prognose entsprechen ebenfalls weitgehend denen der konventionellen Operation (s. o.).

Prinzip von minimal invasiven und mikrochirurgischen Verfahren

DEFINITION Operationsverfahren, die Zugang zum Operationsfeld

durch vorbestehende Körperöffnungen oder mini male

Einstichkanäle erhalten (Schlüssellochchirurgie). Vgl. endoskopisch assistierte Chirurgie 5. 201 .

Der Begriff "minimal invasiv" bezieht sich also auf die Integrität der Körperoberfläche (Zugangstrauma) und nicht den Schweregrad der Operation (z. B. bei großer Resektion). Minimal invasive Techniken kommen v. a. im Rahmen von Operationen in großen Körperhöhlen zum Einsatz (Laparoskopie und Thorakoskopie), die entweder diagnostisch oder therapeutisch genutzt werden. Sie erfordern eine Intubationsnarkose und kontrollierte Beatmung (s. auch Anästhesie S. 66), da der Patient ausreichend relaxiert werden muss, da ein Pneumoperitoneum bzw. -tho-

rax angelegt werden muss. Klassisches Beispiel für eine laparoskopische Operation ist die laparoskopische Cholezystektomie.

Die technische und apparative Ausstattung beinhaltet:

- CO₂-Insufflator
- Lichtquelle, Optik, Kamera mit Videogerät und Monitor

Arbeitswerkzeuge: Trokare (zum Einführen der Instrumente und Entfernung des Resektats), Thermo- und Elektrokoagulationselektroden, spezielles Nahtmaterial, Mikroinstrumente (Saug-Spül-Einrichtung, Scheren, Faszang etc.), Endostapler-Instrumente.

Laparoskopie: Prinzip: Nach Eröffnung der Bauchhöhle insuffiziert man CO₂ in die Peritonealhöhle und baut so ein Pneumoperitoneum (Kapnoperitoneum) bis zu einem Druck von ca. 14 mmHg auf. Über einen Trokar wird die Optik in die Bauchhöhle vorgeschoben. Unter Sicht werden weitere Trokare für die Instrumente angebracht.

Vorteil: Der große Vorteil minimal invasiver Operationen besteht in der Verringerung postoperativer Schmerzen (frühere Mobilisierung möglich, verkürzter Krankenhausaufenthalt etc.), einem kosmetisch besseren Ergebnis sowie einem geringeren Infektionsrisiko durch den kleineren Hautschnitt

Nachteil: technisch höherer Aufwand und höhere Kosten, eingeschränkte Palpation, 2-dimensionales Bild, schwierigere Blutstillung und Bergung größerer Resektate.

Komplikationen:

- Erhöhung des intraabdominellen Drucks durch die CO₂-Insufflation (auch Anstieg des PaCO₂) mit u.U.

Kompression der V. cava inferior oder anderen hämodynamischen Veränderungen

- Gefäßpunktion
- Gasembolie
- Entstehung eines Pneumothorax
- Beeinträchtigung der Atemmechanik • Verletzung von Hohlorganen.

NOTES (natural orifice transluminal endoscopic surgery) ist eine neuartige experimentelle Entwicklung, bei der das Endoskop über eine natürliche Körperöffnung (z. B. Mund, Vagina) eingeführt und zur Bauchhöhle geschoben wird. Äußerlich bleiben somit keine Narben sichtbar. Diese Technik bedarf allerdings noch weiterer Entwicklungen (z. B. bakterielle Kontamination mit Peritonitisgefahr beim Verschieben des Endoskops in die Bauchhöhle).

Bei der sog. Single-Port-Technik werden alle Instrumente über den Bauchnabel eingeführt.

Mikrochirurgie: In der Mikrochirurgie wird im Gegensatz zur minimalinvasiven Chirurgie nicht in Körperhöhlen gearbeitet, sondern ein offenes Operationsfeld dargestellt. Der Operateur arbeitet hierbei mit stark vergrößerten Sehhilfen. Lichtmikroskope werden intraoperativ auf den Operationsbereich gerichtet und Spezialgeräte zur Schnitt- und Nahtführung sorgen für das nötige Handling auf minimalem Raum.

Divertikulose und Divertikulitis +++

entlang intramuraler Blutgefäße (Vasa recta) (Gefäßdurchtritte)

Definition

- **Divertikulose:** Vorhandensein multipler Pseudodivertikel
 - **Divertikel:** Ausstülpung der Darmwand
 - **Pseudodivertikel:** Ausstülpung der Mukosa und Submukosa durch Muskellücken in der Darmwand → erworben
 - **Divertikel:** Ausstülpung der gesamten Darmwand → angeboren (z.B. Meckeldivertikel)
- **Divertikelkrankheit:** Symptomatische Divertikulose
- **Divertikulitis:** Entzündung eines Divertikels und seiner Umgebung
 - **Komplizierte Divertikulitis:** Divertikulitis mit Perforationen, Fisteln oder Abszessen
 - **Chronische Divertikulitis:** Rezidivierende oder persistierende Entzündung, die zu weiteren Komplikationen führen kann (insb. Fisteln und Stenosen)

Epidemiologie

- In Industrieländern haben ca. 50% der über 70-Jährigen eine Divertikulose → 20% Divertikulitis
- In Asien und Afrika Prävalenz <10% → 5% Blutung

Ätiologie (Risikofaktoren)

- **Nicht beeinflussbare Risikofaktoren**
 - Steigendes Lebensalter
 - Genetische Faktoren
- **Beeinflussbare Risikofaktoren**
 - Ballaststoffarme Ernährung
 - Übergewicht
 - Bewegungsmangel
 - Rauchen

Klassifikation

| Typ | (verarbeitete) Classification nach Hansen und Stock |
|-----|--|
| 0 | Asymptomatische Divertikulose |
| 1 | Akute, unkomplizierte Divertikulitis |
| 2 | Akute, komplizierte Divertikulitis <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2a: Mikroabszess ◦ 2b: Makroabszess ◦ 2c: Freie Perforation |
| 3 | Chronische Divertikelkrankheit <ul style="list-style-type: none"> ◦ 3a: Symptomatische, unkomplizierte Divertikelkrankheit ◦ 3b: Rezidivierende Divertikulitis ohne Komplikationen ◦ 3c: Rezidivierende Divertikulitis mit Komplikationen |
| 4 | Divertikelblutung |

Pathophysiologie

- **Entstehung der Divertikulose** *RF + Alter*
 - Chronische Obstipation und altersbedingte Bindegewebsschwäche führen zur Ausstülpung der Darmschleimhaut durch Muskellücken der Tunica muscularis
 - Lokalisation: Insb. im Sigma (ca. 75%)
- **Mögliche Folgen der Divertikulose**
 - Divertikulitis
 - Blutungen

Symptome/Klinik

Divertikulose

- Meist asymptomatisch
- Evtl. linksseitige Unterbauchschmerzen

Divertikulitis

- **Leitsymptome**
 - Akute, progrediente Schmerzen im linken Unterbauch („Linksappendizitis“)
 - Fieber
 - Sonderfälle: Zökumdivertikulitis (Schmerzlokalisierung im rechten Unterbauch) oder anders lokalisierte Divertikel (z.B. prävesikaler Schmerz)
- **Weitere Symptome**
 - Stuhlveränderungen (Obstipation/Diarrhö)
 - Flatulenz
 - Übelkeit, Erbrechen
 - Peritoneale Reizung (lokale Abwehrspannung)

„Bei alten oder immunsupprimierten Patienten kann die Ausprägung der Beschwerden sehr milde sein!“

Diagnostik

Divertikulose

- Häufig als Zufallsbefund im Rahmen einer Koloskopie zur Krebsvorsorge oder im CT-Abdomen
- Koloskopie nach Divertikelblutung

Divertikulitis

Anamnese und Körperliche Untersuchung

- Untersuchung des Abdomens
 - Evtl. lokalisierte Druckschmerzhaftigkeit mit ggf. Resistenz im linken Unterbauch
 - Akutes Abdomen mit lokaler oder generalisierter Abwehrspannung und Loslassschmerz: Verdacht auf Perforation mit peritonealer Reizung
- Digital-rektale Untersuchung: Ggf. Schmerzen
- Körpertemperatur: Typischerweise $>37,5^{\circ}\text{C}$

Labor

- Leukozyten \uparrow
- CRP \uparrow
- Urinstatus: Liefert Hinweise auf Differentialdiagnosen wie Urolithiasis oder Harnwegsinfekte

Bildgebung

- **Abdomensonographie:** Methode der 1. Wahl bei V.a. Sigmadivertikulitis
 - Nachweis entzündeter Divertikel
 - Darmwandverdickung auf $>5\text{ mm}$ mit Aufhebung der Wandschichtung und ggf. Kokardenphänomen
 - Fettgewebsreaktion in der Umgebung
 - Ggf. Nachweis freier Flüssigkeit oder eines Abszesses
- **CT-Abdomen mit Kontrastmittel-Gabe (oral, rektal und i.v.)**
 - Indiziert, wenn sonographischer Befund nicht ausreicht
 - Befund
 - Nachweis entzündeter Divertikel
 - Darmwandverdickung
 - Fettgewebsreaktion in der Umgebung
 - Entzündliche Schwellung und Wandverbreiterung, Fettgewebsimbibierung
 - Ggf. Nachweis von Komplikationen: Perforation (freie Luft), Abszess oder Fistel
- **Röntgen-Abdomen im Stehen:** Bei Vorliegen eines akuten Abdomens (Freie Luft bei Perforation)



schießscheibenähnlich
em Querschnitt
(Targetzeichen)







Abb. 4.9 Kolonkontrastdarstellung multipler Sigmadivertikel (Pfeile). [aus: Reiser, Kuhn, Drebus, Duale Reihe Radiologie, Thieme, 2006]



Koloskopie

- Im entzündungsfreien Intervall nach Abklingen der Akutsituation (Perforationsgefahr) : i.d.R. nach 4–6 Wochen
- Sollte immer erfolgen, insb. zum Ausschluss von Stenosen oder Malignomen

Differentialdiagnosen

- Colitis ulcerosa. Morbus Crohn
- Bakterielle Durchfallerkrankungen.
- Appendizitis
- Ischämische Kolitis
- Kolorektales Karzinom
- Reizdarmsyndrom
- Urozystitis
- Gynäkologische Erkrankungen

IBD CDE

Therapie

Asymptomatische Divertikulose

Typ 0

- Keine Therapiemöglichkeit zur Rückbildung der Divertikel
- **Zur Prophylaxe des Auftretens und Fortschreitens der Divertikulose :**
 - Änderung der Ernährungsgewohnheiten : fetthaltige Nahrung und roten Fleisch reduzieren. Ballaststoffreiche Ernährung. Reichlich Flüssigkeitsaufnahme
 - Reduktion des Körpergewichts
 - Nikotinkarenz
 - Bewegung
 - Stuhlregulierende Maßnahmen

Divertikulitis und Divertikelkrankheit

Allgemeine Maßnahmen (Divertikulitis)

- Kühlung des Unterbauchs („Eisblase“)
- Evtl. Nahrungskarenz, parenterale Ernährung und Flüssigkeitssubstitution
- Bedarfsgerechte Analgesie : Metamizol. Opioide bei starken Schmerzen (Pethidin oder Buprenorphin)

Stadiengerechte Therapie der Divertikulitis und Divertikelkrankheit (Sigma)

| Typ | Konservative Therapie | Operative Therapie |
|-------------------------------------|---|--|
| Typ 1 <i>AKut unkompliziert</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Ggf. ambulant • Ggf. antibiotische Therapie | <ul style="list-style-type: none"> • Indikationen <ul style="list-style-type: none"> ○ Bei Versagen der konservativen Therapie: Frühelektive Operation < 48h ○ Bei hohem Rezidivrisiko: Elektive Operation (nach erfolgreicher konservativer Therapie) • Verfahren: einzeitige, minimal-invasive Sigmaresektion |
| Typ 2a <i>AKut + Mikrobazess</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Stationäre Behandlung • Antibiotische Therapie | <ul style="list-style-type: none"> • Indikationen <ul style="list-style-type: none"> ○ Bei Versagen der konservativen Therapie : Frühelektive Operation < 48h ○ Bei hohem Rezidivrisiko: Elektive Operation (nach erfolgreicher konservativer Therapie) • Verfahren: einzeitige, minimal-invasive Sigmaresektion |
| Typ 2b <i>AKut + Makrobazess</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • Indikationen <ul style="list-style-type: none"> ○ Bei Versagen der konservativen Therapie : Frühelektive Operation ○ Bei hohem Rezidivrisiko: Elektive Operation (nach erfolgreicher konservativer Therapie) ○ Bei Sepsis/akutem Abdomen: Notfalloperation • Verfahren : zweizeitiges Vorgehen mit primärer Anastomosierung und Anlage eines protektiven Stomas (Ileostoma) und Rückverlagerung im Verlauf <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alternativ: Diskontinuitätsresektion nach Hartmann |

Ileus/Perforation/Sepsis/Akutes Abdomen \Rightarrow Notfall OP

Akute + Perforation
Chronisch
symptomatisch
Rezid. ohne Komplikationen
Rezid. + Komplikationen
Chronisch + Blutung

| Typ | Konservative Therapie | Operative Therapie |
|--------|--|---|
| Typ 2c | | <ul style="list-style-type: none"> Indikation: Immer chirurgische Notfalloperation Verfahren: zweizeitiges Vorgehen mit primärer Anastomosierung und Anlage eines protektiven Stomas (Ileostoma) und Rückverlagerung im Verlauf <ul style="list-style-type: none"> Alternativ: Diskontinuitätsresektion nach Hartmann |
| Typ 3a | <ul style="list-style-type: none"> Mesalazin oral | nicht bei Blutungskompliziert |
| Typ 3b | <ul style="list-style-type: none"> Antibiotische Therapie im akuten Schub | ggf. elektive, einzeitige, minimal-invasive Sigmaresektion (individuelle Abwägung) |
| Typ 3c | | <ul style="list-style-type: none"> Indikationen <ul style="list-style-type: none"> Bei Fisteln und Stenosen: Elektive Operation >4W Bei Ileus: Notfalloperation Verfahren: einzeitige, minimal-invasive Sigmaresektion <ul style="list-style-type: none"> Bei Notfalloperation ggf. zweizeitiges Vorgehen mit primärer Anastomosierung und Anlage eines protektiven Ileostomas und Rückverlagerung im Verlauf |
| Typ 4 | <ul style="list-style-type: none"> Koloskopische Blutstillung (siehe Divertikelblutung) | OP bei nicht endoskopisch behandelbare Blutungen |

* Die antibiotische Therapie sollte gramnegative und anaerobe Erreger erfassen. Eingesetzt werden bspw. :

- Cefuroxim oder Ciprofloxacin, jeweils + Metronidazol (Anaerobier)
- Piperacillin/Tazobactam oder Ampicillin/Sulbactam


* Operation: Zeitpunkt und Verfahren:

- Notfalloperation:** Sofort, zweizeitiges Vorgehen
- Frühelektive Operation:** In <48 h, möglichst einzeitiges Vorgehen
- Elektive Operation:** Im entzündungsfreien Intervall (nach >4 Wochen), möglichst einzeitiges Vorgehen

* **Diskontinuitätsresektion nach Hartmann** : Blindverschluss des Rektums und Anlage eines endständigen Stomas (Ileostoma oder Kolostoma). Wiederherstellung der Darmkontinuität (nach 3-6 M). Durchgeführt meistens bei septischen oder instabilen Patienten

Komplikationen

- Divertikelblutung (Typ 4)** 5%
 - Diagnostik**
 - Koloskopie
 - Falls koloskopische Lokalisation der Blutungsquelle nicht möglich: CT-Angiographie oder Angiographie (DSA)
 - Therapie**
 - Koloskopische Blutstillung
 - Falls koloskopische Blutstillung nicht möglich: Angiographische Embolisation, bei persistierender Blutung OP
- Perforation**
 - Klinik:** Akutes Abdomen
 - Verlaufsformen**
 - Gedekte Perforation mit perikolischem Abszess** : Gefahr der Expansion der Entzündung ins retroperitoneale Gewebe (z.B. sekundärer Psoasabszess)
 - Freie Perforation mit Peritonitis** : radiologisch freie intraabdominelle Luft \rightarrow Notfall-OP \rightarrow Resektion des betroffenen Darmabschnitts mit primärer Anastomosierung und ggf. protektivem Ileostoma oder Diskontinuitätsresektion nach Hartmann, Spülung der Bauchhöhle
- Fistelbildung**
 - Meist kolovesikal, Kann zu rezidivierenden Harnwegsinfekten bis hin zur Urosepsis führen
 - Auch kolovaginal, koloenteral oder kolokutan
- Darmstenosen:** Gefahr des mechanischen Ileus



Mit hochauflösenden
Schallfrequenzen ($\geq 7,5$ MHz)

Ü

Diskontinuitätsresektion nach Hartmann: Sie ist ange zeigt z. B. bei perforierter Sigmadivertikulitis und pal liativ bei nichtresezierbaren Rektumkarzinomen. Dabei wird der entsprechende Darmabschnitt reseziert und das proximale Ende als endständiges Stoma ausgeleitet Der distale Teil wird blind verschlossen.

Die Wahrscheinlichkeit bei einer Koloskopie nach stattgehabter Divertikulitis ein Adenom oder Karzinoms zu diagnostizieren ist signifikant erhöht. Ein erhöhtes Risiko für ein kolorektales Karzinom bei Divertikulose lässt sich hingegen nicht belegen.

Evidenzlevel 2, Starker Konsens

Nach Ausheilung einer konservativ behandelten Divertikulitis (i.d.R. nach 6-8 Wochen) sollte die Indikation zur Koloskopie in Abhängigkeit von klinisch-anamnestischen Faktoren (protrahierter Verlauf, persistierende Beschwerden, Alter des Patienten, Bildgebung) gestellt werden.

Die doppelläufige Anlage (d. h. oraler und aboraler Darmabschnitt werden ausgeleitet) erfolgt meist dann, wenn eine Rückverlegung geplant ist. Die endständige Stomaversorgung wird eher bei permanenter Stomaversorgung bevorzugt (Ausnahme: Hartmann-Operation, S. 125). Nach 6-12 Wochen kann i.d.R. der künstliche Ausgang zurückverlegt werden.

Das gehäufte Auftreten von Kolondivertikeln im Sigma sei aufgrund der zahlreichen Vasa recta, der hohen intraluminalen Drücke und der sich prellbockartig vor dem Rektum brechenden peristaltischen Wellen zu erklären.

Die Divertikulitis ist eine entzündliche Veränderung von Kolondivertikeln. Begünstigt wird dies dadurch, dass durch die Herniation die mitgeführten Blutgefäße komprimiert werden, die prolabierte Schleimhaut lokal minderversorgt ist und ein verengter Divertikelhals zur längeren Retention von keimbelastetem Stuhl im Divertikellumen führt.

Chronische Gastritis ++

Definition

Chronische Entzündung der Magenschleimhaut. **Histologische Diagnose**

Ursachen – ABC-Klassifikation

► Typ-A-Gastritis (5 %): → autoimmun

- Autoantikörpern gegen Belegzellen und/oder gegen Intrinsic-Faktor. Die Belegzellen (Parietalzellen) sind verantwortlich für die Produktion der Magensäure und des Intrinsic-Faktors und befinden sich im Magenfundus bzw. -korpus.

- **Folgen:** Achlorhydrie (=Anazidität → Erhöhtes Risiko für Magenkarzinome).

Hypergastrinämie (→ Erhöhtes Risiko für Karzinoidtumoren). Mangel an Intrinsic-Faktor (→ perniziöse Anämie)

- Lokalisation im Magenfundus bzw. -korpus.

► Typ-B-Gastritis (am häufigsten: 60 %): → bakteriell

- durch *Helicobacter pylori* (gramnegative Stäbchen).

- **Folgen:** Hypochlorhydrie (keine Achlorhydrie) und intestinale Metaplasien (→ Erhöhtes Risiko für Magenkarzinome und MALT-Lymphome)

- Lokalisation im Magenantrum

► Typ-C-Gastritis (30 %): → chemisch

- durch Gallereflux (häufig beim operierten Magen) oder Einnahme von NSAR.

- Folgen: Erosionen und Ulzera der Magenschleimhaut, Hypochlorhydrie, ggf. Metaplasien (→ Erhöhtes Risiko für Magenkarzinome, jedoch weniger ausgeprägt als Typ A und Typ B)

Klinik

► Häufig keine Symptome

► Evtl. epigastrische Schmerzen (Nüchternschmerz, aber auch postprandialer Schmerz möglich), Übelkeit, Völlegefühl, Aufstoßen

► Typ-A-Gastritis : Bei schwerem Vitamin-B12-Mangel (Trias aus hämatologischer, neurologischer und gastrointestinaler Störung). Ggf. andere Autoimmunerkrankungen in der Anamnese: Z.B. Hashimoto-Thyreoiditis

► Typ-B-Gastritis : Relativ häufig erst durch Blutung bei Ulcus ventriculi oder duodeni symptomatisch

► Typ-C-Gastritis : Verursachende Medikamente (NSAR, zusätzliche Einnahme von Glucocorticoiden und/oder SSRI). Blutungszeichen

Diagnostik

► **Gastroskopie mit Biopsie** für histologische Untersuchung (Entnahme von mindestens 2 Gewebepartikeln getrennt aus Korpus und Antrum) und für Urease-Schnelltest im Rahmen der HP-Diagnostik.

► **Helicobacter-pylori-Diagnostik:**

- Untersuchung endoskopischer Biopsien (Histologie, Urease-Schnelltest, ± Kultur und Resistogramm, ± PCR)

- Nicht-invasive Verfahren (Stuhl-Antigentest, Harnstoff-Atemtest, Serologie)

► **Labor :**

- mikrozytäre Anämie (bei chronischer Blutung), makrozytäre Anämie (bei Vit-B12 Mangel)

- Bei Typ-A-Gastritis evtl. Bestimmung von Vitamin B12 sowie Antikörpern gegen Belegzellen und/oder Intrinsic-Faktor im Serum. Typ A

Die Diagnose einer chronischen Gastritis darf nur in der Zusammenschau aus endoskopischem und histopathologischem Befund (inklusive HP-Diagnostik) gestellt werden!

Therapie

► Typ-A-Gastritis:

- Vitamin B12-Substitution parenteral
- endoskopische Kontrollen alle 3 Jahre (erhöhte Karzinominzidenz).

► Typ-B-Gastritis:

- Hp-Eradikationstherapie bei:

- Obligate Indikationen : Gastroduodenale Ulkuskrankheit, MALT-Lymphom
- Fakultative Indikationen : Symptomatische Typ-B-Gastritis, HP-Nachweis bei geplanter Dauermedikation mit NSAR

- bei intestinaler Metaplasie endoskopische Kontrollen alle 3 Jahre (erhöhte Karzinominzidenz).

► Typ-C-Gastritis:

- Noxenkarenz (NSAR, Nikotin, Alkohol) *PPI (Omeprazol 40 mg 1-0-0)*
- Bei symptomatischem Gallereflux evtl. Prokinetika oder Colestyramin *MCP, Domperidon*
- Bei NSAR-Einnahme : Indikation überprüfen, ggf. absetzen oder Kombination mit PPI. *?
Schnell
Symptome
Kontrolle*

Komplikationen (Siehe : Folgen)

Colestyramin und Colesevelam binden irreversibel Gallensäuren im Dünndarm

Akute Gastritis -

Definition

- Akute Entzündung der Magenschleimhaut

Ursachen

- Stress: Sepsis, Schock, postoperativ, nach Verbrennungen und Traumata u. a.
- Noxen : Alkohol, Medikamente (v. a. NSAR), Säuren, Laugen.
- Infektionen: z. B. im Rahmen einer akuten Gastroenteritis.

Klinik

- Epigastrische Schmerzen.
- Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen.
- Bei erosiver Gastritis mit Blutung: Symptome einer oberen gastrointestinalen Blutung.

Diagnostik

- Bei kurzdauernder unkomplizierter Symptomatik Verlaufsbeobachtung.
- Bei persistierenden bzw. rezidivierenden Beschwerden oder Blutung: Gastroskopie mit Biopsie.

Therapie

- Allgemeinmaßnahmen: Alkohol- und Nikotinkarenz, passagere Nahrungskarenz oder Schonkost, Überprüfung der Medikation.
- Leichte Fälle heilen spontan ab, bei Beschwerden Antazida
- Schwere Fälle mit ausgedehnten Erosionen: H2-Blocker oder Protonenpumpenhemmer.
- Bei oberer gastrointestinaler Blutung (Siehe).
- Bei Helicobacter-pylori-Nachweis Eradikationstherapie.

MALT-Lymphom

Abstract

Beim MALT (Mucosa Associated Lymphoid Tissue)-Lymphom handelt es sich um ein B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom mit meist niedrig-malignem Verlauf. Ätiologisch geht der Erkrankung oft eine Typ-B-Gastritis mit Helicobacter-pylori-Infektion voraus. Außer unspezifischen Allgemeinsymptomen (Bauchschmerzen, Schwächegefühl) sind klinisch nur eine Anämie und in einigen Fällen eine Hämatemesis zu erwarten. Die Diagnose wird mit den in der Ösophagogastroduodenoskopie gewonnenen Biopsaten anhand der Histologie und Immunhistochemie (Infiltrate mittelgroßer lymphoider Zellen: CD-20-positiv) gesichert. Therapeutisch gibt es eine Besonderheit: Das MALT-Lymphom ist das einzige Lymphom, bei dem im Frühstadium durch die Beseitigung der Ursache (HP-Eradikation) eine vollständige Remission möglich ist. Im Spätstadium ist eine Polychemotherapie nach dem CHOP-Schema + Rituximab (bei CD-20 Positivität) und ggf. eine Radiatio indiziert.

Gastroduodenale Ulkuskrankheit ++

Definition

- **Ulzerierender Gewebedefekt** im Bereich der Wand des Magens bzw. des Duodenums.
 - **Ulkus**: Gewebedefekt, der die **Muscularis mucosae überschreitet**
 - **Erosion**: Oberflächlicher Gewebedefekt mit noch **intakter Muscularis mucosae**

✗ **Ulcus duodeni** 2–3× häufiger als **Ulcus ventriculi**.

Ätiologie

Helicobacter-pylori-(HP-)Infektion (=HP-positive Ulkuskrankheit)

Am häufigsten entwickelt sich ein gastroduodenales Ulkus auf dem Boden einer **chronischen Typ-B-Gastritis** (HP-positives Ulkus). Bei >90% der Patienten mit duodenalem Ulkus (= **Ulcus duodeni**) und bei ca. 75% der Patienten mit Magenulkus (= **Ulcus ventriculi**) ist die Magenschleimhaut mit HP besiedelt.

HP-negative Ulkuskrankheit

- **Risikofaktoren** : Einnahme nichtsteroidaler Antirheumatika (**NSAR**), insbesondere in Kombination mit **Glucocorticoiden**. **Nikotin**, **Alkohol**. **Alter >65 Jahre**
- **Selten**: **Hyperparathyreoidismus**, **Zollinger-Ellison-Syndrom** (Gastrinom)

Akutes Stressulcus

- **Ursachen**: Polytrauma, große Operationen, etc. **Therapie**: Stressulcusprophylaxe

Klassifikation

- **Ulcus ventriculi** : Lokalisation meist **kleine Kurvatur** oder **Antrum**
- **Ulcus duodeni** : Lokalisation meist im **Bulbus duodeni**, gehäuft bei Menschen mit der Blutgruppe 0

Eine atypische Lage ist immer karzinomverdächtig!



Pathophysiologie

Anatomie des Magens

Kardia. Fundus. Korpus. Antrum. Pylorus

Physiologischer Magensaft

- **Belegzellen** (=Parietalzellen): Bildung von **Salzsäure (HCl)** und **Intrinsic-Faktor (B₁₂)**
- **Nebenzellen** : Bildung von **protektivem Schleim**
- **Hauptzellen**: Bildung von **Pepsinogen**
- **Regulation der Sekretion**
 - **Acetylcholin**, **Histamin** und **Gastrin** : Stimulation der Belegzellen
 - **Prostaglandine** : Stimulation der Nebenzellen und Hemmung der Belegzellen (protektiv)



Symptome/Klinik

- **Epigastrische Schmerzen**: typischerweise als bohrend oder dumpf empfunden. Besserung durch Antazida.
 - **Ulcus ventriculi** : Schmerzen unmittelbar **nach Nahrungsaufnahme** oder Schmerzen unabhängig von Nahrungsaufnahme
 - **Ulcus duodeni** : **Nüchternschmerzen** (insbesondere nachts). Linderung der Schmerzen durch Nahrungsaufnahme
- Atypische Symptome : Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl, Aufstoßen
- Evtl. Blutungszeichen (Anämie, Hämatemesis, Meläna)
- Asymptomatische Verläufe sind möglich

Verlaufs- und Sonderformen

- **Ulcus Dieulafoy** : Seltene Erkrankung. Schleimhauterosion aufgrund einer submukösen Arterie zu Blutungen führen kann. Beim Dieulafoy-Ulkus handelt es sich um eine **solitäre Schleimhautläsion** auf dem Boden einer **Angiodysplasie** der Magenwand mit nachfolgend schweren **gastrogenen** Blutungen.

Diagnostik

Ösophago-Gastro-Duodenoskopie (ÖGD) mit Biopsien


Mehrere Biopsien : **2× Magenantrum** (an kleiner und großer Kurvatur) und **2× Magenkorpus** (kleine und große Kurvatur).

Helicobacter pylori-Diagnostik (von Biopsien)

- **Histologie** mit Färbung und direktem mikroskopischen Nachweis
- **Urease-Schnelltest** mit Nachweis einer Ammoniakbildung durch Urease des HP

Zelltypen des Magens

| | Magen-Hauptzellen | Nebenzellen | Parietalzellen (= Belegzellen) |
|-------------|--|------------------------------------|--|
| Zytoplasma | • Basophil | • Blass | • Azidophil |
| Aktivierung | • Durch Acetylcholin (über muscarinerge Cholinozeptoren) und Gastrin | • Kontinuierliche Produktion PG | • Durch Acetylcholin (über muscarinerge Cholinozeptoren), Histamin und Gastrin |
| Sekret | • Pepsinogene | • Mucine (Glykoproteine) | • Protonen und Chlorid-Ionen (Salzsäure bzw. HCl) • Intrinsic-Faktor (IF) |
| Funktion | • Spaltung der mit der Nahrung aufgenommenen Proteine | • Bildung eines Schleimteppichs | • Ermöglicht Resorption von Vitamin B ₁₂ • HCl-Sekretion in das Magenlumen |



Wenn HP-negativ und keine NSAR-Einnahme

- Bestimmung von **Gastrin**: Bei Gastrinom (Zollinger-Ellison-Syndrom) stark erhöht
- Bestimmung von **Serumcalcium** und **Parathormon**: Bei primärem Hyperparathyreoidismus erhöht
- Zum Ausschluss eines Magenkarzinoms muss jedes Magengeschwür bis zur vollständigen Abheilung mittels ÖGD und histologischer Untersuchungen kontrolliert werden!

Therapie

Medikamentöse Therapie

HP-Eradikationstherapie wenn HP-positiv

- **Indikation**
 - Ulcus ventriculi: Eradikation bei **zwei** positiven HP-Tests (z.B. Histologie und Urease-Schnelltest)
 - Ulcus duodeni: Eradikation bei **einem** positiven HP-Test
- **Durchführung: Protonenpumpeninhibitor in doppelter Standarddosis + 2 Antibiotika über 7-14 Tage**, anschließend weitere Gabe eines PPI in Standarddosierung
- **Resistenzsituation**: Clarithromycin (10%), Metronidazol (35%), Amoxicillin (keine Resistenzen)

| Erstlinientherapien zur Helicobacter-pylori-Eradikation | | |
|---|--|----------------|
| Französische Tripeltherapie | PPI* p.o. 1-0-1 + <u>Amoxicillin 1000 mg</u> p.o. 1-0-1 + <u>Clarithromycin 500 mg</u> p.o. 1-0-1 | 7-14 Tage |
| Italienische Tripeltherapie → (bei Penicillinallergie) | PPI + <u>Metronidazol 400(-500) mg</u> p.o. 1-0-1 + <u>Clarithromycin</u> | |
| Zweitlinientherapie nach Versagen der franz. oder ital. Tripeltherapie <i>od. Clarithro-Resistenz</i> | | |
| Bismut-Quadrupeltherapie | <u>PPI</u> + <u>Bismut-Kaliumsalz</u> + <u>Tetracyclin</u> + <u>Metronidazol</u> (pro Hartkapsel: 140 mg/125 mg/125 mg) p.o. 3-3-3-3 | <u>10 Tage</u> |
| Vierfachtherapie | <u>PPI</u> + <u>Clarithromycin</u> + <u>Metronidazol</u> + <u>Amoxicillin</u> | <u>7 Tage</u> |
| In letzte Linie | | |
| Fluorchinolon-Tripeltherapie | <u>PPI</u> + <u>Levofloxacin</u> + <u>Amoxicillin</u> | <u>10 Tage</u> |

* Omeprazol 20 mg, Pantoprazol 40 mg

- Nach 4-6 Wochen endoskopische Kontrolle des Eradikationserfolges, auch um übersehene Karzinome auszuschließen! Bei fehlender Indikation zur Kontrollendoskopie Therapiekontrolle mittels **Harnstoff-Atemtest und Stuhlantigentest**

HP-negativer Ulcus

- Noxenkarenz (NSAR, Nikotin, Alkohol). Stressabbau
- Protonenpumpeninhibitoren

Interventionelle Therapie (bei Blutung)

- **Endoskopische Blutstillung**: Unterspritzung, Clip, Fibrinkleber etc.

Operative Therapie


- bei **Komplikationen** (endoskopisch **nicht beherrschbare Blutung**, **Perforation**) oder **Karzinomverdacht**

Magenteilresektion (nach Billroth)

mit Gastroduodenostomie oder Gastrojejunostomie

Vagotomie

- **Trunkuläre Vagotomie**: Durchtrennung von Nervus vagus (N.X) im Bereich des distalen Ösophagus
- **Selektive Vagotomie**: Durchtrennung der Fasern des Nervus vagus (N.X), die den proximalen Magenanteil innervieren.
- **Postvagotomiesyndrom** (Magenentleerungsstörungen) (frühes Sättigungsgefühl, Aufstoßen, Inappetenz und Refluxbeschwerden). Die Therapie ist symptomatisch



Die **Billroth-I-Resektion** ist die einfachste Form der **Magenresektion**. Sie wird aufgrund von Komplikationen aktuell (2021) nur noch in **Ausnahmefällen** oder zur **Palliation** im Rahmen fortgeschrittener **Tumorerkrankungen** angewendet.

2 Indikationen


distales **Magenkarzinom**
Gastroduodenale Ulkuskrankheit (*Ulcus ventriculi*,
Ulcus duodeni)
Pylorusstenose

3 Vorgehen

Die **distalen 2/3 des Magens** werden reseziert, der **Magenstumpf** wird mit dem **Duodenumstumpf** **End-zu-End** oder **Seit-zu-End anastomosiert** (**Gastroduodenostomie**). Die Passage der Nahrung durch das Duodenum wird also erhalten.

Magenteilentfernung (Billroth I)

Linkes Bild: Resektionsbereich (transparente Fläche) mit proximalem (grüne gestrichelte Linie) und distalem (violett gestrichelte Linie) Resektionsrand. Zusätzlich erfolgt die Präparation des Duodenums (rot gestrichelte Linie) mit Herauslösung aus dem Retroperitonealraum. Rechtes Bild: Nach der Resektion erfolgt die Anlage einer **End-zu-End-Gastroduodenostomie** (grüne und violette Nahtlinie), für die das Duodenum nach Präparation in Richtung Anastomose mobilisiert werden muss.



Magenteilentfernung (Billroth II)

1. Magenteilresektion (transparente Fläche) und **blinder Verschluss des verbleibenden Duodenalstumpfes** (violette Naht).
2. **Seit-zu-End-Anastomose** zwischen erster Jejunumschlinge und Magenstumpf (grüne Naht = Gastrojejunostomie).
3. **Seit-zu-Seit-Anastomose** zwischen dem zuführenden und dem abführenden Dünndarmschenkel (blaue Naht = Jeunojejunostomie, Braunsche Fußpunktanastomose). Die Braunsche Fußpunktanastomose **verhindert, dass Gallen- und Duodenalsekrete an die Magenschleimhaut gelangen.**

Die **Billroth-II-Resektion** ist eine Form der **Magenresektion** mit unphysiologischer Rekonstruktion der Nahrungspassage.

2 Indikationen


distales **Magenkarzinom**
Ulcus ventriculi
Gastroduodenale Ulkuskrankheit
Pylorusstenose

3 Vorgehen

Die distalen zwei Drittel des Magens werden abgesetzt, der **Duodenumstumpf** wird blind verschlossen. Eine **isoperistaltische Jejunumschlinge** wird an den Magen hochgezogen und **anastomosiert** (**Gastrojejunostomie**).

Das Jejunumsegment kann **antekolisch** (vor dem **Colon transversum**) oder **retrokolisch** (durch Schlitzung des **Mesocolon**) hochgezogen werden. Um den Abfluss des Duodenalsekrets aus dem blind verschlossenen Duodenalstumpf zu erleichtern und dessen Rückfluss in den resezierten Magen zu verhindern, wird am Fußpunkt des durch die Jejunalschlinge gebildeten Bogens eine weitere **Anastomose** angefertigt. Diese wird als **Braun-Fußpunktanastomose** bezeichnet.

lebensbedrohliche Blutungen treten bei Arrosion der A. gastroduodenalis (U. duodeni im Bereich der Bulbushinterwand) oder der A. gastrica (U. ventriculi) auf.



Komplikationen

Blutung

- Starker Blutung bei Arrosion der **A. gastroduodenalis** (an der Hinterwand des Duodenums)
- **Therapie** : Versuch der endoskopischen Blutstillung. Bei Versagen → Operation

Perforation von Magen/Duodenum

- **Klinik** : **Plötzlich** einsetzender, **starker stechender** Schmerz, anschließend diffuser Bauchschmerz (beginnende Peritonitis)
- **Diagnostik** :
 - **Tympanitischer Klopfschall**
 - Röntgen-Abdomen im Stehen : **Subphrenische Luftsichel**
- **Therapie**: Notfalloperation

Magenausgangsstenose (=Pylorusstenose)

Entartungsrisiko beim Ulcus ventriculi

Prävention

Rezidivprophylaxe

- **Noxenkarenz** (NSAR, Nikotin, Alkohol). Stressabbau
- Erfolgreiche **HP-Eradikationstherapie**

Stressulkusprophylaxe

- **Gabe von PPI oder H₂-Blocker**
- **Nachteil von langfristiger PPI-Gabe**: Evtl. erhöhtes Risiko für **Pneumonien** und **gastrointestinale Infekte!**

Protonenpumpenhemmer

Wirkung

- **Irreversible** Hemmung der **H⁺/K⁺-ATPase** der Parietalzellen mit resultierendem pH-Anstieg im Magen
- ⇒ **Vollständige Suppression der Magensäuresekretion** **> 90%**

Nebenwirkung

- **Gastrointestinale Nebenwirkungen** (Flatulenz, Bauchschmerzen, Übelkeit, Meteorismus, Völlegefühl)
- **Osteoporose** bei langfristiger Gabe
- **Schwindel, Kopfschmerzen**
- Selten irreversible **Sehstörungen** (vorwiegend bei i.v. Gabe)

Bakterielle Besiedlung des Magens aufgrund der Säurereduktion: Gefahr von Atemwegsinfektionen

Indikation

- Ulcus ventriculi und duodeni
- Refluxkrankheit
- Kombinationstherapie bei Helicobacter-pylori-Eradikation
- Zollinger-Ellison-Syndrom
- Gastropathien durch nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR)
- Besondere Indikation: MALT-Lymphom (Stadium I und II)

Indikation

- Omeprazol **20 mg**
- Pantoprazol **40 mg**

Gastrinom

Für alle GEP-NEN gelten die oben dargestellten Angaben bzgl. der allgemeinen Ätiologie, Klassifikation, Pathophysiologie, Symptomatik, Diagnostik, Pathologie, Therapie, Nachsorge und Prognose neuroendokriner Neoplasien. Im Folgenden werden nur die Details und Besonderheiten des Gastrinoms dargestellt.

Allgemeines [18]

- Pathomechanismus: Sekretion von Gastrin durch Tumorzellen → Chronische Hypergastrinämie → Magensäurehypersekretion → Peptische Ulzera in Pankreas, Magen, Duodenum und/oder Jejunum
- Dignität: In ca. 60–70% der Fälle maligne
- Ätiologie
 - Überwiegend sporadisch (75% der Fälle)
 - Im Rahmen eines MEN1-Syndroms (25% der Fälle)
- Lokalisation
 - Meist im Pankreas
 - Seltener auch in Magen oder Duodenum

Spezifische Klinik

- Rezidivierende, therapieresistente Ulzera v.a. in Pankreas, Duodenum und (seltener) im Magen
- Gastroösophagealer Reflux
- Diarrhö (insb. Steatorrhö)
 - Ursache: Deaktivierung von Lipasen durch erhöhten Säuregehalt
- Ggf. Symptome eines MEN1-Syndroms

Spezifische Diagnostik [8]

- Gastrin-Bestimmung
 - Durchführung: Mind. einmalige Bestimmung des

Nüchterngastrinspiegel im Serum

- Interpretation: Diagnosesicherung bei:
 - Erhöhung des Nüchterngastrinspiegels über das 10-Fache der Norm (im Allgemeinen auf $>1.000 \text{ pg/mL}$) und
 - Gleichzeitigem Magensaft-pH <2
- Sekretin-Test
 - Indikation: Bei grenzwertig hohem Nüchterngastrinspiegel und einem Magensaft-pH <2
 - Durchführung: I.v. Gabe von 2 U/kg KG Sekretin
 - Interpretation: Test ist positiv, wenn der Serumgastrinspiegel um $>200 \text{ pg/mL}$ ansteigt
- Bei gesichertem Gastrinom
 - Gendiagnostik: Nachweis/Ausschluss einer MEN1
 - Alternativ: Biochemisches Screening (mind. einmalige Bestimmung von Serum-Calcium, PTH und Prolaktin)

Spezifische Pathologie [8]

- Bei größeren Biopsaten: Intensivierte Aufbereitung des gewonnenen Duodenum-Gewebes
- Spezifischer immunhistochemischer Marker: Gastrin

Spezifische Therapie [8]

- Kurativ
 - Ausschließlich chirurgische Resektion, nicht endoskopisch!
 - Ziel: Komplet-Resektion des Primarius inkl. einer

Lymphadenektomie im sog. Gastrinom-Dreieck [25]

- Ggf. spezielle Verfahren (bspw. Eukleation eines Gastrinoms

am Pankreaskopf): Bei sporadischen Gastrinomen abhängig von den anatomischen Verhältnissen

- Symptomatisch
 - Protonenpumpeninhibitoren (in initial hoher Dosierung): Bspw.

Omeprazol

- H2-Blocker

■ Beachte: Ranitidin nicht mehr indiziert! Siehe: Rote-Hand-Brief zu Ranitidin

- Somatostatin-Analoga

Gastrointestinale Blutung ++

Ätiologie

Obere GI-Blutung (90% aller Fälle)

Ursache proximal des Treitz-Bandes (Übergang Duodenum–Jejunum)

- **Ulcus ventriculi/duodeni** (in 50% aller Fälle, häufigste Ursache)
- **Ösophagusvarizen** (Hinweise auf Leberzirrhose oder Alkoholabusus; ggf. Zeichen der portalen Hypertension). **Mallory-Weiss-Syndrom** (Hinweise auf fulminantes Erbrechen). **Tumoren** (Ösophaguskarzinom, Magenkarzinom). **Erosive Gastritis** bzw. **erosive Duodenitis**. **Schwere Ösophagitis**, **Hiatushernie**, **Angiodysplasie**
- In 5-10% der Fälle findet sich keine Blutungsquelle (z.B. bei einem **Ulcus Dieulafoy**)

Solitäre Schleimhautläsion auf dem Boden einer Angiodysplasie der Magenwand

Untere GI-Blutung

Ursache distal des Treitz-Bandes (zumeist Kolon)

- **Vaskuläre Ursachen** : Hämorrhoiden. Angiodysplasien
- **Tumoren** : Kolorektales Karzinom, Analkarzinom. Kolonpolypen. Karzinoide des Dünndarms
- **Entzündliche Ursachen** : CED (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn)
- **Divertikulose**

Klassifikation

Klassifikation nach Modus des Blutungsnachweises

- **Okkulte Blutung**: chronische Eisenmangelanämie
- **Overte (Offensichtliche) Blutung**: klinische Blutungszeichen

Klassifikation der Blutungsaktivität bei gastroduodenalen Ulzera nach Forrest

Einschätzung des Risikos einer Rezidivblutung.

| Stadium | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Forrest I | Aktive Blutung : Ia <u>Spritzende</u> arterielle Blutung. Ib <u>Sicker</u> blutung |
| Forrest II | Inaktive Blutung : IIa Läsion mit <u>sichtbarem Gefäßstumpf</u> . IIb <u>Koagelbedeckte</u> Läsion. IIc <u>Hämatinbelegte</u> Läsion |
| Forrest III | Läsion <u>ohne Blutungszeichen</u> |

Symptome/Klinik

Allgemeinsymptome

- **Bei chronischen Blutungen = Blutungsanämie** : Blässe der Haut und Schleimhäute. Schwäche, Müdigkeit, Belastungsdyspnoe
- **Bei akuten Blutungen = Hypovolämischer Schock** : Tachykardie. Hypotonie. Tachypnoe, Schock, Vigilanzminderung, Oligurie bis Anurie

Spezifische Symptome

- **Obere GI-Blutung** : **Hämatemesis** (Bluterbrechen). **Meläna** (Teerstuhl). **Hämatochezie** (Blutstuhl)
- **Andere Ursachen für Schwarzfärbung des Stuhls** : Nahrungsmittel (Heidelbeeren, rote Bete, Spinat, dunkle Schokolade), Medikamente (Eisen- und Kohletabletten)
- **Untere GI-Blutung** : **Hämatochezie**. **Meläna**
- Eine Meläna ist bei oberer und unterer GI-Blutung möglich! Zudem sollten auch Blutungen aus dem Nasen-Rachen-Raum mitbedacht werden!

Diagnostik

Anamnese



Blutungszeichen. Medikamentenanamnese (NSAR, Antikoagulantien). Voroperationen oder -erkrankungen (Leberzirrhose)

Körperliche Untersuchung

Symptome der Blutungsanämie. Überwachung der Vitalparameter. Anale Inspektion und digital-rektale Untersuchung

Das **Ligamentum suspensorium duodeni** (Syn.: Treitz-Band) ist ein Aufhängeband des Zwölffingerdarms, das von der A. mesenterica superior zum Übergang vom Zwölffingerdarm in den Leerdarm (Flexura duodenojejunalis) zieht. Es enthält glatte Muskulatur (Musculus suspensorius duodeni, Treitz-Muskel), welche zusammen mit der schlingenförmigen Struktur des Bandes den Übergang von Duodenum zu Jejunum im Sinn eines muskulären Schließmuskels verengen kann.

Das Treitz-Band gilt als Grenze zwischen dem oberen und mittleren Teil des Magen-Darm-Traktes.



Labor

- BB : Hb↓, Hkt↓ (nicht bei hochakuter Blutung). Quick, aPTT, Glucose, Kreat, K⁺, Na⁺.
Blutgruppenbestimmung
- Stuhltest auf okkultes Blut

Apparative Diagnostik

- **(Notfall-)Endoskopie zur Lokalisation der Blutungsquelle :** ggf. Blutstellung
Ösophagogastroduodenoskopie (wichtigste Maßnahme zur Lokalisation und Therapie einer GI-Blutung). Koloskopie. Nach Stabilisierung der Kreislauftsituation.
- **Bei Verdacht auf Dünndarmblutung bzw. nicht lokalisierbarer Blutungsquelle :**
Kapselendoskopie (Bei Verdacht auf stenosierenden Darmprozess kontraindiziert). „Push-and-pull-Endoskopie“ (= Doppelballonendoskopie, Intestinoskopie). Ggf. angiographische Verfahren (CT, DSA), insb. in Notfallsituation.
- **Cave :** Hämatochezie und stabiler Patient → Koloskopie zuerst UGIB
Hämatochezie und instabiler Patient → ÖGD zuerst OGIB

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Stationäre Überwachung (IMC, ITS)
- O₂-Gabe, 2 periphere Venenzugänge legen
- Kontrolle und Stabilisierung der Vitalparameter (z.B. Flüssigkeitssubstitution : Kristalloide Infusionslösungen bevorzugen, evtl. Bluttransfusion)
 - **Transfusionsziele und -grundsätze :** 1 Erythrozytenkonzentrat (EK) erhöht den Hb um etwa 1 g/dL. Zielwert: Hb um 8 g/dL. 1 Plasmakonzentrat pro 2 Erythrozytenkonzentrate. Systolischen Blutdruck >100 mmHg anstreben. ZVD von 10 mmHg anstreben.

Kausale Therapie

- **Bei relevanter Blutung:** Intravenöse PPI-Gabe. Notfallendoskopie (zunächst Gastro-, dann Koloskopie). Unterspritzung, Sklerosierung, Ligatur oder Koagulation einer identifizierten Blutungsquelle (Blutstillung)
- **Bei endoskopisch nicht beherrschbarer Blutung (selten):** Chirurgisches Vorgehen (Alternativ : angiographische Embolisation)

Komplikationen

- Hypovolämischer Schock
- Anämie
- Bei Leberzirrhose Gefahr der hepatischen Enzephalopathie
- Aspirationspneumonie

Injektionsverfahren: Blutende Läsionen werden mit verdünnter Adrenalinlösung unterspritzt

1mg/100ml NaCl

- Argon-Plasma-Koagulation (APC): Elektrische Energie wird über einen Argon-Gasstrahl (leitfähig) auf das Gewebe übertragen. Die Eindringtiefe ist begrenzt, Perforationen sind selten
- Elektrische Koagulation: Mit mono- oder bipolaren endoskopischen Sonden kann bspw. ein blutender Gefäßstumpf thermisch koaguliert werden

Ikterus und Cholestase ++

Definition

- **Ikterus** (= „Gelbsucht“): Gelbfärbung von Haut/Schleimhaut und Skleren durch Bilirubinablagerung
 - **Sklerenikterus**: Bei Serumbilirubinwerten >2 mg/dL
 - **Hautikterus**: Bei Serumbilirubinwerten >3 mg/dL
- **Pseudoikterus**: Farbstoffablagerungen, z.B. durch übermäßigen Karottengenuß (= falscher Ikterus → DD)
- **Cholestase** (= **Verschlussikterus**): Störung der Gallensekretion (nicht-obstruktive intrahepatische Cholestase) oder Störungen des Gallenabflusses, sowohl in der Leber (obstruktive intrahepatische Cholestase) als auch zwischen Leber und Duodenum (obstruktive extrahepatische bzw. posthepatische Cholestase)

Ätiologie

Prähepatischer Ikterus

- **Hämolyse** (z.B. Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel, Sphärozytose)
- Ineffektive Erythropoese (z.B. perniziöse Anämie)

Intrahepatischer Ikterus

- **Nicht-obstruktive Cholestase**
 - Hepatitis (z.B. viral, autoimmun, alkoholisch)
 - Leberzirrhose
 - Stauungsleber
 - Primär biliäre Cholangitis
- **Obstruktive Cholestase**
 - Lebertumoren (z.B. hepatozelluläres Karzinom, Metastasen, cholangiozelluläres Karzinom)
 - Intrahepatische Gallensteine
 - Primär sklerosierende Cholangitis

Posthepatischer Ikterus (= obstruktive posthepatische Cholestase)

- Choledocholithiasis
- Primär sklerosierende Cholangitis
- Fehlbildungen der Gallenwege
- Tumoren (Pankreaskarzinom, Gallengangskarzinom)
- Gallengangsstrikturen (postoperativ, entzündlich)

„Ein Ikterus muss nicht zwangsläufig mit einer Cholestase einhergehen, sondern kann auch prähepatische Ursachen haben. Umgekehrt schließt ein fehlender Ikterus eine Cholestase nicht aus, da bspw. im Frühstadium einer Cholestase mitunter noch kein Ikterus auftritt!“

Pathophysiologie

Bilirubin ist das Endprodukt des Hämabbaus. Es hat für den Körper keinen weiteren Nutzen und muss ausgeschieden werden, höhere Konzentrationen können sogar toxisch wirken.


Bilirubin-Stoffwechsel :

- (1) Häm entsteht beim Abbau des Hämoglobins in der Milz und im Knochenmark.
- (2) Es wird in Makrophagen zu unkonjugiertem Bilirubin aufgespalten und an Albumin gebunden mit dem Blut zur Leber transportiert.
- (3) In der Leber wird das Bilirubin konjugiert und kann anschließend mit der Galle ausgeschieden werden.
- (4) Ein Teil von konjugiertem Bilirubin tritt vorübergehend in die Blutbahn.
- (5) Das über die Galle in den Darm gelangte Bilirubin wird durch Bakterien dekonjugiert und dann zu Urobilinogen reduziert.
- (6) Urobilinogen wird zu einem Teil mit dem Stuhl ausgeschieden, wobei es in das braune Stercobilin umgewandelt wird.
- (7) Ein anderer Teil des Urobilinogens wird jedoch im Darm resorbiert und verlässt den Körper auf zwei Wegen:
 - (8) Der Großteil wird erneut über die Leber ausgeschieden (enterohepatischer Kreislauf)
 - (9) Ein kleiner Teil wird über den Urin ausgeschieden, wo ein Teil davon in das gelbe Urobilin oxidiert.

Lokalisation

Pathologie

Prähepatisch




Hämolyse

Z.B. Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel, Sphärozytose

Ineffektive Erythropoese

Z.B. Thalassämie, perniziöse Anämie (Vitamin-B12-Mangel)

Intrahepatisch



Nicht-obstruktive Cholestase

Z.B.:


- Hepatitis
- Leberzirrhose
- Stauungsleber
- Primär biliäre Zirrhose (PBC)
- Zystische Fibrose

Mechanisch-obstruktive Cholestase

Z.B.:

- Lebertumoren
- Intrahepatische Gallensteine
- Primär sklerosierende Cholangitis (PSC)

Posthepatisch



Z.B.:

- Choledocholithiasis
- Entzündliche Prozesse (z.B. PSC)
- Fehlbildungen der Gallenwege
- Tumoren (z.B. Pankreaskarzinom)
- Gallengangsstrikturen

Ikterus

Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel

von lateinisch: faba - Bohne

Synonyme: Favismus, G6PD-Mangel, G-6-PDH-Mangel

Englisch: Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, G6PD deficiency, favism

Inhaltsverzeichnis

- 1 Definition
- 2 Epidemiologie
- 3 Genetik
- 4 Pathophysiologie
- 5 Klinik
 - 5.1 Neugeborenenikterus
 - 5.2 Akute hämolytische Anämie
- 6 Diagnostik
 - 6.1 Klassifikation
- 7 Differenzialdiagnostik
- 8 Therapie
- 9 Literatur

1 Definition

Der Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel, kurz G6PD-Mangel, ist eine **genetisch** bedingte Erkrankung, die durch einen Mangel des **Enzyms Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase** zu **rezidivierenden hämolytischen Anämie** führt.

ICD-10-Code: D55.0

2 Epidemiologie

Der G6PD-Mangel kommt häufig in tropischen und subtropischen Ländern (Afrika, Südeuropa, mittlerer Osten, Südostasien und Ozeanien) vor. Vermutlich sind weltweit mindestens 400 Millionen Menschen Träger des mutierten **Allels**. Etwa 10% der männlichen afroamerikanischen Bevölkerung sind betroffen. Die **Prävalenz** des G6PD-Mangel in Deutschland beträgt unter einem Prozent.

Die hohe **Allelfrequenz** von ungefähr 20% in **Malaria-Endemiegebieten** erklärt sich durch den **Selektionsvorteil**, den **heterozygote** Anlageträger besitzen: Eine relative Resistenz gegenüber der sonst oft letal verlaufenden Infektion mit **Plasmodium falciparum**. Die Erreger können sich offenbar durch die Störung des **Hexosemonophosphatwegs** nicht ausreichend vermehren. Daher bleibt ein Ausbruch der Erkrankung aus. Der gleiche Effekt findet sich beispielsweise bei der **Sichelzellanämie**. Ironischerweise löst eine Malariatherapie mit **Chloroquin** bei vorliegendem G6PD-Mangel eine Hämolyse aus.

3 Genetik

Das G6PD-Gen hat eine Länge von ungefähr 18,5 **kB** und weist 13 **Exons** auf. Es befindet sich auf dem langen Arm des **X-Chromosoms** an **Genlokus** Xq28.

Ursache des G6PD-Mangels sind über 150 verschiedene **Mutationen** im G6PD-Gen. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um **Missense-** oder **Nonsense-Mutationen**. Die häufige Varianten sind:

- Defektvariante A: Restaktivität der G6PD von 5 bis 15 % der Norm; kommt in der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA, in Westafrika und in Südeuropa vor
- Mediterrane Defektvariante: Restaktivität auf unter 1 % der Norm; insbesondere an den Küsten des Mittelmeeres, im mittleren Osten und in Indien
- G6PD Vianchan und G6PD Mahidol: In Südostasien
- G6PD Canton: In China
- G6PD Union: Weltweit

Der genetische Defekt wird **X-chromosomal-rezessiv** vererbt, entsprechend erkranken Männer und **homozygot** betroffene Frauen. **Heterozygote** Frauen besitzen sowohl betroffene als auch gesunde Klone von Erythrozyten und können gesund oder krank sein (genetisches **Mosaik**).

4 Pathophysiologie

Oxidative Stoffe bewirken im Körper unter anderem die Bildung von **Wasserstoffperoxid**. Unter **Oxidation** von **Glutathion** vermittelt die **Glutathion-Peroxidase** die Überführung von Wasserstoffperoxid in Wasser. Um oxidiertes Glutathion wieder in die **antioxidativ** wirksame, reduzierte Form umzuwandeln, benötigt das Enzym **Glutathionreduktase** das **Coenzym NADPH**. NADPH wird in den Erythrozyten durch **Glycolyse** produziert. 90 - 95% der **Glucose** wird zur Herstellung von **ATP** verbraucht, die restlichen 5 - 10% zur Bildung von NADPH auf dem Hexosemonophosphatweg (Pentosephosphat-Zyklus). Dabei wandelt das Enzym Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase **Glucose-6-phosphat** und **NADP+** zu **6-Phosphogluconolacton** und NADPH um.

Da die Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase in Erythrozyten die einzige Quelle für NADPH darstellt, führt eine verminderte Enzymaktivität zu einem fehlenden Schutz der Erythrozyten gegenüber oxidativem Stress. Entsprechend können **Peroxidasen** ungehindert die **Erythrozytenmembran** und die **SH-Gruppen** von **Proteinen** angreifen.

Weiterhin benötigt die **Methämoglobin-Reduktase** NADPH zur Reduktion von Fe^{3+} zu Fe^{2+} . Entsprechend kann ein G6PD-Mangel unter bestimmten Situationen zur **Methämoglobinämie** führen.

5 Klinik

Träger eines G6PD-Mangels sind meist asymptomatisch, besitzen jedoch ein erhöhtes Risiko für einen **Neugeborenenikterus** und für eine akute hämolytische Anämie, die durch bestimmte oxidative Substanzen ausgelöst wird.

5.1 Neugeborenenikterus

Der Neugeborenenikterus auf Grundlage eines G6PD-Mangels zeigt sich meist erst am zweiten oder dritten Lebenstag. Die häufig nur geringe Anämie kann jedoch im Rahmen von **Infektionen**, in Zusammenhang mit bestimmten Umweltfaktoren (z.B. **Naphthalin**) oder bei Koexistenz des **Gilbert-Meulengracht-Syndroms** schwere Formen annehmen. In diesen Fällen kann ein **Kernikterus** mit permanenten **neurologischen** Schäden entstehen.

5.2 Akute hämolytische Anämie

Eine akute hämolytische Anämie kann beim G6PD-Mangel durch verschiedene Situationen ausgelöst werden:

Genuss von bestimmten Nahrungsmitteln: **Saubohnen** (Favabohnen), Erbsen, Johannisbeeren

Infektionen

metabolische Azidose

Einnahme von bestimmten **Medikamenten**:

Malariamittel: Primaquin, Chloroquin

Sulfonamide: Sulfamethoxazol, Sulfasalazin

Antibiotika: Cotrimoxazol, Nitrofurantoin, Ciprofloxacin

ASS (vor allem hochdosiert)

Metamizol

Rasburicase

Naphthalin, **Anilinderivate**

Ascorbinsäure (> 1 g)

Vitamin-K-Analoga

Im Schub können **Fieber**, **Schüttelfrost**, Rücken- und Bauchschmerzen, Schwäche und **Schock** auftreten. Um der Hämolyse entgegenzuwirken, werden in verstärktem Maß **Retikulozyten** in das Blut abgegeben, deren Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase bei **hemizygoten** und **heterozygoten** Personen mit der Defektvariante A noch Restaktivität zeigt, sodass die Krise überwunden werden kann. Bei Erkrankten mit der mediterranen Defektvariante dagegen ist der Mangel an funktionsfähigem Enzym in der Regel viel stärker ausgeprägt, sodass es unter Umständen zu einer **Hämoglobinurie** und einem akuten **Nierenversagen** kommt.

6 Diagnostik

Die Anämie ist meist **normochrom** und **normozytär**. Als Zeichen einer **extravasalen Hämolyse** sind **LDH**, **Retikulozyten** und **indirektes Bilirubin** erhöht. Aufgrund einer zumindest teilweisen **intravasalen Hämolyse** zeigt sich eine **Hämoglobinurie** und ein vermindertes **Haptoglobin**.

Im Blutausstrich finden sich **Sphärozyten** sowie eine **Anisozytose** und **Polychromasie**. Weiterhin tauchen in der **Supravitalfärbung Heinz-Körper** auf.

Die definitive Diagnose gelingt mit einer quantitativen Testung der Enzymaktivität oder durch eine **molekulargenetische Untersuchung**.

6.1 Klassifikation

Die **WHO** klassifiziert den G6PD-Mangel nach der relativen Enzymaktivität von G6PD in den Erythrozyten:

| WHO | Relative Enzymaktivität (in % normal) | Klinik |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | vermindert | chronische hämolytische Anämie |
| 2 | <10% | schwerer G6PD-Mangel |
| 3 | 10-60% | mäßiger G6PD-Mangel |
| 4 | normale Aktivität (60-100%) | kein G6PD-Mangel |
| 5 | gesteigerte Aktivität (> 110%) | kein G6PD-Mangel |


7 Differenzialdiagnostik

Ein G6PD-Mangel ist insbesondere gegenüber **Hämoglobinopathien**, der **hereditären Sphärozytose**, **autoimmunhämolytischen Anämien** und der **paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie** abzugrenzen.

8 Therapie

Eine kausale Therapie gibt es derzeit (2019) nicht. Die Behandlung besteht daher in der Vermeidung der oben genannten Auslöser. Die Lebenserwartung unterscheidet sich dann nicht von gesunden Menschen.

Zur Behandlung einer akuten hämolytischen Krise bei G6PD-Mangel wird in Einzelfällen Haptoglobin eingesetzt, wobei der therapeutische Effekt umstritten ist. Im Gegensatz zur hereditären Sphärozytose besteht kein Hinweis auf einen selektiven Zelluntergang in der **Milz**. Dennoch kann die **Splenektomie** in der Praxis bei schweren Verläufen vorteilhaft sein.



Begleitsymptome (bei cholestatischen Erkrankungen)

- Helle Stühle
- Dunkler Urin
- Pruritus (Reizung der peripheren Nerven wegen Retention von Gallensäuren)
- Steatorrhö, Gewichtsverlust (durch Fettmalabsorption; die Galle ist zur Emulsion der Lipide notwendig)

Diagnostik

Anamnese und körperliche Untersuchung

- Anamnese: Medikamente, frühere Hepatitis, Alkoholabusus
- Klinische Zeichen der Leberzirrhose →

Labor

- Cholestaseparameter
 - Alkalische Phosphatase (AP) ↑
 - Gamma-Glutamyl-Transferase (γ -GT) ↑
 - Bilirubin ↑ (Die Differenzierung in indirektes und direktes Bilirubin hilft bei der weiteren Eingrenzung der möglichen Ursachen)
- Transaminasen (AST = GOT, ALT = GPT)
 - De-Ritis-Quotient (AST/ALT): Erlaubt die Einschätzung der Schwere einer Leberzellschädigung (ALT befindet sich im Zytoplasma, AST in den Mitochondrien der Hepatozyten. Der Zytoplasmahalt wird bereits bei einer geringeren Schädigung in das Serum freigesetzt als der Inhalt der Mitochondrien. Daher überwiegt erst bei schwerer Leberzellschädigung das AST gegenüber dem ALT)
 - < 1 = „Entzündungstyp“
 - ≥ 1 = „Nekrosentyp“


„-AST findet sich auch in der Skelett- und Herzmuskulatur, so dass differentialdiagnostisch auch Muskelerkrankungen und insbesondere ein Myokardinfarkt bei einem Quotienten ≥ 1 bedacht werden müssen!“

- Entzündungsparameter
- Erhöhte Cholesterolspiegel (bei Cholestase)
- Ggf. Hämolyseparameter, Hepatitis-Serologie, Autoantikörper

Entzündungsparameter
Cholestaseparameter $\leftarrow \begin{matrix} AP \\ \gamma GT \\ Bil \end{matrix}$
Transaminase AST, ALT
Cholesterin
Hämolyseparameter
Hepatitis

Hämolysezeichen

- **Haptoglobin ↓**: Es wird nur das freie ungebundene Haptoglobin gemessen; dieser empfindliche Parameter ist bei Hämolyse erniedrigt, weil Haptoglobin frei gewordenen Hämoglobin bindet
 - Die Erniedrigung tritt i.d.R. nur bei intravasaler Hämolyse auf!
 - Erkrankungen, bei denen die Anämie auf einem Abbau der Erythrozyten in der Milz beruht (extravasale Hämolyse), gehen nur bei hämolytischen Krisen mit einer Erniedrigung des Haptoglobins einher
 - Extravasale Hämolyse: Überwiegend immunhämolytische Anämien, einige korpuskuläre Anämien
 - Intravasale Hämolyse: Mikroangiopathische hämolytische Anämien, einige korpuskuläre Anämien
 - CAVE! Erhöhte bzw. "falsch-normale" Haptoglobinwerte bei Vorliegen einer Entzündungsreaktion
- **LDH ↑**: Unspezifischer Parameter, der einen erhöhten Zelluntergang (wie z.B. bei der Hämolyse) widerspiegelt
- **Indirektes Bilirubin ↑**: Das bei der Hämolyse frei werdende Hämoglobin wird zu (indirektem) Bilirubin abgebaut, welches in der Leber (zu direktem Bilirubin) konjugiert werden muss
 - Durch die erhöhten Spiegel kann es zum hämolytischen Ikterus kommen
 - Urobilinogenurie
- **Retikulozyten ↑**: Unreife Erythrozyten, die aufgrund einer kompensatorischen Erythropoese reaktiv vermehrt im Blut zu finden sind
- Ggf. **freies Hämoglobin ↑**
 - Brauner Urin aufgrund einer Hämoglobinurie



Leberzirrhose

Bildgebung

Sonographie

Hohe Spezifität und Sensitivität zur Unterscheidung der Cholestaseformen:

- **Obstruktive Cholestase** *Stauung, Steine, Tumoren*
 - Gestaute Gallenwege
 - Extrahepatisch: Dilatierter DHC (Ductus hepatocholedochus), ggf. **Double-Duct-Sign** *CBD & Pancreatic duct sind dilatiert + loss of Signal distal.*
 - Intrahepatisch: **Doppelflintenphänomen** (Dilatation der intrahepatischen Gallenwege)
 - Ggf. Stauungsursache wie Steine, Tumoren, Cholangitis
- **Nicht-obstruktive Cholestase**
 - Fehlen der o.g. Stauungszeichen
 - Ggf. Nachweis der Grunderkrankung (z.B. Leberzirrhose) *Aszytix*

Evtl. Weitere Bildgebung

wie CT, MRCP, ERCP je nach Klinik

Differentialdiagnostik Ikterus

- **indirektes (unkonjugiertes) Bilirubin** ↑ *prähepatisch*
 - vermehrter Bilirubinanstieg (Hämolyse) *G6PD, Sphärozytose*
 - Gestörte hepatische Aufnahme (Medikamente) *Gilbert*
 - Gestörte hepatische Konjugation (M. Meulengracht)
- **direktes (konjugiertes) Bilirubin** ↑ : Cholestase *hepatisch, posthepatisch*
 - **AST, ALT** ↑ : Leberzellschaden
 - **AP, γ-GT** ↑ : Cholestase
 - Gallenwege in Sono normal : **Intrahepatische Cholestase**
 - Gallenwege in Sono erweitert : **Extrahepatische Cholestase**

Morbus Gilbert-Meulengracht

ist eine Störung des Bilirubin-Stoffwechsels. Sie führt zu einer leichten Hyperbilirubinämie.

Verminderung der Aktivität der Bilirubin-UDP-Glukonyltransferase auf unter 50 %

| Genese | Stuhlfarbe | Indir Bili im Serum | Dir Bili im Serum | Bili im Urin | Urobilinogen im Urin | Weitere wegweisende Befunde |
|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---|
| Prähepatischer Ikterus | Dunkel (normal) | ↑↑ | Normal | Normal | ↑↑ (kein dunkler Urin) | - Hämolyseparameter ↑ - Anämie |
| Intrahepatischer Ikterus | Hell oder dunkel | ↑ | ↑ | ↑ (dunkler Urin) | Normal oder ↑ | - Transaminasen ↑ - Cholestaseparameter ↑ |
| Posthepatischer Ikterus (= obstruktive Cholestase) | Hell | Normal | ↑↑ | ↑↑ (sehr dunkler Urin) | Normal | - Gestaute Gallenwege - Cholestaseparameter ↑↑ |


Differentialdiagnosen (Weitere Ursachen von Pruritus)

- **Dermatologische Erkrankungen** : Urtikaria, Ekzem.
- **Medikamente** : Opiode, ACE-Hemmer
- **Infektionen** : Parasiten (z.B. Skabies)
- **Stoffwechselerkrankungen** : Diabetes mellitus, Hyperurikämie
- **Renale Erkrankungen** : Chronische Niereninsuffizienz mit Urämie
- **Hämatologische Erkrankungen** : Eisenmangelanämie
- **Neurologische Erkrankungen** : Polyneuropathie


Therapie

- Behandlung je nach ursächlicher Erkrankung
- Therapie des cholestatischen Pruritus: **Colestyramin** (Hemmung der intestinalen Gallensäureresorption)

bindet Gallensäure im Dünndarm irreversibel



Abrupt loss of bile signal at the distal portions of the common bile duct & pancreatic ducts with mild dilatation of their proximal portions (giving rise for the characteristic double duct sign) and to less degree the central intra-hepatic biliary radicles.



Flinte
aus Rohr
nel

Querschnittsbild durch den linken Leberlappen. In der Mitte mehrere „Doppelflutenphänomene“ als Zeichen eines Gallestaus. Es liegt eine obstruktive Cholestase vor.

Komplikationen

- Komplikationen der jeweiligen Grunderkrankung
- Komplikationen der Cholestase : **Hepatomegalie** (Gallenrückstau)
- Bei Neugeborenen : Gefahr eines **Kernikterus**

Hyperbilirubinämie-Syndrome (hereditär)


- **Indir. BLB ↑** : **Konjugationsstörung** (Meulengracht, Crigler-Najjar)
- **Dir. BLB ↑** : **Transportstörung** (Dubin-Johnson-Sd, Rotor-Sd) *sehr selten, kein Therapie notwendig*

Morbus Gilbert (Morbus Meulengracht)

- **Ätiologie** : Gering verminderte Aktivität des Enzyms Glucuronyltransferase (gering gestörte Konjugation)
- **Auslösende Faktoren** : Körperliche Anstrengung, Fastenperioden, Alkoholkonsum
- **Diagnostik** : Indirektes Bilirubin ↑ (Sonst normale Blut-/Leberwerte), Nachweis der Mutation mittels PCR (*genetisch vgl.*), *Fastentest*, *Nikotensäure-Test (inj → ↑ Bilirubin)*
- **Klinik** : Ikterus. Evtl. Inappetenz oder Schläppheit
- **Keine Therapie notwendig**

Crigler-Najjar-Syndrom

- Aktivität der Glucuronyltransferase **stark vermindert** (stark gestörte Konjugation)




Da Bilirubin aber wasserunlöslich ist, wird es im Blut an Albumin gebunden transportiert. Diese Form von Bilirubin wird als **indirektes (unkonjugiertes, wasserunlösliches) Bilirubin (IBIL)** bezeichnet.

In der Leber wird Bilirubin dann wasserlöslich gemacht (an Glucuronsäure gebunden). Diese Form des Bilirubins wird als **direktes (konjugiertes, wasserlösliches) Bilirubin (DBIL)** bezeichnet.

Prähepatischer Ikterus

Ursache



- Ineffektive Erythropoese
- Thalassemie
- primäre Hämie


Labor



Urin





Stuhl



Labor

durch bei der Hämolyse frei werdendes Hämoglobin ist das Haptoglobin im Blut erniedrigt; es bildet einen Komplex mit Hb, um in die Leber aufgenommen zu werden

Hämolyse




- indirektes (unkonjugiertes) Bilirubin
nicht wasserlöslich -> renale Ausscheidung nicht mögl.
- direktes (konjugiertes) Bilirubin
wasserlöslich -> renale Ausscheidung mögl.
- Urobilinogen
entsteht im Darm aus direktem Bilirubin
Reabsorption im enterohepat. Kreislauf
wasserlöslich -> renale Ausscheidung mögl.

Intrahepatischer Ikterus

Ursache

Leberschädigungen

unterschiedlichster Art
(z.B. Virushepatitis,
Zirrhose, Alkohol u.v.m.)



Labor

indirektes
Bilirubin

direktes
Bilirubin

Transaminase
ALAT/ASAT

Urin

braun

Bilirubin +

Stuhl


hell

Labor

durch Zellschäden und -
nekrosen steigen die
Transaminasen im Blut an

durch die Schädigung der
Hepatozyten ist auch die
Exkretion des direkten
Bilirubins vermindert;
dadurch Anstieg des
direkten Bilirubins

durch die Schädigung der
Hepatozyten ist die
Konjugation vermindert;
dadurch Anstieg des
indirekten Bilirubins



Ursachen

sind vielfältig; entscheidend ist die
direkte Schädigung der
Hepatozyten, etwa durch:

(Virus)hepatitis
Leberzirrhose
Alkohol
Medikamente
Toxine, Pilze o.a. Substanzen
M. Wilson (Kupferablagerung)
Hämochromatose (Eisenablagerung)
u.v.m.



indirektes (unkonjugiertes) Bilirubin

nicht wasserlöslich -> renale Ausscheidung
nicht mögl.

direktes (konjugiertes) Bilirubin

wasserlöslich -> renale Ausscheidung mögl.


Urobilinogen

entsteht im Darm aus direktem Bilirubin
Reabsorption im enterohepat. Kreislauf
wasserlöslich -> renale Ausscheidung mögl.

Posthepatischer Ikterus

Ursache

Cholestase



Steine
Tumoren
Strikturen

Labor

direktes
Bilirubin



Cholestaseparameter

gamma-GT
AP




Urin

braun

Bilirubin +

Stuhl

hell



Labor

durch die Cholestase sind auch die Cholestase-anzeigenden Enzyme gamma-GT und Alkalische Phosphatase (AP) im Blut erhöht

indirektes (unkonjugiertes) Bilirubin

nicht wasserlöslich -> renale Ausscheidung nicht mögl.


direktes (konjugiertes) Bilirubin

wasserlöslich -> renale Ausscheidung mögl.

Urobilino-gen

entsteht im Darm aus direktem Bilirubin
Reabsorption im enterohepat. Kreislauf
wasserlöslich -> renale Ausscheidung mögl.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

Funktion

Exokrin: Produktion von Verdauungssäften

Endokrin: Regulation des Blutzuckers über Insulin und Glucagon

Länge

12–15 cm

Gewicht

Ca. 70 g

Lage

Sekundär retroperitoneal quer im Oberbauch

Arterielle Versorgung

Caput:

- Truncus coeliacus → A. hepatica communis
→ A. gastroduodenalis → Aa. pancreaticoduodenales
superiores posterior und anterior
- A. mesenterica superior → A. pancreaticoduodenalis
inferior

Korpus und Cauda:


- Truncus coeliacus → A. splenica → A. pancreatica
inferior / A. pancreatica dorsalis / A. caudae pancreatis / A. pancreatica
magna

Venöser Abfluss


Vv. pancreaticae → V. splenica → V. portae hepatis

Mögliche Krankheitssymptome

Gürtelförmiger Bauchschmerz, Blutzuckerschwankungen,
Fettstuhl, Gewichtsabnahme





Histologie der Bauchspeicheldrüse



Exokrine Acini

Schaltstück

Endokrine
Langerhans-Insel



Exocrin

Verdauungsenzyme des Pankreas (Auswahl)

| Enzym | Proenzym | Zu spaltende Nahrungsbestandteile |
|--|--|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • α-Amylase | <ul style="list-style-type: none"> • - | Kohlenhydrate |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lipase • Phospholipase A • Cholesterinesterase | <ul style="list-style-type: none"> • - • Prophospholipase A • - | Fette |
| <ul style="list-style-type: none"> • Elastase • Carboxypeptidase • Trypsin • Chymotrypsin | <ul style="list-style-type: none"> • Proelastase • Procarboxypeptidasen • Trypsinogen • Chymotrypsinogen | Proteine |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ribonuklease • Desoxyribonuklease | <ul style="list-style-type: none"> • - • - | RNA/DNA |

Endocrin

Zelltypen der Pankreasinseln

| Zelltyp | Anteil | Hormon |
|--|--------|----------------------------------|
| A-Zelle (Alphazelle, α -Zelle) | 20% | Glucagon |
| B-Zelle (Betazelle, β -Zelle) | 70-80% | Insulin |
| D-Zelle (Deltazelle, δ -Zelle) | 5% | Somatostatin |
| PP-Zelle | 1-2% | Pankreatisches Polypeptid |

Akute Pankreatitis ++

Ätiologie

- Gallenwegserkrankungen = „Biliäre Pankreatitis“ (z.B. Choledocholithiasis,...): 45%
- Alkoholabusus = « alkoholische Pankreatitis »: ca. 35%
- Idiopathisch: ca. 15%
- Weitere Ursachen: Hypertriglyceridämie, Hyperkalzämie, Iatrogen (z.B. bei ERCP),...

Klassifikation (Atlanta-Klassifikation)

- **Leichte akute Pankreatitis**: Ohne lokale Komplikationen (Nekrosen) und ohne systemische Komplikationen (Organversagen)
- **Mittelschwere akute Pankreatitis**: Mit lokalen Komplikationen oder passagerem Organversagen (z.B. Nierenversagen), welches sich binnen 48 h bessert
- **Schwere akute Pankreatitis**: Mit anhaltendem Organversagen (länger als 48 h) oder Multiorganversagen

Pathophysiologie

- Autodigestion des Organs durch proteolytische Enzyme → Inflammatorische Reaktion → Ödeme, Vasodilatation, Blutungen, ggf. Nekrotisierung

Symptome/Klinik

- **Leitsymptome**: Plötzlich einsetzender **Oberbauchschmerz**. Evtl. gürtelförmig mit Ausstrahlung in den Rücken. Kolikartig bei Gallensteinen
- Übelkeit, Erbrechen
- Meteorismus (paralytischer Ileus).
- Evtl. Fieber, Ikterus
- Evtl. Schocksymptomatik

Diagnostik

Anamnese

- Schmerzen (OPQRST-Schema)
- Ursache? Gallensteine, Alkohol, ERCP, ↑Ca²⁺, ↑TG

Körperliche Untersuchung

- Prall-elastisches Abdomen („Gummibauch“).
- Evtl. Tachykardie, Hypotonie, Oligurie/Anurie (Schockzeichen).
- Evtl. Aszites, Pleuraerguss.
- Evtl. Hautzeichen: **Ekchymosen** (Periumbilikal: **Cullen-Zeichen**, Flankenregion: **Grey-Turner-Zeichen**, Leistenregion: **Fox-Zeichen**)
- Evtl. EKG-Veränderungen (T-Negativierungen)

Labor

- **Lipase im Serum** ↑ (Bei >180 U/L besteht der Verdacht auf eine Pankreatitis), ggf.

Amylase ↑ 40-140 U/L

NL: 0-160 U/L

- ALT ↑ spricht für eine biliäre Pankreatitis
- γ-GT ↑ und MCV ↑ spricht für eine alkoholische Pankreatitis
- Prognostisch ungünstige Zeichen (**Ranson-Score**)

- Bei Aufnahme: Alter >55 Jahre. Leukozytose. Hyperglykämie. LDH ↑. AST ↑
- Nach 48 h: pO₂ ↓. Hämatokrit ↓. Calcium ↓. Harnstoff ↑. Basendefizit. Flüssigkeitssequester/-defizit

Apparative Diagnostik

- **Abdomensonographie**: Mittel der 1. Wahl.
 1. Verminderte Echogenität mit unscharfe Begrenzung der Pankreasloge
 2. Ggf. Nachweis von Komplikationen: Nekrosen, Abszesse, Pseudozysten
 3. Ätiologische Abklärung: Nachweis einer Choledocholithiasis bzw. von erweiterten Gallenwegen (biliäre Pankreatitis)
 4. Peripankreatische Flüssigkeitsansammlung
- **Endosonographie oder MRCP**: Weiterführende Diagnostik bei V.a. biliäre Genese





Figure 1: (A) Periumbilical ecchymosis (Cullen sign) and (B) connecting patches



bei Aufnahme nach 48 h

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Alter >55 | P _a O ₂ <60 |
| WBCs >16000 | Hct ↓ >10% |
| Glucose >200 | Ca ²⁺ <8 |
| LDH >350 | Urea ↑ >10 mg/dl |
| AST >250 | BE >4 |
| | fluids >6l loss |

Score <3 Mortality 0-3%

Score >3 Mortality 11-15%

Score >6 Mortality 40%

- **ERCP**: Weiterführende Diagnostik zur Darstellung des Gallen- und Pankreasgangsystems mit gleichzeitiger Interventionsmöglichkeit (z.B. Steinextraktion)
- **Ggf. CT mit Kontrastmittel** im Verlauf: Einschätzung des Schweregrades. Nachweis von Komplikationen: Nekrosen, Abszesse, Pseudozysten.
- **Ggf. Röntgen-Thorax oder Abdomen**: Nachweis von Komplikationen (Pneumonie, Pleuraerguss, Ileus)

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Stationäre Aufnahme
- Parenterale Flüssigkeitszufuhr (mind. 3 l/Tag)
- *Sondennahrung* Enterale Ernährung durch Anlage einer Jejunalsonde (Nahrungskarenz nicht mehr empfohlen)
- Fettthaltige Nahrung vermeiden

Medikamentöse Therapie

- Analgetika (Metamizol)
- PPI (Omeprazol zur Stressulkusprophylaxe)
- Thromboseprophylaxe
- Ggf. **Antibiotikatherapie** (bei Cholangitis und/oder infizierten Nekrosen) *Fieber*

Interventionelle Therapie

- **Bei Cholangitis**: Antibiotikatherapie und **sofortige ERCP**
- **Bei Choledocholithiasis**:
 - **Antibiotikatherapie**
 - ERCP zur Darstellung und Extradktion von Gallensteinen (Papillotomie mit Steinextraktion) nach spätestens 48 Stunden
 - Cholezystektomie innerhalb von 72 Stunden

Operative Therapie

- **Bei nicht infizierten Nekrosen**: Keine Intervention
- **Bei Komplikationen** (z.B. Arrosionsblutung, Perforation): absolute OP-Indikation

Komplikationen

Lokal

- **Pankreasabszess**:
 - Entsteht aus einer bakteriellen Infektion der Nekrosen/ Pseudozysten
 - Therapie: Punktion mit Drainage, bei Scheitern Operation mit Nekrorektomie

Blutungen

Paralytischer Ileus

- Pfortaderthrombose, Milzinfarkt
- Fistelbildung durch Darmarrosion

Systemisch

- Sepsis
- Schock
- Nierenversagen
- Respiratorische Insuffizienz, Pneumonie

Prognose

- **Letalität**
 - Unkomplizierte Pankreatitis: 1 %
 - Nekrotisierende Pankreatitis: 20 %
- **Risikofaktoren für einen schweren Verlauf**: **Ranson-Score++**, Atlanta-Klassifikation

Kalkulierte antibiotische Therapie der akuten Pankreatitis

- **Carbapeneme** wie z.B. **Meropenem 3g/24 h** und **Imipenem/Cilastatin 500/500mg /24hs** sind nachweislich wirksam sowie pankreas- und nekrosegängig

Alternativen

- Kombination aus Ciprofloxacin und Metronidazol
- Kombination aus **Ceftriaxon und Metronidazol**
- Kombination aus **Piperacillin und Tazobactam**

bei bilige Cholangitis, Nekrosen, Fieber, Leukozytose & Entzündungsparameter

Chronische Pankreatitis +/-

Ätiologie

- **Alkoholabusus** (ca. 80%)
- Idiopathisch

Akute Pankreatitis
- Bilirubin (Cholelithiasis) 15%
- Alkoholisch 35%
- idiopathisch 15%
- iatrogenisch ERCP, 9TG, 9Ca²⁺

Symptome/Klinik

- **Leitsymptom:** rezidivierende gürtelförmige Oberbauchschmerz mit Ausstrahlung in die Seiten und in den Rücken
- Übelkeit, Erbrechen, Gewichtsverlust, Diarrhö, Steatorrhö (Exokrine Insuffizienz).
Diabetes mellitus (Endokrine Insuffizienz)

Diagnostik

Anamnese und körperliche Untersuchung

Labor

- **Blut:** Pankreasenzyme (Lipase, Amylase, Elastase-1) ↑ bei akutem Schub
- **Stuhl:** Elastase-1-Konzentration <200 µg/g Stuhl → Exokrine Pankreasinsuffizienz

Bildgebende Verfahren

- **Sonographie:** Pankreasverkalkungen
- Ggf. MRCP und CT mit Kontrastmittel
- **Endosonographie**
- Ggf. ERCP: Kaliberunregelmäßigkeiten und ggf. Steine im Gallen- und Pankreasgangsystem

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Strikte Alkohol- und Rauchkarenz
- Kleine und häufige Mahlzeiten, kohlenhydratreich und fettarm

Medikamentöse Therapie

- Im Schub: Therapie entsprechend akuter Pankreatitis: Salzinne, Flüssigkeitzufuhr, Sauerstoffzufuhr, Analgetika, PPI, und ggf. Thrombozytopenie
- Substitution pankreatischer Enzyme bei exokriner Pankreasinsuffizienz zu den Mahlzeiten
- Bedarfsgerechte Insulingabe bei endokriner Insuffizienz

Operative Therapie

Bei V.a. ein Pankreaskarzinom in der Bildgebung, therapieresistenter Schmerz bzw.

Komplikationen

Interventionelle Therapie

- Stenosen und Strikturen des Pankreasganges → Ballondilatation, Stents
- Pankreasgang-Konkremente → Papillotomie und Steinentfernung

Komplikationen

- **Pseudozysten:** Sie können sich spontan zurückbilden. Bei symptomatischen Zysten oder Komplikationen (Infektion, Kompression, Ruptur) CT-gesteuerte, endoskopische oder operative Drainage
- **Weitere Komplikationen:** Pankreasabszess, Pfortaderthrombose, Milzvenenthrombose, Pankreoprivier Diabetes mellitus, Pankreaskarzinom

Pankreaskarzinom ++

Epidemiologie

- Häufigkeitsgipfel zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr
- Dritthäufigster Tumor des Gastrointestinaltrakts (hinter Kolon- und Magenkarzinom)

Ätiologie

- unklar
- Genetische Disposition
- **Risikofaktoren :**
 - Rauchen
 - Adipositas
 - Alkoholkonsum
 - Chronische Pankreatitis

Klassifikation

- TNM-Klassifikation
- Stadieneinteilung der UICC (Union for International Cancer Control)

Symptome/Klinik

- **Keine Frühsymptome!**
- **Mögliche Symptome**
 - Oberbauchschmerzen
 - Schmerzloser Ikterus
 - Übelkeit, Erbrechen
 - Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Schwäche
 - **Courvoisier-Zeichen:** Prallelastische, schmerzlose Gallenblase + Ikterus (durch Verschluss des Ductus choledochus)
 - **Hyperkoagulabilität** (paraneoplastisches Syndrom)
 - **Thrombophlebitis migrans** (Trousseau-Syndrom)
 - Rezidivierende Thrombophlebitis (Entzündung oberflächlicher Venen) mit unterschiedlichen Lokalisationen
 - Ätiologie: Paraneoplastisch (v.a. bei Pankreas- und Bronchialkarzinom), Vaskulitiden,...
 - (Rezidivierende) Thrombosen (z.B. Phlebothrombose, Milzvenenthrombose)

„Die Symptome können denen einer chronischen Pankreatitis ähneln. Es handelt sich um eine schwierige Differentialdiagnose, da bei Karzinomen auch eine Begleitpankreatitis vorliegen kann!“

Diagnostik

Anamnese und körperliche Untersuchung

Risikofaktoren, Courvoisierzeichen

Labor

- Tumormarker zur Verlaufskontrolle: CA 19-9 und CEA
- Evtl. Lipase↑ bei Begleitpankreatitis

[bei Magen CA, CA72-4, CA19-9, CEA]

Bildgebung

- **Wegweisender Befund:** „**Double-Duct-Sign**“ (Dilatation des Ductus choledochus und pancreaticus)
- **Strategien der Bildgebung :**
 - **Abdomensonographie und Endosonographie, CT-Abdomen mit Kontrastmittel,** Ggf. MRT + MRCP + MR-Angiographie
 - Befunde : Raumforderung meist im Kopfbereich des Pankreas, Dilatation der Gallenwege (Double-Duct-Sign), Ggf. Lebermetastasen oder Peritonealkarzinose
 - **Ggf. ERCP : Double-Duct-Sig.** Erweiterung intrahepatischer Gallenwege, irreguläre Stenose im Ductus pancreaticus

Pathologie

- **Lokalisation:** Pankreaskopf (70%)
- Meist **Adenokarzinome** (Seltener Insulinom, Gastrinom)


Differentialdiagnosen

- **Pankreaszyste**
- **Pankreasmetastasen:** Sehr selten
- **Pankreatitis**

Therapie

Kurative Therapie: Operation + adjuvante Chemotherapie (nach R0-Resektion)

- **Pankreaskopfkarzinom**
 - **Pylorusershaltende partielle Duodenopankreatektomie (nach Traverso):** Methode der Wahl
 - Pankreaskopfresektion, Duodenumteilresektion, Resektion von Gallenblase und Ductus choledochus sowie Lymphadenektomie, Rekonstruktion durch Roux-Y-Schlinge mit Pankreatikojejunostomie, Duodenojejunostomie und biliodigestive Anastomose
 - **Partielle Duodenopankreatektomie ("Whipple-OP")** bei Infiltration des Bulbus duodeni
 - Pankreaskopfresektion, distale Magenteilresektion, Duodenumresektion, Resektion von Gallenblase und Ductus choledochus sowie Lymphadenektomie, Rekonstruktion durch Roux-Y-Schlinge mit Pankreatikojejunostomie, Gastrojejunostomie und biliodigestive Anastomose
- **Karzinome des Pankreaskorpus und -schwanzes**
 - Pankreaslinksresektion mit Splenektomie
 - **Totale Duodenopankreatektomie:** Vollständige Pankreasresektion und Splenektomie, wenn geringeres Resektionsausmaß unzureichend



Palliative Therapie

- **Palliative Chemotherapie:** Bei fortgeschrittenem oder metastasiertem Pankreaskarzinom
- **Strahlentherapie:** Bei symptomatischen Metastasen, vor allem in Knochen und Gehirn
- **Blockade des Plexus coeliacus:** bei Versagen der Schmerztherapie nach WHO-Stufenschema
- **Bei Tumor-bedingter Cholestase**
 - **ERCP mit Stenteinlage**
- **Bei Tumor-bedingter Passagestörung**
 - **Medikamentöser Therapieversuch** (mit prokinetika) ^{MCP}
 - **Perkutane endoskopische Jejunostomie (PEJ)**
- **Bei exokriner Pankreasinsuffizienz:** Substitution pankreatischer Enzyme

Komplikationen

- **Frühe Metastasierung**
 - Peritonealkarzinose
 - Lebermetastasen
 - Seltener Lungen- und Knochenmetastasen
- **Stenosen**
 - Magenausgangstenose
 - Stenose des Ductus choledochus (Cholestase)
- **Weitere Komplikationen**
 - Pankreopriver Diabetes mellitus
 - Verbrauchskoagulopathie (DIC)

Prognose

- 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit: <2%



Appendizitis ++

Definition

- Entzündung des Wurmfortsatzes (Appendix vermiformis)
- Umgangssprachlich „Blinddarmentzündung“

Epidemiologie

- Häufigste Ursache für ein akutes Abdomen
- Häufigkeitsgipfel: 10.–30. Lebensjahr

Ätiologie

- **Obstruktion** → Entleerungsstörung der Appendix durch:
 - Kotsteine (Koprolithen)
 - Abknickungen
 - Narbenstränge
- **Intestinale Infekte**
- Selten: Fremdkörper, hämatogene Infekte, Wurmbefall ^{we!}

Pathophysiologie

Stadien der Appendizitis

- **Katarrhalisch**: Hyperämie der Blutgefäße, Ödembildung, reversible Phase
- **Purulent**: Tiefere Ausbreitung der Entzündung im Gewebe
- **Ulzero-phlegmonös**: Diffuse entzündliche Veränderungen der gesamten Appendixwand
- **Gangränös**: Nekrotisierende Entzündung, ggf. mit Perforation
- **Perforation**
 - Gedeckte Perforation mit Perityphlitis, ggf. perityphlitischem Abszess
 - Freie Perforation mit diffuser Peritonitis

Symptome/Klinik

- **Schmerzwanderung**
 - Zunächst diffuse epigastrische/periumbilikale Schmerzen (viszeraler Schmerz)
 - Schmerzwanderung in den rechten Unterbauch nach ca. 4–24 Stunden (somatischer Schmerz)
- **Vegetative Symptomatik**: Übelkeit, Erbrechen, Inappetenz, Wind- und Stuhlverhalt
- **Fieber**
- **Sonderfälle**
 - **Perforation**: Ggf. vorübergehende Schmerzreduktion mit anschließend diffusem Bauchschmerz bei Peritonitis
 - **Ungewöhnliche Schmerzlokalisation**
 - Lagevarianz der Appendix (z.B. retrozökal)
 - Bei Schwangeren kann der Schmerz höher lokalisiert sein
 - **Atypische Symptomatik**: Bei alten Patienten oder Kindern kann die Klinik geringer oder untypisch ausgeprägt sein

„Leitsymptom der Appendizitis sind Schmerzen im rechten Unterbauch!“

Diagnostik

Anamnese

- Schmerzen (OPQRST-Schema)
- Übelkeit, Erbrechen
- Appetitlosigkeit
- Änderung der Stuhlgewohnheiten
- Fieber

| Schmerzlokalisierung | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|
| | Somatischer Schmerz | | Neuropathischer Schmerz | Viszeraler Schmerz |
| | Somatischer Oberflächenschmerz (Hautschmerz) | Somatischer Tiefenschmerz | | |
| Aktivierung | <ul style="list-style-type: none"> Reizung von Nozizeptoren der Haut | <ul style="list-style-type: none"> Reizung von Nozizeptoren in tiefen Körperregionen (Muskeln, Gelenke, Knochen, Bindegewebe) | <ul style="list-style-type: none"> Direkte Schädigung eines Nerven | <ul style="list-style-type: none"> Reizung von Nozizeptoren in den Kapseln und serösen Häuten der Organe und den Wänden der Gefäße und Hohlorgane |
| Schmerzkomponente | <ul style="list-style-type: none"> Früher und später Schmerz | <ul style="list-style-type: none"> Später Schmerz | <ul style="list-style-type: none"> Je nach Lokalisation der Schädigung früher oder später Schmerz | <ul style="list-style-type: none"> Später Schmerz |
| Fasertyp | <ul style="list-style-type: none"> Aδ-Fasern C-Fasern | <ul style="list-style-type: none"> C-Fasern | <ul style="list-style-type: none"> Je nach Lokalisation der Schädigung δ-Fasern oder C-Fasern | <ul style="list-style-type: none"> C-Fasern |
| Beispiel | <ul style="list-style-type: none"> Nadelstich Quetschung | <ul style="list-style-type: none"> Muskelkrampf Zahnschmerz Kopfschmerz | <ul style="list-style-type: none"> Diabetische Neuropathie Post-Zoster-Neuralgie | <ul style="list-style-type: none"> Gallenkolik Blinddarmentzündung |

„^{جاءه مريض} Ausschlaggebend zur Diagnose der Appendizitis sind die Anamnese und die körperliche Untersuchung. Weitere Diagnostik wie Blutuntersuchung und Sonographie sind hilfreich, aber nicht entscheidend zur Diagnosestellung!“

Körperliche Untersuchung

Allgemeines

- **Abdomen** : Auskultation, Palpation, Prüfen der **Appendizitiszeichen**
 - Druckschmerz im rechten Unterbauch
 - Abwehrspannung
 - Schmerzauslösung durch Erschütterung *Los lass Schmerz*
- **Digital rektale Untersuchung (DRU)**
- **Temperatur**: Axillo-rektale Temperaturdifferenz $\geq 1^\circ\text{C}$ *(Nl 0,3-0,5° Unterschied)*

Appendizitiszeichen

➤ Schmerzhaft Druckpunkte

- **McBurney-Punkt**: Punkt auf der Linie zwischen rechter Spina iliaca anterior superior und Bauchnabel zwischen dem lateralen und mittleren Drittel
- **Lanz-Punkt**: Punkt auf der Linie zwischen beiden Spinae iliacae zwischen rechtem und mittlerem Drittel
- **Blumberg-Zeichen**: Kontralateraler **Loslassschmerz** (im rechten Unterbauch) nach Palpation des linken Unterbauchs

➤ Schmerzhaft Manöver

- **Rovsing-Zeichen**: Schmerzen im rechten Unterbauch durch Ausstreichen des Kolons längs des Colonrahmens in Richtung Appendix
- **Douglas-Schmerz**: Schmerzen beim Palpieren des Douglas-Raums bei der rektalen Untersuchung
- **Psoas-Zeichen**: Schmerzen im rechten Unterbauch durch Anheben des rechten Beines gegen Widerstand (Hinweis auf retrozökale Appendizitis)
- **Baldwin-Zeichen**: Schmerzen in der Flanke nach Fallenlassen des gestreckten, im Liegen angehobenen rechten Beines (Hinweis auf retrozökale Appendizitis)

Laboruntersuchungen

✓ Entzündungsparameter

- Leukozytose (kann bei älteren Menschen fehlen)
- CRP-Erhöhung
- Bei Peritonitis: Möglicherweise Leukopenie bzw. Thrombopenie als Zeichen der Sepsis

• Urinstatus


- Die Urindiagnostik ist wichtig zur differentialdiagnostischen Abgrenzung von Harnwegsinfekten/Harnleitersteinen
- Es kann aber im Rahmen einer Appendizitis auch zu einer begleitenden Entzündung des rechten Harnleiters (häufig mit Begleitereithrozyturie) kommen, sodass ein pathologischer Urinbefund keinesfalls zum Ausschluss einer Appendizitis führen darf


- Bei Frauen im gebärfähigen Alter: Schwangerschaftstest

Bildgebung


Sonographie

- Appendixdurchmesser $> 6-8\text{ mm}$
- **Kokarden-Phänomen** (Wandschichten stellen sich wechselnd echoarm und echoreich dar)
 - DD: Appendizitis, Darminvagination, Crohn, Divertikulitis
- **Wandverdickung**
- **Flüssigkeit** um die Appendix
- Appendix **nicht komprimierbar**
- Bei Perforation: Intraabdominelle **freie Flüssigkeit**






Rovsing-Zeichen




Psoas-Zeichen



Douglas-Schmerz



Baldwin-Zeichen



Ggf. Röntgen-Abdomen

Ausschluss Ileus

Cgf. Computertomographie

Bei unklaren Befunden oder schlechten Untersuchungsbedingungen (z.B. Adipositas)

Differentialdiagnosen

Gastrointestinale Erkrankungen

- Gastroenteritis (häufige Differentialdiagnose!)
- M. Crohn
- Wurmbefall
- Divertikulitis
- Tumoren/Karzinome
- Entzündung des Meckel-Divertikels

Pseudoappendizitis

- Lymphadenitis mesenterialis bei einer Yersiniose
- Pseudoappendicitis diabetica (bei Ketoazidose)
- Bronchiale Infekte bei Kindern

Gynäkologische Erkrankungen

- Adnexitis
- Extrauterin gravidität
- Stielgedrehtes Ovar (Ovarialtorsion), stielgedrehte Ovarialzyste
- Ovulationsschmerz
- Endometriose

Urologische Erkrankungen

- Harnwegsinfekt
 - Auch als begleitende Entzündungsreaktion bei Appendizitis möglich
 - Pathologischer Urinbefund (z.B. Erythrozyturie) schließt Appendizitis nicht aus
- Urolithiasis
- Hodentorsion

Meckel-Divertikel

- **Definition:** Überrest des embryonalen Ductus omphaloentericus
- **Lokalisation:** Ileum (meist zwischen 30 und 100 cm proximal der Ileozökalklappe/Bauhin-Klappe)
- **Symptome/Klinik**
 - Oft asymptomatisch und Zufallsbefund bei Laparoskopie/Laparotomie
 - Schmerzlose blutige Stühle oder schwarzer Stuhl (Teerstuhl) durch Magensäureproduktion
 - Bei Entzündung (Meckel-Divertikulitis): Symptome wie bei Appendizitis
- **Pathologie**
 - Bei ca. 2/3: Normale Dünndarmschleimhaut
 - Bei ca. 1/3: Ektope Magenschleimhautanteile → Peptische Ulzera mit Entzündungen und Blutung möglich
- **Diagnostik**
 - Wie Appendizitis/akutes Abdomen
 - Szintigraphie
- **Therapie**
 - Bei Kindern: Operative Resektion
 - Bei Erwachsenen: Ggf. operative Resektion, asymptomatische Meckel-Divertikel können aber belassen werden

„Bei Verdacht auf eine Appendizitis, aber sich intraoperativ (relativ) blande darstellender Appendix, sollte das Ileum immer auf Vorhandensein eines Meckel-Divertikels untersucht werden!“

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Stationäre Aufnahme (Chirurgie)
- Nahrungskarenz
- Parenteraler Flüssigkeitszufuhr, ggf. parenterale Ernährung
- Analgesie (bedarfsabhängig) : Metamizol 1 g i.v. bis zu 1-1-1-1.
- Ggf. Antibiotikatherapie (z.B. Cefuroxim)
- Ggf. Thromboseprophylaxe

Operative Therapie (Appendektomie)

„Der Verdacht auf eine Appendizitis rechtfertigt im Regelfall eine operative Therapie!“

➤ **Laparoskopisch** (Vorteile : kleinere Wunde, diagnostische Laparoskopie möglich)

1. Einbringen der Trokare (meist drei)
2. Diagnostische Laparoskopie
3. Darstellung der Appendix
4. Präparation und Ligatur der Appendixbasis
5. Absetzung und Bergung der Appendix (mittels Begebeutel)
6. Bauchdeckenverschluss

➤ **Offen-konventionell**

1. **Wechselschnitt** im rechten Unterbauch
2. Aufsuchen der Appendix über die **Taenia libera** des Zökums
3. Präparation und Ligatur der Appendixbasis
4. Absetzung der Appendix
5. Versenkung des Appendixstumpfes mittels **Tabaksbeutelnaht**
6. Bauchdeckenverschluss


Ggf. Konservative Therapie


- **Indikationen**
 - Unklare Befunde
 - Ggf. bei länger anhaltenden Beschwerden
 - Ggf. bei milder Appendizitis ohne Anhalt für Komplikationen
- **Vorgehen**
 - **Bei unklaren Befunden**
 - Stationäre Überwachung
 - Bei Befundverschlechterung zeitnahe Operation
 - **Bei länger anhaltender Beschwerdesymptomatik**
 - Stationäre Überwachung
 - Primäre Antibiotikatherapie, z.B. mit Piperacillin/Tazobactam oder Cefuroxim
 - Ggf. **Abszessdrainage und Intervallappendektomie**
 - **Bei milder Appendizitis**
 - Stationäre Überwachung und Antibiotikatherapie
 - Bei Befundverschlechterung Operation

Beim **Wechselschnitt** handelt es sich um einen chirurgischen **Zugangsweg** zum **Abdomen**, der meist für eine konventionelle **Appendektomie** benutzt wird.


2 Vorgehen

Am rechten Unterbauch wird ein kurzer Schrägschnitt angelegt. Anschließend werden die **Faszien** eröffnet und die schräge **Bauchmuskulatur** jeweils in ihrem Faserverlauf auseinandergedrängt. Nach Durchtrennung der darunterliegenden **Fascia transversalis** wird zuletzt noch das **Peritoneum parietale** eröffnet.





ABDOMINAL INCISIONS



Komplikationen

Freie Perforation

- **Hinweise:** Persistenz der klinischen Symptomatik über mehr als 24 Stunden, starke Infektzeichen
- **Klinik :** Nach Perforation kann eine **Schmerzreduktion** auftreten. Im Verlauf generalisierte **Peritonitis** (kann zu einem Leukozytensturz führen)
- **Therapie :** Appendektomie mit ausgiebiger Spülung der Abdominalhöhle, ggf. Einlage einer **Drainage** und **Antibiotikatherapie**

Perityphlitischer Abszess (bei gedeckter Perforation)

- Abszess in der Umgebung der Appendix als Folge einer **gedeckten Perforation**
- **Therapie :** **Appendektomie mit Abszessausräumung** und gleichzeitiger intravenöser Antibiotikatherapie

Komplikationen der Appendektomie

- **Intraoperative Komplikationen**
 - **Blutung**
 - **Darmverletzung**
 - **Ureterverletzung**
- **Postoperative Komplikationen**
 - Nachblutung
 - Infektion, Wundheilungsstörung, **Abszess** (u.a. Bauchdeckenabszess, Douglas-Abszess)
 - Thrombose, Embolie
 - **Trokar-/Narbenhernie**
 - Mechanischer oder paralytischer Ileus
 - **Appendixstumpfsuffizienz**

Prognose

- Bei unkomplizierter Appendizitis und adäquater Behandlung (OP): Letalität 0,001%
- Bei Perforation und Peritonitis: Letalität 1%
- Ältere Patienten (>60 Jahre) haben schlechtere Prognose

Ileus ++

Definition

- Störung der Darmpassage im Bereich von Dün- oder Dickdarm

Klassifikation

- **Mechanischer Ileus:** Störung der Darmpassage aufgrund eines mechanischen Hindernisses
 - **Ausprägung der Darmpassagestörung**
 - **Kompletter Ileus:** Aufgehobene Darmpassage
 - **Inkompletter Ileus (Subileus):** Eingeschränkte Darmpassage
 - **Lokalisation**
 - **Dünndarmileus**
 - **Dickdarmileus**
- **Paralytischer Ileus:** Störung der Darmpassage aufgrund einer Motilitätsstörung des Darms

Ätiologie

Mechanischer Ileus

- **Passagestörung durch intraluminalen Obstruktion**
 - **Stenose durch Tumoren**, Morbus Crohn, Divertikulitis
 - **Kotstein** (bei schwerer Koprostase)
 - **Invagination, Volvulus**
 - **Fremdkörper**
 - **Gallenstein**
 - **Mekoniumileus, Darmatresie** (bei Neugeborenen)
 - **Passagestörung durch extrinsische Kompression**
 - **Verwachsungen** (z.B. Bridenileus)
 - **Inkarzerierte Hernie**
 - **Peritonealkarzinose**
- Sonderformen mit Gefäßstrangulation (und Ischämie des betroffenen Darmabschnittes)**

- **Invagination**
- **Volvulus**
- **Inkarzerierte Hernie**
- Alle Formen des mechanischen Ileus, wenn nicht zeitgerecht behandelt werden.

Häufigkeiten nach Lokalisation

- **Dünndarmileus in 80% der Fälle:** Ursache sind meist operationsbedingte Verwachsungen (65%) oder Hernien (15%)
- **Dickdarmileus in 20% der Fälle:** Ursache sind meist malignombedingte Stenosen (70%) oder entzündliche Prozesse (10%)

Paralytischer Ileus

- **Primäre Formen** (selten)
 - Morbus Hirschsprung
- **Sekundäre Formen** (häufig!)
 - **Reflektorisch:** Durch Manipulation, Trauma oder entzündliche Reizung des Peritoneums
 - **Elektrolytstörung:** Hypokaliämie, Hyperkalzämie
 - **Medikamentös:** Opioide, ...
 - **Vaskulär:** Mesenterialischämie
 - **Neurogen:** Bspw. bei Kompression des Rückenmarks

Pathophysiologie

Mechanischer Ileus

Stase im Darmlumen → Darmdistension → Hypoxie & Ödem → **Hoher Flüssigkeitsverlust**, Bakterien durchwandern Darmwand → **Peritonitis/Sepsis** → Hypovolämischer und/oder septischer **Schock**

Paralytischer Ileus

Hemmung der Peristaltik → Darmdistension → Weitere Abläufe wie beim mechanischen Ileus

Symptome/Klinik

Allgemeine Symptome

- Schmerzen
- Übelkeit, „schwallartiges“ Erbrechen
- Meteorismus, Stuhl- und Windverhalt

- Peritonismus/Abwehrspannung möglich
- Schock

„Inkomplette Symptomatik bei Subileus“

Lokalisationsabhängige Symptomatik

- **Hoher (Dünndarm-)Ileus:** I.d.R. akuter Beginn, starke kolikartige Schmerzen, „schwallartiges“ Erbrechen, initial kein Stuhl- und Windverhalt
- **Tiefer (Dickdarm-)Ileus:** I.d.R. schleichender Beginn, symptomarmer Verlauf, absoluter Wind- und Stuhlverhalt bei Vorstellung, Erbrechen eher im späteren Stadium (Miserere als Extremform)

Verlaufs- und Sonderformen

Postoperativer Ileus

- Akut postoperativ auftretende funktionelle Darmpassagestörung ohne mechanisches Korrelat und ohne Peritonismus
- Hohe Inzidenz insb. nach abdominalen Eingriffen/Kolonchirurgie
- **Symptome/Klinik:** Übelkeit, Erbrechen, Meteorismus, Maximum der klinischen Symptomatik um den 3. bis 5. postoperativen Tag
- **Diagnostik:** I.d.R. klinisch
- **Therapie:** Supportiv

Diagnostik

Anamnese und körperliche Untersuchung

- **Auskultation des Abdomens**
 - Mechanischer Ileus: Hochgestellte, klingende Darmgeräusche
 - Paralytischer Ileus: „Totenstille“
- **Palpation:** Abwehrspannung? Raumforderung? Hernie? Meteorismus?
- **Rektale Untersuchung:** häufig schmerzhaft (Tastbares Rektumkarzinom?)


Labor

Blutbild. Entzündungsparameter (Leukozyten, CRP). Gerinnung (INR, aPTT)
Elektrolyte (Natrium, Kalium, Calcium). Transaminasen, Cholestaseparameter, Lipase

Bildgebung

- **Röntgen-Abdomen** im Stehen oder in Linksseitenlage bei nicht stehfähigen Pat.
 - **Leeraufnahme im Stehen:** erweiterte Darmschlingen und Spiegelbildung
 - Zentrale Spiegel → Dünndarmileus
 - Periphere Spiegel → Dickdarmileus
 - Freie Luft im Abdomen → Perforation
 - **Im Anschluss Gastrografin®-Passage:** Gabe von wasserlöslichem Kontrastmittel p.o. und sequenzielle Abdomenübersichtsaufnahmen
 - **Diagnostisch:** Zur Darstellung der Passage und Lokalisation des Passagehindernisses (Ileus inkomplett oder komplett?)
 - **Therapeutisch:** Abführende Wirkung bei inkompletten Ileus
- **Sonographie Abdomen**
 - Erweiterte Darmschlingen
 - Verdickte Darmwand
 - Strickleiter-Phänomen (bzw. Klaviertasten-Phänomen)
 - Ggf. Freie Flüssigkeit im Abdomen
 - **Mechanischer Ileus : Pendelperistaltik.** Ggf. Darstellung von Hernien. Ggf. Kalibersprung, (z.B. bei Bridenileus am Dünndarm)

BGA
PCT, Lactat
TSH



Strickleiter *gpa*





Dünndarmileus mit Strickleiter-Phänomen



Sonographischer Längsschnitt des Dünndarms:

Das Darmlumen ist deutlich erweitert und bis auf wenige Partikel (Faeces, echoreich) mit Flüssigkeit (echoarm) gefüllt. Das Schleimhautrelief (grüne flächige Markierung) zeigt deutlich die Kerkring-Falten, die im Anschnitt wie die Sprossen einer Strickleiter in das Darmlumen hineinragen.


Dieses sonographische Bild wird deshalb auch als „Strickleiter-Phänomen“ bezeichnet und ist neben dem Klaviertasten-Phänomen typisch für einen Dünndarmileus.



Klaviertastenphänomen



Strickleiterphänomen



- **Paralytischer Ileus: Fehlende Peristaltik**
„Bei schlechter Schallbarkeit → CT“
- **CT-Abdomen mit Kontrastmittel-Gabe oral und i.v.:** Goldstandard bei Diagnostik des mechanischen Ileus, zur ursächlichen Abgrenzung.
 - Nachweis bzw. Ausschluss einer manifesten mechanischen Obstruktion → Entscheidung für einen konservativen Therapieversuch oder dessen Abbruch zugunsten einer Notfalloperation!
 - Ggf. Nachweis einer Perforation
 - Ggf. Nachweis von Aszites, Peritonealkarzinose, Gefäßstrangulationen und -verschlüssen

Differentialdiagnosen

Siehe Differentialdiagnosen des akuten Abdomens

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Stationäre Aufnahme (Chirurgie)
- Nahrungskarenz (Ggf. Magensonde legen bei Erbrechen)
- Parenteraler Flüssigkeitszufuhr, ggf. parenterale Ernährung
- Analgesie (bedarfsabhängig): Metamizol 1 g i.v. bis zu 1-1-1-1 (keine Opioide!)
- Ggf. Antibiotikatherapie (bei Zeichen eines Infekts)
- Ggf. Thromboseprophylaxe

Paralytischer Ileus → konservative Therapie

- **Voraussetzungen**
 - Kein absoluter Passagestopp (in der bildgebenden Diagnostik)
 - Klinisch stabiler Patient ohne Notfall-Operationsindikation
- **Gastrografin®-Passage:** Gabe von wasserlöslichem Kontrastmittel über die Magensonde und sequentielle Röntgenaufnahmen des Abdomens über 24(-48) Stunden
 - Diagnostisch
 - Therapeutisch bei paralytischem Ileus gelingt häufig das Abführen sowie die Zunahme der Motilität
 - Passage des Kontrastmittels in das Kolon binnen 4-24 Stunden spricht gegen die Notwendigkeit einer operativen Therapie
- **Prokinetika bei Ileus:** Bei paralytischem Ileus als Therapieversuch möglich, bei mechanischem Ileus kontraindiziert: Metoclopramid

Mechanischer Ileus

- **Operative Therapie:** Binnen 6 Stunden absolute Operationsindikation bei absolutem Passagestopp, Gefäßstrangulation und/oder Ischämie, insb. bei klinisch unstabilen Patienten
 - **Kolonileus:** Zumeist operative Therapie notwendig
 - **Bei rektumnahen Stenosen:** Ggf. überbrückend bis zur Operation oder in palliativer Situation Einlage einer entlastenden Sonde bzw. eines Stents
- **Konservativer Therapieversuch:** Bei Fehlen absoluter Operationsindikationen und klinisch stabilen Patienten möglich
 - **Gastrografin-Passage:** Bei inkomplettem mechanischem Dünndarmileus, klinische Besserung in bis zu 80% der Fälle
 - **Engmaschige klinische Kontrollen:** „Ärztliche Bauchvisite“ alle 2-4 Stunden, **Bei Verschlechterung der Symptomatik oder ausbleibender Besserung:** Operationsindikation erneut prüfen

Operatives Vorgehen

- **Bestandteile der operativen Therapie**
 - **Beseitigung der Ileusursache:** bspw. durch Adhäsiolektomie, Herniotomie
 - **Vitalitätsprüfung des Darmes**

- **Resektion avitaler Darmanteile**
- ⑥ **Rekonstruktion der Passage:** Anastomosierung anzustreben, jedoch unter Beachtung des Risikos für Anastomoseninsuffizienzen. Ansonsten Kolostoma/Ileostoma
- **Laparoskopische Techniken:** Bevorzugen, wenn eine Expertise vorliegt und die Ursache laparoskopisch vollständig behandelbar ist

Prognose

- **Mechanischer Ileus**
 - Hohe Letalität: ca. 5–25%
- **Paralytischer Ileus**
 - Je nach Grunderkrankung sehr unterschiedlich

Kolorektales Karzinom ++

Epidemiologie

- 90% der Kolonkarzinome werden nach dem 50. Lebensjahr diagnostiziert
- **Lokalisation** : **Rektum: 50%**, Colon sigmoideum: 30%, Colon transversum und Colon descendens: 10%, Zökum und Colon ascendens: 10%

Risikofaktoren

Prädisponierende Faktoren

- **Genetisch** : Familiäre Polyposis-Syndrome. kolorektale Karzinome in der Familie
- **Ernährung, Lebensstil** : Rauchen, Alkohol. Adipositas. Fett- und fleischreiche, ballaststoffarme Nahrung
- **Krankheiten mit erhöhtem KRK-Risiko** : Kolorektale Adenome. Colitis ulcerosa und Morbus Crohn *← selten*
- **Alter** : >40 Jahre

Protektive Faktoren

- Körperliche Aktivität
- Schnelle Stuhlpassage
- Ernährung: Ballaststoff- und gemüserich, fleischarm

Symptome/Klinik

- **Keine** auffälligen Frühsymptome!
- **Veränderung des Stuhlgangs** : Obstipation. Evtl. **rektale Blutabgänge** (sichtbar oder okkult). „Bleistiftstühle“
- Leistungsabfall
- **Gewichtsverlust**
- Evtl. Fieber

„Die Hälfte aller Kolonkarzinom-Patienten hat zusätzlich Hämorrhoiden. Daher sollten rektale Blutabgänge auch bei vorliegendem Hämorrhoidalleiden zum koloskopischen Karzinomausschluss führen!“

Lokalisation und Metastasierungswege beim KRK

| | | Abstand von der Anokutanlinie | Lymphogene Metastasierung | Hämatogene Metastasierung |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| Kolonkarzinom | | ≥16 cm | Mesenteriale Lymphknoten | V. portae → Leber |
| Rektumkarzinom | Oberes Drittel | 12–16 cm | Paraaortale Lymphknoten | V. portae → Leber |
| | Mittleres Drittel | 6–12 cm | Paraaortale Lymphknoten + Beckenwand | V. portae → Leber V. cava → Lunge |
| | Unteres Drittel | <6 cm | Paraaortale Lymphknoten + Beckenwand + inguinale Lymphknoten | V. cava → Lunge |

- Bei einem Viertel der Patienten finden sich zum Diagnosezeitpunkt bereits Lebermetastasen!
- Weitere hämatogene Metastasierungsziele: Insb. **Skelett und Gehirn**
- Metastasierung auch per continuitatem: Infiltration des umgebenden Binde-/Fettgewebes, ggf. Nachbarorgane (Harnblase, Dünndarm etc.)

Stadien

TNM-Klassifikation des kolorektalen Karzinoms

| TNM | Ausdehnung |
|-----|--|
| Tis | Carcinoma in situ |
| T1 | Infiltration der Submukosa |
| T2 | Infiltration der Muscularis |
| T3 | Infiltration der Subserosa oder des perirektalen Fettgewebes |
| T4 | Infiltration der Serosa (T4a) oder anderer Organe (T4b) |
| N1 | 1-3 regionäre Lymphknoten |
| N2 | ≥ 4 regionäre Lymphknoten |
| M1 | Fernmetastasen |

Magen CA
 N1 1-2 LN
 N2 3-6 LN
 N3 ≥ 7 LN

Stadieneinteilung der UICC (Union for International Cancer Control)

| UICC-Stadium | TNM |
|--------------|-------------------------|
| 0 | Tis (Carcinoma in situ) |
| I | Bis T2, N0, M0 |
| II | Bis T4, N0, M0 |
| III | Jedes T, N1/N2, M0 |
| IV | Jedes T, jedes N, M1 |

Diagnostik

Screening

- **Rektal-digitale Untersuchung:** Bis zu 10% der kolorektalen Karzinome ertastbar!
- **Stuhltest auf okkultes Blut:** zum Nachweis einer okkulten Blutung
 - **Bei positivem Befund:** Notwendigkeit der endoskopischen Untersuchung des gesamten Dickdarms
 - **Falsch-positive Befunde:** Beim Schlucken von eigenem Blut (z.B. bei Zahnfleischbluten oder Epistaxis)
- **Koloskopie**
 Adenokarzinome in bis zu 5% der Fälle multipel → Suche nach weiteren Tumoren

Staging

- **Kolon- und Rektumkarzinom**
 - **Abdomen-Sonographie.** Komplette Koloskopie mit Biopsie. Röntgen-Thorax
 - Evtl. CT von Abdomen, Becken und Thorax. Evtl. Angio-CT der Leber
 - Tumormarker: CEA-Bestimmung als Ausgangswert vor Therapiebeginn
- **Speziell Rektumkarzinom**
 - **Starre Rektoskopie:** Die genaue Abschätzung des Abstandes von Karzinom zu Schließmuskel bzw. zur Linea dentata ist für die Therapieplanung und den Kontinenterhalt entscheidend
 - **Rektale Endosonographie** → Bestimmung der Infiltrationstiefe (T-Stadium)
 - **MRT Becken** (alternativ CT Becken)

Sono abd
 Koloskopie
 Röntgen
 ggf CT TAP
 ggf Angio Leber
 CEA

Pathologie

- **Fast immer Adenokarzinom**
 - 95% der Karzinome entstehen aus Adenomen.
 - Häufigkeit der Adenome: Tubulär > tubulovillös > villös („Je villöser desto böser“)

Carcinoembryonales
 Antigen

KRK

TNM

T_{is}

T₁

infiltration
der Schleimhaut

T₂

infiltration
der Muscularis propria

T₃

Infiltration
der Subserosa
Perikolisches
Periviskales
Festgewebe

T₄

Perforation des
viszeralen Peritoneums
Infiltration anderer
Organe/Strukturen

N₁

1-3
Regional-LK

N₂

> 4
Regional-LK

M

Fremdmetastasen

UICC

0

T_{is}

I

bis T₂, N₀, M₀

II

T₃, N₀, M₀

T₄, N₀, M₀

III

jede N₁, N₂

IV

jede M₁

T_{is}

→ 0

T_{1,2}

N₀

M₀

→ I

T_{3,4}

N₀

M₀

→ II

T_{1,2,3,4}

N_{1,2}

M₀

→ III

T_x, N_{1,2}, M₀

T_{1,2,3,4}

N_{1,2}

M₁

→ IV

T_x, N_x, M₁

- Entartungsrisiko abhängig von : Histologischem Typ (villös > tubulovillös > tubulär), Größe (>1 cm), Anzahl (≥ 3)

Differentialdiagnosen

Dünndarmtumoren

- Epidemiologie**
 - Dünndarmtumoren machen <5% aller gastrointestinalen Tumoren aus
 - Mehrheitlich (majoritairement) benigne
 - Maligne Dünndarmtumoren (nur 1–3%) : 20% Lymphom, 30% Neuroendokrine Tumoren, 40% Adenokarzinom
- Komplikationen** : Blutung, Ileus, Metastasierung, Ggf. Karzinoid-Syndrom bei neuroendokrinen Dünndarmtumoren
- Diagnostik**: Sonographie, Hydro-MRT, Videokapselendoskopie
- Therapie**: Dünndarmresektion, bei R1-Resektion adjuvante Chemotherapie wie beim Kolonkarzinom
- Prognose bei Malignität** : 5-Jahres-Überlebensrate von ca. 20%

Therapie

Kolonkarzinom

Operative Therapie

- Indikation**: Alle Tumoren, die entweder keine oder resektable Lungen- und/oder Lebermetastasen aufweisen + Patient operabel
- Verfahren : Offene Chirurgie**
 - Kolonresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität**
 - Colon ascendens/Zökum → Hemikolektomie rechts**
 - Resektion des Colon ascendens mit rechter Kolonflexur sowie der Bauhin'schen Klappe und eines kleinen Ileumabschnittes
 - Arterielle Versorgung: A. mesenterica superior
 - End-zu-End- oder End-zu-Seit-Ileotransversostomie
 - Colon transversum → Transversumresektion**
 - Arterielle Versorgung: A. mesenterica superior
 - Colon sigmoideum/descendens → Hemikolektomie links**
 - Arterielle Versorgung: A. mesenterica inferior
 - Lokal inoperable Tumoren → Zur Erhaltung der Passage bspw. Anlage eines endständigen Stomas oder Anlage eines Bypass als Umgehungsweg
 - Mit Komplette mesokolische Exzision (CME) und Lymphadenektomie** (mind. 12 Lymphknoten)

Adjuvante Chemotherapie (Keine Radiatio am Kolon)

- Voraussetzung**: R0-Resektion des Primärtumors
- Indikationen** : UICC Stadium II (Einzelfallentscheidung), UICC Stadium III^{N1,2}
- Kontraindikationen**: Schwere Infektion, Einschränkung der Lebenserwartung durch Komorbiditäten. Leberzirrhose (Child B oder C). Schwere KHK oder Herzinsuffizienz. (Prä-)terminale Niereninsuffizienz. Blutbildungsstörung
Schwere Infekt, Schwere Komorbiditäten (Herz, Nieren, Leber)
- Durchführung** (Postoperativ baldmöglichst)
 - UICC Stadium II**: Monotherapie
 - UICC Stadium III**: **FOLFOX**: 5-FU + Folinsäure + Oxaliplatin

Rektumkarzinom

Neoadjuvante Therapie (Radiotherapie oder Radiochemotherapie)




Senkt die Lokalrezidivrate um bis zu 50%

- Indikation**: UICC Stadium II und III im mittleren und unteren Drittel (im oberen Drittel nur bei Risikofaktoren)
- Durchführung**
 - Kurzzeitbestrahlung : Operation 10 Tage nach Beginn der Radiotherapie
 - Oder Radiochemotherapie mit 5-FU : Operation nach 6–8 Wochen


Halbseitenentfernung rechts
= Hemikolektomie rechts

Querkolonentfernung
= Transversumresektion

Halbseitenentfernung links
= Hemikolektomie links



Dick- und Mastdarm
Arterielle Blutversorgung
Regionale Lymphknoten



Operationsverfahren

- **Standard:** (Tiefe) anteriore Rektumresektion + totale oder partielle mesorektale Exzision + Lymphadenektomie + Rekonstruktion mit meist Anlage eines protektiven Ileostomas
 - **Oberes Rektumdr Drittel:** anteriore Rektumresektion (AR) + partielle mesorektale Exzision (PME). Distaler Sicherheitsabstand von mind. 5 cm
 - **Mittleres und unteres Rektumdr Drittel:** Tiefe anteriore Rektumresektion (TAR) + totale mesorektale Exzision (TME). Distaler Sicherheitsabstand von mind. 2 cm (bei Low-Grade-Tumor) bzw. 5 cm (bei High-Grade-Tumor)
 - **Falls Sicherheitsabstand nicht einzuhalten ist:** Abdominoperineale Rektumexstirpation (APR) mit TME

AR, PME
5 cm

TAR, TME
2-5 cm

APR + TME

Ggf. adjuvante Therapie (Radiochemotherapie)

- UICC-Stadium II und III bei Vorliegen von Risikofaktoren für ein Lokalrezidiv

Therapie bei Metastasierung UICC IV (M)

Chirurgisch

- **Indikation:** bei R0-resektablen Metastasen von Leber und Lunge und operablen Patienten

Lokalablativ Verfahren

- **Radiofrequenzablation (RFA):** Alternative zur chirurgischen Therapie bei Lebermetastasen

Systemische Chemotherapie (effektiv oder palliativ)

- **Indikation:** Primär nicht resektable Metastasierung
- **Durchführung:** FOLFOX: 5-FU + Folinsäure + Oxaliplatin

Nachsorge

- **UICC-Stadium I** (nach R0-Resektion): lediglich eine **koloskopische Nachsorge** (wie unten beschrieben)
In den **UICC Stadien II und III** gelten (bei kurativem Ansatz) folgende Empfehlungen:

Rektum- und Kolonkarzinom

- Alle 6 Monate für mindestens 2 Jahre, anschließend alle 12 Monate (für insg. 5 Jahre): **Anamnese, körperliche Untersuchung, CEA-Bestimmung, Abdomensonographie**
- Innerhalb von 6–12 Monaten postoperativ, danach alle 5 Jahre: **Koloskopie**

Nur bei Rektumkarzinom

- 3 Monate nach Abschluss der Therapie: **CT-Untersuchung**
- Alle 6 Monate für mind. 2 Jahre: **Sigmoidoskopie**
- Alle 12 Monate (für insg. 5 Jahre): **Röntgen-Thorax**

80% der Rezidive treten in den ersten beiden Jahren nach Behandlung auf!

Prävention

Darmkrebsvorsorge

Früherkennung kolorektaler Karzinome (Sekundärprävention)

Nicht-Risikopersonen


1. **Alter ≥50 Jahre:** Jährlich Stuhltest auf okkultes Blut
2. **Alter ≥55 Jahre:** Alle zehn Jahre Koloskopie bei unauffälligem Befund. Bei vollständiger Koloskopie ist kein Stuhltest auf okkultes Blut nötig
3. **Falls Koloskopie abgelehnt wird:** Alle fünf Jahre Sigmoidoskopie und jährlicher Stuhltest auf okkultes Blut
4. **Falls auch Sigmoidoskopie abgelehnt wird:** Jährlich Stuhltest auf okkultes Blut

Risikopersonen

- **Verwandte ersten Grades** von Patienten mit **kolorektalem Karzinom** oder **Adenom** (das vor dem 50. Lebensjahr entdeckt wurde): **Komplette Koloskopie idealerweise zehn Jahre vor dem Alterszeitpunkt des Auftretens des Karzinoms beim Indexpatienten, spätestens jedoch im Alter von 40-45 Jahren**
 - Bei unauffälligem Befund → Wiederholung mind. alle 10 Jahre


"ASS-Prophylaxe"

- Eine Studienanalyse verschiedener randomisierter Studien zur ASS-Kardioprotektion konnte einen protektiven Effekt einer Langzeittherapie mit Acetylsalicylsäure (≥75mg/Tag) für Ösophagus-, Pankreas-, Lungen-, Magen-, Prostata- und das kolorektale Karzinom belegen



IMA

- ① High-Tie-Ligatur
- ② Low-Tie-Ligatur




Abdominoperineale Rektumexstirpation


Dargestellt ist das Resektionsausmaß (links) sowie das postoperative Ergebnis (rechts) bei abdominoperinealer Rektumexstirpation. Dieser Eingriff wird meist bei tiefsitzenden Rektumkarzinomen durchgeführt, bei denen eine kontinenserhaltende Operation nicht möglich ist (in der Abbildung symbolisiert als graue Läsion).

Colon sigmoideum, Rektum und Analkanal werden vollständig entfernt. Die orale Resektionsgrenze liegt im Bereich des kolosigmoidalen Übergangs. Das zugehörige Mesenterium sowie das Lymphabflussgebiet dieser Darmabschnitte werden ebenso entfernt (bei malignen Veränderungen im Sinne einer TME). Die A. mesenterica inferior wird entweder abgangsnah durchtrennt („high-tie“-Ligatur), oder nach dem Abgang der A. colica sinistra abgesetzt („low-tie“-Ligatur). Bei Resektion der A. colica sinistra muss eine suffiziente Durchblutung der verbleibenden oralen Darmabschnitte sichergestellt werden, was bspw. durch die unregelmäßig vorhandene Riolan-Anastomose geschieht.


Nach dem Eingriff ist der Anus verschlossen (hier symbolisiert durch eine blaue Naht) und das Colon descendens durch ein permanentes Stoma im linken Mittelbauch ausgeleitet.




Hemikolektomie rechts




Erweiterte Hemikolektomie rechts




Transversumresektion




Hemikolektomie links






Erweiterte Hemikolektomie links




Radikuläre Sigmaresektion




Ascendodendostomie




End-zu-End-Ileotransversostomie




End-zu-Seit-Ileotransversostomie



Seit-zu-Seit-Ileotransversostomie



Transversorektostomie



- Acetylsalicylsäure soll nicht zur Primärprävention des kolorektalen Karzinoms in der asymptomatischen Bevölkerung eingenommen werden.

Prognose

- 5-Jahres-Überlebensrate : 60 %

Krebs, Häufigkeit

- **Männer** : Prostata-Ca, Bronchial-Ca, kolorektales Ca
- **Frauen** : Mamma-Ca, kolorektales Ca, Bronchial-Ca

Krebs, Mortalität

- **Männer** : Bronchial-Ca, Prostata-Ca, kolorektales Ca
- **Frauen** : Mamma-Ca, Bronchial-Ca, kolorektales Ca,

TX^o ist

Kolon CA ohne od. bei resektablen Lungen- u. Lebermetastasen und operable Pt.

Hemikolektomie od. Transversumresektion
[mit CME und Lymphadenektomie (12)] + CME + Chemo (ab UICC III) **FOLFOX**
(bei UICC II Einzelfallentscheidung (Monotherapie))
↑
KT kein schwere Infekt
Schwere Nebenwirkungen (Herz, Leber, Nieren)

NB. bei Kolon CA kein Radiotherapie)

Rektal CA Radiochemo ab UICC II/III in mittleren und unteren 1/3
OP in 6-8 W

wenn nur Kurzstrahltherapie dann OP in 10 Tage.

| | | | |
|----|----------------|------------------------|--------|
| OP | oberen 1/3 | AR + PMR | 5 cm |
| | mittleren 1/3 | TAR + TMR + Radiochemo | 2-5 cm |
| | u. unteren 1/3 | | |

Kein zicherer Zustand → APR + TMR

Analkarzinom ++

- seltener Tumor
- **Alter:** Häufigkeitsgipfel um das 60. Lebensjahr

Ätiologie

- **Risikofaktoren**
 - Infektionen mit Humanem Papillomavirus Typ 16, 18 und 33 (80%)
 - Männern, die Sex mit Männern haben, insb. unter HIV-Infizierten Personen

Klassifikation

- **Histologie:** Plattenepithelkarzinome (80 %), Adenokarzinome (20 %)
- **Lokalisation**
 - **Analkanalkarzinom:** Tumor zwischen Linea anorectalis und Linea anocutanea
 - **Analrandkarzinom:** Tumor distal der Linea anocutanea

Symptome/Klinik

- Zufallsbefund in etwa 20 %
- Blutung (Hauptsymptom)
- Druckgefühl, Schmerzen
- Pruritus ani
- Stuhlinkontinenz

Diagnostik

- **Körperliche Untersuchung**
 - Inspektion
 - Digital-rektale Untersuchung
- **Histologische Diagnostik (Biopsie)**
- **Ausbreitungsdiagnostik (Staging)**
 - Lokale Tumorausdehnung: MRT des Beckens bzw. CT des Beckens
 - Fernmetastasierung : Abdomen-Sono, Röntgen-Thorax

Röntgen-Th.
Sono. Abdom.
MRT, CT Becken

Therapie

- **Kombinierte Radiochemotherapie:** Standardtherapie bei **allen** Analkarzinomen
- **Chirurgische Therapie**
 - Kurativ: Bei Analrandkarzinomen mit T1, N0, M0 (Exzision in toto)
 - Potentiell kurativ bzw. palliativ: abdominoperineale Rektumexstirpation mit permanentem Kolostoma (Bei Resttumor, Rezidiv oder persistierender Fistel nach Radiochemotherapie)

APR



Komplikationen



- **Metastasierung**
 - **Lokoregionär:** Lymphknoten und Nachbarorgane
 - **Fernmetastasen :** hämatogen in Leber und Lunge
- **Rezidiv**

Prognose

relativ gute Prognose

- **5-Jahres-Überleben**
 - 80 % bei mit Radiochemotherapie behandelbaren Analkarzinomen
 - 30–60 % nach Rektumamputation





Morbus Crohn ++

CDE - IBD

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankung unklarer Genese. Sie befällt meist junge Erwachsene und Kinder (Häufigkeitsgipfel : 15 - 35 Lebensjahr). ♂ = ♀

- Hauptlokalisationen: **Terminales Ileum und Kolon**. Aber jede Stelle im Verdauungstrakt kann betroffen sein

Ätiologie

- Unbekannt
- Risikofaktoren : **Nikotinabusus**, **Familiäre Disposition** (zahlreiche Gene bekannt)

Klassifikation (Aktivitätsindex nach Best)

- **Leichte**, **mäßige** oder **schwere Entzündungsaktivität** (oder Schub)

Symptome/Klinik

Typisch ist ein **schubförmiger Verlauf**. Bei Persistenz der Symptome über ein halbes Jahr wird der Verlauf als „chronisch aktiv“ bezeichnet.

Intestinale Symptome

- Meist **unblutige, chronische Diarrhö**. **Tenesmen**
- **Appendizitis-ähnliche Symptome** : Schmerzen im rechten **Unterbauch**. Evtl. **subfebrile Temperaturen**
- Konglomerattumor im rechten Unterbauch
- Intestinale **Fisteln** (Enteroenteral, Enterokutan). Intestinale **Stenosen** und **Strikturen**.
- **Anale Fisteln, Anorektale Abszesse** (sind häufig erste Symptome des Morbus Crohn!)

Malabsorptionssyndrom

- **Gewichtsverlust**. **Anämie**
- Wachstumsstörungen bei Kindern
- Gallensäureverlustsyndrom : Chologene Diarrhö. Steatorrhö

Extraintestinale Symptomatik

- Gelenke: **Arthritis** (Sacroiliitis, Spondylitis)
- Auge: **Uveitis**, Iritis, Episkleritis
- Gallengänge: Primär sklerosierende **Cholangitis** (seltener als bei Colitis ulcerosa)
- Haut : **Erythema nodosum**. Pyoderma gangraenosum (seltener als bei Colitis ulcerosa)
- Orale Manifestation : Pyostomatitis vegetans, Cheilitis

Diagnostik

Anamnese

Körperliche Untersuchung

Labor

Entzündungsparameter (CRP, BSG, Leukozyte)↑. **Anämie**, ggf. Zeichen eines Eisenmangels (Ferritin↓, Transferrin-Sättigung↓). **ASCA positiv** (ca. 60%) **pANCA -ve** anti-**Saccharomyces cerevisiae** antibodies (ASCA)

Stuhluntersuchung

Bakteriologische Untersuchung zum Ausschluss einer Gastroenteritis. Evtl. Bestimmung von **Calprotectin** zur Abgrenzung von funktionellen Beschwerden, erhöhte Werte im Stuhl zeigen Entzündungsaktivität.


Endoskopie (histologische Bestätigung)

- **Ileokoloskopie** : mit **Stufenbiopsien**. **Diskontinuierlicher Befall** (Ulzera, Fissuren, Rötung). Jährliche Kontrolle wegen Entartungsrisiko
- **Ösophagogastroduodenoskopie** : evtl. Aphthen der Schleimhaut

Bildgebung

- **Sonographie** : Darmwandverdickung, **Kokarden-Phänomen**. Abszess-/Fistelnachweis
- **+ Röntgen nach Sellink** : Insb. zum Nachweis von Fisteln oder Stenosen **doppelkontrast Untersuchung des Dünndarms**
- **Hydro-MRT (MRT des Dünndarms nach Sellink, MRT-Enteroklysma)** : Darmwandverdickung, Vergrößerung der Lymphknoten

Enteroklysma



Röntgen nach Sellink (Enteroklysma), rechter Unterbauch:
 Kontrastmittelgefüllte Dünn- und Dickdarmschlingen,
 langstreckige Stenose (S) des terminalen Ileums (I). (C =
 Caecum; A = Colon ascendens)

Differentialdiagnosen

- Colitis ulcerosa ++. Gastroenteritis. Divertikulitis. Kolonkarzinom. Akute Appendizitis. Reizdarmsyndrom.

Differentialdiagnostische Erwägungen: Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

| Symptome | Morbus Crohn | Colitis ulcerosa |
|----------------------------------|---|--|
| Stuhlfrequenz/-art | - Gering erhöht (oder Obstipation) - Eher unblutig | - Stark erhöht - Blutig |
| Ernährungszustand | Reduziert | Meist normal |
| Schmerzen | - Meist kontinuierlich - Eher rechter Unterbauch | - Meist nur vor oder bei Defäkation - Eher linker Unterbauch |
| Fisteln | Häufig | Sehr selten |
| Endoskopie und Bildgebung | | |
| Ausbreitungsmuster | - Diskontinuierlicher Befall des gesamten GI-Traktes - Bevorzugte Lokalisation: Terminales Ileum und Kolon | - Kontinuierlich : Beginn im Rektum und Ausbreitung nach oral - Befall auf Dickdarm beschränkt : Heilung durch Proktokolektomie möglich |
| Histologie | - Transmuraler Befall - Granulome | - Mukosa und Submukosa betroffen - Keine Granulome |

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Nikotinkarenz**
- Bei sekundärer Laktoseintoleranz (ca. 30%): **Laktosefreie Diät**
- Bei Malabsorptionssyndrom: **Substitution von Vitaminen, Kalorien, Eiweiß, Calcium**
- Bei chologener Diarrhö: Cholestyramin

Medikamentöse Therapie

Akuter Schub

- Leichte Entzündungsaktivität : **Topische Glucocorticoidgabe** (Budesonid) *9 mg 1x/Tag*
- Mäßige bis hohe Entzündungsaktivität, kein Ansprechen auf Budesonid : **Systemische Glucocorticoidgabe** (Prednisolon) *1 mg / Kg / Tag*
- Steroid-refraktärer Verlauf: **Immunsuppressiva** (TNF- α -Hemmer)

Remissionserhaltung

- Immunsuppressiva als Dauertherapie mit **Azathioprin** oder **TNF- α -Hemmer** (Infliximab)

Interventionelle oder operative Therapie bei Komplikationen

- Abszess** : Primär **CT-gesteuerte Drainage**
- Fisteln**: Ggf. **Fadendrainage**
- Perforation, Ileus** : darmsparende Chirurgie
- Intestinale **Stenosen** : **Ballondilatation** bei Stenosen **<5 cm** **Darmsparende Resektion** bei Stenosen **≥ 5 cm**

Komplikationen

- Intestinale Komplikationen : **Fisteln, Abszesse, Fissuren, Stenosen und Strikturen** des Darms \rightarrow Ileus. Freie Perforation \rightarrow Peritonitis. **Erhöhtes Karzinomrisiko**
- Amyloidose. Osteoporose
- Cholelithiasis. Urolithiasis

Prognose

- Chronische Erkrankung: Eine Heilung ist bisher **nicht** möglich
 - Rezidive und Komplikationen sind ohne Behandlung häufig
 - Normale Lebenserwartung bei optimaler Behandlung

Colitis ulcerosa +

- chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED) und tritt meist bei jungen Menschen zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr auf.
- Ausbreitungsmuster: Meist Beginn im Rektum und kontinuierlicher Aufstieg im Dickdarm

Ätiologie

- Unbekannt
- Risikofaktor: **Genetische** Prädisposition
- Protektiver Faktor: **Nikotinkonsum**

Schweregrad eines Schubs

- **Leichter, mäßiger** oder **schwerer** Schub

Symptome/Klinik

Intestinale Symptome

- Leitsymptom: **Blutige**, schleimige **Durchfälle**
- Bauchschmerzen. Tenesmen (schmerzhafter Stuhldrang)
- Evtl. Fieber

Extraintestinale Symptome

- Gallengänge: **Primär sklerosierende Cholangitis (PSC)** +++
- Gelenke: **Arthritis**, Spondylitis, Sakroiliitis
- Haut : **Erythema nodosum**, **Pyoderma gangraenosum**,
- Mund : Pyostomatitis vegetans
- Auge: Iritis, Episkleritis, **Uveitis**

Verlaufsformen

- Chronisch-intermittierend (**schubförmig**) ++. Chronisch-kontinuierlich. **Akut-fulminant**

Sonderform : Backwash-Ileitis

- Entzündung des terminalen Ileum bei einer Colitis ulcerosa (nur die letzten Zentimeter)

Diagnostik

Anamnese

Körperliche Untersuchung

Labor

Blut : **Entzündungswerte** (BSG↑, CRP↑, Leukozytose). Anämie. **pANCA** meist ↑. Erhöhte **γ-**

GT kann Hinweis auf PSC sein

Stuhluntersuchung

Bakteriologische Stuhluntersuchung zur Ausschlussdiagnostik. **Calprotectin** als Marker für Schleimhautentzündung

Heokoloskopie (Mit Stufenbiopsien)


- **Rötung**. Kontaktblutung. **Ulzera** = **kontinuierlicher Befall**
- Bei fortgeschrittener Krankheit : **Haustrenverlust**. **Pseudopolypen**
- Regelmäßige Koloskopie-Kontrollen (wegen Entartungsrisiko)

Bildgebung

- **Sonographie** : Kolonwandverdickungen
- **Röntgen mit Doppelkontrasteinlauf** : **Verlust der Haustrierung**, **Ulzera**
- **Hydro-MRT** : **Wand des proximalen Dünndarms i.d.R unauffällig**

Differentialdiagnosen

- Morbus Crohn, Gastroenteritis. Divertikulitis. Kolonkarzinom. Reizdarmsyndrom.



Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Substitution bei Mangelzuständen (z.B. Eisen)
- Bei schwerem Schub evtl. parenterale Ernährung

Medikamentöse Therapie

- Schubtherapie:
 - Leichter bis mäßiger Schub: 5-ASA-Präparate (Mesalazin) rektal oder oral (ggf. kombiniert). Ggf. topische Glucocorticoide
 - Schwerer Schub oder kein Ansprechen auf lokale Therapie : Glucocorticoide i.v.
 - Unzureichendes Ansprechen auf Glucocorticoide : Immunsuppressiva (Infliximab)
- Remissionserhaltende Therapie : Mesalazin oder Azathioprin oder TNF- α -Hemmer

Operative Therapie

Proktokolektomie mit ileoanaler Anastomose bei Komplikationen (toxisches Megakolon, Perforation, etc.)

„Im Gegensatz zum Morbus Crohn ist die Colitis ulcerosa operativ heilbar (Proktokolektomie)“

Komplikationen

- Massive Blutungen
- Toxisches Megakolon : Lebensbedrohliche Komplikation mit septischem Krankheitsbild
- Perforation. Peritonitis
- Karzinomrisiko↑
- Amyloidose

Prognose

- Normale Lebenserwartung bei isolierter Proktosigmoiditis
- 20-Jahre-Überlebensrate 80% bei Pankolitis

Arterielle Verschlusskrankheit viszeraler Gefäße ++

- **Ischämische Darmerkrankung** : akute oder chronische Durchblutungsstörung des Darmes

Ätiologie

- **Chronische Mesenterialischämie**
 - **Atherosklerose** : die Hauptrisikofaktoren sind Nikotinabusus, Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie, Dyslipidämie (Insb. LDL-Erhöhung oder HDL-Erniedrigung)
- **Akute Mesenterialischämie**
 - Akute arterielle **Embolie** : **Vorhofflimmern**, Myokardinfarkt, Endokarditis
 - Akute arterielle **Thrombose** (bei Mesenterialatherosklerose)
 - **Aortendissektion**

Pathophysiologie

- **Chronische Ischämie**
 - Langsame Stenoseentwicklung in der A. mesenterica superior → Aufrechterhaltung der Zirkulation durch Kollateralisierung
 - **Postprandiale** Dehnung des Darms erhöht Strömungswiderstand → Minderperfusion → Schmerzattacken
 - Hochgradige Stenose der A. mesenterica inferior → Evtl. ischämische Kolitis
- **Akute Ischämie** (Thrombus, Embolie) → Darminfarkt
 - In ca. **90%** der Fälle **A. mesenterica superior betroffen** → Gefahr einer Ischämie von Jejunum und Ileum, evtl. mit Dickdarmischämie
 - Seltener: Stromgebiet des **Truncus coeliacus** betroffen

„Die Ischämietoleranz des Darms beträgt ca. 6 Stunden!“

Symptome/Klinik

Chronischer Mesenterialischämie

- **Stadium I**: Symptomlose Stenose
- **Stadium II**: Angina abdominalis (intermittierender, postprandialer Schmerz)
- **Stadium III**: Dauerschmerz und Malabsorptionssyndrom, evtl. ischämische Kolitis
- **Stadium IV**: Akuter Mesenterialinfarkt

„Leitsymptom: Angina abdominalis = Hypoxisch bedingter postprandialer Bauchschmerz“

Akuter Mesenterialinfarkt – 3 Stadien

- **Initialstadium (0–6 Std.)**
 - Stärkster, diffuser, krampfartiger **Abdominalschmerz**
 - Abnorme Peristaltik
 - Palpatorisch **weiches** Abdomen (meist ohne Abwehrspannung)
 - Übelkeit, Erbrechen und Diarrhö
- **Latenzstadium (6–12 Std.)**
 - **Nachlassen der Schmerzen** und Abnahme der Peristaltik
 - „**Fauler Frieden**“ → Stadium der Wandnekrose
 - **Blut im Stuhl**
- **Spätstadium (>12 Std.)**
 - **Unerträgliche Schmerzen**
 - Paralytischer Dünndarm-Ileus mit auskultatorischer „**Totenstille**“ → **Übelkeit**, **Erbrechen**
 - **Hämorrhagische Durchfälle**
 - ggf. **Darmperforation** → **Peritonitis** (brettharter Bauch) mit **Schocksymptomatik**

„Typischer Patient: Vorhofflimmern (bzw. Herzrhythmusstörungen) → Plötzliche Bauchschmerzen!“

Diagnostik

Anamnese

- Vorangegangene Episoden **postprandialer Abdominalschmerzen**
- Arteriosklerose-Risikofaktoren. **Vorhofflimmern**

Körperliche Untersuchung

- **Hämatochezie**
- Auskultation des Abdomens
 - Evtl. Stenosegeräusch im Epigastrium
 - **Fehlende Darmgeräusche** aufgrund eines **paralytischen Ileus („Totenstille“)**
- **Abwehrspannung bei Peritonitis**

Labor

- **Mesenterialinfarkt**
 - **Laktat↑, LDH↑, CK↑**
 - Leukozytose
 - **Metabolische Azidose**

Apparative Diagnostik

- **EKG**: Evtl. Vorhofflimmern
- **Sonographie**
 - Suche nach **freier Flüssigkeit** im Abdomen und nach stehenden Darmschlingen
 - Farbduplexsonographie zur Detektion von Abgangsstenosen
- **Röntgen** (Abdomenübersichtsaufnahme): **Erweiterte Dünndarmschlingen** mit Luftspiegeln, ggf. **Nachweis intramuraler Lufteinschlüsse** als Zeichen der Darmwandnekrose
- **Angio-CT oder -MRT (Evtl. Angiographie)**: Nachweis von **Gefäßstenosen/-Verschlüssen**
- **Ggf. Koloskopie**: bei ischämischer Kolitis: **Schleimhautödem und -blässe**, Ulzera (nicht bei Mesenterialinfarkt)

„Bei Verdacht auf akuten Mesenterialinfarkt ist eine zügige Gefäßdarstellung (Angiographie, CT, MRT oder Duplex-Sonographie) entscheidend - bei Peritonitis oder Schockgefahr kann jedoch auch eine Notfall-OP ohne apparative Diagnostik notwendig sein!“

Differentialdiagnosen (Mesenterialinfarkt : siehe DD des akuten Abdomens)

- **(Akute) Mesenterialvenenthrombose**
 - Symptome eher unspezifisch, ähnlich einer chronischen Mesenterialarterienischämie
 - Ätiologie: Angeborene Thrombophilie, Pankreatitis, paraneoplastisch, Pankreaskarzinom
- **Nicht-okklusive Mesenterialischämie (NOMI)**
 - HZV (Herzeitvolumen)↓ und gleichzeitige Vasokonstriktion der Splanchnikusgefäße
 - Insbesondere bei Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Schock
 - Digitalis → Vasospasmen im Splanchnikusgebiet

Therapie

- **Leichte ischämische Kolitis**
 - **Basistherapie der Atherosklerose**: Behandlung von Risikofaktoren, **Thrombozytenaggregationshemmer, Statine**,
- **Chronische mesenteriale Ischämie/Angina abdominalis**
 - **Basistherapie der Atherosklerose**
 - **Diät** (häufige **kleine Mahlzeiten**, **ballaststoffarme Kost**)
 - **Revaskularisation**: **interventionell** (PTA und Stentimplantation), **operativ** (Thrombendarteriektomie, Bypass-OP)
- **Akuter Mesenterialinfarkt**
 - **Notfalloperation**
 - Revaskularisation durch **Embolektomie** (bei Embolien) oder **Bypass-OP** (bei Thrombosen)
 - Bei Darmnekrosen: **Resektion**
 - **Ggf. interventionelle Therapie**
 - Bei Verschlüssen ohne Darmnekrosen oder Peritonitis
 - **Revaskularisation** durch Embolektomie (bei Embolien) oder **lokale Lyse** (bei Thrombosen), ggf. mit PTA und **Stentimplantation** (bei bestehenden Stenosen)

„Bei Verdacht auf einen Mesenterialinfarkt muss rasch gehandelt werden - die Ischämietoleranz des Darms liegt bei ca. 6 Stunden!“

Komplikationen

- Peritonitis
- Sepsis
- Multiorganversagen

Prognose

- Der akute Mesenterialinfarkt hat eine Letalität von 60–80% (schlechte Prognose)

Clostridium-difficile-Infektion ++

Pseudomembranöse Kolitis

- **Erreger:** Clostridium difficile, grampositives Stäbchen, obligat anaerob, Toxinbildner
- **Übertragung:** Fäkal-orale Infektion. Hohe Durchseuchungsrate bei Kleinkindern und hospitalisierten Patienten, Übertragung über die Hände des Personals
- **Mechanismus:** Antibiotikagabe zur Therapie einer anderen Erkrankung (z.B. im HNO-Bereich oder bei Pneumonie). Nach Antibiotikatherapie-bedingter Schädigung der Darmflora überwuchert der Erreger den Darm

Symptome/Klinik:

- Häufig asymptomatisch
- Auftreten von Symptomen meist 2–10 Tage nach Beginn einer Antibiotika-Therapie: Hohes Fieber. Krampfartige Unterbauchschmerzen. Akute, evtl. blutige Diarrhö, charakteristisch übelriechend

Diagnostik

- **Stuhl:** Nachweis der Clostridium-difficile-Toxine A und B
- **Blutbild:** Leukozytose
- **Ggf. Koloskopie:** nur unter großer Vorsicht, Nachweis der typischen Pseudomembranen bei Vorliegen einer pseudomembranösen Kolitis. Nur bei unklarer Diarrhö oder fehlendem Erregernachweis

Therapie

- **Isolierung.** Antiseptische Maßnahmen (s.u.)
- **Absetzen der auslösenden Antibiotikatherapie,** sobald vertretbar.
- **Flüssigkeitssubstitution**
- **Antibiotische Therapie: (für 10 Tage)**
 - **Milder Verlauf:** Metronidazol oral. Bei Passagestörung (Ileus, Megakolon) Metronidazol intravenös
 - **Schwerer Verlauf oder Rezidiv:** Vancomycin oral

- **Stuhltransplantation:** bei Versagen mehrere Antibiotikaregime
- **Interventionell/chirurgisch:** bei Komplikationen

Komplikationen


- **Paralytischer Ileus** → koloskopische Anlage einer Dekompressionssonde
- **Toxisches Megakolon:** Akute, lebensbedrohliche Dilatation des Dickdarms.
 - **Ursachen:** Pseudomembranöse Kolitis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Amöbenruhr, Shigellose, Morbus Hirschsprung
 - **Klinik:** Akutes Abdomen (gebläht) mit septischem Krankheitsbild, erhöhte Perforationsgefahr
 - **Diagnostik:** Röntgen-Abdomenübersicht → Stark dilatierter Kolonrahmen
 - **Therapie:** Im Anfangsstadium (<72 Std.) ggf. konservative Therapie (Anlage einer Dekompressionssonde). Später operative Therapie (Kolektomie und terminales Ileostoma, im Verlauf Kontinenzherstellung)

Sepsis


Prävention

- **Isolierung:** symptomatische Phase bis 2 Tage nach Abklingen der Symptome
- **Antiseptische Maßnahmen:** Handschuhe und Schutzkittel bei Patientenkontakt benutzen. Händedesinfektion und anschließend Händewaschen mit Seife. Konsequente Flächendesinfektion von Zimmern.

- **Meldepflicht:** nur bei schwerem Verlauf



Eine Stuhltransplantation oder fäkale Mikrobiota-Transplantation (FMT) (auch: fäkaler Mikrobiomtransfer, fäkale Bakteriotherapie und Fäkaltransplantation) ist die Übertragung von Stuhl eines gesunden Spenders in den Darm einer erkrankten Person mittels Endoskopie oder Kapseln.



Leistenhernie ++

Definition

Ausstülpung von Peritoneum, ggf. mit intraabdominellen Strukturen, durch eine Schwachstelle der Bauchwand im Bereich der Leiste.

Epidemiologie

- Indirekte Leistenhernie > direkte Leistenhernie (2:1). Rechtsseitig > linksseitig
- **Geschlecht:** ♂ > ♀ (9:1)

indirekt
re-
→

Ätiologie (=Klassifikation)

Direkte Leistenhernie


- **Lokalisation**
 - **Medial** der Vasa epigastrica (sie versorgen die untere Bauchwand)
 - Verlauf **ohne Beziehung zum Funiculus spermaticus** (=Samenstrang), **orthogonal zur Bauchwand**
 - **Bruchpforten:** **Hesselbach-Dreieck*** (innere Bruchpforte) und **äußerer Leistenring** (äußere Bruchpforte). * muskelfreie Stelle der Bauchwand
 - **Bruchsack/-hüllen:** Peritoneum und **Hüllen von Bauchwand**
 - **Bruchsackinhalt:** Häufig Anteile des Dünndarms, aber auch andere Bauchorgane möglich
- **Ätiologie:** **Immer erworben**
- **Risikofaktoren**
 - Intraabdominelle Druckerhöhungen (bspw. durch Obstipation)
 - Bindegewebsschwäche (bspw. durch Alter)
- Meist ältere Männer

Bestandteile

Indirekte Leistenhernie

nicht obliterierenden processus vaginalis peritui

- **Lokalisation**
 - **Lateral** der Vasa epigastrica
 - Verlauf **im Leistenkanal** innerhalb des Samenstrangs, **parallel zur Bauchwand**
 - **Bruchpforten:** **Innerer und äußerer Leistenring**
 - **Bruchsack/-hüllen:** Peritoneum und **Hüllen des Samenstrangs**
 - **Bruchsackinhalt:** Häufig Anteile des Dünndarms, aber auch andere Bauchorgane möglich
- **Ätiologie:** **Angeboren oder erworben**
- **Risikofaktoren** (= direkte Leistenhernie)
- Insb. **Neugeborene, Kinder und junge Menschen** (meist Männer)
- **Sonderform: Skrotalhernie:** Leistenhernie, bei der der Bruchsack bis in den Hoden reicht




Symptome/Klinik

- **Vorwölbung in der Leistenregion**
- Ggf. Vergrößerung des Skrotums
- Ggf. **Fremdkörpergefühl** und/oder **Schmerzen** im Bereich der Hernie
- **Bei Inkarzeration:** Ileussympomatik und starke Schmerzzunahme

Diagnostik


Anamnese und körperliche Untersuchung

- Inspektion: Reponible **Vorwölbung** in der Leiste
- Beschwerdezunahme bei Belastung oder Husten
- **Palpation des Leistenkanals im Stehen und im Liegen**, bds.
 - Beim Mann: Im Stehen durch die Skrotalhaut bis zum äußeren Leistenring tasten, dann Patienten husten lassen. **Hustenanprall?**
 - Bei der Frau meist nicht möglich
- **Auskultation:** Ggf. Nachweis von Darmgeräuschen



DEFINITION Angeborene oder erworbene Hernie oberhalb des Leistenbandes (Lig. inguinale). Die Leistenhernie tritt immer durch den äußeren Leistenring hindurch. Unterschieden wird zwischen direktem und indirektem Leistenbruch:

- **direkter Leistenbruch:** Die Bruchpforte befindet sich medial der epigastrischen Gefäße in der Fossa inguinalis medialis (Hesselbach-Dreieck). Der Bruchsack liegt medial des Samenstrangs. Am Anulus inguinalis externus tritt der Bruch nach außen.



indirekter Leistenbruch: Die Bruchpforte liegt lateral der epigastrischen Gefäße. Der Bruch verläuft vom inneren Leistenring durch den Leistenkanal zum äußeren Leisten ring. Der Bruchsack liegt also im Samenstrang und kann bis ins Skrotum ziehen.

- **Kaltlichtlampe:** Differenzierung von Skrotalhernie und begleitender Hydrozele
- „Die körperliche Untersuchung ist das wichtigste Kriterium zur Diagnosestellung einer Leistenhernie!“

Bildgebende Verfahren

- **Sonographie:** Darstellung von Bruchpforte und Bruchinhalt
- **Ggf. MRT:** Bei unklaren Befunden und zur Abgrenzung von Differentialdiagnosen

Differentialdiagnosen

- **Hydrozele testis** (Flüssigkeitsansammlung im Skrotum): **schmerzlos** Größenzunahme des Skrotums ohne Rötung
- **Varikozele testis** (Erweiterung der Hodenvenen) : **schmerzlos** Größenzunahme des Skrotums ohne Rötung
- **Hodentumor** : **schmerzlos** Größenzunahme des Skrotums ohne Rötung
- **Abszess** : überwärmt und gerötet sowie deutlich **druckschmerzhaft** (DD : inkarzerierte Leistenhernie)
- **Schenkelhernie** (Vorwölbung im Bereich des Oberschenkels, selten, kommt häufig bei Frauen vor)

Therapie

Konservative Therapie

- **Abwartendes Verhalten:** Nur bei asymptomatischen und nicht-progredienten Leistenhernien beim Mann

Operative Therapie

Indikationen

- **Alle symptomatischen oder progredienten Hernien**
- **Alle Hernien bei der Frau** (hohes Inkarzerationsrisiko)

Zeitpunkte

- Bei reponibler Leistenhernie: Elektive Operation
- Bei inkarzierter Hernie: Notfalloperation

Verfahren

- **Offene Operationsverfahren**
 - **Nahtbasiert nach Shouldice** : Verstärken des Leistenkanals mittels Naht
 - **Netzbasiert nach Lichtenstein** : Netzeinlage
- **Minimalinvasive Operationsverfahren** (**immer netzbasiert** = Netzeinlage)
 - **TAPP** (= Transabdominelle präperitoneale Plastik)
 - **TEP/TEPP** (= Total extraperitoneale Plastik/Total extraperitoneale Patch-Plastik)

Wahl des Verfahrens

- **Immer minimalinvasive OP**
 - Bei allen Hernien der **Frau**
 - Bei **beidseitigen** Hernien
 - **Minimalinvasiv ODER offen:** Bei primärer **einseitiger** Hernie beim **Mann**
- „Vorteil von netzbasierten Verfahren : seltener Rezidive
Vorteil von minimalinvasiven Verfahren : seltener chronische Schmerzsyndrome“

Komplikationen

Inkarzeration

Definition

- **Inkarzeration** = **Einklemmung** von Bruchinhalt in der Bruchpforte → Unterbrechung der Durchblutung des betroffenen Darmabschnitts → Darmischämie, Nekrose und Peritonitis

Risikofaktoren

- Kleine Bruchpforte

Klinik und Diagnostik

- **Irreponible** Schwellung
- Schmerzen und **Rötung** im Bereich des Unterbauchs und ggf. Skrotums
- Auskultatorisch: **Hochfrequente, spritzende Geräusche**
- Ileussyndromatik: **Übelkeit, Erbrechen, Stuhlverhalt**

- Ggf. septisches Krankheitsbild, Perforation, Peritonismus

Therapie

- **Notfalloperation**
 - Hernienversorgung (siehe: Operationsverfahren)
 - Ggf. Entfernung des Darmabschnitts

Komplikationen nach Operation

- Verletzung des Ductus deferens
- Hodennekrose
- Rezidiv
- Akzidentelle Durchtrennung von Nerven, teilweise mit chronischen Leistenschmerzen
- Nach Netzeinlage : Infektionen, Netzschrumpfung mit Leistenbeschwerden

Prognose

- Rezidivrate nach OP: ca. 5%
- Letalität bei inkarzierter Hernie: Ca. 20% (trotz Operation)


Besondere Patientengruppen

Leistenhernie im Kindesalter (wie bei Erwachsenen)


Leistenkanal (Canalis inguinalis)




- **Definition** : röhrenförmige Verbindung zwischen Bauchhöhle und äußerer Genitalregion
- **Öffnungen** : innerer und äußerer Leistenring
- **Inhalt** :
 - beim Mann : Samenstrang Funiculus spermaticus (mit Ductus deferens und Blutgefäße)
 - bei der Frau : Ligamentum teres uteri

Chirurgische Anatomie




Chirurgische Anatomie







beim Mann: Funiculus spermaticus



bei der Frau

- N. ilioinguinalis
- R. genitalis des N. genitofemoralis
- Lig. teres uteri
- A./V. lig. teres uteri





Offen anteriore Leistenhernienreparatur

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| Rekonstruktion | mit Naht | Shouldice | Transversalisfaszien-Doppelung |
| | | Bassini (historisch) | Naht Internusmuskulatur ad Leistenband |
| | mit Netz | Lichtenstein | Spannungsfreie Netzimplantation (Netz <u>vor</u> Transversalis-Faszie) |
| | | ... weitere Verfahren im „Nachschlag für die Interessierten“ | |

Endoskopisch minimal-invasive Leistenhernienreparatur

TAPP Trans **A**bdomineller **P**räperitonealer **P**atch *Plastik*

TEP Total Extraperitonealer **P**atch */ Plastik*

Hiatushernie +

Definition


Verlagerung von Magenanteilen aus der Bauchhöhle in den Thoraxraum.

Ätiologie (Risikofaktoren)

- Alter
- Faserarme Kost
- Abdominelle Druckerhöhung
- Schwangerschaft/Adipositas

Klassifikation

- **Axiale Hiatushernie (Gleithernie):** Verlagerung von **Cardia und Fundusanteilen** durch den Hiatus oesophageus in den Thoraxraum (mit 90% die häufigste Form). Funktion des Ösophagussphinkters gestört
- **Paraösophageale Hernie:** Verlagerung von **Fundusanteilen** am Ösophagus vorbei (=paraösophageal) in den Thoraxraum. **Die Kardia liegt normal** → unterer Ösophagussphinkter intakt
 - Extremvariante „Upside-down-Magen“: Sonderform der paraösophagealen Hiatushernie = Verlagerung des gesamten Magens in den Thorax
 - Höhere Komplikationsrate, Morbidität und Mortalität (insbesondere bei Upside-down-Magen)
- **Mischhernie:** Kombination aus einer axialen und einer paraösophagealen Hernie



Symptome/Klinik

- **Axiale Hiatushernie**
 - Meist asymptomatisch
 - **Unkompliziert: Refluxbeschwerden**
 - **Kompliziert:** Ösophagitis, chronische Blutung (→Eisenmangelanämie), Stenosen, Barrett-Ösophagus
- **Paraösophageale Hernie (3 Stadien)**
 - Asymptomatisch
 - **Unkompliziert: Dysphagie**, Aufstoßen, Druckgefühl in der Herzgegend, Völlegefühl, epigastrische Schmerzen
 - **Kompliziert:** Eisenmangelanämie aufgrund chronischer Blutungen, Erosionen, Ulzera, Inkarzerationen, Magenvolvulus

Diagnostik

Endoskopie

- Bei **Gesunden** liegt **Z-Linie** (Übergang von Plattenepithel des Ösophagus zu Zylinderepithel des Magens) in Höhe des Zwerchfelldurchtritts *(Einschnürung (isthm) endoskopisch)*
- **Axiale Hiatushernie**: Die **Z-Linie** liegt oberhalb des Zwerchfelldurchtritts (<3cm = kleine Hernie, >3cm = große Hernie)
- **Paraösophageale Hernie**: **keine Z-Linien-Verlagerung**. Sie kann daher endoskopisch **nicht** immer sicher identifiziert werden!

Bildgebung

- **Röntgen-Thorax**: ggf. glatt begrenzte Raumforderung in Projektion auf das Mediastinum, mit evtl. **Spiegelbildung**
- **Ösophagusbreischluck**: Lokalisation der Kardia oberhalb des Zwerchfells. Verlegung des Magens in den Thoraxraum
- **CT-Thorax-Abdomen mit Kontrastmittel**: Insb. bei V.a. Inkarzeration

Ggf. Langzeit-pH-Metrie

Therapie

Axiale Hiatushernie

- **Konservative Therapie**: Protonenpumpeninhibitoren bei Refluxbeschwerden
- **Operative Therapie**: Offene oder laparoskopische **Fundoplicatio** mit **Hiatoplastik** und ggf. auch Fundo- oder Gastropexie. Bei therapieresistenter, rezidivierender Ösophagitis

Paraösophageale Hiatushernie und Mischhernien

Immer aufgrund des hohen Komplikationsrisikos: **operativ** (meist laparoskopisch)

Komplikationen (siehe komplizierte Formen)

Leberzirrhose +

- Zerstörung und Fibrosierung des Lebergewebes.

Ätiologie

- **Toxisch**
 - **Äthyltoxisch** = **Alkoholabusus** (häufigste Ursache)
 - **Medikamentös** (z.B. Amiodaron, Zytostatika wie z.B. Methotrexat)
- **Entzündlich**
 - **(Chronische) Virushepatitis B, C, D** (zweithäufigste Ursache)
 - Primär biliäre Cholangitis (PBC)
 - Primär sklerosierende Cholangitis (PSC)
 - Autoimmunhepatitis
- **Stoffwechselerkrankungen**
 - Nichtalkoholische Fettlebererkrankung
 - Hämochromatose (Bronzdiabetes : bronzartiges Hautkolorit + DM)
 - Morbus Wilson (Akkumulation von Kupfer im Körper = neurologische/psychiatrische Auffälligkeiten + indir. BLB ↑)
 - α_1 -Antitrypsin-Mangel (Lungenemphysem < 50 J)
- **Vaskulär**
 - Budd-Chiari-Syndrom (Leberventhrombose)
 - Cirrhose cardiaque
- **Kryptogen**: die Ätiologie nach ausreichender Diagnostik unklar verbleibt

Child-Pugh-Klassifikation

- **Parameter**: Serumalbumin, Serumbilirubin, Quick-Wert, Aszites (sonographisch), Hepatische Enzephalopathie. (für jedes Parameter 1 bis 3 Punkte)
- **Child A**: 5–6 Punkte; **Child B**: 7–9 Punkte; **Child C**: 10–15 Punkte

Pathophysiologie

- **Entzündungsinfiltrat** → Untergang von Hepatozyten und Reparaturvorgänge
- **Leberfunktionsstörung**: mit verminderten Synthese von:
 - Gerinnungsfaktoren → Blutungsneigung
 - Harnstoff → Ammoniak↑ → Hepatische Enzephalopathie (in der Leber wird Ammoniak in Harnstoff umgewandelt)
 - Albumin → Aszites
 - Gallensäuren → Aufnahme fettlöslicher Vitamine↓
 - Transportproteinen für Hormone
- **zunehmende Fibrosierung**: Portale Hypertension mit den Komplikationen Aszites, portokavale Umgehungskreisläufe (z.B. Ösophagusvarizen) und Splenomegalie

Symptome/Klinik

- Eine Leberzirrhose ist zu Beginn häufig symptomfrei
- **Allgemeinsymptome**: Müdigkeit, Leistungsminderung. Völlegefühl im Oberbauch. Ikterus. Pruritus. Bauchumfangszunahme
- **Leberhautzeichen**
 - **Kopf**: Lacklippen, ^{Atrophie der Zungenpapillen} Lackzunge, Spider naevi (Teleangiektasien : Erweiterung der Hautgefäße)
 - **Rumpf**: Spider naevi. Gynäkomastie. Bauchglatze und Brustglatze. Caput medusae (Periumbilikale Erweiterung der subkutanen Venen)
 - **Extremitäten**: Palmar- und Plantarerythem. Milchglasnägel/Weißnägel. Dupuytren-Kontraktur (Kontraktur der Hand und Finger). Uhrglasnägel
 - **Generell**: Hautatrophie
- **Hormonstörungen**: Libido-/Potenzstörungen. Amenorrhö. Gynäkomastie.
„Eine Gynäkomastie kann auch als Nebenwirkung einer Therapie mit Spironolacton auftreten!“

[2][3]

| Punkte | 1 | 2 | 3 |
|---|-------|-----------|----------|
| <u>Albuminkonzentration im Serum in g/dL</u> | >3,5 | 2,8–3,5 | <2,8 |
| <u>Bilirubinkonzentration im Serum in mg/dL</u> | <2,0 | 2,0–3,0 | >3,0 |
| <u>Quick-Wert in %</u> | >70 | 40–70 | <40 |
| <u>Aszites (sonografisch)</u> | kein | mäßig | viel |
| <u>Hepatische Enzephalopathie</u> | keine | Grad I–II | >Grad II |

Child A: 5-6 Punkte; Child B: 7-9 Punkte; Child C: 10-15 Punkte

Diagnostik

Anamnese und körperliche Untersuchung

- Leberhautzeichen
- Ggf. Knotige, höckrige Leber (Palpation)
- Ggf. Aszites (Perkussion)

Labor

- **Leberparenchymschaden**
 - Transaminasen↑, GLDH↑ (Glutamatdehydrogenase) → Zytolyse
 - Alkalische Phosphatase↑, γ-GT↑. Evtl. Bilirubin↑ → Cholestase
 - Ammoniak↑
- **Synthesestörung**
 - INR↑, Quick-Wert↓
 - Gesamteiweiß bzw. Albumin↓
 - Cholinesterase↓
- Thrombozytopenie bei Hypersplenismus infolge der Splenomegalie
- Anämie : makrozytär durch Vitaminmangel (B₁₂, Folsäure), mikrozytär durch chronischen Blutverlust
- Serumelektrophorese: Albumin-Bande↓, γ-Bande↑

Apparative Untersuchungen

Sonographie

- Leberkontur höckrig (bosselé), inhomogene Parenchymstruktur (durch Regenerationsknoten)
 - Initial Organvergrößerung, im Verlauf Atrophie
 - Komplikationen wie portale Hypertension, Aszites,...
- „Bei allen Patienten mit Leberzirrhose durch Hepatitis-C, Hepatitis B und Fettleberhepatitis sollte eine Früherkennungsuntersuchung (Sonographie der Leber) angeboten werden (Screening von HCC)“

Ggf. Computertomographie

Zur Differentialdiagnostik bei Leber Raumforderungen (z.B. bei Verdacht auf HCC)

Ggf. Leberbiopsie

- bei unklarer Ätiologie und möglicher therapeutischer Konsequenz
- Bei fortgeschrittener Zirrhose und eindeutiger Ätiologie sollte eine Biopsie aufgrund ihrer Invasivität vermieden werden.

Differentialdiagnosen

HCC, Cholelithiasis, Rechtsherzinsuffizienz

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Alkoholabstinenz
- Vermeidung lebertoxischer Medikamente
- Behandlung der Grunderkrankung
- Ausgewogene, kalorisch ausreichende Kost, keine Eiweißrestriktion

Medikamentöse Maßnahmen

- Senkung des portalen Drucks bei Nachweis von Ösophagusvarizen : Nicht-selektive Betablocker, z.B. Propranolol
- Bei Aszites oder generalisierten Ödemen : Spironolacton, ggf. + Schleifendiuretikum
- Bei Mangel an Gerinnungsfaktoren : Vitamin K substituieren (10 mg p.o. 1-0-0)

Interventionell

- Senkung des portalen Drucks durch TIPS-Anlage (Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt) = Verbindung durch einen Stent zwischen Vena portae und Vena cava inferior
- Indikation: Therapierefraktärer Aszites, rezidivierende Ösophagusvarizenblutung

Operativ

- Lebertransplantation als Ultima ratio



Komplikationen

Dekompensierte Leberzirrhose

- Situative Verschlechterung der Leberfunktion im Rahmen einer Leberzirrhose
- Manifestationen
 - Folgen einer portalen Hypertension
 - Ösophagusvarizenblutung
 - Aszites, spontane bakterielle Peritonitis
 - Organfehlfunktionen
 - Exazerbation eines Ikterus
 - Hepatische Enzephalopathie
 - Hepatorenales Syndrom
 - Hepatopulmonales Syndrom
 - Pfortaderthrombose
 - Spätkomplikationen: Hepatozelluläres Karzinom (HCC)



Hepatische Enzephalopathie

Funktionsstörung des Gehirns, die durch eine unzureichende Entgiftungsfunktion der Leber und konsekutive Akkumulation von neurotoxischen Stoffwechselprodukten (z.B. Ammoniak) entsteht.

Trigger

Verschlechterung der Leberfunktion. Infektionen (z.B. spontan-bakterielle Peritonitis). Ösophagusvarizenblutungen

Klinik

- Bewusstseinsstörung bis hin zum Koma
- neuropsychiatrische Auffälligkeiten

Therapie

- Leichte Formen (Stadium 0-1): ambulante Behandlung
 - Vermeidung auslösender Faktoren (z.B. leberschädigende Medikamente, Alkohol)
 - Lactulose
- Schwere Formen (Stadium ≥ 2): stationäre Behandlung
 - Behandlung auslösender Faktoren (Blutungen, Infektion)
 - Lactulose Lactulose 10-40 mL p.o. 2-3x/Tag; Individuelle Dosierung mit dem Ziel von 2x täglich weichem Stuhlgang
 - Bei gastrointestinaler Blutung: Breitspektrumantibiotikum für 5 Tage (z.B. Ceftriaxon)
 - Restriktion der Proteinzufuhr über einige Tage, Supplementation mit Aminosäuren
 - Intravenöse Gabe von Ornithinaspartat → Steigerung der Ammoniakentgiftung

Hepatorenales Syndrom

- Nierenfunktionsstörung bei schweren Lebererkrankungen (durch renale Vasokonstriktion mit konsekutiv verringerter Nierenperfusion)
- Triggerfaktoren: Volumenverluste (Aszitespunktion, Gastrointestinale Blutung, forcierte Diurese)
- Klinik
 - Typ I: rasch mit sehr ungünstiger Prognose
 - Typ II: langsam, bessere Prognose
- Therapie: Lebertransplantation als einzige kurative Option

Pulmonale Komplikationen bei portaler Hypertension

- Hepatopulmonales Syndrom
- Pulmonale Hypertonie
- Hydrothorax

Prognose

1-Jahres-Überlebensraten

Nach Child-Pugh-Score : Child A: Fast normal. Child B: 85%. Child C: 35%

Portale Hypertension +

Druckerhöhung in der Pfortader. Dies führt über einen Rückstau zur Ausbildung von portokavalen Kollateralen an periumbilikalen, rektalen und gastralen/ösophagealen Venen sowie zu Splenomegalie und Aszites.

Ätiologie

Prähepatisch

- Pfortaderthrombose
- Milzvenenthrombose

Intrahepatisch (am häufigsten)


- Leberzirrhose (häufigste Ursache in Europa)
- Schistosomiasis (weltweit häufigste Ursache)

Posthepatisch

- Budd-Chiari-Syndrom *Lebervenen thrombose*
- Rechtsherzinsuffizienz, Pericarditis constrictiva

Paquet-Klassifikation von Ösophagusvarizen

| | |
|----------|---|
| Grad I | Kleine Varizen |
| Grad II | Vorwölbung $\leq 1/3$ des Ösophaguslumens |
| Grad III | Vorwölbung $\leq 1/2$ des Ösophaguslumens |
| Grad IV | Varizen füllen das Ösophaguslumen aus |



Symptome/Klinik

- **Klinik der Grunderkrankung** (z.B. Leberzirrhose, Rechtsherzinsuffizienz)
- **Folgen des erhöhten Pfortaderdrucks**
 - Ausbildung portokavaler Anastomosen: Ösophagus- und Magenvarizen (Blutung möglich → Hämatemesis, Mälena,...). Rektumvarizen. Caput medusae
 - Splenomegalie
 - Aszites

Diagnostik

Doppler-Sonographie

- Pfortadererweiterung $> 13 \text{ mm}$
- portokavale Anastomosen. Splenomegalie. Aszites
- Ggf. (chronische) Pfortaderthrombose

Ggf. CT-Abdomen (oder Endosono)

Nachweis einer Pfortaderthrombose

Ösophago-Gastro-Duodenoskopie (ÖGD)

Abklärung und ggf. Behandlung von Ösophagusvarizen.

Therapie

Medikamentöse Therapie

- **Propranolol** (nicht-selektiver β -Blocker) \downarrow Pfortaderdruck
- Drucksenkung in der Pfortader

Interventionell

Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt (TIPS)

- Zur Senkung des portalen Drucks (Verbindung durch einen Stent zwischen Vena portae und Vena cava inferior)
- **Indikation** : Therapierefraktärer Aszites, rezidivierende Ösophagusvarizenblutung
- **Kontraindikation** : Vorbestehende hepatische Enzephalopathie (bzw. Child C) / HCC

Operativ (als Alternative)

Operative portosystemische Shuntverfahren

- **Komplette oder portosystemische Shunts**: niedriges erneutes Blutungsrisiko bei Varizen, jedoch höheres Enzephalopathierisiko
- **Selektive portosystemische Shunts**: höheres erneutes Blutungsrisiko bei Varizen, jedoch niedriges Enzephalopathierisiko

Komplikationen : Ösophagusvarizenblutung

Klinik

Symptome der oberen gastrointestinalen Blutung : Hämatemesis, Meläna, Hämatochezie. Evtl. Hämorrhagischer Schock

Therapie

Akute Therapie

- **Allgemeine Maßnahmen (siehe GI-Blutung)**
 - Intensivstationäre Überwachung
 - Legen von mind. zwei großlumigen Venenverweilkanülen
 - Kreislaufstabilisation : Flüssigkeitssubstitution. Bluttransfusion
 - Magensonde → Ableiten des Blutes
 - Ggf. (Schutz-)Intubation zur Aspirationsprophylaxe
- **Medikamentös**
 - Terlipressin i.v. für 3–5 Tage (→ Portale Drucksenkung)
 - Gabe von Vitamin K bei Gerinnungsstörung
 - Protonenpumpenhemmer hochdosiert i.v.
 - i.v. Antibiotikagabe
- **Endoskopisch : Endoskopische Ösophagusvarizenligatur (Gummibandligatur)**
 - Alternative: Injektion von Histoacryl (bei Fundusvarizen)
- **Reserveverfahren: Ballontamponade der Ösophagusvarizen (Blakemore-Sonde)**

Prophylaxe

- **Primärprophylaxe**
 - Medikamentöse Senkung des portalen Drucks (s.o.) in allen Stadien
 - Endoskopische Ösophagusvarizenligatur (Gummibandligatur) : bei hohem Blutungsrisiko → Varizen ab Stadium II nach Paquet, Child B–C, Koagulopathie
- **Sekundärprophylaxe**
 - Kombinierte Therapie mit medikamentöser Drucksenkung (z.B. Propranolol) und endoskopischer Varizenligatur bei residualen Varizen
 - Bei Blutungen trotz adäquater Prophylaxe → TIPS

Gutartige Leberraumforderungen +

- Die gutartigen Raumforderungen der Leber werden oftmals zufällig in der Bildgebung entdeckt.
- Charakteristische Eigenschaften bezüglich Morphologie und Kontrastmittel-Verhalten erlauben oftmals eine Zuordnung. Besteht Unklarheit, ist gegebenenfalls eine Laparoskopie und/oder biopsische Untersuchung vorzunehmen.
- Gerade bei Frauen, die unter starkem Einfluss weiblicher Hormone stehen (Kontrazeptiva, Schwangerschaft), zeigen sich gehäuft das **Hämangiom**, die **fokale noduläre Hyperplasie** sowie das **Adenom**.

Übersicht

| | Leberhämangiom | Fokale noduläre Hyperplasie (FNH) | Leberzelladenom (Hepatozelluläres Adenom) | Leberzyste |
|--------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| Epidemiologie | Häufigster benigner Lebertumor. ♀ > ♂ | Zweithäufigster benigner Lebertumor. ♀ > ♂ | Selten. ♀ > ♂ | >50. LJ |
| Ätiologie | <ul style="list-style-type: none"> Unbekannt Ggf. Kontrazeptiva | <ul style="list-style-type: none"> Unbekannt Ggf. Kontrazeptiva | <ul style="list-style-type: none"> Unbekannt Ggf. Kontrazeptiva | Kongenital |
| Symptome/ Klinik | <ul style="list-style-type: none"> Häufig asymptomatisch Ggf. Oberbauchbeschwerden, Völlegefühl, Übelkeit (insb. größere Tumoren) | | | |
| Sonographie | <ul style="list-style-type: none"> Homogen echoreich | <ul style="list-style-type: none"> Homogen echoarm Zentrale Narbe | <ul style="list-style-type: none"> Meist isoechogen Inhomogenitäten durch Einblutungen | Echofrei, rund |
| Kontrastmittel -CT/-MRT | <ul style="list-style-type: none"> Früharterielle Anreicherung des peripheren Randes dann zentrale Anreicherung | Früharterielle Anreicherung mit zentraler Narbe | Früharterielle Anreicherung | Keine Anreicherung |
| Therapie | i.d.R. konservativ mit sonographischen Kontrollen | Konservativ mit sonographischen Kontrollen | Operative Entfernung | Konservativ |
| Komplikation | <ul style="list-style-type: none"> Rupturgefahr mit Blutungen (sehr selten) Keine maligne Entartung | <ul style="list-style-type: none"> Größenzunahme Keine maligne Entartung | <ul style="list-style-type: none"> Rupturgefahr Lebensbedrohliche Blutungen Maligne Entartung möglich (5-10%) | Keine maligne Entartung |


- **Leberabszess**: sonographisch unregelmäßig begrenzte echoarme Läsion, ggf. Gaseinschlüsse
- **Echinokokkuszyste**: meist gekammert + Zystenmembranen + Wandverkalkungen möglich
- **Biliom**: Ansammlung von Gallenflüssigkeit in zystischer Form

Immunologische Tests: Es stehen KBR (Komplementbindungstest), Hämagglutinationstest, indirekte Immunfluoreszenz und EUSA zum Nachweis einer Echinokokkuszyste bzw. zur weiteren Differenzierung zwischen E. cysticus und E. multilocularis zur Verfügung.

Differentialdiagnosen

- **Maligne Tumoren der Leber**: Hepatozelluläres Karzinom, intrahepatisches cholangiozelluläres Karzinom, Lebermetastasen
- „**Pseudotumoren der Leber**“: Regeneratknoten bei Leberzirrhose

| Leberhämangiom | Fokale noduläre Hyperplasie (FNH) | Leberzelladenom (Hepatozelluläres Adenom) | Leberzyste |
|---|--|--|--|
| <p>tritt v.a. bei Frauen</p> <p>Hormon abhängig wächst</p> <p>Ruptur & Blutungen selten</p> <p>Solitär od. multiple</p> <p>entartet nicht</p> <p>Embolisation oder Resektion) ist nur bei Blutungen indiziert.</p> | <p>auch bei Frauen</p> <p>hormonabhängiges Wachstum</p> <p>Solitär</p> <p>entartet nicht</p> <p>Die oralen Kontrazeptiva sollten abgesetzt werden, eine Resektion ist nur bei Symptomen oder Größenzunahme indiziert.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • gleich oder -arm • inhomogener Binnestruktur • entarten etwa 10 % der Adenome zum Leberzellkarzinom. • eine Biopsie mit Histologie sinnvoll <p>Typisch ist das Fehlen von Zentralvenen und Gallengängen.</p> <p>Die oralen Kontrazeptiva sollten abgesetzt werden. Eine Resektion ist nur bei Komplikationen und Größenzunahme indiziert.</p> | <p>echt — Pseudo</p> <p>Solitär — Multiple</p> <p>angeboren — erworben</p> <p>echofrei, scharf-wandig und zeigt eine dorsale Schallverstärkung.</p> <p>Bei asymptomatischen Zysten ist keine Therapie erforderlich. Große Zysten, die Beschwerden hervorrufen, sollten reseziert werden.</p> |




Leberhämangiom



Sonographie der Leber im Oberbauchsschrägschnitt rechts:

Im rechten Leberlappen ist eine scharf abgrenzbare echoreiche Raumforderung (grüne Fläche) erkennbar, die ein inhomogenes Binnenmuster mit echoarmen Anteilen aufweist. Angedeutet ist eine leichte „dorsale“ Schallverstärkung. Es handelt sich dabei um ein Leberhämangiom, wobei die echoarmen Anteile am ehesten Thrombosierungen entsprechen (Kreis 1: Lebervenenast, Kreis 2: Pfortaderast).

Hämangiom

Irisblendenphänomen





CT Abdomen axial mit KM, spaterarterielle/portalvenose Phase: KM-Anreicherung in der Leber mit hypodenser zentraler Narbe.
Diagnose: Fokale nodulare Hyperplasie.



Sonographie der Leber im schrägen Oberbauchschnitt rechts:

Am kaudalen Rand der Leber ist eine große echofreie Raumforderung (weiße Umrandung) mit dorsaler Schallverstärkung (weiße Fläche) erkennbar. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um eine benigne Zyste. Der kaudale Rand (gestrichelte Linie) der Zyste ist aufgrund einer Schallauslöschung (grüne Fläche, bedingt durch Darmgase) jedoch nicht erkennbar.



Echinokokkose

CT-Abdomen, nativ, Transversalschnitt: Im rechten Leberlappen zeigt sich eine septierte hypodense Raumforderung (rot). Diagnostisch lässt sich eine Echinokokkose mit singulärer, septierter Zyste feststellen, die vermutlich durch *Echinococcus granulosus* verursacht wurde. Auf der CT-Aufnahme sind ebenso Magen (MA), Wirbelkörper (WK), Aorta (A), Milz (M) und linke Niere (N) zu sehen.



Biliom

CT-Abdomen axial nach intravenöser KM-Gabe. Biliom (markiert) bei Z.n. Hemihepatektomie.

Weitere Strukturen: Leber (Le), Magen und Magenblase (Ma), Milz (Mi), Aorta (A), Wirbelkörper (W), Lunge (L), vermutlich Nierenoberpol (N).

Die Therapie von Echinokokkuszysten richtet sich nach dem Erreger:

- **E. cysticus**: Präoperativ erfolgt eine Vorbehandlung für 4 Wochen mit Albendazol bzw. Mebendazol. Die Zyste wird operativ punktiert (Cave: Verschleppung vermeiden !), die Scolices mit hyperosmolarer Lösung getötet und die Zyste im Anschluss nach Eröffnung der Kutikula (Zystektomie) oder mit Kutikula (Perizystektomie) entfernt. Postoperativ sollte die Therapie mit Albendazol und oder Mebendazol noch für 1-2 Monate fortgesetzt werden, wenn die Zyste komplett entfernt werden konnte. Gelingt keine vollständige Resektion, ist eine dauerhafte medikamentöse Therapie notwendig (bis zu 2 Jahre).

- **E. multilocularis**: Das Wachstum ist invasiv. Daher muss diese Zyste wie ein Malignom behandelt werden: Resektion im Gesunden mit mindestens 1 cm großem Sicherheitsabstand.

Hepatozelluläres Karzinom (HCC) +

Definition

maligner Tumor der Leber. Am häufigsten wird die Diagnose als sonographischer Zufallsbefund oder im Rahmen von Verlaufskontrollen der Zirrhose/Hepatitis mittels Sonographie oder Anstieg des Alpha-FP gestellt.

Ätiologie

- Leberzirrhose (80%)
- Chronische Hepatitis B oder C, alkoholischer oder nichtalkoholischer Fettleberhepatitis

Klassifikation

Barcelona-Klassifikation

Symptome/Klinik

- In frühen Stadien: Keine spezifischen Beschwerden
- In fortgeschrittenen Stadien: Druckgefühl im Oberbauch, Gewichtsverlust, Inappetenz, Ikterus

Diagnostik

- Anamnese und körperliche Untersuchung
- Labor: Bestimmung des Alpha Fetoproteins im Blut (zur Früherkennung und als Verlaufsparmeter)
- Sonographie: inhomogene unscharf begrenzte Raumforderung
- Sonographie mit Kontrastmittel: Irreguläre Vaskularisation des Tumors. Früharterielle Anreicherung. Rasche portalvenöse Auswaschung des Kontrastmittels
- Ggf. sonographisch gesteuerte Leberpunktion
- Staging: Computertomographie (oder MRT) der Leber mit Kontrastmittel. CT-Thorax, Skelettszintigraphie

rasche Anreicherung
rasche Auswaschung

Differentialdiagnosen

- Lebermetastasen:
 - Häufigste maligne Raumforderung der Leber. Primärtumoren liegen dabei v.a. im Gastrointestinaltrakt (Kolon, Magen, Pankreas), in der Lunge oder Mamma
 - Diagnostik:
 - Abdomen-Sonographie: relativ scharf begrenzte Raumforderung, echoarm (Mamma-, Bronchialkarzinom), echoreich (Gastrointestinale Tumoren).
 - Staging: Kontrastmittel-CT oder MRT
- Intrahepatisches cholangiozelluläres Karzinom
- Regeneratknoten bei Leberzirrhose
- Benigne Lebertumoren: Leber-zyste / -hämangiom/-adenom. Fokale noduläre Hyperplasie

Therapie

Frühstadien ohne Gefäßinvasion und ohne Metastasen

- Chirurgische Resektion: nur bei ausreichender Leberfunktion
- Lebertransplantation
- Ablative Verfahren (in kurativer Absicht)
 - Radiofrequenzablation: Hitze nekrose erzeugen
 - Transarterielle Chemoembolisation

Fortgeschrittene Stadien mit Gefäßinvasion oder Metastasen

- palliative Chemotherapie bzw. rein symptomatische Therapie
- Ggf. Ablative Verfahren (in palliativer Absicht)

Prognose

Schlecht, mittlere Überlebenszeit nach Diagnose 4 – 12 Monate.

| TNM | Befund | UICC-Stadium | Erläuterung |
|-----|---|--------------|------------------|
| T1 | Solitärer Primärtumor ohne Gefäßinvasion | I | T1N0M0 |
| T2 | Solitärer Primärtumor mit Gefäßinvasion oder multiple Primärtumoren (alle <5 cm) | II | T2N0M0 |
| T3a | Multiple Primärtumoren >5 cm ohne Gefäßinvasion | IIIA | T3aN0M0 |
| T3b | Solitärer Tumor oder multiple Tumoren >5 cm mit Gefäßinvasion | IIIB | T3bN0M0 |
| T4 | Tumor mit Penetration in extrahepatisches Gewebe bzw. Perforation des viszerale Peritoneums | IIIC | T4N0M0 |
| N0 | Kein Befall lokoregionärer Lymphknoten | - | - |
| N1 | Befall lokoregionärer Lymphknoten | IVA | Jedes N1 ist IVA |
| M0 | Keine Fernmetastasen | - | - |
| M1 | Fernmetastasierung jeglicher Art | IVB | Jedes M1 ist IVB |

| Stadium | Allgemeinzustand (ECOG) | Primärtumor | CHILD-Score bei Leberzirrhose |
|---------|-------------------------|---|--|
| 0 | 0 | Singulärer Tumor <2 cm bzw. Carcinoma in situ | Keine Leberzirrhose bzw. maximal CHILD A |
| A | 0 | Frühestmögliches Stadium (singulärer kleiner Tumor) | Keine Symptomatik bei Leberzirrhose |
| A1 | 0 | Solitärer Primärtumor <5 cm (Milan-Kriterien erfüllt) | Keine klinisch signifikante portale Hypertension (HVPG <10 mmHg), Bilirubin normal |
| A2 | 0 | Solitärer Primärtumor <5 cm (Milan-Kriterien erfüllt) | Portale Hypertension, Bilirubin normal |
| A3 | 0 | Solitärer Primärtumor <5 cm (Milan-Kriterien erfüllt) | Portale Hypertension, Bilirubin erhöht |
| A4 | 0 | ≤3 Primärtumoren <3 cm (Milan-Kriterien erfüllt) | CHILD A oder B |
| B | 0 | Multilokulärer Befall, Herde >3 cm | CHILD A oder B |
| C | 1-2 | Zusätzlich Gefäßinvasion oder Metastasen | CHILD A oder B |
| D | 3-4 | Alle höhergradigen Befunde | CHILD C |

Barcelona-Klassifikation Stadium 0

Allgemeinzustand (ECOG)
0

Primärtumor



Singulärer Tumor <2 cm
bzw. Carcinoma in situ

Milan-Kriterien

Nicht erfüllt

CHILD-Score

Keine Leberzirrhose,
bzw. maximal CHILD A



Barcelona-Klassifikation Stadium A-A4

Allgemeinzustand (ECOG)
0

Primärtumor

A: Frühestmögliches Stadium
(singulärer kleiner Tumor)

A1-A3: Solitärer Primärtumor
<5 cm

A4: ≤3 Primärtumoren <3 cm

Milan-Kriterien

A: Nicht erfüllt

A1-A4: Erfüllt

CHILD-Score





A: Keine Symptomatik bei
Leberzirrhose

A1: Keine portale Hypertension
(HPVG <10 mmHg),
Bilirubin normal

A2: Portale Hypertension,
Bilirubin normal

A3: Portale Hypertension,
Bilirubin erhöht

A4: CHILD A oder B



Barcelona-Klassifikation Stadium B

Allgemeinzustand (ECOG)

0

Primärtumor



Multilokulärer Befall,
Herde >3 cm

Milan-Kriterien

Nicht erfüllt

CHILD-Score

CHILD A oder B



Barcelona-Klassifikation Stadium C

Allgemeinzustand (ECOG)

1-2

Primärtumor



Multilokulärer Befall,
Herde >3 cm,
zusätzlich Gefäßinvasion
oder Metastasen

Milan-Kriterien

Nicht erfüllt

CHILD-Score

CHILD A oder B



Barcelona-Klassifikation Stadium D

Allgemeinzustand (ECOG)

3-4

Primärtumor



Multilokulärer Befall,
Herde >3 cm,
zusätzlich Gefäßinvasion
und/oder Metastasen
bzw. höhergradige Befunde

Milan-Kriterien

Nicht erfüllt

CHILD-Score

CHILD C



Gallengangskarzinom +

Risikofaktoren

- Chronische Cholangitis
- Primär sklerosierende Cholangitis
- Colitis ulcerosa
- Gallenblasenpolypen
- Porzellangallenblase

Einteilung (nach Lokalisation)

- Karzinome der Gallenblase/Ductus cysticus
- intrahepatische Karzinome (cholangiozelluläre Karzinome)
- perihiläre Karzinome (= Klatskin-Tumoren) : in der Hepatikusgabel (Vereinigung von Ductus hepaticus dexter und sinister zum Ductus hepaticus communis) gelegen
- distale extrahepatische Karzinome
- Papillenkarzinom (= Karzinome der Ampulla vateri)

Klassifikation (TNM-Klassifikation. Stadieneinteilung der UICC)

Symptome/Klinik

- **Courvoisier-Zeichen**: Schmerzloser Ikterus + vergrößerte, schmerzlose Gallenblase (bei distaler extrahepatischer Karzinomen)
- **Cholestasezeichen**: Ikterus, heller Stuhl, dunkler Urin, Pruritus
- Oberbauchschmerzen, Gewichtsverlust

Diagnostik

- Anamnese und klinische Untersuchung
- Bildgebung : Sonographie, MRCP, ERCP, ggf. CT
- Labor : Cholestaseparameter, CA 19-9 (zur Verlaufskontrolle)

Pathologie

Meist Adenokarzinome

Therapie

Kurativer Ansatz: Operativ (<25%)

- **Intrahepatische Gallengangskarzinome** : Leberteilresektion
- **Perihiläre Gallengangskarzinome (Klatskin-Tumoren)** : Resektion des DHC (inklusive der Hepatikusgabel), Cholezystektomie, ggf. Leberteilresektion, Hepatikojejunostomie mit nach Roux ausgeschalteter Y-Schlinge
- **Distale extrahepatische Gallengangskarzinome** : Resektion des DHC, Cholezystektomie, Hepatikojejunostomie mit Roux-Y-Schlinge

- **Papillenkarzinome** : Whipple-OP *distale Gallengangsresektion, Duodenumresektion, Cholezystektomie, Resektion Ductus choledochus, Rekonstruktion Roux-/Schlinge mit Pankreaskep-Resektion Gastrojejunostomie, bilio-digestiv Anastomose*

Palliativer Ansatz: Konservativ (>75%)

- Bei nicht resektablem Tumor : Gallendrainage mittels ERCP und Stenteinlage
- Bei intrahepatischen cholangiozellulären Karzinomen : Transarterielle Chemoembolisation


Komplikationen

- Infiltration der Leber
- Operation: Verletzung der A. hepatica oder der V. portae, Gallenfistel, Cholangitis

Prognose

Schlecht





Hepatikojejunostomie mit nach Roux ausgeschalteter Y-Schlinge



TNM-Klassifikation des Cholangiokarzinoms

| TNM | Tumorausdehnung | | |
|-----|--|---|--|
| | Intrahepatisches Cholangiokarzinom iCCA | pCCA (Klatskin-Tumor) Perihiläres Cholangiokarzinom | Distales Cholangiokarzinom dCCA |
| Tis | • — | | • Carcinoma in situ |
| T1 | • Solitärer Tumor ohne vaskuläre Invasion <ul style="list-style-type: none">◦ T1a: ≤5 cm◦ T1b: >5 cm | • Auf Gallengang beschränkt | • Tumor infiltriert die Wand des Gallengangs ≤5 mm |
| T2 | • Solitärer Tumor mit vaskulärer Invasion oder multiple Tumoren | • Tumor durchbricht den Gallengang <ul style="list-style-type: none">◦ T2a: Infiltration des benachbarten Weichgewebes◦ T2b: Infiltration des benachbarten Leberparenchyms | • Tumor infiltriert die Wand des Gallengangs 5–12 mm |
| T3 | • Tumor durchbricht das viszerale Peritoneum | • Tumor infiltriert unilaterale Äste der V. portae oder A. hepatica | • Tumor infiltriert die Wand des Gallengangs >12 mm |
| T4 | • Direkte Infiltration extrahepatischer Strukturen | • Tumor infiltriert Hauptast oder bilaterale Äste der V. portae oder <ul style="list-style-type: none">• Tumor infiltriert A. hepatica communis oder Äste 2. Ordnung bilateral oder• Tumor infiltriert unilaterale Gallengänge 2. Ordnung und kontralaterale Äste der V. portae oder A. hepatica | • Tumor infiltriert Truncus coeliacus, A. mesenterica superior und/oder A. hepatica communis |
| N0 | • Keine regionären Lymphknotenmetastasen | | |
| N1 | • Metastasen in regionalen Lymphknoten | • Metastasen in 1–3 regionären Lymphknoten | |
| N2 | • — | • Metastasen in ≥4 regionären Lymphknoten | |
| M0 | • Keine Fernmetastasen | | |
| M1 | • Fernmetastasen | | |

Bismuth-Corlette-Klassifikation perihilärer Cholangiokarzinome



Operative Therapie [2]

- Indikation: Immer wenn eine R0-Resektion möglich erscheint und keine Fernmetastasierung vorliegt
- Operationsumfang: Abhängig vom TNM-Stadium
 - Tis–T1a: Cholezystektomie
 - \geq T1b: Cholezystektomie mit Gallenblasenbettektomie
 - \geq T1b und biliäre/vaskuläre Beteiligung: (Erweiterte) rechtsseitige Leberresektion
- Vorgehen bei inzidentellem Gallenblasenkarzinom
 - Nachresektion 2–4 Wochen nach initialer Operation anstreben
 - Bei laparoskopischer Voroperation radikale Exzision der Trokarzugänge empfohlen [6]

Systemtherapie (Chemotherapie) [2]

- Empfehlungen identisch zum Cholangiokarzinom
- Siehe: Systemtherapie (Chemotherapie) biliärer Karzinome

Akutes Abdomen +

Definition

- **Hauptsymptom: Akuter Schmerz im Bauchbereich**, der aufgrund seiner Intensität und Bedrohlichkeit notfallmäßig abgeklärt und entsprechend therapiert werden muss
- **Weitere Leitsymptome**
 - **Abwehrspannung** über dem Abdomen
 - **Übelkeit und Erbrechen**
 - **Meteorismus und Stuhlveränderungen** (z.B. Obstipation)
 - **Reduzierter Allgemeinzustand**
 - **Kreislaufbeteiligung** (bis hin zum Schock)
- Andere mögliche Symptome: Bspw. Fieber, Schonhaltung, Schonatmung

Epidemiologie

- **Prävalenz von Bauchschmerzen in der Notaufnahme:** 10% aller Patienten, davon wiederum: 20% als akutes Abdomen, 40% als unspezifische Abdominalbeschwerden
- **Häufigste Ursachen des akuten Abdomens :** Akute Appendizitis (20%), Cholezystitis (10%), Ileus (5%)
- **Altersabhängige Häufigkeiten**
 - **Ältere Patienten:** Ileus (z.B. Bridenileus oder durch Tumoren), Biliäre Erkrankungen (z.B. Cholezystitis und Cholangitis), Mesenterialinfarkt
 - **Jüngere Patienten:** Appendizitis, gynäkologische Erkrankungen (z.B. rupturierte Ovarialzysten) bei ♀

Diagnostik

Bei Patienten mit akutem Abdomen wird aus Klinik, Labordiagnostik und Bildgebung eine Verdachtsdiagnose generiert.

Anamnese (Sample-Schema)

Schmerzanamnese (OPQRST“-Schema)

- **Beginn (Onset):**
 - Plötzlich: U.a. bei Perforation (bspw. eines Ulcus ventriculi), Ileus, Mesenterialinfarkt, Hodentorsion
 - Schleichend: Häufig bei Appendizitis
- **Verstärkende bzw. lindernde Faktoren (Provokes/Palliates):**
 - Schonhaltung/Schonatmung: Häufig bei peritonitischem Entzündungsschmerz
 - Unruhe: Häufig bei Kolikschmerz
 - Verstärkung im Stehen: Hernien
 - Verstärkung im Liegen: Pankreatitis
 - Verstärkung bei tiefer Atmung: Pleuritis
 - Schmerzzunahme bei Nahrungsaufnahme/Alkoholkonsum: Häufig bei Pankreatitis
- **Qualität und Charakter (Quality):**
 - **Schmerztypen**

| | |
|----------------------------|--|
| Perforationsschmerz | <ul style="list-style-type: none">• Initialer Schmerzpeak• Intermittierende Besserung bzw. Schmerzfreiheit• Im Verlauf erneute Verschlechterung mit Peritonismus |
| Kolikschmerz | <ul style="list-style-type: none">• Intermittierende, zu- und abnehmende Schmerzintensität |
| Entzündungsschmerz | <ul style="list-style-type: none">• kontinuierliche Schmerzprogredienz |

o Schmerzqualitäten

| | Viszeraler Schmerz | Somatischer (peritonealer) Schmerz |
|-------------------|---|---|
| Lokalisierbarkeit | Schlecht lokalisierbar | Genau lokalisierbar |
| Schmerzcharakter | Meist dumpf bzw. krampfartig, weniger stark | Stark, schneidend bzw. brennend |
| Schmerzdauer | Intermittierend | Dauerschmerz mit kontinuierlicher Zunahme |
| Körperhaltung | Motorische Unruhe | Schonhaltung (z.B. Rumpfbeugung) |
| Erleichterung | Bewegung | Ruhe |

- **Ausstrahlung (Radiates):**
 - o Schmerzwanderung von einer epigastrischen Lokalisation in den rechten Unterbauch: Häufig bei Appendizitis
 - o Schulterschmerzen: Häufig bei Cholezystitis
 - o Gürtelförmige Ausstrahlung in die Seiten und den Rücken: Häufig bei Pankreatitis
 - o Ausstrahlung in Leiste, Schamlippen oder Hoden: Häufig bei Urolithiasis
- **Stärke (Severity):** anhand einer Schmerzskala
- **Zeitlicher Verlauf (Time)**
 - o Wellenartige Schmerzspitzen (Kolik): Häufig bei Uro- oder Nephrolithiasis, auch bei Ileus
 - o Schmerzfreies Intervall nach starkem initialem Schmerz, im Anschluss erneute Verschlechterung: Häufig bei Mesenterialischämie (sog. „fauler Frieden“)
 - o Kontinuierliche Schmerzzunahme: Häufig bei entzündlicher Genese, bspw. Appendizitis

Körperliche Untersuchung

Labor

Bildgebung


Onset
Provokation
Qualität
Radiating
Severity
Time

Ursachen des akuten Bauchschmerzes nach Schmerzort

| Oberbauch | | |
|--|--|---|
| Rechtsseitig | Links- und/oder rechtsseitig | Linksseitig |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gallenwege <ul style="list-style-type: none"> ○ Cholezystitis ○ Cholezysto-/docholithiasis ○ Cholangitis • Leber <ul style="list-style-type: none"> ○ Hepatitis ○ Akute Stauungsleber ○ Leberruptur ○ Leberhämatom ○ Pfortaderthrombose • Duodenum: Ulcus duodeni | <ul style="list-style-type: none"> • Herz: Akuter Myokardinfarkt • Ösophagus <ul style="list-style-type: none"> ○ (Reflux-)Ösophagitis ○ Ösophagus-Spasmus ○ Mallory-Weiss-Syndrom ○ Boerhaave-Syndrom • Lunge <ul style="list-style-type: none"> ○ (Unterlappen-)Pneumonie ○ Lungenembolie • Pleura: Pleuritis • Pankreas <ul style="list-style-type: none"> ○ Pankreatitis ○ Pankreasruptur | <ul style="list-style-type: none"> • Magen <ul style="list-style-type: none"> ○ Gastritis ○ Ulcus ventriculi • Milz <ul style="list-style-type: none"> ○ Milzinfarkt ○ Milzruptur |
| Unterbauch | | |
| Rechtsseitig | Links- und/oder rechtsseitig | Linksseitig |
| <ul style="list-style-type: none"> • Darm <ul style="list-style-type: none"> ○ Appendizitis ○ Ileitis terminalis (Morbus Crohn) ○ Zökumdivertikulitis | <ul style="list-style-type: none"> • Leiste: Inkarzerierte Hernie • Harnwege und Nieren <ul style="list-style-type: none"> ○ Akuter Harnverhalt ○ Urolithiasis ○ Pyelonephritis ○ Niereninfarkt • Geschlechtsorgane ♀: <ul style="list-style-type: none"> ○ Salpingitis und Adnexitis ○ Ovarialzystenruptur ○ Extrauterine Schwangerschaft • Geschlechtsorgane ♂: Hodentorsion | <ul style="list-style-type: none"> • Darm: Sigmadivertikulitis |

Diffuse/variable Lokalisation in Ober- und/oder Unterbauch

- **Peritonitis**
- **Darm**
 - Ileus
 - Akute Gastroenteritis
 - Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
 - Mesenterialinfarkt/-venenthrombose
 - Invagination im Kindesalter
 - Koprostase
- **Bauchaorta**
 - (Aneurysma-)Ruptur
 - Aortendissektion



Dysphagie +-

Grundlagen

- **Dysphagie:** Subjektives Gefühl der Schluckstörung
- **Begleitsymptome:**
 - **Obstruktionsgefühl:** Druck- und Engegefühl beim Schlucken
 - **Odynophagie:** Auftreten von Schmerzen beim Schluckakt
 - **Regurgitation:** Zurückströmen von Nahrung aus der Speiseröhre in den Mund- und Rachenraum, Gefahr der Aspiration von Nahrungsbestandteilen.

Vorgehen

Anamnese

- **Vorerkrankungen:** Refluxkrankheit, neuromuskuläre Erkrankungen, Z. n. Schlaganfall
- **Schluckbeschwerden abhängig von der Konsistenz der Nahrung?**
 - flüssige Nahrung: bei Z.n. Schlaganfall oder Morbus Parkinson
 - feste Nahrung: bei peptischen Stenosen oder Karzinomen
 - feste und flüssige Nahrung: bei Motilitätsstörungen (diffuser Ösophagospasmus, Achalasie)
- **zeitlicher Verlauf der Schluckbeschwerden?**
 - akut: nach Schlaganfall
 - über Wochen bis Monate progredient: Bei Ösophaguskarzinom
 - über Jahre progredient: Bei peptischen Stenosen
 - intermittierend: Bei rezidivierenden Ösophagitiden oder diffusem Ösophagospasmus
- **im Vordergrund stehende Beschwerden?**
 - Husten/rezidivierende Atemwegsinfekte: durch rezidivierende Aspirationen
 - Sodbrennen: Bei gastroösophagealer Refluxkrankheit
 - Obstruktionsgefühl: Bei peptischen Stenosen oder Karzinomen
 - Odynophagie: Bei entzündlichen Prozessen
 - intermittierende heftige thorakale Schmerzen : bei diffusem Ösophagospasmus
 - Regurgitation: Bei zentral bedingter Schluckstörung sofort, bei Einengung des Ösophaguslumens meist nach 30 – 90 Sek.
- **Risikofaktoren?:** z. B. Alkohol und Rauchen beim Ösophaguskarzinom.

Körperliche Untersuchung

Inspektion des Mund- und Rachenraumes, Hals (Schwellungen, Lymphknoten) sowie Beobachtung des Kau- und Schluckvorganges bei Probeschluck mit Wasser, neurologische Untersuchung.

Basisdiagnostik bei V. a. oropharyngeale Dysphagie

(typisch: Husten, Regurgitation über Nase, wiederholte Schluckversuche)

- **FEES = Fiber-Endoskopische Evaluation des Schluckens:** direkte Beobachtung des Schluckvorgangs mit Endoskop
- **Videofluoroskopie:** Beobachtung des Schluckakts mittels Röntgendurchleuchtung
- **HNO-Konsil** bei V. a. entzündlichen oder tumorösen Prozess

Basisdiagnostik bei V. a. ösophageale Dysphagie

(typisch: Fremdkörpergefühl nach dem Schluckvorgang v.a. retrosternal)

- **Ösophagoskopie**
- **Röntgenuntersuchung des Ösophagus mit Kontrastmittel**

Differenzialdiagnose

| Verdachtsdiagnose | wegweisende Untersuchungen |
|---|---|
| A/ oropharyngeale Dysphagie | |
| 1- mechanisch: Benigne : Tonsillitis, Tonsillarabszess, Zenker-Divertikel, Maligne : Hypopharynxkarzinom | Inspektion, HNO-Konsil |
| 2- neuromuskulär : nach Schlaganfall, Morbus Parkinson,... | Anamnese, neurologische Untersuchung, FEES, Neurokonsil |

| B/ ösophageale Dysphagie | |
|--|--|
| 1- luminal: Benigne : peptische Stenose, Ösophagitis, Sklerodermie, Verbrennungen und Bestrahlung, Fremdkörper, Achalasie, diffuser Ösophagospasmus Maligne: Ösophaguskarzinom | <i>Kontrastmittelschluck, Endoskopie, Manometrie</i> |
| 2- extraluminal: Benigne : Struma (maligna) Maligne: Mediastinaltumoren: z.B. Lymphome | <i>Thorax-CT</i> |
| C/ funktionelle Dysphagie z. B. „Globus hystericus“: andauerndes Fremdkörpergefühl ohne Schluckbehinderung, wird beim Schlucken von Nahrungsbestandteilen eher besser (Ausschlussdiagnose). | |

Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD...) +-

Definition

- **Gastroösophagealer Reflux:** Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre.
- **Gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD):** Klinisches Beschwerdebild und/oder Schleimhautläsionen in der Endoskopie
 - **NERD (nicht-erosive Refluxkrankheit):** Klinisches Beschwerdebild einer Refluxkrankheit ohne Nachweis von Schleimhautläsionen in der Endoskopie (60%)
 - **ERD (erosive Refluxkrankheit):** Refluxkrankheit mit Nachweis von Schleimhautläsionen in der Endoskopie (40%)

Ätiologie

Primär

- **Häufigste Form:** Transientes Erschlaffen (Insuffizienz) des unteren Ösophagussphinkters außerhalb des Schluckaktes, meist unklarer Genese. Oft liegt gleichzeitig eine axiale Hiatushernie vor (90%)
- **Begünstigende Faktoren :** Kaffee, Nikotin, Alkohol, Stress, Übergewicht

Sekundär

Schwangerschaft. Iatrogen (Medikamente: Calciumantagonisten, Nitrate. Nach Gastrektomie). Kardiakarzinom. Sklerodermie

→ Klassifikation

Klassifikation der Refluxkrankheit nach Savary und Miller

| | |
|-------------|---|
| Stadium 0 | Reflux ohne Schleimhauterosionen |
| Stadium I | Isolierte Schleimhauterosionen |
| Stadium II | Longitudinal konfluierende Erosionen (nicht zirkulär) |
| Stadium III | Zirkulär konfluierende Erosionen |
| Stadium IV | Komplikationen : Ulzerationen, Strikturen, Barrett-Metaplasie |

Symptome/Klinik

Auslösende Faktoren

Beim Liegen oder Bücken. Kaffee, Nikotin, Alkohol. Stress

Klinik

- **Leitsymptom: Sodbrennen :** brennender evtl. aufsteigender retrosternaler Schmerz.
- Druckgefühl. Luftaufstoßen (Ruktus), Übelkeit, Erbrechen. Mundgeruch. Chronischer Reizhusten

Diagnostik

Bei typischen Symptomen und ohne Warnsymptome*

- Versuch einer empirischen Therapie mit PPIs

Bei atypischen Symptomen, Warnsymptomen* oder mehrjähriger Anamnese

(* Dysphagie, Hämatemesis, Melaena, Gewichtsabnahme, Anämie)

Ösophagogastrroduodenoskopie

- Probeentnahme bei suspekten Läsionen
- Stadieneinteilung der Refluxösophagitis (Savary)

Langzeit-pH-Metrie (über 24 h)

- Registrierung von Refluxepisoden mit $\text{pH} \leq 4$ zur Diagnostik und Therapiekontrolle mittels nasaler Sonde. Pathologisch wenn entweder $>8\%$ der Zeit tagsüber oder $>3\%$ der Zeit nachts Refluxepisoden auftreten
- Insbesondere bei NERD indiziert

Differentialdiagnosen

Retrosternale/thorakale Schmerzen

- **Kardial** : Angina pectoris. Perikarditis. Akutes Koronarsyndrom
- **Gastrointestinal** : Diffuser Ösophagusspasmus. Achalasie. Ulcus ventriculi
- **Ossär**: Osteochondrose
- **Da-Costa-Syndrom (Herzneurose, funktionelle Herzbeschwerden)**

Gastroskopische Differentialdiagnosen

- **Soorösophagitis** bei Immunsuppression (durch Candida albicans)
- **CMV-Ösophagitis** bei Immunsuppression
- **Eosinophile Ösophagitis** : Ätiologie Unklar, in 50% der Fälle liegt gleichzeitig eine allergische Erkrankung vor (allergisches Asthma, allergische Rhinitis usw.)

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- **Mahlzeiten** : Klein, kohlenhydrat- und fettarm, eiweißreich
- **Gewichtsnormalisierung**, Meidung enger Hosen, schlafen mit erhöhtem Oberkörper
- **Noxen meiden** : Nikotin, Alkohol, Kaffee, Medikamente (Calciumantagonisten, Nitrate)

Medikamentöse Therapie

- **Protonenpumpeninhibitoren (PPI)** : Z.B. Omeprazol (40 mg tä. über 4 Wochen dann 20mg tä. über 4 Wochen). Die Therapie mit PPIs führt zu einer 90%igen Heilungsrate, jedoch kommt es nach Absetzen in 50% der Fälle zu einem Rezidiv.
- Ggf. Antazida
- Ggf. Prokinetika (Metoclopramid)

Operative Therapie

Indikation

Therapieresistenz. Medikamentenunverträglichkeit. Fortgeschrittenes Stadium.

Verfahren

- **Funduplicatio nach Nissen** : Es wird eine Manschette aus dem Fundus des Magens gebildet, um den distalen Ösophagus geschlungen und mit Nähten fixiert.
 - **Komplikationen** : Intraoperative Verletzungen von Milz, Magen, Ösophagus. **Gas-bloat-Syndrom** (Unfähigkeit des Aufstoßens, die zu Völlegefühl mit vermehrter Flatulenz führt). Schluckstörungen
- Hiatoplastik

Komplikationen

- **Ulzerationen und peptische Strikturen**
- **Laryngitis, Aspirationspneumonie**
- **Chronische Blutung**
- **Barrett-Ösophagus (= Endobrachyösophagus, Barrett-Metaplasie)** :
 - Schädigung des Plattenepithels mit Ersatz durch Zylinderepithel vom intestinalen Typ. Präkanzerose für Adenokarzinom mit ca. 10% Entartungsrisiko
 - Jährliche Endoskopiekontrolle mit Biopsie
 - Bei intraepithelialen Neoplasie : Radiofrequenzablation oder endoskopische Resektion der Läsion



Ösophaguskarzinom +/-

Ätiologie

Adenokarzinom (55%):

- Risikofaktoren : **gastroösophageale Refluxkrankheit**
- Präkanzerose: **Barrett-Ösophagus** als Komplikation einer Refluxkrankheit
- **Pathogenese**: Gastroösophagealer Reflux führt zur Schädigung des ösophagealen Plattenepithels mit Ersatz durch Zylinderepithel vom intestinalen Typ („Barrett-Metaplasie“) → Dysplasie → Adenokarzinom
- Lokalisation: Vor allem **unteres Drittel** des Ösophagus (>90%)

Plattenepithelkarzinom (45%)

- Risikofaktoren : **Alkoholabusus, Rauchen**
- Lokalisation : meist im **mittleren Ösophagusdrittel** (50%)

Symptome/Klinik

- **Leitsymptom: Dysphagie**
- **Weitere lokale Symptome** : Gastrointestinale **Blutung** (Hämatemesis oder Melaena), **Erbrechen**, **Völlegefühl**, Pseudohypersalivation, Heiserkeit (Dysphonie)
- **Allgemeinsymptome** : Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust

Diagnostik

Diagnosesicherung

- **Anamnese**: Schluckstörungen
- **Endoskopie (ÖGD)**: Goldstandard zur Diagnosesicherung. Entnahme von Biopsien aus allen suspekten Läsionen

Staging-Untersuchungen

- **Endoskopische Sonographie** : Beurteilung der lokalen Infiltrationstiefe des Tumors. Außerdem Beurteilung des Befalls regionärer Lymphknoten
- **Computertomographie von Abdomen/Thorax**: Erhebung des Lymphknotenstatus, Metastasen
- **Abdomensonographie**: Lebermetastasen
- **Zervikale Sonographie**: zervikaler Lymphknotenmetastasen
- Ggf. Röntgen-Breischluck-Untersuchung: Ausschluss lokaler Komplikationen (z.B. Fisteln).
- Fernmetastasen : **Leber**, Lunge, Skelett

Differentialdiagnose

Ösophagitis, Ösophagusspasmen, Ösophagusstenosen, Achalasie (Störung der Ösophagusmotilität : verminderte Peristaltik + fehlendes Erschlaffung des unteren Ösophagussphinkters beim Schluckvorgang → Dysphagie)

Therapie

Endoskopische Resektion

- Tumorstadien bis T1, N0, M0

Chirurgische Resektion

- Tumorstadium T2, T3, T4a, N+, M0 (Rekonstruktion durch **Magenhochzug**)
- Ggf. mit **perioperativer Chemotherapie** (neoadjuvant und adjuvant) bzw. **perioperativer Radiochemotherapie** (neoadjuvant)

Definitive Radiochemotherapie (potentiell kurativ)


- **Indikationen**: Alternative zur chirurgischen Therapie (bei Kontraindikationen für eine Operation). Plattenepithelkarzinomen des **zervikalen Ösophagus**

Palliativtherapie

Palliative Chemotherapie

- Stadium **T4b** (Infiltration von **Aorta**, **Wirbelkörper** oder **Trachea**) oder **Fernmetastasen** **M₁**

Bei Passagestörung : Implantation eines **Metallstents** bzw. **Ablation einer Stenose** mittels Argon-Plasma-Coagulation (APC)



| TNM | Ausdehnung |
|--|---|
| TX | Primärtumor kann nicht beurteilt werden |
| T0 | Kein Anhalt für Primärtumor |
| Tis | Carcinoma in situ |
| T1 | <ul style="list-style-type: none"> T1a: Infiltration der Lamina muscularis mucosae T1b: Infiltration der Submukosa |
| T2 | Infiltration der Muscularis propria |
| T3 | Infiltration der Adventitia |
| T4 | <ul style="list-style-type: none"> T4a: Infiltration von Pleura, Perikard, Zwerchfell T4b: Infiltration anderer Nachbarstrukturen (z.B. Aorta, Wirbelkörper, Trachea) |
| NX | Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden |
| N0 | Keine regionären Lymphknotenmetastasen |
| N1 | 1-2 regionäre Lymphknoten |
| N2 | 3-6 regionäre Lymphknoten |
| N3 | ≥7 regionäre Lymphknoten |
| M0 | Keine Fernmetastasen |
| M1 | Hämatogene Fernmetastasen oder nicht-regionäre Lymphknoten, z.B. supraklavikulär |
| Nach postoperativer histopathologischer Sicherung | |
| pM1 | Fernmetastasen |
| pN0 | Bei Tumorfreiheit nach regionärer Lymphadenektomie und histologischer Untersuchung |

Komplikationen

- Infiltration benachbarter Strukturen
- Fernmetastasierung
- Stenosierung
- Ösophagotracheale Fistel : Auswurf enthält Nahrungsbestandteile. Gefahr der Aspirationspneumonie

Prognose

- Insgesamt schlechte Prognose (Die 5-Jahresüberlebensrate beträgt weniger als 10%)
- Je weiter aboral die Lokalisation, desto besser ist die Prognose

Akute Virushepatitis +/-

Definition

- Akute virale Infektion der Leber
- Meldepflicht: Bei Verdacht, Erkrankung und Tod.

Ursachen

Hepatitisvirus A, B, C, D und E

Infektionswege

- **fäkal-oral** (Kontaminierte Lebensmittel und Wasser): Hepatitis A und E
- **parenteral** (Krankenhauspersonal, Dialysepatienten, Empfänger von Blutprodukten, i. v.-Drogenkonsumenten, Tätowierte): Hepatitis B, C und D
- **sexuell, perinatal**: Hepatitis B, seltener C und D

„Infektiosität bei Hepatitis A und E: 14 Tage vor und bis 14 Tage nach Erkrankungsbeginn“

„Hepatitis-D ist nur als Koinfektion mit Hepatitis-B möglich (Simultaninfektion oder Superinfektion bei chronischem HBsAg-Träger)“

Klinik

- Häufig **asymptomatischer Verlauf** (60 – 70 % der Fälle).
- Prodromalsymptome: Leistungsminderung, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Arthralgien, Myalgien, leichtes Fieber, Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Hautausschlag
- Später evtl. **Ikterus** mit dunklem Urin und hellem Stuhl, **Juckreiz**. Evtl. **Hepatomegalie**.
- Krankheitsdauer : **6 – 8 Wochen**. Bei Hepatitis A meist kürzer.

Komplikationen

- **Fulminante Verlaufsform** mit **akutem Leberversagen**: Schwerer **Ikterus**, **Aszites**, **Gerinnungsstörungen**, **Leberkoma**. Insb. bei **Schwangeren Hepatitis E**, seltener bei Hepatitis A, B, D und C.
- **Chronische Verlaufsform** mit Gefahr der Entwicklung einer **Leberzirrhose** und eines primären **Leberzellkarzinoms** oder asymptomatische Viruspersistenz (Infektionsgefahr!): Hepatitis B (Erwachsene 10 %, perinatal 90 %), C (50-90 % je nach Genotyp), D-Superinfektion (90 %), D-Simultaninfektion (5 %).

Diagnostik

- **Anamnese**: Risikofaktoren (siehe UInfektionswege), Reiseanamnese.
- **Klinik**
- **Standard-Labor**:
 - Erhöhung von **Transaminase**: GPT (ALT) stärker als GOT (AST)
 - bei ikterischem Verlauf: Erhöhung von **Bilirubin**, **γGT** und **AP**
 - bei fulminantem Verlauf : Verminderung von **Quick**, **Albumin**, **CHE**
- **Serologie**

| | Hepatitis A | Hepatitis B | Hepatitis C | Hepatitis D | Hepatitis E |
|--|----------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|
| Virus | HAV (DNA) | HBV (DNA) | HCV (RNA) | HDV (RNA) | HEV (DNA) |
| Inkubationszeit | 2 – 6 W. | 1 – 6 M. | 1 – 6 M. | 1 – 6 M. | 3 – 6 W. |
| Übertragungswege | fäkal-oral | sexuell, parenteral, perinatal | Parenteral, sexuell | sexuell, parenteral, perinatal | fäkal-oral |
| chronischer Verlauf (ohne antivirale Therapie) | nein | ja | ja | ja | nein |
| fulminanter Verlauf | selten | selten | selten | selten | Häufig bei Schwangeren |
| Nachweis einer akuten Infektion | Anti-HAV-IgM* | Anti-HBc-IgM , HBs-AG (nach ca. 2 M.) | HCV-RNA , anti-HCV (nach ca. 2 M.) | Anti-HDV-IgM (+ HBs-AG) | Anti-HEV-IgM |
| Impfung | ja | ja | nein | Nein (Hepatitis-B-Impfung) | nein |

* Anti-HAV-IgG spricht für Immunität (Ausheilung oder Impfung)

Differenzialdiagnose

- Andere infektiöse Hepatitiden: Viren (z.B. EBV, ...). Bakterien (z.B. Brucellose, ...). Parasiten (z.B. Amöbiasis)
- Autoimmunhepatitis
- Alkoholtoxische Leberschädigung: z. B. Fettleberhepatitis
- Medikamentös bedingte Leberschädigung: z. B. Isoniazid, Paracetamol,...

Therapie

- Stationäre Behandlung nur bei schwerem Verlauf
- Allgemeine Maßnahmen : Körperliche Schonung, Alkoholkarenz, Isolationsmaßnahmen bei Hepatitis A und E
- Ggf. Antivirale Therapie bei fulminantem Verlauf (insb. bei Hepatitis B)

Prophylaxe

Aktiv- und Passivimpfung gegen Hepatitis A und B

Chronische Virushepatitis +/-

Definition

Chronische (> 6 Monate dauernde) Entzündung der Leber

Ursachen

Hepatitisvirus B, C, D

Klinik

- Im Frühstadium bzw. bei geringer entzündlicher Aktivität oft asymptomatisch
- Leistungsminderung, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Oberbauchschmerzen, Ikterus bei akutem entzündlichem Schub
- Klinik bei Leberzirrhose (siehe)
- Evtl. extrahepatische autoimmune Manifestationen : Autoimmunthyreoiditis, Vaskulitiden, Sjögren-Syndrom, ...

Diagnostik

- **Anamnese:** Risikofaktoren, Abgelaufene Hepatitis, Medikamente, Alkoholkonsum,...
- **Klinik**
- **Standard-Labor:**
 - Erhöhung von Transaminase > 6 Monate (= Aktivitätsparameter)
 - Ggf. Erhöhung von Bilirubin, γGT und AP
 - Ggf. Verminderung von Quick, Albumin, CHE
- **Serologie:**
 - **chronische Hepatitis B:** HBs-AG positiv > 6 Monate. HBe-AG und HBV-DNA positiv bei Virusreplikation (prognostische Marker). Anti-HBs spricht für Immunität (Ausheilung oder Impfung)
 - **chronische Hepatitis C:** Anti-HCV positiv (bei HCV-Infektion, aber auch nach Ausheilung). HCV-RNA positiv (6 Genotypen : 1–6)
 - **chronische Hepatitis D :** Anti-HDV, HDV-RNA sowie HBs-AG positiv
- **Sonografie:** Hepatomegalie. Ggf. Zeichen einer Leberzirrhose (siehe)
- **Ggf. Leberbiopsie**

Differenzialdiagnose

- **Autoimmunhepatitis :** tritt häufig bei Frauen auf. Autoantikörper positiv (SMA bei Typ I, LKM-1 bei Typ II). Therapie mit Glukokortikoiden und Azathioprin. Nach Absetzen der Therapie Rezidive häufig
- toxische Leberschädigung (Alkohol, Medikamente)
- primär biliäre Cholangitis
- andere Ursachen einer Leberzirrhose

Komplikationen

Leberzirrhose, hepatozelluläres Karzinom

Therapie

- Allgemeine Maßnahmen : Körperliche Schonung bei akutem Schub, Alkoholkarenz
- **Chronische Virushepatitis:**
 - **Chronische Hepatitis B:** Antivirale Therapie mit PEG-Interferon-α oder Nukleosid-/Nukleotidanaloga
 - **Chronische Hepatitis C:** antivirale Kombinationstherapie je nach Genotyp
 - **Chronische Hepatitis D:** = Hepatitis B
- **Lebertransplantation:** Bei Versagen der medikamentösen Therapie und vital bedrohlicher Leberinsuffizienz erwägen

Prognose

Günstig bei adäquater antiviraler Therapie. Unbehandelt hohes Risiko, im weiteren Verlauf eine Leberzirrhose zu entwickeln. Von den Zirrhosepatienten entwickeln 3 % ein HCC.

HBV-Infektion

- 95 % Ausheilung
- 5 % Viruspersistenz
 - 70 % gesunde Träger
 - 30 % chronische Hepatitis
 - 20 % Leberzirrhose (innerhalb von 10 Jahren)
 - 3 % HCC

HCV-Infektion

- 15-50 % Ausheilung
- 50-95 % Viruspersistenz (=chronische Hepatitis)
 - 20 % Leberzirrhose (innerhalb von 20 Jahren)
 - 3 % HCC

Hepatitis B

Verlaufsformen

Die Serologie hilft bei der Unterscheidung in:

- Akute Infektion
- Ausgeheilte Infektion
- Chronische Infektion:
 - Chronische Hepatitis B
 - HBsAg-Trägerstatus → hoch-virämisch
 - HBsAg-Trägerstatus → niedrig-virämisch
- Zustand nach Impfung
- Kein Hinweis für eine Infektion

HBs - Ag s surface Aktive Infekt.

HBc - Ag c core (Kern) Kann in serum nicht bestimmt werden
aber Antikörper dagegen ist messbar

HBe - Ag e envelope Hinweis auf stattfindende Virusreplikation

anti HBs - AK

AKUT

Anti HBc Suchmarker für HBV-Infekt
(steigt als erstes)



IGM

IGG



Anti HBe Kein Schutz

Anti HBs Ausheilung

Chronisch (Kein Anti HBs Ag)



Marker im Überblick



Anti-HBs: Schutzfunktion

Anti-HBc: Suchmarker

HBs-Antigen: Viruspersistenz

- Anti-HBc-IgM: akute Infektion

- HBe-Antigen: Virusreplikation

- Anti-HBe: partielle Serokonversion

HBs Ag

Viruspersistenz

Anti HBs

Schutz

Impfung Anti HBs

Ausgeheilt Anti HBs
Anti HBc

Anti HBc

Aktiv Infekt
(Akut od. Chronisch)

Anti HBc
HBs Ag

Ausgeheilt

Anti HBc
Anti HBs


HBe Ag

Virusreplikation

Anti HBe

partielle
Serokonversion

Serologische Diagnostik



- initial ausreichend: "HBs-Ag + Anti-HBc"
- ambulant: "Anti-HBs, HBsAg, Anti-HBc, falls positiv Anti-HBc-IgM"

| HBs-Antigen | Anti-HBc | Anti-HBs | Ergebnis |
|-------------|----------|----------|-------------------------------------|
| - | - | - | ☒ Kein Hinweis auf eine Infektion |
| + | - | - | ☒ Beginn der Infektion |
| + | + | - | ☒ Aktive Infektion (akut/chronisch) |
| Kein Virus | + | + | ☒ Ausgeheilte Hepatitis |
| - | - | + | ☒ Z.n. Impfung |

Handwritten notes and arrows:

- akut (above Anti-HBc) and ausgeheilt (above Anti-HBs) with arrows pointing to the respective columns.
- Schutz (above Anti-HBs) with an arrow pointing to the Anti-HBs column.
- HBs-Ag (above the first row) with an arrow pointing to the first row.
- HBc-Ag (above the first row) with an arrow pointing to the first row.
- HBs-Ag (above the second row) with an arrow pointing to the second row.
- HBc-Ag (above the second row) with an arrow pointing to the second row.
- HBs-Ag (above the third row) with an arrow pointing to the third row.
- HBc-Ag (above the third row) with an arrow pointing to the third row.
- HBs-Ag (above the fourth row) with an arrow pointing to the fourth row.
- HBc-Ag (above the fourth row) with an arrow pointing to the fourth row.
- HBs-Ag (above the fifth row) with an arrow pointing to the fifth row.
- HBc-Ag (above the fifth row) with an arrow pointing to the fifth row.

Alkoholtoxischer Leberschaden +-

Stadieneinteilung

Steatosis hepatis (reversibel)

- **Labor**
 - γ -GT \uparrow und Ferritin \uparrow , MCV \uparrow (B9 Defizit) : unspezifisch für Alkoholmissbrauch
 - **CDT \uparrow** (Carbohydrate-deficient-transferrin) : spezifisch für Alkoholmissbrauch
- **Sonographie** : Steatosis hepatis

„Bei Alkoholkarenz: Rückbildung der Veränderungen im Labor und der Bildgebung innerhalb eines Monats“

Steatohepatitis (irreversibel)

Siehe akute und chronische Hepatitis

Alkoholische Leberzirrhose (irreversibel)

Therapie

In allen Stadien: Alkoholkarenz

Aszites +/-

- **Aszites:** Ansammlung freier Flüssigkeit in der Bauchhöhle.
- **Empfindlichste Nachweismethode:** Sonografie (ab ca. 50 ml).
- Differenzialdiagnostisch wegweisend ist die Differenzierung zwischen **Transsudat** (Gesamteiweiß ≤ 30 g/l) und **Exsudat** (Gesamteiweiß > 30 g/l) im Aszites

Häufigste Ursachen

- **Transsudat:** Leberzirrhose (am häufigsten), Rechtsherzinsuffizienz.
- **Exsudat:** Maligne Erkrankungen des Abdomens.

Vorgehen

Anamnese

- frühere Erkrankungen, Grunderkrankungen
- **Alkoholkonsum, Medikamente**
- Begleitsymptome: Dyspnoe, Schmerzen, Fieber, Ikterus.

Körperliche Untersuchung

- **Distendiertes** Abdomen, evtl. **Hernien** der Bauchwand
- **Undulation, Wechsel des Klopfschalls bei Lageänderung**
- **Ödeme, Ikterus, Leberhautzeichen**
- **Leberpalpation.**

Basisdiagnostik

- **Labor:** BSG/CRP, Blutbild, GPT, GOT, γ GT, aP, LDH, Lipase, Bilirubin, Gesamteiweiß, Albumin, Kreatinin, Elektrolyte, Serum-Elektrophorese, Quick/INR, Urinstatus
- **Abdomensonografie**
- **Röntgen-Thorax** in 2 Ebenen, bei Herzvergrößerung **Echokardiografie**

Aszitespunktion

Jeder Aszites unklarer Genese erfordert eine diagnostische (und ggf. gleichzeitig therapeutische) Punktion

Weiteres diagnostisches Vorgehen

orientiert sich an der Klinik und an der Differenzierung zwischen Transsudat und Exsudat. Ein hämorrhagischer Aszites ist bis zum Beweis des Gegenteils tumorverdächtig.

Differenzialdiagnose

| Verdachtsdiagnose | wegweisende Untersuchungen (+ diagnostische Punktion) |
|---|--|
| meist Transsudat: | |
| Hepatisch, portale Hypertension: – Leberzirrhose (häufigste Ursache) – Budd-Chiari-Syndrom (Leberventhrombose) – Pfortaderthrombose | – GOT, GPT, γ GT, Quick/INR, E.-phorese, Sono – Duplexsonografie – Duplexsonografie |
| Kardial: – Rechtsherzinsuffizienz, Pericarditis constrictiva | – Röntgen-Thorax, Echokardiografie |
| Hypoalbuminämie: – nephrotisches Syndrom, Malnutrition,... | Albumin – Urinstatus, Kreatinin |
| meist Exsudat: | |
| Malignome: → blutig – Peritonealkarzinose,... – Leberzellkarzinom, Metastasenleber | Punktat: Zytologie – Sono, Gastroskopie, Koloskopie, Abdomen-CT, gynäkologische Unt. – Sono, AFP |
| Entzündungen: → trüb – (spontane) bakterielle Peritonitis, Tuberkulose – Pankreatitis | – Punktat: Kultur – Lipase (Serum, Punktat) |
| chylöser Aszites → milchig | |
| Störung des Lymphabflusses durch maligne Prozesse | Sono, Abdomen-CT |

Portale HTN

Peritonealpunktion (Aszitespunktion = Parazentese)

- **Indikationen:**
 - **diagnostisch:** Differenzialdiagnose des Aszites
 - **therapeutisch:** Entlastungspunktion bei aszitesbedingten Beschwerden.
- **Kontraindikationen** (relativ): Gerinnungsstörungen.
- **Komplikationen:** Infektion, Blutung, Verletzung intraabdomineller Organe.
- **Material:**
 - **allgemein:** Punktionskanülen (z. B. graue oder gelbe Braunüle®), Verbindungsschläuche (z. B. Infusionssystem), Dreiwegehahn, Auffangbehälter (*Réceptient de collecte*), sterile Tupfer, sterile Handschuhe, sterile Abdecktücher, Desinfektionslösung, 5 – 10 ml Lokalanästhetikum (z. B. Lidocain 1 %), Kanülen, Spritzen, Verbandsmaterial
 - **diagnostische Punktion:** Zusätzlich Blutkulturflaschen, Probengefäße für klinische Chemie, Tbc-Diagnostik und zytologische Untersuchung.
- **Durchführung :**
 - Rückenlage oder leichte Seitenlage
 - Markierung der Punktionsstelle im **rechten oder linken Unterbauch lateral der epigastrischen Gefäße unter sonografischer Kontrolle**
 - Hautdesinfektion, sterile Handschuhe anziehen, Abdecken
 - Lokalanästhesie: Wechsel zwischen Injektion und Aspiration, nach Aspiration von Aszites ungefähre Punktionstiefe merken
 - Punktion: **senkrecht** (*à la verticale*) zur Hautoberfläche unter Aspiration mit Spritze; lässt sich Aszites aspirieren, Stahlkanüle (*acier*) etwas zurückziehen und Plastikkanüle vorschieben
 - ggf. Material für die Diagnostik entnehmen, dann Ableitungsschlauch anschließen und Aszites ablassen. Bei der therapeutischen Punktion kann **unter engmaschigen Puls- und RR-Kontrollen** der gesamte Aszites **langsam** auf einmal abgelassen werden, ggf. durch Lagerung des Patienten auf die Punktionsseite kontralateral gelegenen Aszites mobilisieren.
- **Untersuchungen bei der diagnostischen Aszitespunktion**
 - klinische **Chemie** : spezifisches Gewicht, pH, Gesamteiweiß, Albumin, LDH, Glukose, Leukozyten und Erythrozyten, Triglyzeride, Lipase/Amylase
 - **bakteriologische Diagnostik**
 - **Tbc-Diagnostik**
 - **zytologische Diagnostik**

Lidocain Dosis:-
als lokal Anästhetikum
4.5 mg / Kg
max 300 mg
1% Lidocaine
= 10mg / 1 ml
z.B. 70kg Pt
- 4.5 x 70 =
315 mg
- 315 / 10 =
31.5 ml

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Behandlung der Grunderkrankung
- Regelmäßige Gewichtskontrolle
- **Flüssigkeitsrestriktion**
- **Natriumrestriktion**

Aszites vom Transsudat-Typ

- **Diuretische Therapie** : Spironolacton ± Schleifendiuretika
- bei Therapierefraktärer Aszites : **Aszitespunktion**. TIPS (bei portaler Hypertension)

Aszites vom Exsudat-Typ

- Entzündliche Genese : **Kausale Therapie**. **Diuretische Therapie nicht effektiv**
- Maligne Genese : **onkologische Therapie**. **kurzfristig Parazentesen**. **Diuretische Therapie nicht ausreichend effektiv**.

Kolonpolypen +-

Definition

Schleimhautvorwölbung in das Lumen des Kolons

Ätiologie

- Neoplastisch : z.B. Adenom (70%), Lipom, Karzinom
- Nicht-neoplastisch : z.B. hamartöser oder entzündlicher Polyp

Klassifikation (Histologische Unterteilung)

- **Neoplastischer Polyp (zumeist Adenom)**
 - Großteil der Kolonkarzinome entwickeln sich aus Adenomen
 - **Häufigkeit der Adenome** : tubulär > tubulovillös > villös
 - **Entartungsrisiko** : villös > tubulovillös > tubulär
- **Entzündlicher Polyp** : z.B. bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
- **Hyperplastischer Polyp** : mit unterschiedlichem Entartungsrisiko
- **Sessiles Adenom** : Ähnliche Morphologie wie hyperplastischer Polyp, hohes Entartungsrisiko
- **Hamartom** : Angeboren, evtl. Syndrom-assoziiert

Symptome/Klinik

- Meistens asymptomatischer Zufallsbefund
- Evtl. schleimiger, blutiger Stuhl
- Evtl. Stuhlveränderungen (Obstipation oder Diarrhö)

Sonderformen : Hereditäre gastrointestinale Polyposis-Syndrome

Familiäre adenomatöse Polyposis (FAP)

- >100 Polypen im gesamten Gastrointestinaltrakt, insb. im Kolon. Vorwiegend adenomatös
- Lebenszeitrisiko für kolorektales Karzinom 100%
- Vorsorgeuntersuchungen ab dem 10. Lebensjahr
- Ggf. Prophylaktische Proktokolektomie

Peutz-Jeghers-Syndrom

- Meist <20 Polypen, insb. im Dünndarm. Vorwiegend hamartomatös
- Lebenszeitrisiko für kolorektales Karzinom: 40%

Diagnostik

- **Körperliche Untersuchung**: Rektal-digital
- **Interventionell** : Rekto-/Koloskopie
- **Ggf. Bildgebung**: Virtuelle Koloskopie

Therapie

- Koloskopische Entfernung und histologische Beurteilung
- Bei großen Polypen oder Malignitätsverdacht: Operative Resektion

Prävention

Zur Nachsorge: Siehe Darmkrebsvorsorge

Diarrhö +-

Grundlagen

- Bei einer **Diarrhö** sind die Stuhlgänge:
 - zu häufig: > 3/d
 - zu flüssig: > 75 % Wasseranteil
 - zu viel: > 250 g/d
- Paradoxe Diarrhö**: Häufige, flüssige Stuhlgänge mit eher verminderter Gesamtmenge v. a. bei stenosierenden Prozessen im distalen Kolon bzw. Rektum mit prästenotischer Koprostase.
- Pseudodiarrhö**: Erhöhte Stuhlfrequenz ohne pathologische Steigerung des Stuhlgewichts (> 250 g/d), häufig beim Reizdarmsyndrom, Stuhlinkontinenz oder infolge Dyschezie (= Störung der Rektumfunktion mit Überempfindlichkeit auf rektale Dehnungsreize) bei Proktitis.
- Laxantienabusus**: Osmotische Diarrhö nach Einnahme osmotisch wirksamer Laxantien (Hypokaliämie, Dehydratation, Meteorismus)
- Einteilung der Diarrhö nach der Dauer:
 - akute Diarrhö: ≤ 2 Wochen
 - chronische Diarrhö: > 2 Wochen.

Einteilung nach Pathophysiologie und Ursachen

| | |
|--------------------------------|---|
| Malabsorptive Diarrhö | Kurzdarmsyndrom (bei Resektionen des Dünndarms), Zöliakie |
| Osmotische Diarrhö | Laktoseintoleranz, exokrine Pankreasinsuffizienz |
| Hypermotile Diarrhö | Hyperthyreose, Reizdarmsyndrom |
| Exsudativ-entzündliche Diarrhö | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED), Invasive Infektionen (Enterohämorrhagische Escherichia coli, Amöbiasis, Yersiniose), Ischämische Kolitis |
| Sekretorische Diarrhö | Enterotoxinbildende Escherichia coli, „Lebensmittelvergiftungen“ durch Enterotoxine (Staphylococcus-aureus), sekretorische Laxantien |

Bei einer Vielzahl von Durchfallerkrankungen können mehrere Pathomechanismen gleichzeitig vorliegen (z.B. CED : exsudativ-entzündliche und malabsorptive Durchfälle)


Häufigste Ursachen

- Akute Diarrhö**: Infektionen, Lebensmittelvergiftung, Medikamente.
- Chronische Diarrhö**: Reizdarmsyndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Tumoren, Laktoseintoleranz, exokrine Pankreasinsuffizienz, Infektionen.

Vorgehen

Anamnese

- Beschreibung der Diarrhö:
 - häufige wässrige Durchfälle meist ohne Fieber bei akuter infektiöser Diarrhö : durch Vibrio cholerae, Salmonellen, toxinbildende E. coli, Noro- und Rotaviren,...
 - weniger voluminöse, dafür eitrige und/oder blutige Stühle, meist mit Bauchschmerzen und Fieber bei akuter infektiöser Diarrhö durch Shigellen, Campylobacter, Yersinien, Clostridium difficile, bei Tropenrückkehrern auch Amöben
 - blutige Stühle auch bei ischämischer Kolitis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Tumoren
 - voluminöse evtl. fettglänzende Durchfälle mit Meteorismus bei Maldigestion und Malabsorption
 - häufige, flüssige Stuhlgänge mit eher verminderter Gesamtmenge bei Tumoren im distalen Kolon bzw. Rektum
 - intermittierende breiige, flüssige, schleimige Diarrhö v. a. morgens und postprandial bei jahrelanger Anamnese (und stabilem Allgemeinzustand) spricht für eine funktionelle Genese
- weitere Personen im Umfeld mit ähnlichen Symptomen?
- Beziehung der Diarrhö zur Nahrungsaufnahme: Besserung beim Fasten? (bei Malabsorption)




- Begleitsymptome: Chronische Gewichtsabnahme, Abdominalschmerzen, Fieber, Mangelerscheinungen (z. B. Ödeme,..)
- Medikamente, Genussmittel
- Auslandsaufenthalte, Voroperationen (z. B. Magen- oder Darmresektion), Vorerkrankungen (z. B. Pankreatitis), Grunderkrankungen (z. B. Diabetes mellitus).

Körperliche Untersuchung

Allgemeinzustand, Exsikkose, Kachexie ($\text{BMI} < 18,5 \text{ kg/m}^2$), Ödeme, Abdominalbefund, rektale Untersuchung, Stuhlinnspektion u. a.

Diagnostik bei akuter Diarrhö (Vorgehen)



Bei schwerem Krankheitsverlauf : BSG/CRP, Blutbild, Differenzialblutbild, Blutglukose, Kreatinin, Elektrolyte

Diagnostik bei chronischer Diarrhö

- **Basisdiagnostik**
 - **Fastenversuch** über 48 Std. oder **Bestimmung des Stuhlgewichts**: Eine Besserung der Diarrhö beim Fasten oder ein Stuhlgewicht $> 250 \text{ g/d}$ spricht für eine malabsorptive Diarrhö.
 - **Laboruntersuchung** einschließlich **Mikrobiologie** je nach Verdacht (vgl. akute Diarrhö), zusätzlich aP, γ GT, Bilirubin, Serumeisen, Cholesterin, Gesamteiweiß, TSH
 - **Abdomensonografie**
- **erweiterte Diagnostik nach Verdacht** :
 - **Koloileoskopie** einschließlich **histologischer und bakteriologischer Untersuchung** von Biopsien aus verdächtigen Schleimhautbezirken, bei makroskopisch unauffälliger Schleimhaut Entnahme von Stufenbiopsien
 - **Gastroduodenoskopie** einschließlich tiefer Duodenalbiopsie

Differenzialdiagnose

Differenzialdiagnose der akuten Diarrhö

| Verdachtsdiagnose | wegweisende Untersuchungen |
|--|--|
| Infektiöse Diarrhö: - Bakterien oder Bakterientoxine: Campylobacter, Salmonellen, Shigellen, enteropathogene E. coli, Yersinien, Staphylokokken, Clostridien. - Viren: v. a. Noro- und Rotaviren - Protozoen: Amöben | Erregerdiagnostik im Stuhl , Serologie |
| Lebensmittelvergiftung durch Enterotoxine: v. a. Staphylococcus aureus | Klinik |
| Medikamente: v. a. Laxanzien, Antibiotika (Kolitis durch Clostridium difficile) | Anamnese |
| Ischämische Kolitis | Duplexsonographie, Angiografie |

Differenzialdiagnose der chronischen Diarrhö

| Verdachtsdiagnose | wegweisende Untersuchungen |
|---|--|
| Colitis ulcerosa, Morbus Crohn | Koloskopie |
| ischämische Kolitis | Duplexsonographie, Angiografie |
| Tumoren | Koloskopie |
| Maldigestion | |
| exokrine Pankreasinsuffizienz | Sono, Abdomen-CT, Bestimmung der Elastase 1 im Stuhl |
| Gallensäurenverlustsyndrom: z.B. Ileumresektion, Crohn, ... | Anamnese |
| Malabsorption | |
| Kurzdarmsyndrom nach Dünndarmresektion | Anamnese |
| Morbus Crohn | Koloskopie |
| Laktoseintoleranz | Toleranztest |
| Zöliackie | ÖGD, Transglutaminase |
| Hyperthyreose | TSH |
| Medikamente | Anamnese |
| Reizdarmsyndrom | Ausschlussdiagnose |

Therapie

Ambulantes Prozedere

- Orale Rehydratation
- Schonkost: Reis, meiden von Fett
- Antiemetika bei Übelkeit und Erbrechen
- Ggf. Antidiarrhoika: nicht routinemäßig
- Antibiotika: Nur bei Nachweis einer speziellen Genese
- Ggf. Meldepflicht
- Berufsverbot: Bei Tätigkeit in Kontakt mit Lebensmitteln Gewerbe oder in Gemeinschaftseinrichtungen

Stationäres Prozedere

- Isolation im Einzelzimmer bis eine genaue Einschätzung erforderlicher Hygienemaßnahmen nach Erregernachweis
- Volumen- und Elektrolytausgleich i.v.
- Schonkost, ggf. parenterale Ernährung
- ggf. Antiemetika, Antibiotika
- Überwachung von Blutdruck, Volumenstatus, Nierenfunktion und Elektrolyten
- Ggf. Meldepflicht

Unspezifische Gastroenteritis

- Magen-Darm-Entzündung, die mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen einhergeht und bei der kein Erreger nachgewiesen wurde. In der Regel wird dieses Krankheitsbild von verschiedenen Viren oder Bakterien ausgelöst.
- **Basisdiagnostik:** Anamnese, klinische Untersuchung, eine Erregerdiagnostik ist nicht zwingend erforderlich

- **Erweiterte Diagnostik:** Mikrobiologische Stuhlkultur, Laboruntersuchung und Abdomensonographie nur bei Warnsymptomen
 - Beschwerdepersistenz
 - Verdacht auf einen schweren Krankheitsverlauf (z.B. akutes Nierenversagen)
 - Aktive Krebserkrankung
 - Immunsuppression
 - Aufenthalt in den Tropen

- **Therapie:** Symptomatische Therapie

Norovirus-Infektion

- Epidemisches **Risiko:** Gemeinschaftseinrichtungen. **Saisonalität:** Oktober bis März
- **Infektionsweg :** Fäkal-oral. **Infektiosität:** Sehr hoch!
- **Symptome :** Akute wässrige Diarrhö. Erbrechen. Meist kein hohes Fieber. Abdominelle Schmerzen
- **Prävention :** Hygienemaßnahmen
- Ggf. **Meldepflicht**

Obstipation +-

Definition

Stuhlfrequenz von $<3 \times / \text{Woche}$ und harte Stuhlkonsistenz.

Ätiologie

(Primäre) Funktionelle Obstipation

idiopathisch

- **Obstipation mit normaler Darmpassagezeit**: 60 % (Ursache ungeklärt)
- **Beckenbodendyssynergie**: 25 %. paradoxes Anspannen des Analsphinkters beim Defäkationsvorgang
 Störung der Koordination der Muskul
- **Obstipation mit verzögerter Darmpassage**: 15 %. infolge einer Neuropathie

Sekundäre Obstipation

- **Exogene Ursachen**: Ernährung (Geringe Trinkmengen, faserarme Kost). Bewegungsmangel. Psychischer Stress. Medikamente (Opiode, Eisenpräparate, Diuretika, usw.). Anale Läsionen (Rhagaden, Fissuren).
- **Systemische Erkrankungen**
 - **Endokrinologisch**: Hypothyreose, Hyperparathyreoidismus (Hyperkalzämie)
 - **Neurologisch**: Multiple Sklerose, diabetische autonome Neuropathie, M. Parkinson
- **Mechanische Ursachen**: Stenose infolge eines Colonkarzinoms oder Morbus Crohn

Diagnostik

Anamnese

Vorerkrankungen, Medikamente, Ernährungsanamnese

(sekundär?)

Körperliche Untersuchung

Palpation. Anale Inspektion (Rhagaden, Fissuren, Hämorrhoiden). Digital-rektale Untersuchung (DRU)

Erweiterte Diagnostik bei Obstipation

- **Laboruntersuchungen**: Blutbild, CRP, Kreatinin, Elektrolyte (Kalium ++), TSH, Blutzucker, HbA1c, GOT, GPT
- **Sonographie des Abdomens**
- **Koloskopie**
- Ggf. neurologische Untersuchung
- Ggf. spezielle apparative Diagnostik: Bestimmung der Colont transitzeit (Hinton-Test). Anorektale Manometrie. Ballonexpulsionstest. Defäkographie. Colomanometrie.

Diagnostischer Stufenplan

- **Basisdiagnostik** (Mit unauffälliger Anamnese und körperlicher Untersuchung) **ohne Warnsymptome** → Konsequente Therapie und Verlaufsbeobachtung **über 4 Wochen**
 - Bei ausbleibender Besserung: Erweiterte Diagnostik mit Labor und Bildgebung
- **Warnsymptome in der Basisdiagnostik, hoher Leidensdruck oder starke Beschwerden** → Sofort erweiterte Diagnostik inklusive Laboruntersuchung, Sonographie des Abdomens und endoskopische/ radiologische Untersuchung (insb. Ileokoloskopie)
- **Warnsymptome bzw. auffällige Befunde**: Blutbeimengung ^{علائق}. Paradoxe Diarrhöen. Vergrößerte Lymphknoten. Abdominell tastbare Resistenzen. Anämie (blasse Haut). Alter >50 J. Gewichtsverlust >10 %. Karzinome des Gastrointestinaltraktes in der Eigen- oder Familienanamnese. Zunehmender oder fulminanter Verlauf

Differentialdiagnosen (Siehe: sekundäre Obstipation)

Obstipation im Kindesalter (Insb. im Rahmen der Sauberkeitserziehung)

- **Ätiologie**: Circulus vitiosus: Rückhaltemanöver als Auslöser → Stuhl verhärtet → Schmerzhaftes Defäkation → Weitere Rückhaltung
- **Therapie**: Ernährungsumstellung, stuhlaufweichende Therapie

Therapie

Allgemeinmaßnahmen

Ballaststoffreiche Kost (Weizenkleie, Flohsamen), ausreichende Flüssigkeitszufuhr, körperliche Bewegung.

Medikamentöse Therapie

- **Osmotische Laxantien** (Sing. Laxans) wie Macrogol in erster Linie. Alternative : Laktulose
- **Stimulative (sekretorische) Laxantien** wie Bisacodyl in zweiter Linie.

Therapie der sekundären Obstipation (Kausale Therapie)

- Wenn möglich Behandlung der Primärerkrankung (z.B. Tumoresektion)
- Behandlung oder Vorbeugung von opioidbedingter Obstipation : Laxanzien (Macrogol).
- **Supportive Externa** : bei Fissuren oder Rhagaden mit Defäkationsschmerz
 - Kombinationspräparate auf Basis von Zinkoxid und Harnstoff
 - Kombinationspräparate aus Glucocorticoiden und Lokalanästhetika

Auch bei Schmerzen und Stillzeit

*jedes alter
2xTag
max 2 wochen*

Hämorrhoiden und Hämorrhoidalleiden +-

Definition

- **Hämorrhoiden** : Erweiterung des Corpus cavernosum recti, mit Aussackung des Gefäßpolsters.
- **Hämorrhoidalleiden**: Symptomatische Hämorrhoiden. Häufiges Krankheitsbild.

Ätiologie

- nicht ausreichend gesichert.
- Begünstigende Faktoren: Familiäre Veranlagung (=Prädisposition). Fehlerhafte Ernährung (Ballaststoffarme Ernährung, unzureichende Flüssigkeitsaufnahme). Erhöhter intraabdomineller Druck. Gestörtes Defäkationsverhalten. Langes Sitzen

Pathophysiologie

Die Pathophysiologie zur Entstehung von Hämorrhoiden ist nicht eindeutig. Folgende Hypothesen werden diskutiert:

- Intraabdominelle Druckerhöhung durch chronische Obstipation
 - Chronisch durchfallartiger Stuhlgang
 - Hämorrhoiden sind Aussackungen des Gefäßpolsters, keine Varizen (= Erweiterung einer Vene)!
- Anorektale Varizen können z.B. bei portaler Hypertension entstehen.

Symptome/Klinik

Lokalisation

Oberhalb der Linea dentata

Symptome (stadienabhängig)

Die Beschwerden des Hämorrhoidalleidens sind nicht von der Größe der Hämorrhoiden abhängig, korrelieren jedoch mit den unterschiedlichen Stadien. Sie sind uncharakteristisch und können auch bei anderen proktologischen Erkrankungen auftreten.

- **Transanale Blutung** (häufigstes Symptom)
- Schleimige Sekretion, mit Pruritus und Brennen
- Analschmerz
- Fremdkörpergefühl

Stadien (Schweregrad-Einteilung nach Goligher)

Die Einteilung der Hämorrhoiden erfolgt anhand des Ausmaßes des Prolaps in den Analkanal oder vor den Anus und dessen Reponierbarkeit.

| Grad | Befund |
|------|---|
| I | Nur proktoskopisch sichtbare Knoten, ohne Prolaps |
| II | Prolaps beim Pressen, spontan reponierbar |
| III | Prolaps beim Pressen, nur manuell reponierbar |
| IV | Fixierter Prolaps; nicht reponierbar |

Diagnostik

Anamnese

Blutabgang. Nässen, Juckreiz, Schmerzen

Körperliche Untersuchung

Inspektion. Digitale rektale Untersuchung (DRU)

Apparative Diagnostik

- Proktoskopie
- Rektoskopie, Koloskopie : Zum Tumorausschluss

Differentialdiagnosen

- Anal- Rektum- oder Kolonkarzinom
- Analvenenthrombose
- Analfissur, Analfistel
- Mariske : Hautläppchen am Analrand.
- Hypertrophe Analpapille (Resektion nur bei Symptomatik)

Therapie

Eine Therapie ist nur bei Hämorrhoidalleiden erforderlich und erfolgt stadienabhängig.

Konservativ

- **Kausal**
 - **Stuhlregulierung** : Ballaststoffreiche Ernährung. Ggf. Laxantien (Z.B. Macrogol)
 - **Gewichtsreduktion**, Sport
- **Symptomatisch** : Salben/Suppositorien (=Zäpfchen) : auf Lidocain-Basis

Interventionell

- **Sklerosierung** (insb. Stadium I)
- **Gummibandligatur** (insb. Stadium II)

Operativ (ab Stadium III - IV)

- **Segmentäre Verfahren** : Offene Hämorrhoidektomie nach Milligan-Morgan
- **Zirkuläre Verfahren** : Stapler-Hämorrhoidopexie (nach Longo)

| | |
|-----------------------|--|
| Hämorrhoiden | Hyperplasie des <u>Corpus cavernosum recti</u> |
| Hämorrhoidalleiden | Symptomatische Hämorrhoiden |
| Innere Hämorrhoiden | Echte Hämorrhoiden (<u>Plexus hämorrhoidalis superior</u> betroffen) |
| "Äußere" Hämorrhoiden | Irrtümlicher Begriff für unechte Hämorrhoiden (<u>Plexus haemorrhoidalis inferior</u> betroffen, siehe <u>Perianalthrombose</u>) |
| Rektumvarizen | Erweiterte Venen im Bereich des Rektum |

Therapie des Hämorrhoidalleidens nach Ausschluss anderer Blutungsquellen!

Optimierung von Ernährung
und Defäkationsverhalten

Grad I

Grad II

Grad III/IV

Ohne Inkarzeration oder
Thrombosierung

Grad III/IV

Inkarzeration oder
Thrombosierung

Sklerosierung

Gummibandligatur

Operation

Zunächst
konservativ

Zirkulärer Befund

Segmentärer
Befund

Grad III

Grad IV

Zirkuläres Verfahren


Z.B. Stapler-Hämorrhoidopexie
nach Longo

Segmentäres Verfahren


Z.B. Milligan-Morgan

Hämorrhoiden


OP: Hämorrhoidektomie n. Milligan-Morgan



jm
Mannheim, Chirurgie



Stapler-Hämorrhoidopexie (nach Longo)



Analabszess und Analfistel +-

- **Analabszess** : eitrige Entzündung im Afterbereich
- **Analfistel** : pathologische Verbindung zwischen Analkanal und Haut

Ätiologie


- **Häufigste Ursache (90% der Fälle):** Infektion der **Proktodealdrüsen** (=Glandulae anales)
- Seltener Ursachen
 - **Chronisch entzündliche Darmerkrankungen** (Morbus Crohn, seltener Colitis ulcerosa)
 - **Akute Infektionen des Gastrointestinaltraktes**

Klassifikation

Fisteln (Parks-Klassifikation)

- **Intersphinkteräre Analfistel** (Parks Typ I)
- **Transsphinkteräre Analfistel** (Parks Typ II)
- **Suprasphinkteräre Analfistel** (Parks Typ III)
- **Extrasphinkteräre Analfistel** (Parks Typ IV)
- **Submuköse Analfisteln** (Ggf. Parks Typ V)

post operative ?



Symptome/Klinik

Analabszess

- Schmerzen, Schwellung und Rötung
- Fieber, Abgeschlagenheit, Leukozytose

Analfistel

- Schmerzen
- Sekretion aus einer Fistelöffnung

Diagnostik

Die Diagnose einer Analfistel bzw. eines -abszesses wird im Regelfall klinisch gestellt (Blickdiagnose). Eine weiterführende apparative Diagnostik (Proktoskopie, Rektoskopie, MRT) ist selten präoperativ erforderlich.

| | Analabszess | Analfistel |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Inspektion | Schwellung, Rötung perianal | Ggf. Fistelostium sichtbar |
| Palpation | Schmerzhafte Induration | Ggf. Fistelverlauf als harter Strang tastbar |
| Fistel Sondierung | | <i>Ggf. Fistelostium und -verlauf sondierbar</i> |
| Digital rektale Untersuchung | | <i>Ggf. Fistelverlauf als harter Strang tastbar</i> |

Therapie

Analabszess


- **Dringende OP-Indikation**, um Fortschreiten der Entzündung zu verhindern
- Abszessentlastung oder ggf. Inzision, jeweils mit Spülung der Wundhöhle

Analfistel

- Indikation zur (**elektiven**) Operation, um der Ausbildung von Analabszessen vorzubeugen
- Operationstechniken richten sich nach Fistelverlauf

Parks typ IV %

Hierbei handelt es sich um eine sehr seltene Fistelform, die anders als die Typen I–III nicht auf einer Infektion der Proktodealdrüsen, sondern auf selteneren Ursachen (z.B. CED, perforierte Sigmadivertikulitis, iatrogene Manipulation, Fremdkörper) beruht. Deshalb befindet sich die innere Öffnung der Fistel auch nicht im Bereich der Mündung der Proktodealdrüsen (Linea dentata), sondern meist weiter kranial.



Die Klassifikation nach Parks teilt die Analfisteln nach ihrer Lage in Relation zur Sphinktermuskulatur (2+3) ein:

Parks I: Intersphinkteräre Analfistel mit Verlauf im anatomischen Spaltraum zwischen innerem (2) und äußerem (3) Schließmuskel.

Parks II: Transsphinkteräre Analfistel, die den M. sphincter ani externus (3) penetriert.

Parks III: Suprasphinkteräre Analfistel, die im intersphinkterären Spalt nach kranial aufsteigt, den M. levator ani (1) penetriert und dann nach kaudal in der Fossa ischiorectalis verläuft.

Parks IV: Extrasphinkteräre Analfistel, die von der inneren Öffnung in der Ampulla recti (oberhalb der Linea dentata) ausgeht und den M. levator ani (1) penetriert.

Parks V: Subkutane/subanodermale/submuköse Analfisteln, die unterhalb der perianalen bzw. analen Haut bzw. der Rektumschleimhaut verlaufen.

Sonstiges +-

Boerhaave-Syndrom

- **Definition** : Ruptur des Ösophagus als Folge einer Episode forcierten Erbrechens (Barotrauma). In >90% befindet sich die Ruptur im distalen Drittel des Ösophagus.
- **Symptome**: Mackler-Trias (retrosternaler Vernichtungsschmerz, nach massivem Erbrechen, Haut- oder Mediastinalemphysem), Dyspnoe, Zyanose
- **Diagnostik** : Anamnese, Röntgen mit wasserlöslichem Kontrastmittel –Gastrografin- (Pneumothorax, Ergussbildung), CT
- **Komplikationen** : Mediastinitis (Fieber, Brustschmerzen, ggf. Hautemphysem, Schocksymptomatik)
- **Therapie** : Operativ. Antibiotika-Gabe
- Bei ausbleibender Behandlung liegt die Letalität bei fast 100%.

Hernia umbilicalis (Nabelhernie)

- **Definition**: Faszienlücke im Nabel führt zur Ausstülpung des parietalen Peritoneums und ggf. zur Vorwölbung von Baueingeweiden (Dünndarm, Dickdarm) durch die Bauchwand
- **Ätiologie**
 - Bei Säuglingen/Kleinkindern : Persistieren des physiologischen Nabelbruchs, der während der Embryonalperiode besteht
 - Bei Erwachsenen :
 - Meist paraumbilikale Hernie Seltener echte Nabelhernie
 - Risikofaktoren : Graviddität, Adipositas, Aszites
- **Klinik**: Vorwölbung, ggf. mit Schmerzen in der Nabelregion
- **Diagnostik**: Klinische Diagnose (Anamnese, Inspektion, Palpation)
 - Ggf. Sonographie zur Diagnosebestätigung
- **Therapie**
 - Bei Säuglingen/Kleinkindern: abwartendes Vorgehen (Hohe Rückbildungsrate)
 - Bei Erwachsenen: Operative Versorgung

Zöliakie (Glutensensitive Enteropathie)

- **Entzündliche autoimmune Erkrankung** des Darms, durch Glutenunverträglichkeit. Sie ist mit vielen anderen Autoimmunerkrankungen assoziiert.
- Es werden **Autoantikörper gegen die Transglutaminase** gebildet und es kommt zur Entzündung der Darmschleimhaut.
- Die Erkrankung kann klinisch vielfältig verlaufen – häufige Symptome sind bspw. Stuhlveränderungen, Antriebslosigkeit und durch Malabsorption verursachte Beschwerden.
- Die Diagnose wird mittels **Antikörperbestimmung** im Serum und **Duodenalbiopsie** (Zottenatrophie) gestellt.
- Therapie : **glutenfreie Diät**
- Unter Einhaltung der Ernährungsvorschriften ist die Prognose gut, zumal sich auch das erhöhte Entartungsrisiko (intestinales Lymphom) wieder normalisiert.

Lactoseintoleranz

- abdominelle Beschwerden, hervorgerufen durch Mangel des Enzyms Lactase im Dünndarm
- Betroffene Patienten entwickeln nach dem Verzehr lactosehaltiger Getränke und Speisen eine abdominelle Beschwerdesymptomatik mit Krämpfen, Schmerzen, Diarrhö und Blähungen.
- Sie ist durch die Einnahme von Lactase-Präparaten bei entsprechender Nahrungsaufnahme oder durch einen Verzicht auf Lactose beherrschbar.

Darmchirurgie

- **Elektive Operation** : Resektion und primäre **Anastomosierung** des Darms ohne Anlage eines künstlichen Darmausgangs
- **Notfalloperation** : Gefahr von Anastomoseninsuffizienz höher. Evtl. zweizeitiges Vorgehen mit Anlage eines künstlichen Darmausgangs
 - **Resektion mit primärer Anastomosierung (Kontinuität erhalten)** : Anlage eines **protektiven doppelläufigen Ileostomas**. Rückverlagerung im Verlauf (nach 6–8 Wochen)
 - **Alternativ: Diskontinuitätsresektion nach Hartmann** : Darmresektion und Anlage eines **endständigen Kolostomas**. **Blindverschluss des Rektums**. Nach 3–6 Monaten: **Reanastomosierung** mit Kontinuitätswiederherstellung

Laparoskopische Chirurgie

- Erstellung des Kapnoperitoneums (Insufflieren von CO₂ in die Bauchhöhle, dadurch entsteht ausreichend Raum zum Inspizieren und Operieren)
- **KI** : Dekompensierte kardiorespiratorische Insuffizienz. Relative KI: Multiple Voreingriffe (aufgrund von Verwachsungen)
- **Kpl**: Komplikationen durch Erhöhung des intraabdominellen Drucks bei Kapnoperitoneum (Beeinträchtigung der Atemmechanik und der Hämodynamik, Pneumothorax, Aspirationsrisiko). Verletzung intraabdomineller Organe. Hyperkapnie

Peritonitis

- Entzündung des Bauchfells, stellt in den meisten Fällen einen chirurgischen Notfall dar und wird u.a. eingeteilt nach Ausdehnung (**lokalisiert vs. generalisiert**) und Ätiologie (**primär vs. sekundär**).
- **Am häufigsten** ist die **sekundäre** Form, die in den meisten Fällen durch eine **Hohlorganperforation** (z.B. Ulkus-, oder Divertikelperforation) oder **Infektion** intraabdomineller Organe (z.B. Appendizitis, Cholezystitis) als **Durchwanderungsperitonitis** (z.B. bei Ileus) entsteht.
- Klinisch äußert sich die Peritonitis mit starken abdominellen **Schmerzen** (akutes Abdomen) und Druckschmerz mit **Abwehrspannung** im betroffenen Areal. In der Regel kommt es zu **Fieber** und Allgemeinzustandsverschlechterung sowie zur Ausbildung eines paralytischen Ileus.
- Therapeutische Grundlage der sekundären Peritonitis ist die chirurgische Herdsanierung in Kombination mit Antibiotikatherapie (**Ceftriaxon + Metronidazol**. Ggf. **Tazo**) und intensivmedizinischen Maßnahmen.
- Eine primäre Peritonitis (z.B. spontan bakterielle Peritonitis) verläuft häufig symptomärmer und wird in der Regel konservativ antibiotisch behandelt (Ceftriaxon).

Leberabszess

Ein Leberabszess ist eine Eiteransammlung innerhalb der Leber.

Ätiologie

- **Pyogener Leberabszess** (meistens) : Aszendierend: Cholangitis (häufigste Ursache). Hämatogen
- Seltener Pilze sowie Amöben

Symptome (Häufig unspezifisch!)

- Rechtsseitige Oberbauchschmerzen
- Fieber
- Verschlechterung des Allgemeinzustands

Diagnostik

- **Blutuntersuchung** : Entzündungsparameter, Blutkulturen, Ggf. erhöhte Leberwerte
- **Bildgebung**
 - Sonographie: Echoarme, meist unregelmäßig begrenzte Läsion, ggf. Gaseinschlüsse
 - CT : Hypodenses Areal mit randständiger Kontrastmittelaufnahme
- **Erregernachweis** : **Polymikrobiell** (anaerobe Bakterien sowie gram-negative Bakterien)

Therapie

- **Kalkulierte antibiotische Therapie** : zunächst kalkuliert (**Aminopenicillin + Betalaktamaseinhibitor**), dann gezielt nach Antibiotogramm
- **Interventionelle Therapie** : **Drainage** (Meist sonographisch oder CT-gesteuert)
- **Operative Ausräumung**: bei erfolgloser Drainage

Morbus Hirschsprung (Megacolon congenitum)

- **Angeborene Aganglionose** des Kolons, die insbesondere den **rektosigmoidalen** Abschnitt betrifft und zu einer **Dilatation** der vorangeschalteten Darmabschnitte führt.
- Meist fallen die Neugeborenen bereits postnatal durch einen deutlich verzögerten Mekoniumabgang auf. Bei vollständig fehlenden Ganglien werden die Kinder bereits im Neugeborenenalter mit einem Darmverschluss symptomatisch.
- Bleibt die Krankheit zunächst unentdeckt, entwickeln die Kinder im Verlauf ein Megakolon.
- Die Diagnostik beruht auf drei Säulen: Kontrastmitteleinlauf, rektale Druckmessung und Stufenbiopsie zur histologischen Sicherung der Aganglionose.
- Therapeutisch erfolgt die **operative Resektion** des agangliösen Segments - die Prognose dabei ist gut.

Endokrinologie

Hyperthyreose +++

Ätiologie

1. **Morbus Basedow**: Genetische Prädisposition ($\text{♀} > \text{♂}$)
2. **Funktionellen Schilddrüsenautonomie** (Mit zunehmendem Alter steigt die Inzidenz)
 - Unifokal (= autonomes Adenom). Multifokal. Disseminiert
3. **Seltene Ursachen**
 - **Iatrogen**
 - Hyperthyreosis factitia durch exogene Zufuhr von Schilddrüsenhormonen bzw. Jod
 - insb. jodhaltige Röntgenkontrastmittel
 - Einnahme von Amiodaron
 - **Entzündlich**
 - Passager bei subakuter Thyreoiditis de Quervain
 - Passager bei Hashimoto-Thyreoiditis (sog. Hashitoxikose)
 - **Neoplasie**: Schilddrüsenkarzinome, *paraneoplastisch*

Pathophysiologie

Morbus Basedow (Graves' disease)

- TSH-Rezeptor-Autoantikörper (TRAK) wirken stimulierend auf die Schilddrüsenhormonproduktion und führen zur Hyperthyreose

Schilddrüsenautonomie

- **Physiologische, basale Autonomie**: Jede Schilddrüse besitzt Areale, die sich der Regulation durch die hypothalamisch-hypophysäre Achse entziehen
- **Fakultative Hyperthyreose**: Übermäßiger Anteil von autonomem Schilddrüsenengewebe in Suppressionsszintigraphie ($>1,5-3\%$) bei (noch) euthyreoter Stoffwechselsituation
- **Manifeste Hyperthyreose**: Meist erst bei hoher exogener Jodzufuhr

Symptome/Klinik

Allgemeine Klinik der Hyperthyreose

- **Schilddrüse**: Struma
- **Vegetativ**
 - Tachykardie *ST, VF* **Herzrhythmusstörungen**, *AP* Stenokardie, arterieller Hypertonus, Wärmeintoleranz, Hyperreflexie, Tremor und Schwitzen
 - Diffuser **Haarausfall**
 - Ursache: gesteigerte Sensibilität auf Katecholamine
- **Neuropsychiatrisch**
 - Psychomotorische **Unruhe** und Reizbarkeit, aber auch Apathie
 - **Schlafstörungen** und rasche Ermüdbarkeit
- **Gastrointestinal**: Evtl. erhöhte Stuhlfrequenz/Diarrhö
- **Metabolisch**
 - Gewichtsabnahme
 - Pathologische Glucosetoleranz
- **Muskuloskelettal**: Myopathie oder Osteopathie

Spezielle Klinik des Morbus Basedow

- **Merseburger Trias**: nahezu pathognomonisch
 1. **Struma**
 2. **Tachykardie**
 3. **Exophthalmus** → Endokrine Orbitopathie (60% der Fälle)
Prätibiales Myxödem (selten)

Mersburg Deutsche Stadt am Bodensee wo dr. Basedow gearbeitet hat.

Diagnostik

Laboruntersuchung

- **Manifeste Hyperthyreose**: TSH basal ↓, fT_3 ↑ und/oder fT_4 ↑
- **Latente Hyperthyreose**: TSH basal ↓, fT_3 und fT_4 normal
 - Auftreten von Symptomen möglich, dann auch thyreostatische Therapie indiziert

- **Morbus Basedow:** Schilddrüsen-Antikörper
 - TSH-Rezeptor-Autoantikörper (TRAK) in >90% der Fälle nachweisbar
 - Thyreoperoxidase-Antikörper (TPO-AK) in etwa 70% der Fälle nachweisbar
 - Thyreoglobulin-Antikörper (Tg-AK) in etwa 20% der Fälle nachweisbar
- **Urinuntersuchung:** Bei einer durch Jodkontakt induzierten Hyperthyreose ist ein Nachweis von Jod im Urin möglich

| | Manifeste Hyperthyreose | Latente Hyperthyreose |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| TSH basal | erniedrigt | erniedrigt |
| fT ₃ | erhöht | normal |
| fT ₄ | in 90% erhöht | normal |

„Bei Verdacht auf Hyperthyreose müssen immer auch T₃ und T₄ bestimmt werden, da es auch isolierte T₃-Erhöhungen gibt!“

Sonographie

- Vergrößerte Schilddrüse $\delta^* > 16, \delta^9 > 25 \text{ ml}$
- Vermehrte Vaskularisation
 - Echoarme Areale in Kombination mit vermehrter Perfusion
 - Bei Morbus Basedow typischerweise sog. „Vaskuläres Inferno“
- Homogenes, echoarmes Muster

Differenzialdiagnostisch ist dieses Phänomen auch bei der diffusen Schilddrüsenautonomie zu finden. Eine hohe maximale Flussgeschwindigkeit in den zuführenden Arterien (Peak Systolic Velocity, bis zu 2,5 m/s) spricht für einen Morbus Basedow. Der Nachweis multipler kleiner hypervaskularisierter Knoten und nur wenig echoarmen internodalen Restgewebes sprechen eher für eine multifokale bzw. disseminierte Autonomie.

Scintigraphie

- Technetium-Uptake erhöht (>5%; normal 0,5–2%) *homogene intensive Anreicherung*

Differentialdiagnosen

- Psychosen
- Drogenabusus (Kokain, Amphetamine)
- Unbehandelter Diabetes mellitus (Gewichtsverlust trotz Heißhunger)
- Schilddrüsenhormon-Resistenz: Seltene Erkrankung
 - Labor: TSH basal n/↑, fT₃↑ und/oder fT₄↑

Differentialdiagnose bei Hyperhidrosis

- Dermatologisch: idiopathische Hyperhidrose
- Psycho-vegetativ: Hypoglykämie, Aufregung.
- Endokrinologisch: Klimakterium, Hypercortisolismus
- Medikamente und Drogen (Opiode, Amphetamine u.a.) bzw. ihr Entzug
- Malignome: Insb. Lymphome (Nachtschweiß!)

„Bei Gewichtsabnahme trotz adäquatem Essverhalten muss auch immer an eine Tumorkachexie gedacht werden. Ebenso ist bei jedem unklaren Gewichtsverlust im Alter auch an eine Hyperthyreose zu denken!“

- Bei Abklärung eines Gewichtsverlustes (z.B. Tumorsuche) sollte die Schilddrüsenfunktion stets zu Beginn geklärt werden – insb. vor CT-Untersuchungen mit jodhaltigem Kontrastmittel!“

Therapie

Allgemeine Therapieprinzipien

- **Thyreostatika-Therapie:** Bei allen Formen der Hyperthyreose zur Einstellung einer euthyreoten Stoffwechsellaage
- **Symptomatische Therapie:**
 - Unselektive Betablocker, z.B. Propranolol (Hemmung der Konversion von T₄ zu T₃)
- **Kausale Therapie:**
 - Absetzen auslösender Medikamente
 - Operative bzw. interventionelle Verfahren: je nach der Grunderkrankung
 - Radiojodtherapie: Totale oder subtotale Ablation des Schilddrüsenorgans nach Applikation von radioaktivem Jod
 - Chirurgie: Thyreoidektomie





Abb. 3.4 Diagnostik bei Verdacht auf Hyperthyreose.
[aus: Hahn, Checkliste Innere Medizin, Thieme, 2010]

In der Sonografie lässt sich ein autonomes Adenom als echoarmer Bezirk mit häufig zentral gelegenem echofreiem Areal (Zystenbildung) darstellen. Diffuse Autonomen erscheinen inhomogen. Szintigrafisch können warme (relative Mehrspeicherung im Knoten verglichen mit dem Umgebungsgewebe) oder heiße Knoten (extreme Speicherung im Knoten, subnormale Speicherung im Umgebungsgewebe) nachgewiesen werden



Schilddrüsenszintigraphie eines 24-jährigen Mannes mit Hyperthyreose

Abstufung: Blau – Grün – Gelb – Rot = geringe Anreicherung → starke Anreicherung.

Befund: Vergrößerte Schilddrüse mit homogener Radionuklidanreicherung, mit dem Verdacht eines Morbus Basedow vereinbar.

„- Vor jeder anderen Therapie wird immer durch eine thyreostatische Therapie eine euthyreote Stoffwechsellaage eingestellt!


- Bei einer Hyperthyreose darf Jod nicht ohne eine Abdeckung durch Thionamide gegeben werden
→ Gefahr der thyreotoxischen Krise!“


Therapie bei Morbus Basedow

1. **Thyreostatische Therapie** über 12–18 Monate, i.d.R. mit Thionamiden
 - Remission unter der Therapie in 50% der Fälle
 - Dosisreduktion bei Erreichen der Euthyreose, sonst Verschlimmerung der endokrinen Orbitopathie!
 - Verlaufskontrolle: Kontrolle der TRAK-Spiegel nach 6 Monaten: Bei Werten >10 IU/L → Remission unwahrscheinlich, Operation bzw. Radiojodtherapie indiziert
2. Anschließend: **Auslassversuch** (CAVE: Gefahr einer Hyperthyreose!)
3. **Bei Rezidiv/persistierender Erkrankung**: Definitive Behandlung mit:
 - **Chirurgie**: Eine totale Thyreoidektomie ist der subtotalen Thyreoidektomie bzgl. der Hyperthyreose-Kontrolle überlegen
 - **oder Radiojodtherapie** (Ablatio) (KI in Schwangerschaft und bei V.a.-Karzinom)
→ Jedoch hohe Hypothyreoserate mit lebenslanger Levothyroxin-Substitution

Therapie bei Schilddrüsenautonomie

- Nach Erreichen einer Euthyreose ist aufgrund der hohen Rezidivrate eine definitive Therapie mittels **Radiojodtherapie** oder **Operation** indiziert
 - **Operative Therapie** bei Malignomverdacht (kalte Knoten) oder Kompressionsymptomen (große Struma) in Schwangerschaft





Komplikationen

Thyreotoxische Krise

Definition:

- Akute lebensbedrohliche Exazerbation einer Hyperthyreose

Ätiologie:

- Für eine thyreotoxische Krise besonders gefährdet sind Patienten mit nicht oder nur unzureichend behandelter Hyperthyreose. Die thyreotoxische Krise kann spontan auftreten oder durch folgende Faktoren ausgelöst werden:
 - Schwere Erkrankungen (Infektionen)
 - Jodexposition: Intravenöse Kontrastmittelapplikation, Amiodaron
 - Absetzen thyreostatischer Medikamente
 - Schilddrüsen-OP in hyperthyreotem Zustand

„MR-Untersuchungen sind bei Hyperthyreose-Patienten unproblematisch, da als Kontrastmittel nicht Jod, sondern Gadolinium eingesetzt wird!“

Klinik (Stadieneinteilung nach Hermann)

- **Stadium I**
 - Tachykardie, oft absolute Arrhythmie
 - Fieber, Erbrechen, Durchfälle → Exsikkose
 - Adynamie, Muskelschwäche
 - Tremor, Agitation
- **Stadium II:** Symptome aus Stadium I sowie Bewusstseinsstörungen (Somnolenz, Stupor), Desorientiertheit und psychotische Zustände
- **Stadium III:** Symptome aus Stadium I + II sowie Koma und Kreislaufversagen mit Nebennierenrindeninsuffizienz

Kausale Therapie

- **Thyreostatische Therapie:** Thiamazol hochdosiert + Natrium-Perchlorat
- Bei bedrohlicher thyreotoxischer Krise: Plasmapherese oder Notfall-Thyreoidektomie

Symptomatische Therapie

- **Intensivstationäre Überwachung**
- **Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution**, parenterale bzw. enterale Ernährung
- **Betablocker:** Propranolol → Senkung des Tremors und der Agitation
- **Glucocorticoide:** Prednisolon (wegen relativer Nebennierenrindeninsuffizienz und Hemmung der Konversion von T_4 zu T_3)
- **Fiebersenkende Medikamente:** Ibuprofen oder Paracetamol
- **Thromboembolieprophylaxe**

Prognose

Die Letalität der thyreotoxischen Krise liegt bei >20%!

Thyreostatika

| Wirkstoffe | Wirkmechanismus |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Thionamide <ul style="list-style-type: none"> ○ Thiamazol ○ Carbimazol ○ Propylthiouracil <i>hemmt periphere Umwandlung $T_4 \rightarrow T_3$</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Inhibierung der Schilddrüsenhormonsynthese (durch Hemmung der Thyreoperoxidase) • Wirkungseintritt mit einer Latenz von 1 Woche |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perchlorate <ul style="list-style-type: none"> ○ Natrium-Perchlorat | <ul style="list-style-type: none"> • Hemmung der Jodaufnahme in die Schilddrüse • rascher Wirkungseintritt |

Nebenwirkung

Thionamide

- Diffuse Struma durch TSH-induzierten Wachstumsreiz
- Allergie
- Agranulozytose
- Geschmacksstörungen

↑ cholestatische Parameter

Perchlorate

- Gastritis
- Struma
- Allergie

Indikation

Thionamide

- Hyperthyreose
- Thyreotoxische Krise

Perchlorate

- Hyperthyreose
- **Protektiv vor Kontrastmittelgabe**

Kalte Knoten: Geringe bis ausbleibende Anreicherung des Radionuklids; malignomsuspekt

- Bei Malignomverdacht weitere Diagnostik, siehe auch: Schilddrüsenkarzinom
- Differenzialdiagnosen
 - Zyste
 - Entzündung
 - Einblutung
 - Regressive Veränderungen (Verkalkungen, Narben)

→ Körperliche US
Tumormarker
Sono
Immunoglobulin
Calcitonin

Red Flags bei Struma: Bei Nachweis folgender Zeichen in der klinischen Untersuchung steigt das Risiko für eine maligne Ursache der Struma [3]

- Tasten von **harten, unregelmäßig geformten und schlecht bzw. nicht verschieblicher Knoten**
 - Insb. zusätzliche Heiserkeit und Verdrängungssymptome
- Tasten **vergrößerter Halslymphknoten**
- Tastbare Struma bei **männlichen Patienten**
- **Bestrahlung der Halsregion im Kindes- und Jugendalter** (bspw. bei Hodgkin-Lymphom)
- **Jugendliches (<16) bzw. hohes Alter (>60) der Patienten**
- Positive **Familienanamnese** bezüglich Schilddrüsenkarzinomen (z.B. MEN2)

Malignitätskriterien von Schilddrüsenknoten

- **Solide echoarme Knoten**
- **Mikrokalzifikationen**
- **Intranoduläre Vaskularisationsmuster**
- **Unschärfe Randbegrenzung, fehlendes Halo**
- Bei Malignitätsverdacht und kaltem Knoten in der Schilddrüsenszintigrafie: **Feinnadelbiopsie** bzw. Operation und nachträgliche histologische Sicherung der Diagnose; siehe auch: Diagnostik des Schilddrüsenkarzinoms

Die Entstehung der kalten Knoten hat mehrere Ursachen und ist nicht abschließend geklärt. Diskutiert werden bei der Hormonproduktion entstehende Sauerstoffradikale, Thiocyanide aus Zigarettenrauch, radioaktive Bestrahlung, weibliche Geschlechtshormone, Wachstumsfaktoren, Mutationen und eine familiäre Prädisposition.

Kalte Knoten müssen feinnadelbiopsiert werden, da ein Karzinom vorliegen kann (in 5-8 % d.F.).

Radioiodtherapie

Abstract

Die Radioiodtherapie ist eine nicht-invasive Methode der Nuklearmedizin zur **Destruktion von Schilddrüsengewebe**. Dies liegt darin begründet, dass die Schilddrüse als einziges Organ größere Mengen Iod aufnimmt und speichert. Das nicht-gespeicherte Iod wird über den Urin ausgeschieden. Verwendet **wird das radioaktive ^{131}I , das über β -Strahlung zur lokalen Zeldestruktion führt** sowie über γ -Strahlung diagnostische Wertigkeit besitzt.

Die Radioiodtherapie wird zur definitiven Behandlung einer Hyperthyreose, einer Struma sowie ergänzend zur Therapie der differenzierten Schilddrüsenkarzinome eingesetzt. Bei benignen Schilddrüsenerkrankungen muss vor Therapiebeginn ein Radioiodtest durchgeführt werden, um die individuelle Dosis des ^{131}I -Iods zu evaluieren. Zusätzlich ist eine Iodkarenz und das Pausieren einer eventuellen thyreostatischen Medikation erforderlich. Bei malignen Schilddrüsenerkrankungen wird die Radioiodtherapie als adjuvante Behandlung nach Thyreoidektomie genutzt.

Technischer Hintergrund

- Prinzip: Verwendung von radioaktivem ^{131}I (Gamma- und Betastrahler) als Radiopharmakon
 - Gammastrahlung: Diagnostische Nutzung
 - Betastrahlung: Therapeutische Nutzung
- **Wirkungseintritt: i.d.R. nach 2–3 Monaten**

- ① Iodkarenz 4 W Diät, flüchtige KM, Medikamente bis 12 M
- ② Ausschluss Schwangerschaft, Verhütung nach Behandlung 4 M
- ③ Abstillen 4 m vor

RI T

Absetzen der Thyrostatika 2–3 T vorher wieder

Orale Gabe (Kapseln) Dosis $\left\{ \begin{array}{l} \text{funktionsoptimierend} \\ \text{ablativ} \end{array} \right.$

TSIT alle 2–3 Wochen

szintigraphische Kontrolle 3–6 M

ggf. L-Thyroxin

Schilddrüsenchirurgie

Komplikationen

Allgemeine Komplikationen

- Nachblutung (Cave: Kompression der Trachea)
- Infektion
- Verletzung umliegender Strukturen
- Narbenbildung bzw. Keloidbildung
- Sehr selten thyreotoxische Krise (insb. wenn nicht in euthyreoter Stoffwechsellage operiert wird)
- Bei Reoperationen: Deutlich erhöhtes Risiko für Komplikationen (u.a. Verletzungen des N. recurrens oder Hypoparathyreoidismus)
- Siehe auch: Allgemeine postoperative Komplikationen

Spezielle Komplikationen

Parese des N. recurrens

- Parese • Einseitig: Heiserkeit durch eingeschränkte Beweglichkeit der Stimmlippe (Paramedianstellung)
- Parese • Beidseitig: Atemnot möglich, ggf. Intubation oder Tracheotomie notwendig
- Postoperatives Management: Zum Ausschluss postoperative laryngoskopische Kontrolle der Kehlkopffunktion

Substitutionspflichtige Hypothyreose

- Häufigkeit: Bei subtotaler Resektion in etwa 80%, bei fast-totaler Resektion in nahezu 100% der Fälle
- Postoperatives Management: L-Thyroxin-Substitution

Parathyreooprive Tetanie [2][1]

- Definition: Symptomatische Erniedrigung des ionisierten Calciums infolge einer gestörten PTH-Sekretion nach Schädigung bzw. (teilweiser) Entfernung der Nebenschilddrüsen
 - Häufig vorübergehend, Stabilisierung der Calciumwerte innerhalb weniger Wochen
 - Postoperativ wiederholt Serumcalciumbestimmungen notwendig!
- Seltenerer Verlaufsform: Postoperativer Hypoparathyreoidismus
 - Dauerhafte (>6 Monate) Insuffizienz der PTH-Sekretion
 - Typische Laborkonstellation: Serumcalcium ↓, Phosphat ↑, PTH ↓, Magnesium ↓
 - Permanente Substitutionstherapie notwendig
- Therapie: Ab Calciumwerten <2,0 mmol/L kombiniert mit Parathormonwerten <10 pg/mL oder symptomatischer Hypokalzämie [3][4]
 - Kombination aus Calciumsubstitution oral und Calcitriol
 - Im Notfall (tetanischer Anfall) Calciumsubstitution i.v.
 - Ziel: Symptombefreiheit, Vermeidung einer klinisch relevanten Hyperkalzurie durch Einstellung des Serumcalciums im unteren Referenzbereich
 - Cave: Keine Beeinflussung der (PTH-abhängigen) renalen Calciumrückresorption durch die Substitutionstherapie → Gefahr der Hyperkalzurie und konsekutive Nephrokalzinose
 - Ggf. Einsatz von Phosphatbindern (bei therapieresistenter Hyperphosphatämie) und Thiaziden (bei therapieresistenter Hyperkalzurie)
 - Lebenslange Laborkontrollen unter Therapie (Calcium, Phosphat, Kreatinin, Urincalciumausscheidung), Nierensonografien (Ausschluss Nephrokalzinose), augenärztliche Untersuchungen (Ausschluss Katarakt), Notfallausweis aushändigen!
- Siehe auch: Elektrolytstörungen Calcium

Der **N. vagus** ist der größte Nerv des **Parasympathikus** und hat das größte Innervationsgebiet aller Hirnnerven. Im Gegensatz zu den anderen Hirnnerven begrenzen sich seine afferenten und efferenten Fasern nicht auf den Kopf-Hals-Bereich, sondern ziehen bis in den Bauchraum.



N. laryngeus recurrens (speziell viszeroefferent, allgemein viszeroafferent): Zieht um den Aortenbogen (N. laryngeus recurrens sinister) bzw. die A. subclavia (N. laryngeus recurrens dexter) und läuft zurück zum Kehlkopf; hier besteht eine enge topografische Beziehung zur Schilddrüse

- Motorische Innervation der Kehlkopfmuskeln (außer M. cricothyroideus)
- Sensible Innervation der Larynxschleimhaut unterhalb der Glottis

Nervus-vagus-Läsion

Bei einer einseitigen Schädigung des N. vagus kommt es zu verschiedenen Symptomen in Abhängigkeit zur Schädigungshöhe, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein können:

- Schluckstörung (durch den Ausfall der Pharynxmuskulatur)
- Lähmung des Gaumensegels und Abweichung der Uvula zur gesunden Seite (durch den Ausfall der Pharynxmuskulatur; sog. Kulissenphänomen)
- Heiserkeit (durch den Ausfall der Kehlkopfmuskulatur)



RF DM-2
Genetisch
Übernährung

Diabetes mellitus ++

Definition

Metabolische Erkrankung, gekennzeichnet durch eine Erhöhung der Glucose im Blut (Hyperglykämie)

Klassifikation und Ätiologie

- **Diabetes mellitus Typ 1** (früher „juvener Diabetes“)
 - Autoimmun, HLA-Assoziation
 - Assoziation zu anderen Autoimmunerkrankungen: Hashimoto-Thyreoiditis, Typ-A-Gastritis, Glutensensitive Enteropathie, Morbus Addison *NN Insulin*
 - Progrediente Zerstörung der insulinproduzierenden β -Zellen in den Langerhans'schen Inseln des Pankreas \rightarrow Absoluter Insulinmangel \rightarrow Anstieg des Blutzuckers
- **Diabetes mellitus Typ 2** (früher „Altersdiabetes“)
 - Periphere Insulinresistenz mit starker genetischer Prädisposition
 - Meist mit metabolischem Syndrom assoziiert
- **Diabetes mellitus Typ 3** (spezifische Formen durch Erkrankungen des Pankreas -pankreopriver Diabetes-, Endokrinopathien, Medikamente, Infektionen, genetisch -MODY-)
- **Diabetes mellitus Typ 4 (Gestationsdiabetes)**

Pathophysiologie

Insulin

Einzige blutzuckersenkende Hormon (antiglykämischer Effekt), hält das Fett in den Depots (antilipolytischer Effekt), Stimulation der Proteinsynthese (Anabolie), Verschiebung von Kalium in den Intrazellulärraum

Langfristige Folgen

- Mikroangiopathie (bei allen Formen): Nephropathie, Retinopathie und Neuropathie
- Makroangiopathie (vermehrt bei Typ 2): KHK, pAVK, Karotisstenose,...

Symptome/Klinik

Allgemeine Symptome

- Leistungsminderung, Müdigkeit
- Polyurie \rightarrow Polydipsie (bedingt durch die Glucosurie).
- Wadenkrämpfe, Pruritus, Sehstörungen
- Bei absolutem Insulinmangel: Gewichtsabnahme

Klinische Differentialdiagnose

- **Diabetes mellitus Typ 1**
 - Rasche Manifestation des Krankheitsbildes bei meist jungen Patienten
 - Coma diabeticum als Erstmanifestation möglich
 - Häufiges Auftreten im Anschluss an eine Virusinfektion
- **Diabetes mellitus Typ 2**
 - Schleichende Entwicklung bei meist älteren Patienten
 - Häufig als Zufallsbefund
 - Im Verlauf abnehmende Insulinsekretion und zunehmende Hyperglykämie

Diagnostik

Diagnosesicherung Diabetes mellitus

- **Klinische Chemie:** Pathologischer Nüchternblutzucker (nach 8 h Nahrungskarenz)

| | Diabetes mellitus | „Prädiabetes“ | Gesund |
|-----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| Glucose in mg/dL (nüchtern) | ≥ 126 ($\geq 7,0$ mmol/L) | 100–125 (5,6–6,9 mmol/L) = Abnorme Nüchtern glucose | < 100 ($< 5,6$ mmol/L) |

| | DM | Prä-DM | Gesund |
|---|---------------------|--|--------------------|
| HbA _{1c} in % | ≥6,5 | 5,7–6,4 | <5,7 |
| 2-h-Wert des OGTT* in mg/dL | ≥200 (≥11,1 mmol/L) | 140–199 (7,8–11,0 mmol/L) = Pathologische Glucosetoleranz | <140 (<7,8 mmol/L) |
| * OGTT = Oraler Glucosetoleranztest : nur bei unklarer Diagnose angewendet. | | | |

Weitere allgemeine Untersuchungen

- **Urin**
 - **Mikroalbuminurie** als Frühzeichen der diabetischen Nephropathie
 - **Glucosurie**: Die normale Nierenschwelle (seuil) liegt bei 180 mg/dL Glucose im Blut.
- **Autoantikörper** bei Diabetes mellitus Typ 1 : (nur bei unklarer Diagnose) GAD65-AK, IA-2-AK, ICA-AK, Insulin-Autoantikörper (IAA)
- **C-Peptid-Bestimmung**: C-Peptid↓ beim Typ-1-Diabetes

Differentialdiagnosen

- Diabetes insipidus
- Hyperthyroidie
- Nephropathie

| | Diabetes mellitus Typ 1 | Diabetes mellitus Typ 2 |
|---------------------------|---|---|
| Häufigkeit | 15% | 85% |
| Vererbung | HLA-Assoziation | Keine HLA-Assoziation, aber starke genetische Disposition |
| Pathogenese | Absoluter Insulinmangel | Initial Insulinresistenz |
| Körperbau | Asthenisch | Adipös |
| Beginn | Akute Dekompensation meist zwischen 15. u. 25. Lebensjahr | Langsam, meist >40. Lebensjahr |
| C-Peptid (Insulin) | Niedrig bis fehlend | Anfangs hoch |
| Stoffwechsellaage | Labil | Stabil |
| Ketoseneigung | Hoch | Gering |
| Therapie | Insulintherapie immer erforderlich | Life-Style-Schulung → Medikamente → Insulin |

Therapie

Beim Typ-1-Diabetiker immer eine Insulintherapie erforderlich. Für Typ-2-Diabetiker gibt es konservative Therapieansätze (Gewichtsreduktion, Antidiabetika).

Allgemeine Maßnahmen

- **Tabakkarenz**
- körperliche **Aktivität**
- **Blutdruck- und Cholesterinwert-Einstellung**
- **Diätetische Maßnahmen** :
 - Typ-2-Diabetiker: **energiereduzierte Kost**
 - Typ-1-Diabetiker: optimale Abstimmung von Kohlenhydrataufnahme und Insulinzufuhr
 - **Empfehlungen** : Häufige **kleine Mahlzeiten**. Zusammensetzung der Nahrung: 55% Kohlenhydrate, 25% Fette, 20% Eiweiße. Erhöhung des Anteils langsam resorbierbarer Kohlenhydrate und Reduktion der Aufnahme einfacher Zucker wie Glucose und Saccharose. Ballaststoffreiche Ernährung

Typ-2-Diabetiker

- **Stufenschema für Typ-2-Diabetiker** : Grundsätzlich ist ein HbA_{1c} -Wert zwischen 6,5% und 7% anzustreben. Jede Stufe wird für 3–6 Monate angewandt

| | |
|------------------|---|
| Stufe I | Basistherapie: Tabakkarenz, körperliche Aktivität, Ernährungstherapie, Gewichtsnormalisierung, Schulung |
| Stufe II | Monotherapie: 1. Wahl Metformin |
| Stufe III | - Metformin + Zweites orales Antidiabetikum - oder Metformin + Insulin (Basal unterstützte orale Therapie –BOT– : orale Antidiabetika + langwirksames Insulin) |
| Stufe IV | Intensivierte Insulintherapie , ggf. in Kombination mit oralen Antidiabetika (insb. Metformin) |

Insulintherapie

Grundlagen der Insulintherapie

- **Basal/Prandial:** Das Verhältnis beträgt ca. 1:1
- **Korrekturdosierungen bei Nahrungsaufnahme:** Die prandialen Insulindosen richten sich nach der aufgenommenen Menge Kohlenhydrate
 - Eine IE Insulin senkt i.d.R den Blutzucker um etwa 30–40 mg/dL
 - Eine Kohlenhydrateinheit (KE) entspricht etwa 10 g Kohlenhydraten und erhöht den BZ um 30–40 mg/dL (Broteinheit : BE entspricht 12 g Kohlenhydraten)
 - Es wird also grob (grossièrement) etwa 1 IE für 1 KE benötigt

Die Bestimmung des Insulinbedarfs ist immer individuell ++

Insulintherapieschemata

- **Konventionelle Insulintherapie** : Kombination aus Normalinsulin und NPH-Insulin morgens und abends
*→ morgens und abends injizierten Mischinsulin (Normalinsulin und Verzögerungsinsulin).
 ← strikt, nicht flexibel → kaum bei Typ 1*

- **Intensivierte Insulintherapie:**

- **Intensivierte konventionelle Insulintherapie (Basis-Bolus-Prinzip, ICT) :**

Langwirksame Basalinsuline (Insulin Glargin) einmal täglich + Normalinsulin dreimal täglich
LA SA SA

- **Insulinpumpe** : Externe Pumpe mit kontinuierlicher Applikation von Normalinsulin. Basal- und Bolusgaben können individuell eingestellt werden

Probleme bei der Insulintherapie

- **Dawn-Phänomen** : Frühmorgendliche Hyperglykämie.
- **Somogyi-Effekt** : nächtlicher Hypoglykämie, die durch hormonelle Gegenregulation eine postprandiale Hyperglykämie am Morgen verursacht

Komplikationen

Akute Komplikationen

- Schwere Hyperglykämien bis hin zum hyperglykämischen Koma
- Unter Therapie: Hypoglykämien

Diabetische Makroangiopathie

- Koronare Herzkrankheit, Carotisstenosen (Schlaganfall), periphere arterielle Verschlusskrankheit *pAVK*
- Mönckeberg-Mediasklerose

Diabetische Mikroangiopathie

- Diabetische Nephropathie
- Diabetische Retinopathie
- Diabetische Neuropathie
- Diabetisches Fußsyndrom

Entscheidend zur Vorbeugung einer Mikroangiopathie ist eine strenge Blutzuckereinstellung!

Diabetische Nephropathie

- **Klinik** : Progrediente Niereninsuffizienz + Arterielle Hypertonie
- **Diagnostik** : Initial Mikroalbuminurie. Im Verlauf Makroalbuminurie
- **Therapie** : Reduzierte Proteinzufuhr
- **Prävention**: Eine optimale Einstellung des Blutzuckers und eine konsequente antihypertensive Therapie können die Krankheitsprogression deutlich verzögern

Diabetische Retinopathie

- **Symptome**: Lange symptomlos, später Sehverschlechterung bis Erblindung
- **Therapie** : retinale Laserkoagulation

Diabetische Neuropathie

- **Periphere sensomotorische Polyneuropathie (80%)**: Vor allem distal und symmetrisch: Parästhesien, Areflexie, Schmerzempfinden↓ → Schmerztherapie
- **Autonome diabetische Neuropathie** : Stummer Herzinfarkt, Gastroparese, erektile Dysfunktion, Blasenatonie → Symptomatische Therapie

Diabetische Fußsyndrome

- **Neuropathischer diabetischer Fuß**
 - Häufigste Form des diabetischen Fußes
 - **Klinik**: Warme, trockene Haut.
 - **Diagnostik** : Sensibilität↓, Fußpulse tastbar
 - **Komplikationen** : **Malum perforans** (neuropathisches Ulkus, insb. an Fußballen und Ferse), Diabetisch-neuropathische Osteoarthropathie
 - **Ischämischer Fuß bei pAVK** : Kühler, blasser Fuß mit fehlenden Fußpulsen
- Bei etwa 1/3 der Patienten mit diabetischem Fußsyndrom handelt es sich um eine kombinierte Form aus ischämischem und neuropathischem Fuß!

Prognose

- Entscheidend für die Prognose ist die **Blutzuckereinstellung** sowie die Mitbehandlung von Komorbiditäten (Hypertonie, Hyperlipidämie)
- Todesursachen sind meist Myokardinfarkt und Nierenversagen

Prävention

- Screening der Nüchtern-Blutzuckerwerte (Personen >35. Lebensjahr, alle zwei Jahre)
- Gewichtsnormalisierung, körperliche Aktivität

Diabetische Fußsyndrome +

- **Diabetisches Fußsyndrom:** Folge der Angiopathie und/oder Neuropathie zusammen mit erhöhter Infektanfälligkeit.
- **Neuropathischer diabetischer Fuß**
 - Häufigste Form des diabetischen Fußes
 - **Klinik:** Warme, trockene Haut
 - **Diagnostik**
 - Sensibilität und Vibrationsempfinden↓
 - Schmerz- und Temperaturempfinden↓
 - Fußpulse tastbar
 - **Komplikationen**
 - **Malum perforans** (neuropathisches Ulkus): Schmerzlose neuropathische Ulzera (insb. an Fußballen und Ferse), die Ausgangspunkt für eine lebensgefährliche Phlegmone sein können
 - **Diabetisch-neuropathische Osteoarthropathie** : Deformierende Erkrankung der Gelenke und Knochen
 - Fehlstellungen, Osteolysen, Frakturanfälligkeit, Destruktion des Fußskeletts
- **Ischämischer Fuß bei pAVK**
 - **Klinik:** Kühler, blasser Fuß mit fehlenden Fußpulsen

| neuropathischer Fuß | | ischämischer Fuß |
|--|------------------------|--|
| evtl. nächtliche Schmerzen, Pelzigkeitsgefühl | Anamnese | Belastungs-, später Ruheschmerz |
| rosige Haut, Hyperkeratosen und <i>schmerzlose</i> Drucknekrosen oder -ulzera an druckbelasteten Stellen („Malum perforans“) | Inspektion | atrophisch-livide Haut, <i>schmerzhaft</i> e Ulzera |
| warme, trockene Haut, vorhandene Fußpulse | Palpation | kühler Vorfuß/Zehen, fehlende Fußpulse |
| reduziertes Vibrationsempfinden Dopplerdrucke > 60 mmHg | Basisdiagnostik | unauffälliges Vibrationsempfinden, Dopplerdrucke < 60 mmHg |

- **Therapie und Prävention**
 - Regelmäßige ärztliche und pflegerische Inspektion der Füße
 - Fußpflege
 - Tägliche Pflege
 - Verletzungen vermeiden
 - Nagelpflege
 - Phasenweise **Entlastung bei Deformitäten**, ggf. Versorgung mit orthopädischen Schuhen
 - Phasengerechte **Wundbehandlung** und Sicherung der Wundversorgung
 - Chirurgische Mitbehandlung und ggf. Débridement bei nekrotischen Wundanteilen

„- Bei etwa 1/3 der Patienten mit diabetischem Fußsyndrom handelt es sich um eine kombinierte Form aus ischämischem und neuropathischem Fuß!

- Bei mangelhafter Durchblutung sollte von einer Exzision eines diabetischen Ulkus ohne vorherige, erfolgreiche Revaskularisation abgesehen werden, da aufgrund der schlechten Wundheilung die Gefahr besteht, dass hierdurch lediglich ein noch größerer Defekt geschaffen wird!“

Insuline +/-

| Insuline | Wirkung | Einsatzmöglichkeiten | Besonderheiten |
|---|--|---|--|
| Normalinsulin (Altinsulin) <i>(Humaninsulin)</i> <i>(Actrapid)</i> | <ul style="list-style-type: none"> Beginn: 15–30 min Maximum: 1–3 h Dauer: 5–8 h | <ul style="list-style-type: none"> Akut zur Senkung des Glucosespiegels Konventionelle Insulintherapie Intensivierte konventionelle Insulintherapie: Zu den Mahlzeiten | <ul style="list-style-type: none"> Spritz-Ess-Abstand notwendig: 15–30 min Intravenöse Therapie möglich (einziges Insulin) |
| Schnell- und kurzwirksame Insulinanaloga („Bolus-Insuline“) | | | |
| Insulin Lispro Insulin Aspart | <i>sofort</i> <ul style="list-style-type: none"> Beginn: 5–15 min Maximum: 1 h Dauer: 2–3 h | <ul style="list-style-type: none"> Intensivierte konventionelle Insulintherapie: Zu den Mahlzeiten | <ul style="list-style-type: none"> Kein Spritz-Ess-Abstand notwendig |
| Verzögerungsinsuline und langwirksame Insulinanaloga | | | |
| NPH-Insuline Neutral Protamin Hagedorn. | <ul style="list-style-type: none"> Beginn: 45–90 min Maximum: 4–10 h Dauer: 10–20 h | <ul style="list-style-type: none"> Konventionelle Insulintherapie Bei therapierefraktärem Diabetes mellitus Typ II als supportives Basalinsulin (BOT) | <ul style="list-style-type: none"> Spritz-Ess-Abstand notwendig: 30–60 min |
| Insulin Glargin Insulin Detemir | <ul style="list-style-type: none"> Beginn: 2–4 h Maximum: Langes Plateau Dauer: ca. 24 h | <ul style="list-style-type: none"> Intensivierte konventionelle Insulintherapie: Als Basalinsulin Bei therapierefraktärem Diabetes mellitus Typ II als supportives Basalinsulin (BOT) | <ul style="list-style-type: none"> Insulinanaloga längere Wirkdauer als NPH-Insuline |
| Kombinationsinsuline (Mischinsuline) | | | |
| Kombinationsinsuline | <ul style="list-style-type: none"> Biphasische Wirkung Kurzfristig wie Normalinsulin Langfristig wie ein NPH-Insulin | <ul style="list-style-type: none"> Konventionelle Insulintherapie | <ul style="list-style-type: none"> Enthalten Normalinsulin und NPH-Insulin z.B. Actraphane® 30/70, 30% Normalinsulin und 70% NPH-Insulin |
| Gemeinsame Nebenwirkungen | <ul style="list-style-type: none"> Hypoglykämien Gewichtszunahme Lipodystrophie an der Injektionsstelle Insulinresistenz Morgendliche Hyperglykämie | | |

Endogenes Insulin hat eine Halbwertszeit von 5 min und

- wirkt hauptsächlich auf Leber, Muskulatur und Fettgewebe,
- bindet dort an membranständige Insulinrezeptoren (Tyrosinkinaserzeptoren),
- steigert u. a. die Synthese von Glykogen, Proteinen und Fettsäuren und hemmt deren Abbau und • fördert die Glukoseaufnahme in Fett- und Muskelzellen.

Antidiabetika +

4 Beispiele mit Wirkung und Nebenwirkung

| Wirkstoffgruppe | Wirkung | Nebenwirkungen | Kontraindikationen |
|--|--|---|---|
| Biguanide (Metformin) <i>Vorteile: keine Hypoglykämie ↓ Gewicht Metabolisch syn. beeinflusst geringe NW</i> | <ul style="list-style-type: none"> Verstärkung der Insulinwirkung Hemmung der hepatischen Glukosefreisetzung durch (Hemmung der Glukoseneogenese) | <ul style="list-style-type: none"> Laktatazidose Gewichtsabnahme (eher vorteilhaft!) Häufig gastrointestinale Störungen (Diarrhö, Bauchkrämpfe) | <p><i>Schwangerschaft alle azidotischen und hypotonischen Zustände</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Schwere Niereninsuffizienz (GFR <30 mL/min) Herzinsuffizienz NYHA III und IV Chronische respiratorische Insuffizienz <i>perioperativ, vor jodhaltigen KM-Gabe</i> |
| Sulfonylharnstoffe (Glimepirid) <i>KA</i> | <ul style="list-style-type: none"> Erhöhung der Insulinsekretion <i>unabhängig von Glucagonrezeptor</i> Hemmung des ATP-abhängigen K⁺-Kanals in den β-Zellen der Pankreas ⇒ ↑ Insulin | <ul style="list-style-type: none"> Hypoglykämie Gewichtszunahme(!) | <ul style="list-style-type: none"> Schwere Niereninsuffizienz oder Leberinsuffizienz <i>Schwangerschaft und Stillzeit</i> DM Type 1 <i>KI</i> <i>Perioperativ</i> <i>Alle akute Stoffwechselentgleisungen</i> |
| Glinide (Repaglinid) <i>KA</i> <i>Analoge</i> | <ul style="list-style-type: none"> abhängig von sensorischer Pankreas | | |
| DPP-4-Inhibitoren (Sitagliptin) Dipeptidyl-Peptidase-4 Inhibitoren <i>Gliptine</i> | <ul style="list-style-type: none"> Erhöhung der glucoseabhängigen Insulinausschüttung <i>Inkretin-abbau hemmen</i> | <ul style="list-style-type: none"> Gastrointestinale Beschwerden (häufig) | |
| GLP-1-Analoga (Exenatid) <i>glucagon-like peptide 1</i> Inkretinmimetika | <ul style="list-style-type: none"> Erhöhung der glucoseabhängigen Insulinausschüttung <i>Inkretinwirkung imitieren</i> | <ul style="list-style-type: none"> Gastrointestinale Beschwerden Gewichtsabnahme | <ul style="list-style-type: none"> Schwere Niereninsuffizienz |
| SGLT-2-Inhibitoren (Empagliflozin) <i>SGLT-2 (sodium-dependent glucose transporter).</i> | <ul style="list-style-type: none"> Vermehrte renale Glucoseausscheidung (SGLT-2-Hemmung) Kardioprotektiv bei Herzinsuffizienz | <ul style="list-style-type: none"> Harnwegsinfektionen Polyurie | <ul style="list-style-type: none"> Niereninsuffizienz (GFR <60ml/min) |
| α-Glucosidasehemmer (Acarbose) | <ul style="list-style-type: none"> Verminderung der enteralen Glucoseresorption | <ul style="list-style-type: none"> Gastrointestinale Störungen <i>Meteorismus, Diarrhö</i> | <ul style="list-style-type: none"> Verdauungsstörungen (CED) Schwere Niereninsuffizienz |
| Glitazone (Pioglitazon) <i>PPAR-γ Agonisten</i> | <ul style="list-style-type: none"> Verminderung der Insulinresistenz Proteinsynthese verändert und weniger hyperglykämiefördernde Proteine abgegeben werden. | <ul style="list-style-type: none"> Gewichtszunahme(!) kardiale Dekompensation <i>Ödem</i> | <ul style="list-style-type: none"> Herzinsuffizienz |

Orale Antidiabetika:

- **Biguanide (Metformin)** verzögern die Glukoseresorption aus dem Darm und **hemmen die hepatische Glukoneogenese**. Sie verstärken die Aufnahme von Zucker in die Muskulatur und wirken appetitzügelnd, was zu Gewichtsabnahme führen kann. Mittel der Wahl bei übergewichtigen Typ-2-Diabetikern
- **Glitazone** sind **Insulin-Sensitizer**, d. h. sie **vermindern die muskuläre Insulin-Resistenz**, was die Wirkung des endogenen Insulins verstärkt. Zusätzlich wirken sie sich günstig auf das Gefäßendothel aus und können neben einer Lipidsenkung und Reduzierung der Albuminurie eine leichte Blutdrucksenkung bewirken.
- **Sulfonylharnstoffe stimulieren die Insulinsekretion aus den Beta-Zellen**. Sie können bei Diabetikern mit ausreichender Insulinsekretion eingesetzt werden. Eine vorherige Gewichtsreduktion ist ratsam, da sie ein bestehendes metabolisches Syndrom verstärken können. Zudem können sie aufgrund der verstärkten Insulinwirkung Hypoglykämien auslösen.
- **Glinide** ähneln in ihrer Wirkung den Sulfonylharnstoffen, haben aber eine **kürzere und schnellere Wirkung**. Sie führen ohne Glukose nicht zu einer Insulinfreisetzung und verursachen daher seltener eine Hypoglykämie.

DM Type 1 \Rightarrow DKA
DM Type 2 \Rightarrow hyperosmolares Koma

Hyperglykämisches Koma +

Das hyperglykämische Koma (Coma diabeticum) ist eine schwere Komplikation des Diabetes mellitus; je nach Diabetestyp werden zwei Formen unterschieden: Bei Typ-1-Diabetikern mündet die hyperglykämische Entgleisung in eine diabetische Ketoazidose. Auslöser sind eine fehlende Insulinzufuhr (bspw. bei Erstmanifestation) oder Zustände eines gesteigerten Insulinbedarfs (bspw. Operationen, Infektionen). In Abgrenzung hierzu verläuft eine hyperglykämische Entgleisung bei Typ-2-Diabetikern als hyperosmolares Koma.

Pathophysiologisch unterscheiden sich beide Formen in der Entstehung von Ketonen bei Typ-1-Diabetikern, die bei Typ-2-Diabetikern aufgrund einer Restsekretion von Insulin ausbleibt. Die Blutzuckerbestimmung ist bei jeder Bewusstlosigkeit sinnvoll und erlaubt die Sicherung einer Hyperglykämie. Bei beiden Formen des diabetischen Komas ist eine bedarfsgerechte Rehydratation und die Balancierung der Elektrolyte vordergründig. Die Senkung des erhöhten Blutzuckers darf in diesem Zusammenhang nur langsam unter engmaschiger klinischer und laborchemischer Überwachung erfolgen.

سكت
لا يفر

Ätiologie

- Fehlende oder ungenügende exogene Insulinzufuhr
- Situativ erhöhter Insulinbedarf
 - Infektionen++
 - Akute Erkrankungen : z.B. Myokardinfarkt, Operationen
 - Medikation insb. Glucocorticoide, Thiaziddiuretika

Pathophysiologie

Ketoazidotisches Koma (vorwiegend bei Typ-1-Diabetikern)

- Insulinmangel \rightarrow Hyperglykämie \rightarrow Hyperosmolarität \rightarrow Osmotische Diurese und Elektrolytverlust \rightarrow Hypovolämie (Flüssigkeitsdefizit: ca. 6-8 Liter)
- Insulinmangel \rightarrow Lipolyse \uparrow \rightarrow Hepatische Ketonkörperbildung \rightarrow Ketose \rightarrow Metabolische Azidose (\rightarrow Erbrechen \rightarrow Hypovolämie)

Hyperosmolares Koma (vorwiegend bei Typ-2-Diabetikern)

- Die Pathogenese ist ähnlich wie beim ketoazidotischen Koma, jedoch reichen die geringen Mengen des noch vorhandenen Insulins aus, um die Lipolyse zu hemmen und somit eine Ketose zu verhindern.

Symptome/Klinik

- Gemeinsame Symptome
 - Polyurie, Polydipsie
 - Übelkeit, Erbrechen
 - Exsikkose, Hypotonie, Kollapsneigung
 - Bewusstseinstörung
- Besondere Symptome des ketoazidotischen Komas
 - Zügiger Beginn (<24h) im Vergleich zum hyperosmolaren Koma
 - Bauchschmerzen (Pseudoperitonitis diabetica/Pseudappendizitis diabetica)
 - Nach Azeton riechender Atem
 - Kußmaul-Atmung: tiefe Atemzüge (Hyperventilation) bei normaler Frequenz = respiratorische Kompensation der (metabolischen) Ketoazidose

Diagnostik

Labor

- Blut: Glucose (aus Kapillarblut, dann im venösen Blut), Elektrolyte (Natrium, Kalium, Magnesium, Chlorid, Phosphat), Harnstoff, Kreatinin, Blutbild, CRP, HbA1c, BGA
- Urin: Ketone und Glucose im Urinstatus prüfen

Blutglucose

- **Diabetische Ketoazidose** : I.d.R. Werte um 400-700 mg/dl
- **Hyperosmolares Koma** : I.d.R. sehr hohe Werte um 600-1200 mg/dl
- **Orientierende Faustregel**
 - <700 mg/dL : Ketoazidotisches Koma
 - >700 mg/dL : Hyperosmolares Koma

„Die Ketoazidose ist durch die charakteristische Trias aus Hyperglykämie, Ketonnachweis und metabolischer Azidose mit positiver Anionenlücke charakterisiert!“

Differentialdiagnosen

| | Hyperglykämisches Koma | Hypoglykämischer Schock |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Entwicklung | Langsam (Tage) | Schnell (Minuten) |
| Appetit | Kein Appetit | ↑↑ |
| Durst | ↑↑ | Ø (unverändert) |
| Muskeltonus | ↓↓ (keine Krämpfe!) | ↑↑ (Tremor) |
| Transpiration | ↓↓ (trockene Haut) | ↑↑ (feuchte Haut) |
| Atmung | ↑↑ (Kußmaul-Atmung bei Ketoazidose) | Ø (unverändert) |

Differentialdiagnosen der metabolischen Azidose mit Anionenlücke

- Dekompensierte Niereninsuffizienz bzw. akutes Nierenversagen
- Laktatazidose (Bestimmung des Serumlaktats)

Therapie

Säulen der Therapie

- **Intensivmedizinische Therapie!**
 - **Flüssigkeitssubstitution** (unter Kontrolle der Flüssigkeitsbilanz)
 - NaCl-Lösung: 1000 ml NaCl 0,9 % in der 1. Stunde
 - Danach in Abhängigkeit von ZVD oder Urinausscheidung unter Beachtung des Serumnatriums im Verlauf
 - **Insulingabe** (unter engmaschigen Blutzuckerkontrollen)
 - Low-Dose-Schema mit Normalinsulin: Der Blutzucker sollte pro Stunde maximal um ca. 50 mg/dl gesenkt werden und vorerst nicht unter 250 mg/dl fallen
 - **Engmaschige Elektrolytkontrolle ggf. -ausgleich**
 - **Bikarbonatgabe** (unter Kontrolle des Säure-Basen-Status): In Ausnahmesituationen bei pH-Werten <6,9
- „- Flüssigkeitsbilanz, Blutzucker, Elektrolyte und Säure-Basen-Status müssen in festen Zeitintervallen unter intensivstationären Bedingungen kontrolliert werden!
- Bei diabetischer Ketoazidose soll parallel zur Insulintherapie eine angepasste Kaliumzufuhr erfolgen.

Prävention weiterer Episoden: Nach erfolgter Therapie eines Coma diabeticum jedem Patienten eine diabetologische Betreuung empfehlen“

Komplikationen

- **Hypoglykämie**: Folge einer übermäßigen Insulintherapie oder einer Überwässerung
- **Hypokaliämie**: Folge einer zu schnellen Korrektur von Azidose und Hyperglykämie
- **Lungenödem**: Folge einer Überwässerung

- IMC, IS
 - NaCl 9% 1L/1.Stunde
 - Insulin low dose schone
 nicht <250 mg/dl
 nicht >50 mg/dl stunde
 - Elektrolyten ausgleich
 - Na-Bicarb
 - Prävention

Hypoglykämie (Unterzuckerung) +/-

Definition

- **Blutzucker (BZ) < 50 mg/dL (2,8 mmol/L)**
 - asymptotische Hypoglykämie (ohne Symptomatik)
 - symptomatische Hypoglykämie (mit Symptomatik)
- **Sicherer Nachweis einer Hypoglykämie: Whipple Trias**
 1. Hypoglykämische Symptomatik (s.u.)
 2. Niedriger Blutzuckerwert
 3. Milderung der Symptomatik bei Anhebung des Glucosespiegels
- „Hypoglykämischer Schock“: **schwere** symptomatische Hypoglykämie mit **Bewusstlosigkeit**

Ätiologie

Allgemeine begünstigende Faktoren

- **Unzureichende Nahrungsaufnahme**
- **Alkoholkonsum**
- **Starke körperliche Belastung**

Hypoglykämie bei Diabetikern

- **Überdosierungen blutzuckersenkender Medikamente** : Insulin, Antidiabetika (insb. Sulfonylharnstoffe und Glinide)
- **Reaktive Form**: Postprandial in der Frühphase des Diabetes mellitus Typ 2

Hypoglykämie bei erwachsenen Nicht-Diabetikern

- **Alkoholkonsum, Cannabiskonsum**
- **Postprandiale Formen (nach Gastrektomie)** *Spät Dumping*
- **Endokrinologische Ursachen** : Nebennierenrindeninsuffizienz, Hypopituitarismus
- **Insulinom**
- **Paraneoplasie**

Symptome/Klinik

Die Symptome entwickeln sich häufig innerhalb weniger Minuten!

- **Symptome der autonomen Gegenregulation** : Schwitzen, **blasse Haut**, Tachykardie, **Tremor**, **Heißhunger**, Erbrechen
- **Neuroglucopenische Symptome**: **Unruhe, Verwirrtheit, Kopfschmerzen**. Reizbarkeit, Aggressivität. **Konvulsionen**, fokale Zeichen (**Paresen, Parästhesien**). Müdigkeit → Apathie → Somnolenz → Koma
- **Differentialdiagnose: Hyperglykämisches Koma vs hypoglykämischer Schock**

| | Hyperglykämisches Koma | Hypoglykämischer Schock |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Entwicklung | Langsam (Tage) | Schnell (Minuten) |
| Appetit | Kein Appetit | ↑↑ |
| Durst | ↑↑ | Ø (unverändert) |
| Muskeltonus | ↓↓ (keine Krämpfe!) | ↑↑ (Tremor) |
| Transpiration | ↓↓ (trockene Haut) | ↑↑ (feuchte Haut) |
| Atmung | ↑↑ (Kußmaul-Atmung bei Ketoazidose) | Ø (unverändert) |

Diagnostik

Anamnese

- **Begünstigende Faktoren klären** : Körperliche Aktivität, Nahrungsmittelaufnahme, Alkoholkonsum, Medikamentenanamnese (B-Blocker,...)

ASS, Coumarine

Labordiagnostik

- **Basisdiagnostik**: Blutzuckermessung
- Bei jedem Notfall mit Störung der Vigilanz muss eine Bestimmung des Blutzuckerwerts noch vor Ort durchgeführt werden!

Erweiterte Labordiagnostik durch einen Fastentest

- Der Fastentest ist der Goldstandard der Hypoglykämie-Abklärung und wird erforderlich, wenn keine ätiologische Zuordnung erfolgen kann.
- Der Patient wird maximal 72 Stunden unter Hungerbedingungen stationär überwacht
- Serumglucose↓, **Insulin**↑, C-Peptid↑: Hinweis auf autonome Insulinproduktion oder Sulfonylharnstoff-Überdosierung

نمطية الـ Insulin، غلج الجوز، نقص السكر

Therapie

Symptomatisch: Glucosegabe

- **Erhaltenes Bewusstsein**: Glucosegabe p.o. (Getränke und Süßigkeiten)
- **Bewusstlosigkeit**: Gabe von 8-24 g Glucose in eine laufende Infusion (20-60 mL Glucose 40%, 40-120 mL Glucose 20%). Fortlaufende Dauertropfinfusion mit Glucose 5% bis zur Erreichung eines Plateaus mit einem Blutzucker von 200 mg/dL (11,1 mmol/L).
- **Alternative**: Glucagon i.m. oder s.c.

Kausale Therapie: Abklärung und Behebung der Ursache

- Therapieanpassung bei Diabetikern und Schulung des Patienten

- 20-60 ml Glu 40%
- 40-120 ml Glu 20%
- Dauereinfusion mit Glu 5%
- Ziel 200mg/dl

alte Glucagon

primär sekundär tertiär

angeboren
erworben

Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) +

Ätiologie

- **Primäre Hypothyreose:** ♀ > ♂ (4:1)
 - **Hashimoto-Thyreoiditis:** Autoimmune Genese
 - **Iatrogen:** Amiodaron (kann sowohl eine Hypo- als auch eine Hyperthyreose auslösen)
 - **Extremer Jodmangel**
- **Sekundäre Hypothyreose:** Hypophysenvorderlappeninsuffizienz → TSH-Mangel
- **Tertiäre Hypothyreose:** Hypothalamische Insuffizienz (TRH-Mangel)

Symptome/Klinik

- **Ermüdbarkeit**, Erschöpfung, Apathie, Depressivität. Verlangsamung, Hyporeflexie
- **Kälteintoleranz**, Gewichtszunahme, **Obstipation**
- Kühle, trockene Haut. **Haarausfall**. Hypohidrose
- **Bradykardie**, ggf. Herzinsuffizienz
- Sekundäre **Amenorrhö** bzw. Zyklusanomalien
- **Generalisiertes Myxödem:** Teigig geschwollene, trockene Haut.

Diagnostik

- **Labor:**
 - **Hormone:**

| | | | |
|------------------------|------------------------|------|--|
| Manifeste Hypothyreose | Primäre Hypothyreose | TSH↑ | fT ₄ ↓ (fT ₃ ist für den Nachweis einer Hypothyreose nicht besonders aussagekräftig) |
| | Sekundäre Hypothyreose | TSH↓ | |
| | Latente Hypothyreose | TSH↑ | fT ₃ , fT ₄ normal |

- **Schilddrüsen-Antikörper:** Insb. **Anti-TPO** und **Thyreoglobulin-Antikörper**
- Screening auf Hyperlipidämie, Hypercholesterinämie, Hypoglykämie

Tg AK

Schilddrüsenultraschall

diffuse Echoarmut
verkleinerte SD

Anti-Thyreoperoxidase

Differentialdiagnosen

- Sekundäre und tertiäre Hypothyreose
- Schilddrüsenkarzinom Echoarmut, Inhomogen
- Herzinsuffizienz
- Depression

Therapie

- **Manifeste Hypothyreose:** Lebenslange L-Thyroxin-Substitution unter regelmäßiger Kontrolle von TSH
- **Latente Hypothyreose:**
 - Bei TSH ≤ 10 mU/L : Keine generelle Empfehlung einer Hormonsubstitution
 - Bei TSH > 10 mU/L : Indikation für eine Therapie

Komplikationen

Myxödemkoma (sehr selten)

- **Klinik:** Hypothermie, Myxödem, Hypoventilation, Hypotonie und Bradykardie. Schocksymptomatik
- **Therapie:** Intensivmedizinische supportive Behandlung mit Zufuhr von Flüssigkeit, Elektrolyten, L-Thyroxin i.v., Glucocorticoide, Langsame Erwärmung

Kongenitale Hypothyreose

Symptomatik

- Nach der Geburt: Hypothermie, Apathie, Ikterus, Muskelhypotonie, Obstipation, Nabelhernie
- Im weiteren Verlauf: Gedeihstörungen, geistige Retardierung (**Kretinismus**)

Diagnostik

- **Neugeborenenscreening am 3. Lebenstag:** TSH↑

Therapie der kongenitalen Hypothyreose

- L-Thyroxin-Substitution

- **Prävention:** Jodsupplementation aller Schwangeren

Hashimoto-Thyreoiditis

- ♀ > ♂ (9:1). Assoziation zu anderen Autoimmunerkrankungen :
 - **Polyendokrines Autoimmunsyndrom:** Hashimoto-Thyreoiditis mit Diabetes mellitus Typ 1, Morbus Addison *prim. NNK-Insuffizienz*

PEC 1

Symptome/Klinik

- **Frühstadium:** Meist asymptomatisch (Zu Beginn passagere Hyperthyreose möglich)
- **Spätstadium:** Klinik der Hypothyreose

+ Diagnostik

Klinische Chemie

- **Antikörpernachweis**
 - **TPO-AK** ↑ (= Thyreoid-Peroxidase-Antikörper): Bei 90% der Patienten (auch ↑ bei Morbus Basedow in 70% der Fälle)
 - **Tg-AK** ↑ (= Thyreoglobulin-Antikörper): Bei 50% der Patienten
- **Schilddrüsenstoffwechsel**
 - **Frühstadium:** Vorübergehende Hyperthyreose möglich
 - **Spätstadium:** Hypothyreose

Apparative Diagnostik

- **Schilddrüsensonographie:** Schilddrüse echoarm mit inhomogener Gewebestruktur. Meist verkleinerte Schilddrüse
- **Szintigraphie:** Technetium-Uptake ↓

Differentialdiagnosen

- **Thyreoiditis de Quervain:** Subakut verlaufende Entzündung der Schilddrüse unklarer Ätiologie, die gehäuft nach viralen Atemwegsinfektionen auftritt. Meistens Spontanheilung, Symptomatische Therapie mit NSAR.
- **Riedel-Thyreoiditis („eisenharte Struma“):** Autoimmunthyreoiditis. „Eisenharte“ Struma mit Kompressionssymptomatik
- **Postpartum-Thyreoiditis (PPT):** Autoimmunthyreoiditis
- **Akute eitrige Thyreoiditis**

Therapie

- **L-Thyroxin-Substitution:** Analog zur Therapie der Hypothyreose

Struma (Kropf)

- **Definition:** Schilddrüsenvergrößerung, unabhängig von Ätiologie und Stoffwechsellaage der Schilddrüse. Deutschland ist ein Struma-Endemiegebiet!

- Die häufigste **Ursache** einer Struma ist der **Iodmangel**. Aufgrund der verminderten Aufnahme von Iod kommt es zu einer Hyperplasie der Thyreozyten.

- Die körperliche Untersuchung ist bei der **Diagnostik** der Struma wegweisend, weitere apparative Verfahren werden bei bestimmten Verdachtsdiagnosen ergänzt.

- **Therapie:** Während die euthyreote Struma ohne Autonomie auf die Gabe von Iodid ggf. in Kombination mit Levothyroxin sehr gut anspricht (Regredienz der Struma), findet bei großen Strumen bzw. Schilddrüsenautonomie die Radioiodtherapie Anwendung. Bei strumabedingter Komprimierung von relevanten Strukturen des Halses oder Malignitätsverdacht sind operative Verfahren indiziert.

Schilddrüsenkarzinom +

Ätiologie

- Genetische Faktoren (v.a. beim medullären Karzinom)
 - MEN 2, MEN 3
- Ionisierende Strahlung

Klassifikation

Histologische Klassifikation

| TM Thyreoglobulin + Calcitonin Diagnostik + Verlaufskontrolle | Karzinom | Tumorgewebe | Ausgangsgewebe | Charakteristika | Häufigkeit | Altersgipfel | OP + Radioiod. OP + Externe Strahlen OP ausreichend |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|--|------------|-----------------|--|
| | Papilläres Schilddrüsenkarzinom | Differenziert | Thyreozyten | <ul style="list-style-type: none"> • Lymphogene, zunächst <u>zervikale</u> Metastasierung • <u>multifokales</u> Auftreten möglich | 60% | 25. - 50. LJ | |
| | Follikuläres Schilddrüsenkarzinom | | | <ul style="list-style-type: none"> • Hämatogene Metastasierung (<u>Lunge, Knochen</u>) • <u>Selten</u> multifokales Auftreten | 30% | 50. LJ | |
| | Anaplastisches Schilddrüsenkarzinom | Undifferenziert | | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Schnelles</u> lokales Wachstum • <u>Lymphogene und hämatogene</u> Metastasierung | 5% | Nach dem 60. LJ | |
| | Medulläres Schilddrüsenkarzinom | Differenziert | C-Zellen | <ul style="list-style-type: none"> • Bei familiärem Auftreten (15%): MEN 2, MEN 3 • Sporadisch (85%) | 5% | 50.-60. LJ | |

TNM-Klassifikation

Inoperable Tumoren \Rightarrow Palliative Chemo

Symptome/Klinik

- **Kaum Frühsymptome:** Ggf. derber, schmerzloser Strumaknoten
- **Okkulte Schilddrüsenkarzinome:** Zufallsbefund in 50% der Fälle
- **Spätsymptome**
 - **Dysphagie.** Heiserkeit (Rekurrensparese). Stridor
 - **Horner-Trias** (Myosis, Ptosis, Enopthalmus)
 - **Obere Einflusstauung**
 - **Lymphknotenvergrößerung** zervikal bzw. supraklavikulär

„Nur 25% aller sonographisch entdeckten Schilddrüsenkarzinome waren zuvor klinisch auffällig!“

Diagnostik

Körperliche Untersuchung

- Bei der körperlichen Untersuchung i.d.R. nicht auffällig
- Bei fortgeschrittenen Karzinomen: **Derbe, schmerzlose Knoten**

Klinische Chemie

- **Tumormarker**
 - **Thyreoglobulin:** Zur Verlaufskontrolle des follikulären und papillären Schilddrüsenkarzinoms nach Thyreoidektomie
 - **Calcitonin:** Zur Diagnostik und Verlaufskontrolle des medullären Schilddrüsenkarzinoms
- **Schilddrüsenfunktionsparameter:** Meist TSH basal, fT_3 und fT_4 normwertig

Schilddrüsenultraschall

- Suspekt sind unregelmäßig begrenzte, echoarme Schilddrüsenherde größer als 1 cm
- Malignome zeigen häufig Mikroverkalkungen

Schilddrüsen szintigraphie

- Nachweis nicht-speichernder und damit malignomverdächtiger „kalter“ Knoten

Sono: ein Herd der
• unregelmäßig begrenzt
• echoarm
• > 1cm
• Mikroverkalkungen

* Radioiod unwirksam

Weitere Diagnostik

- **Interventionell**
 - **Feinnadelpunktion** mit Aspirationszytologie bei sonographischem bzw. szintigraphischem Karzinomverdacht (Bei Knoten <1 cm wird auf eine Punktion verzichtet)
 - Bei unklarer **Biopsie**: Meist Empfehlung zur **Operation**
 - **Staging**
 - **Röntgen-Thorax**
 - **Abdomensonographie**
 - **CT/MRT Hals**
 - Insb. bei klinischem Verdacht: **Knochenszintigraphie**, **CT Thorax**, **CT/MRT Abdomen**
- „Ein sonographisch **echoarmer** und szintigraphisch **kalter** Knoten ist hochverdächtig!“

Differentialdiagnosen

- **Schilddrüsenzyste**
 - Sonographisch: Echofreie **rundliche** oder **ovale** Raumforderung. Häufig **dorsale Schallverstärkung**
- **Riedel-Thyreoiditis**

Therapie

Therapiegrundsätze

- **Alle Schilddrüsenkarzinome**: **Totale Thyreoidektomie** mit lokaler **Lymphknotenadenektomie**
 - **Differenzierte Schilddrüsenkarzinome**: Postoperative **Radioiodtherapie** zur Destruktion von Schilddrüsenrestgewebe (oder Metastasen)
 - In 90% der Fälle kurative Behandlung durch diese Kombinationstherapie!
 - **Undifferenzierte Schilddrüsenkarzinome**: Postoperative **externe Strahlentherapie** (Radioiodtherapie unwirksam)
 - **Medulläres Schilddrüsenkarzinom**: **Totale Thyreoidektomie i.d.R. ausreichend** (Radioiodtherapie unwirksam)
- **Bei Inoperabilität oder Progress unter o.g. Maßnahmen**: **Palliative Chemotherapie**

„Nach jeglicher Schilddrüsenresektion ist der Schilddrüsenfunktionsstatus zu prüfen und bei Notwendigkeit eine postoperative **L-Thyroxin**-Substitution einzuleiten!
- Nach Radioiodtherapie: L-Thyroxin-Substitution mit dem Ziel einer TSH-Supprimierung → Reduktion der Wachstumsstimulation“

Prognose

| Karzinomform | 10-Jahres-Überlebensrate |
|--|---|
| Papilläres Schilddrüsenkarzinom | <ul style="list-style-type: none">• Beste Prognose, da eher späte lymphogene Metastasierung |
| Follikuläres Schilddrüsenkarzinom | <ul style="list-style-type: none">• Gegenüber papillären Karzinomen etwas schlechtere Prognose, da bei Erstdiagnose häufiger (hämatogen) fernmetastasiert |
| Medulläres Schilddrüsenkarzinom | <ul style="list-style-type: none">• Lokoregionäre Lymphknotenmetastasen und Fernmetastasen verschlechtern die Prognose wesentlich |
| Anaplastisches Schilddrüsenkarzinom | <ul style="list-style-type: none">• Mittlere Überlebenszeit von wenigen Monaten |




Figure 2 - Histological slides of the thyroid cancer subtypes: (1) Papillary (2) Follicular (3) Medullary (4) Anaplastic

Cushing-Syndrom +/-

Definition

Das Cushing-Syndrom eine Stoffwechselerkrankung, die durch ein Überangebot von Glukokortikoiden (z.B. Cortisol) verursacht wird.

Ätiologie

Exogenes Cushing-Syndrom

Langzeitbehandlung mit Glucocorticoiden (am häufigsten) *Prednisolonequivalent 7.5mg dosis*

Endogenes Cushing-Syndrom

- **Primärer Hypercortisolismus (adrenal)** : ACTH-unabhängig
- **Sekundärer Hypercortisolismus**: ACTH-abhängig
 - **Zentral (Morbus Cushing)**: häufigste Form der endogenen Cushing-Syndrome, meistens durch Mikroadenome des Hypophysenvorderlappens
 - **Ektop**: ACTH-Sekretion im Rahmen eines paraneoplastischen Syndroms (häufig kleinzelliges Bronchialkarzinom)

Symptome/Klinik

- Stammfettsucht, Vollmondgesicht, Stiernacken
- peripher betonte Muskelatrophie, Hautblutungen (Ekchymosen), Osteoporose
- Pathologische Glucosetoleranz, arterielle Hypertonie
- Adynamie, psychische Veränderungen
- ACTH-abhängige Form : Androgene↑ (♀: Menstruationsstörungen, Hirsutismus, Virilismus)

Diagnostik

Klinische Chemie

- Leukozytose, Thrombozytose, Erythrozytose
- Hyperglykämie
- Hyperlipidämie (Hypercholesterin- und Hypertriglyceridämie)
- Hypokaliämie → Über mineralocorticoide Wirkung: Wasser- und Natriumretention ↑, Kaliumausscheidung ↑

BD Glucose
Leuko
Erythro
Thrombo
Lipid

K↑
↓

Hormonlabor

Diagnosesicherung des Hypercortisolismus

- **freier Cortisol im 24-h-Urin** ↑ *NL: 20-150 µg/Tag*
- **Serum-Cortisol** ↑ *NL: <5 µg/dL*
- **Niedrigdosierter Dexamethason-Kurztest**: Cortisol ↔. (Normal: Cortisol↓) *Keine Änderung bei Allerg. Form Cushing*

1-2 mg Dexamethason (nächtl. Gabe)
Morgen messung des Serum Cortisol
Falschpositiv bei Antiepileptika, Kontrazeptiva, Depression, Alkoholisierung

Weiterführende Differentialdiagnostik

- **Plasma-ACTH**: ↓ (adrenal), ↑ (zentral oder ektop)
- **CRH-Test**: ACTH↔ und Cortisol↔ (adrenal, ektop), ACTH↑ und Cortisol↑ (zentral, normal)
- **Hochdosierter Dexamethason-Langtest**: Cortisol↔ (adrenal, ektop), Cortisol↓ (zentral, normal) *zweimaliger nächtlicher Gabe von 8mg Dexamethason*

⇒ Suppression bei zentraler Cushing
Cortisol ↓ <50%

Bildgebung


- CT und/oder MRT des Abdomens (bei V.a. adrenales Cushing-Sd)
- CT und/oder MRT des Schädels (bei V.a. zentrales Cushing-Sd)
- Weitere Bildgebung (bei V.a. ektopes Cushing-Sd)

Therapie

- **Operative Therapie**: Standardtherapie
 - Nebennierenrindentumor → Laparoskopische oder offene Adrenalektomie
 - Hypophysenadenom: Transnasale operative Adenomentfernung
 - ACTH-produzierender ektoper Tumor → Wenn möglich: Tumorresektion
 - **Postoperativ**: Substitutionstherapie mit Glucocorticoiden (sonst Gefahr der Addison-Krise)
- **Medikamentöse Therapie**: Bei inoperablen Tumoren ⇒ Blockade der Cortisolsynthese (z.B. Ketoconazol) in Kombination mit klassischen Zytostatika

CRH ↑ zentral
HbT ↓ zentral

Corticotropin-releasing Hormon (Hypophysenhormon)



Vergrößerte
Sella turcica

Emotionale
Störungen

Vollmondgesicht

Stiernacken

Osteoporose

Hypertonie

Pathologische
Glucosetoleranz

↑ Glu

Dünne,
faltige Haut

Nebennierentumor
oder Hyperplasie

Amenorrhö

Obesitas
Stammfettsucht

Dehnungsstreifen
am Bauch

Muskelschwäche

Porephor betont

Purpura

Hautblutungen

Schlechte
Wundheilung

- **Niedrigdosierter Dexamethason-Kurztest**

- Grundlegendes **Prinzip**: Verwendung von Dexamethason, da es (bei erhaltenem Feedbackmechanismus) eine **ACTH-Hemmung auslöst**, ohne die laborchemische Serumcortisol-Messung wesentlich zu beeinflussen
- **Durchführung**: Nach nächtlicher Gabe von 1–2 mg Dexamethason wird morgens das Serumcortisol bestimmt; Dexamethason führt physiologischerweise zur Hemmung der ACTH-Sekretion in der Hypophyse
- Ergebnis: Bei allen Formen des Cushing-Syndroms bleibt eine Supprimierung der Glucocorticoidsynthese aus → *ausbleiben / انعدم / لا يخرج (NL ↓ Cortisol)*

 Zur Differenzialdiagnostik sollte ein hochdosierter Dexamethason-Langtest folgen (siehe: Differenzialdiagnostik)

- Veraltet: Kein Anstieg des Cortisols im Insulin-Hypoglykämie-Test


Der Dexamethason-Hemmtest ist (zusammen mit der ACTH-Bestimmung) die primäre Untersuchungsmethode, da er bei allen Formen des Hypercortisolismus pathologisch ausfällt!

Verschiedene Medikamente (Kontrazeptiva, Antiepileptika) sowie Grunderkrankungen (Depression, Alkoholismus) können zu falsch-positiven Ergebnissen im Dexamethason-Kurztest führen!

Hochdosierter Dexamethason-Langtest

- Grundlegendes **Prinzip**: Verwendung von Dexamethason, da es (bei erhaltenem Feedbackmechanismus) eine ACTH-Hemmung auslöst, ohne die laborchemische Serumcortisol-Messung wesentlich zu beeinflussen
- **Durchführung**: Nach **zweimaliger nächtlicher Gabe von 8 mg** Dexamethason wird das Serumcortisol bestimmt
- Ergebnis: Bei zentraler Ursache (hypothalamische Überfunktion oder Mikroadenom der Hypophyse) gelingt eine **Supprimierung des Serumcortisols um mindestens 50%** ↓ Cortisol
 - Diese Hemmung bleibt bei ektopter ACTH-Bildung und Nebennierenrindentumoren aus → Cortisol

Nebenniere



Makroskopische Anatomie

- **Funktion:** Biosynthese und Sekretion der **Steroidhormone (Rinde)** und **Katecholamine (Mark)**
- **Lage:** Auf dem oberen Nierenpol
- **Form:** Rechts dreieckig, links halbmondförmig
- **Größe:** Ca. 5 cm lang und dick, ca. 1–2 cm breit

Übersicht über die Steroidhormone der Nebennierenrinde

| Nebennierenhormone (= Corticosteroide) | Wichtigste Vertreter | Ort der Synthese | Wirkung |
|--|--|--|---|
| Mineralocorticoide | <ul style="list-style-type: none"> Aldosteron | <ul style="list-style-type: none"> Zona glomerulosa | <ul style="list-style-type: none"> Regulation des Salz- und Wasserhaushalts (Natrium- und Wasserretention, Kaliumausscheidung) |
| Glucocorticoide | <ul style="list-style-type: none"> Cortisol | <ul style="list-style-type: none"> Zona fasciculata | <ul style="list-style-type: none"> Mobilisation von Energiereserven (Gesteigerte Gluconeogenese, Lipolyse und Proteolyse) Immunsuppression Zahlreiche andere Wirkungen (siehe auch: Glucocorticoide) |
| Androgene | <ul style="list-style-type: none"> DHEA (Dehydroepiandrosteron) DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat) Androstendion | <ul style="list-style-type: none"> Zona reticularis | <ul style="list-style-type: none"> Umwandlung in die aktiveren Hormone Testosteron und Östrogen in den peripheren Geweben |


Nebennierenmark

Das Nebennierenmark besteht aus modifizierten zweiten **Sympathikusneuronen**, die von ersten Sympathikusneuronen des Rückenmarks über cholinerge Synapsen innerviert werden. Die Aufgabe der Nebennierenmarkzellen besteht wie bei postganglionären sympathischen Neuronen in der **Katecholaminproduktion**.

Phäochromozytom

Adrenalin
Noradrenalin

- "Salzig" außen
- "Zucker" in der Mitte
- "Sex" innen



Nebennierenrindeninsuffizienz (NNR-Insuffizienz) +/-

Definition

Ungenügende NNR-Hormonproduktion, wobei die verminderte Gluko- und Mineralokortikoidwirkung klinisch im Vordergrund steht.

Ursachen

- **Primäre NNR-Insuffizienz = Morbus Addison.**
 - **Autoimmun** (häufigste Ursache), bei einigen Patienten im Rahmen eines Polyendokrinen Autoimmunsyndroms:
 - PAS Typ I (Manifestation im Kindesalter): Morbus Addison, primärer Hypoparathyreoidismus,...
 - PAS Typ II (Manifestation im Erwachsenenalter): Morbus Addison, Autoimmunthyreoiditis, Diabetes mellitus,...
 - Tuberkulose, Metastasen, operative Entfernung, Blutung.
- **Sekundäre NNR-Insuffizienz:**
 - Hypophysenvorderlappen- oder Hypothalamus-Insuffizienz
 - nach abruptem Absetzen einer Glukokortikoid-Langzeittherapie. *Addison-Krise*

Klinik

- Allgemeine Schwäche.
- Dehydratation. Arterielle Hypotonie. Gewichtsverlust.
- Abdominelle Beschwerden.
- Haut: hyperpigmentiert (bei Morbus Addison), depigmentiert (bei sekundärer NNR-Insuffizienz)
- Addison-Krise: Schock, Oligurie, Hypoglykämie, Pseudoperitonitis, Bewusstseinsstörung.

Diagnostik

⇒ *Koma*

- **Nachweis der NNR-Insuffizienz:**
 - Serum-Na⁺ ↓, Serum-K⁺ ↑, Hypoglykämie neigung
 - **ACTH-Kurztest**: Serum-Cortisol ↓ (vor dem Test), kein Anstieg nach ACTH-Gabe
- **Differenzialdiagnose primär – sekundär:**
 - **ACTH-basal**: ↑ (bei primärer NNR-Insuffizienz), ↓ (bei sekundärer NNR-Insuffizienz)
- **Erweiterte Diagnostik bei primärer NNR-Insuffizienz:** Bestimmung der NNR-Antikörper Ggf. Sonografie, CT
- **Erweiterte Diagnostik bei sekundärer NNR-Insuffizienz:** CRH-Test

Therapie

- **Substitutionstherapie:**
 - **Glukokortikoid:** Hydrocortison per os. In Stresssituationen (z. B. Infekt, OP, Trauma) Dosiserhöhung erforderlich *10-30 mg/Tag verteilt auf 3 Dosen*
 - **Mineralokortikoid** (nur bei primärer NNR-Insuffizienz): Fludrocortison per os
- Patientenschulung und Notfallausweis
- **Addison-Krise:**
 - Hydrocortison i.v. 100-500 mg i.v. (langsame Aufdosierung bis Wirkung einsetzt), danach bis zur Überwindung der Krise Hydrocortison 100-200 mg/d
 - Flüssigkeitssubstitution, evtl. mit Glucose
 - Elektrolytausgleich
 - Intensivmedizinische Überwachung

| PAS I | PAS II |
|-----------------------|-----------------------|
| Addison | Addison |
| Hypoparathyreoidismus | DM |
| | Autoimmunthyreoiditis |

Phäochromozytom +/-

- Das Phäochromozytom ist ein **hormonell aktiver Tumor** (meist im Nebennierenmark) der **Katecholamine** (insb. Adrenalin und Noradrenalin) produziert und unkontrolliert freisetzt.
- Man unterscheidet dabei zwischen benignen und malignen Phäochromozytomen, wobei die benigne Form deutlich häufiger ist (meist adrenal).

Symptome/Klinik *↑ Adrenalin ↑ Sympathetik*

Typischerweise treten die Symptome anfallsartig auf.

- **Hypertonie**: Persistierend oder paroxysmal, teilweise hypertensive Krisen
- **Tachykardie** und **Palpitationen**
- **Kopfschmerzen**
- **Schweißausbrüche**
- **Unruhe, Angst**

Diagnostik

Labor

Meta Normeta

- **Blutplasma**: Bestimmung der Meta- und Normetanephine (Katecholaminmetabolite)
- **24-h-Urin**: Bestimmung der Metanephine und Normetanephine
- **Bestätigungstest: Clonidinhemmtest**: Bei gesunden Probanden sinken nach Clonidingabe die Plasmakatecholamine um mind. 30%. Bei Vorliegen eines Phäochromozytoms **bleibt das Abfallen des Katecholaminspiegels aus**

Bildgebung

Nachdem mithilfe der oben genannten Tests ein Phäochromozytom diagnostiziert wurde, sollte eine Bildgebung mittels **CT** (bevorzugt) oder **MRT** zur Lokalisationsdiagnostik erfolgen. Erst wenn im CT oder MRT keine Läsion gefunden wurde, sollte eine **Szintigraphie** durchgeführt werden.

Therapie

Operabel

- **Verfahren: Tumorentfernung** (laparoskopisch bevorzugt)
- **Besonderheiten bei der Durchführung und präoperativen Vorbereitung**
 - **Präoperative Gabe eines unselektiven α -Blockers: Phenoxybenzamin** (Die Manipulation am Tumorgewebe führt zu einer Freisetzung von Katecholaminen – die α -Blockade verhindert die Wirkung der Katecholamine. Ohne die Blockade kann es zu lebensgefährlichen Hypertensionen kommen.).
 α -Blocker
 - Bei auftretenden Tachyarrhythmien: Kombination mit **Beta-Blockern**
 β -Blocker
 - „No touch“-Technik (Jede Berührung des Tumors kann zu einer massiven Freisetzung von Katecholaminen führen)

Inoperabel

- **Benigne**: Dauerhafte Gabe von **Phenoxybenzamin**
- **Maligne**: ¹³¹MIBG-Therapie oder **Chemotherapie**
Phenoxybenzamin

Maligne: Bei ¹²³Iod-MIBG-Positivität → ¹³¹MIBG-Therapie, alternativ Palliation (Chemotherapie, Tumorembolisation)

Methyljodbenzylguanidin (MIBG) ist eine Substanz, die in seiner chemischen Struktur den körpereigenen Katecholaminen (Botenstoffe des sympathischen Nervensystems) ähnlich ist und sich daher in Katecholamin-produzierenden Tumoren wie dem Neuroblastom oder dem Phäochromozytom intensiv anreichert. Dies macht man sich bei der nuklearmedizinischen Therapie des Neuroblastoms zunutze. Durch die Verbindung des MIBG mit radioaktivem Iod wird bei Gabe von ¹³¹I-MIBG innerhalb des Tumors eine hohe Strahlendosis erzielt. Wegen der kurzen Reichweite der Strahlung (β -Strahlung) wird das umliegende, gesunde Gewebe jedoch nur wenig in Mitleidenschaft gezogen.

Primärer Hyperaldosteronismus (Conn Sd) +/-

Definition

- Hyperaldosteronismus, durch autonome Überproduktion von Aldosteron in der Nebennierenrinde
- Zählt zu den häufigsten Ursachen einer sekundären Hypertonie

Ätiologie

- Idiopathische Hyperplasie der Nebennierenrinde (2/3 der Fälle, meist bilaterale)
- Aldosteronproduzierendes Nebennierenrindenadenom (1/3 der Fälle)

Klassifikation

- **Normokaliämisch**: Insb. bei einer Hyperplasie der Nebennierenrinde
- **Hypokaliämisch**: Insb. beim Aldosteron-produzierenden Nebennierenrindenadenom

Symptome/Klinik

- ~~Medikamentös~~ schwer einstellbare arterielle Hypertonie
- Bei Vorhandensein einer Hypokaliämie: Adynamie, Muskelschwäche, Obstipation
- Metabolische Alkalose: Führt u.a. zu Missempfindungen (Kribbeln, Taubheitsgefühl) der Haut

Diagnostik

- Hinweise auf das Vorliegen einer sekundären Hypertonie

Screening auf einen primären Hyperaldosteronismus

- **Bestimmung des Aldosteron-Renin-Quotienten**: Eine Erhöhung des Aldosteron-Renin-Quotienten deutet auf einen primären Hyperaldosteronismus hin >19
- **Unterstützende Laborbefunde**
 - **Blut**: Aldosteronkonzentration \uparrow , Reninkonzentration und -aktivität \downarrow , Hypokaliämie, Metabolische Alkalose
 - **Urin**: Aldosteronkonzentration \uparrow und Aldosteronmetabolite \uparrow im 24h-Urin

„Vor der Diagnostik müssen rechtzeitig alle Medikamente abgesetzt werden, die das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (Diuretika, Beta-Blocker, ACE-Hemmer, AT1-Rezeptor-Blocker und Aliskiren) beeinflussen, da diese das Ergebnis stark verfälschen könnten!“

Verfahren zur Bestimmung der Ursache des primären Hyperaldosteronismus

- **CT oder MRT des Abdomens**: Darstellung von Raumforderungen
- **Differentialdiagnosen Adenom und idiopathische Hyperplasie der NNR**
 - **Orthostasetest**: Adenom = Kein Anstieg der Aldosteronsekretion
- Katheterisierung der Nebennierenvenen und seitengetrennte Bestimmung der Aldosteronkonzentration

Dem Patienten wird zunächst nach strikter Bettruhe, im Anschluss nach 2–4 Stunden des Stehens und Herumlaufens (Orthostase) Blut abgenommen.

„Bildgebende Verfahren sollen erst nach Sicherung einer hormonellen Erkrankung eingesetzt werden“

Differentialdiagnosen

- **Pseudohyperaldosteronismus** (Aldosteronkonzentration \downarrow , Reninkonzentration \downarrow):
Lakritzabusus
- **Sekundärer Hyperaldosteronismus** (Aldosteronkonzentration \uparrow , Reninkonzentration \uparrow):
Nierenarterienstenose, Chronische Niereninsuffizienz
- **Inzidentalom**: Jede zufällig entdeckte Raumforderung der Nebenniere (Inzidentalom) soll endokrinologisch abgeklärt werden.

Therapie

Idiopathische Hyperplasie der Nebennierenrinde

- Medikamentöse Therapie mit Aldosteronantagonisten (Spironolacton)

Aldosteronproduzierendes Nebennierenrindenadenom

- **Unilaterale Adrenalektomie**

Hyperparathyreoidismus +/-

- **Definition :** übermäßiger Anstieg des Parathormons (PTH) im Serum.
- **Formen :** Der Hyperparathyreoidismus kann in drei Unterformen unterschieden werden:
 - Die **primäre Form** ist vorwiegend auf **Adenome** sowie seltener auf Epithelkörperchenhyperplasien im Bereich der Nebenschilddrüse zurückzuführen und bedingt eine Hyperkalzämie.
 - Die **sekundäre Form** besteht in der regulatorischen Erhöhung des PTH als Reaktion auf chronisch erniedrigte Calciumspiegel (z.B. Vitamin-D-Mangel, Niereninsuffizienz, Malassimilationssyndrom).
 - Die seltenere **tertiäre Form** beschreibt eine auftretende Hyperkalzämie bei lange bestehendem sekundärem Hyperparathyreoidismus aufgrund einer inadäquat hohen PTH-Freisetzung.
- **Symptome :** Eine Klinik ist bei allen Unterformen nicht obligat, aber möglich. In voller Ausprägung kommt es beim primären Hyperparathyreoidismus zu **Nephrolithiasis**, **Knochenschmerzen** und **Ulcus ventriculi**. „Stein-, Bein- und Magenpein“!
- **Diagnostik :** Diagnostisch sind die relevanten Laborparameter **Calcium**, **Phosphat** und **PTH** zu bestimmen.
 - **Laborkonstellation Knochenerkrankungen :**

| | Serum calcium | Serum phosphat | alkalische Phosphatase | Parathormon (PTH) | Weiterhin |
|---|---------------|----------------|------------------------|-------------------|--|
| Osteoporose | n | n | n/↑ | n | T-Score↓ |
| Osteomalazie/ Rachitis | ↓ | n/↓ | ↑ | ↑ | - Bei Vitamin-D abhängiger Rachitis Typ1 : Vitamin D↓ - Bei Vitamin-D-abhängiger Rachitis Typ2 : Vitamin D↑ |
| Morbus Paget | n | n | ↑↑ | n | |
| primärer (und tertiärer) Hyperparathyreoidismus | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | |
| sekundärer Hyperparathyreoidismus (z.B. renale Osteopathie) | ↓ | n/↑ | ↑ | ↑ | Kreatinin↑ (bei renaler Genese) |
| Malignome/Osteolytische Metastasen | ↑ | n/↓ | ↑ | n/↓ | Skelettszintigraphie |

- **Therapie :**
 - **Primärer Hyperparathyreoidismus :** operative Therapie bei symptomatischem Verlauf. Konservatives, beobachtendes Verhalten bei moderatem, asymptomatischem Verlauf (Viel trinken, Vitamin-D- und Calciumsubstitution).
 - **Sekundäre Form :** die Behandlung der Grunderkrankung steht im Vordergrund. Vitamin-D- und Calciumsubstitution.
 - **Tertiäre Form :** Ggf. chirurgische Entfernung der Nebenschilddrüsenanteile

Hypoparathyreoidismus +/-


- **Definition :** Unterfunktion der Nebenschilddrüsen mit verminderter Bildung von Parathormon (PTH).
- **Ursachen :** Insb. **Iatrogen** (Nach Schilddrüsenoperation oder Bestrahlung der Halsorgane)
- **Klinik :** Zeichen einer **Hypokalzämie** (Parästhesien, Hyperreflexie, Chvostek-Zeichen)
- **Diagnostik :** Serumcalcium↓, Serumphosphat ↑, PTH↓
- **Therapie :** Permanente Vitamin-D- und Calciumsubstitution

Das Chvostek-Zeichen ist ein klinisches Zeichen für eine bestehende Nerven-Übererregbarkeit (Tetanie). Das Chvostek-Zeichen wird durch Beklopfen des Nervus-facialis-Stammes geprüft, 1–2 cm ventral des Ohrfläppchens. Bei anschließender Kontraktion der Gesichtsmuskulatur ist das Chvostek-Zeichen positiv.

Das Trousseau-Zeichen ist ein klinischer Hinweis auf eine vorliegende Tetanie, beispielsweise im Rahmen eines Hypoparathyreoidismus. Tritt nach dem Aufpumpen einer Blutdruckmanschette über den systolischen Blutdruck hinaus eine Pfötchenstellung der Hand ein, ist von einer latenten Tetanie aufgrund eines Kalziummangels (Hypokalzämie) auszugehen. Die Pfötchenstellung besteht in einer spastikartigen Kontraktion der Fingerbeuger und Handmuskulatur.



Pfötchen کن لیس



Allgemeine Endokrinologie +

Grundlagen der Endokrinologie

Hormone


- Hormone sind körpereigene Stoffe, die von Drüsen oder einzelnen Zellen abgegeben werden und der Signalübertragung dienen.

- Hormone können anhand ihrer **Sekretionsweise** eingeteilt werden:

Somatostatin o **Parakrin**: Wirkung auf Nachbarzellen durch Diffusion des Hormons

IL2 o **Autokrin**: Wirkung der Hormone auf die bildende Zelle selbst

Schilddrüsenhormone o **Endokrin**: Das Hormon erreicht seine Zielzelle über den Blutstrom



Hypothalamus und Hypophyse

Hypothalamus

Wichtigstes Steuerzentrum des vegetativen Nervensystems und des endokrinen Systems

- Teil des Diencephalon (Zwischenhirn)
- Reguliert neben vielen Hormonachsen auch eine Reihe vegetativer Funktionen (z.B. Körpertemperatur und Nahrungszufuhr)
- Die Hormone des Hypothalamus wirken zum Großteil auf die Hormonausschüttung der Adenohypophyse *vorderlappen*
- Unterschieden werden **Releasing-Hormone** (steigern die Freisetzung von Hormonen in der Hypophyse) und **Inhibiting-Hormone** (senken die Freisetzung von Hormonen in der Hypophyse)

Hypophyse

- Liegt in einer knöchernen Vertiefung (Sella turcica) der mittleren Schädelgrube
- Besteht aus zwei Anteilen
 - Adenohypophyse** (= Hypophysenvorderlappen, HVL) *TSH, ACTH, LH, FSH, GH, Prolactin, MSH*
 - Neurohypophyse** (= Hypophysenhinterlappen, HHL) *ADH, Oxytocin*

Übersicht der Hormonachsen von Hypothalamus und Hypophysenvorderlappen

- Der HVL produziert zwei Arten von Hormonen
 - Glandotrope Hormone** → Steuern andere endokrine Drüsen
 - Nicht-glandotrope Hormone** → Haben einen direkten Effekt auf den Organismus


Glandotrope Hormone

| Hypothalamus | Adenohypophyse | Endokrines Zielorgan |
|---|--|--------------------------|
| CRH (Corticotropin-releasing-Hormon) | Adrenocorticotropes Hormon (ACTH) | Nebennierenrinde |
| TRH (Thyreotropin-releasing-Hormon) | Thyreoida-stimulierendes Hormon (TSH) | Schilddrüse |
| GnRH (Gonadotropin-releasing-Hormon) <i>HVL</i> | <ul style="list-style-type: none"> Luteinisierendes Hormon (LH) Follikel-stimulierendes Hormon (FSH) | Gonaden : Ovarien, Hoden |


Nicht-Glandotrope Hormone

| Hypothalamus | Adenohypophyse | Hauptsächliche Wirkung |
|---|---|--|
| GHRH (Growth-Hormon-releasing-Hormon) | Somatotropes Hormon = Growth-Hormon (GH), Somatotropin, Wachstumshormon | Wachstumsreiz bzw. anabole Wirkung auf Organe |
| Somatostatin | | |
| MSH-RH (Melanozyten-stimulierendes-Hormon-releasing-Hormon) | Melanozyten-stimulierendes Hormon (MSH) | Haut: Stimulation der Melanozyten mit Hautpigmentierung↑ |
| Melanozyten inhibierendes Hormon | | |
| TRH (Thyreotropin-releasing-Hormon) | Prolaktin | Brustdrüse: Wachstum und Laktation |
| Prolaktin inhibierendes Hormon (PIH) | | |

Adeno-
Hypophyse



Hormoneller Regelkreis der glandotropen Hormone



Hormoneller Regelkreis der nicht-glandotropen Hormone

Hormone des Hypothalamus-Hypophysenhinterlappen-Systems

- Die Neurohypophyse ist Ort der Speicherung und Sezernierung zweier Peptidhormone, die im Hypothalamus produziert werden
 - Antidiuretisches Hormon (ADH = Vasopressin)**: Regulation des Wasserhaushalts (und Blutdrucks)
 - Oxytocin**: Kontraktion des Uterus

Wichtige Erkrankungen


- Hypophysenvorderlappeninsuffizienz. Prolaktinom. Akromegalie. Diabetes insipidus. SIADH

Nebennierenrinde


Regelkreislauf

- Hypothalamus**: CRH → Stimuliert die **Hypophyse** zur Ausschüttung von ACTH → stimuliert die **Nebennierenrinde** zur Ausschüttung von Glucocorticoiden und Androgenen
 - Stimuli**
 - Schmerzen, Stress (psychisch/physisch)
 - Pyrogene, Adrenalin, Histamin
 - Hypoglykämie, Hypotonie
 - Hemmung**
 - Glucocorticoide wirken über eine negative Feedback-Regulation hemmend auf die Ausschüttung CRH und ACTH

Neuro-
Hypophyse



Hormoneller Regelkreis der Neurohypophysenhormone



Hormoneller Regelkreis der Nebennierenhormone

Physiologische Wirkung der Nebennierenrindenhormone

- **Glucocorticoide:** Hauptvertreter **Cortisol** \rightarrow Cushing Syndrom
 - Stoffwechsel: **Blutzucker** \uparrow , Proteinkatabolismus, Lipolyse, Knochenabbau
 - Immunsuppressiv \rightarrow Hyperglykämie
 - Antiphlogistisch
 - Permissiver Effekt für Katecholamine
- **Androgene:** In der NNR hauptsächlich **Dehydroepiandrosteron** (schwach wirksames männliches Sexualsteroid)
 - Stoffwechsel, anabole Wirkung auf Muskulatur und Knochen
 - Einfluss auf Verhalten/ZNS-Prozesse
 - Beim Mann: Geschlechtsdifferenzierung, Stimulierung der Spermatogenese
- **Mineralcorticoide:** Hauptvertreter **Aldosteron** \rightarrow Regulierung hauptsächlich über das **Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS)** \rightarrow **Conn-Syn.**
 - Renale Minderperfusion z.B. durch Blutdruckabfall \rightarrow Freisetzung von **Renin** in den Nieren \rightarrow Renin wandelt **Angiotensinogen** (in der Leber gebildet) zu **Angiotensin I** um \rightarrow Umwandlung von **Angiotensin I** zu **Angiotensin II** durch das **Angiotensin-konvertierende Enzym** (ACE, v.a. in der Lunge lokalisiert) \rightarrow **Angiotensin II** wirkt stark vasokonstriktorisch und bewirkt in der Nebennierenrinde die Freisetzung von Aldosteron \rightarrow **Aldosteron fördert in der Niere die Rückresorption von Natrium (und Wasser)** und führt gleichzeitig zu einer verstärkten Kalium- und Protonenausscheidung \rightarrow **Extrazellulärvolumen** \uparrow , **Blutdruck** \uparrow , **K⁺** \downarrow , **pH** \uparrow

„Die Freisetzung der Mineralcorticoide wird durch das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System gesteuert!“

Wichtige Erkrankungen

- Hypocortisolismus. Hypercortisolismus. Primärer Hyperaldosteronismus. Adrenogenitales Syndrom **Conn**

Schilddrüse

Regelkreislauf

- **Hypothalamus:** TRH \rightarrow Stimuliert die **Hypophyse** zur Ausschüttung von TSH \rightarrow Stimuliert die **Schilddrüse** zur Ausschüttung von T₃ (Triiodthyronin) und T₄ (Thyroxin, Tetraiodthyronin)
 - **Stimuli:** Starke Kälteexposition. Stress
 - **Hemmung**
 - Negative Rückkopplung von T₃/T₄ auf TRH und TSH
 - Zusätzliche Hemmung der Bildung von TSH und TRH durch: Somatostatin, Dopamin. Glucocorticoide. Fasten. Systemische Infektionen

Schilddrüsenhormone

Die Schilddrüse schüttet die beiden Schilddrüsenhormone T₃ (**Triiodthyronin**) und T₄ (**Thyroxin, Tetraiodthyronin**) aus. T₄ ist selbst nur geringgradig aktiv, wird aber in deutlich höheren Mengen gebildet (Verhältnis T₄:T₃ etwa 20:1). Es wird im Blut durch eine Dejodase zu dem biologisch aktiveren T₃ umgewandelt und ist somit ein Prohormon. Die Halbwertszeit von T₃ beträgt etwa 1 Tag (ca. 20h), die von T₄ beträgt etwa 1 Woche. T₄ stellt also eine Art "wirkungsarme Depotform" von Schilddrüsenhormonen dar und wird daher auch in der Substitutionstherapie eingesetzt.

Physiologische Wirkung der Schilddrüsenhormone

- Grundumsatz \uparrow (Sauerstoffverbrauch \uparrow und Körpertemperatur \uparrow)
- Stimulation des Kohlenhydratstoffwechsels
- Proteinanabolismus (in hohen Dosen: Proteinkatabolismus)
- Je nach Stoffwechsellaage Förderung der Lipolyse oder Liponeogenese
- Permissiver Effekt für Katecholamine (v.a. über β -Rezeptoren)
- Bei Kindern: Stimulation des Knochenwachstums und der Reifung des Nervensystems

Wichtige Erkrankungen

- Hypothyreose. Hyperthyreose

Gonaden

Regelkreislauf

- **Hypothalamus:** GnRH → stimuliert die **Hypophyse** zur Ausschüttung von FSH und LH → LH und FSH entfalten ihre Wirkung an den **Gonaden** mit unterschiedlichen Effekten bei Mann und Frau
 - **Stimuli :** GnRH wird ab der Pubertät pulsatil freigesetzt
 - **Hemmung:** Die GnRH-, LH- und FSH-Sekretion wird gehemmt durch: Androgene, Östrogene, Progesteron. Inhibin.

Physiologische Wirkung von LH, FSH und der Sexualhormone

- **Ovarien**
 - FSH: Follikelreifung → Östrogene↑
 - LH: Östrogene↑, Eisprung und Progesteron↑ (Progesteron hat seine Hauptfunktion im Menstruationszyklus und bei der Aufrechterhaltung der Schwangerschaft)
- **Hoden**
 - FSH: Spermienproduktion, Inhibin↑
 - LH: Testosteronproduktion↑
 - Wirkungen von **Testosteron** : Ausbildung männlicher Geschlechtsmerkmale in der Pubertät. Spermatogenese. Libidosteigerung. Anabole Wirkung (Knochenaufbau, Wachstum, Muskelaufbauende Wirkung)

Wichtige Erkrankungen

- Hypogonadotroper Hypogonadismus. Hypergonadotroper Hypogonadismus

Nebenniere (Glandula suprarenalis)

Endokrines Organ, das jeweils dem oberen Nierenpol aufsitzt. Makroskopisch unterscheidet man 2 Anteile, die jeweils unterschiedliche Hormone produzieren:

- **Nebennierenrinde:**
 - Zona glomerulosa : Mineralocorticoide (z.B. Aldosteron)
 - Zona fasciculata : Glucocorticoide (z.B. Cortisol)
 - Zona reticularis : Geschlechtshormone (v.a. Androgene, in geringerem Ausmaß auch Östrogene)
- **Nebennierenmark:** Die chromaffinen Zellen produzieren Katecholamine (Adrenalin und Noradrenalin).

Sonstiges +-

Schilddrüsenknoten - Vorgehen

Klinische Untersuchung

- **Inspektion:** sichtbare Struma oder Knoten?
- **Palpation:** Der Untersucher steht hinter dem Patienten und tastet die Schilddrüse mit beiden Händen. Beurteilt werden **Größe, Konsistenz, Abgrenzbarkeit zur Umgebung, Schluckverschieblichkeit, Lymphknotenstationen.**

Malignomverdächtig sind: **fehlende Schluckverschieblichkeit, Schmerzlosigkeit, rasches Wachstum, derbe knotige Struktur, Fixierung an der Haut, Lymphknotenschwellungen.**

Labordiagnostik

TSH, fT3 und fT4 Antikörper: TRAK, TP-AK, Tg-AK

Apparative Diagnostik

- **Sonografie** (morphologische Beurteilung, Größe, Durchblutung)
- **Szintigrafie** (Gewebefunktionalität) ↑↓
- **Feinnadelaspiration** (= Feinnadelpunktion/Feinnadelbiopsie): zur präoperativen Abklärung malignitätsverdächtiger Knoten. Jedoch kann sie eine Malignität nicht mit letzter Sicherheit ausschließen. Im Zweifelsfall ist trotz negativer Zytologie eine OP indiziert. Kontraindikationen: hämorrhagische Diathese, orale Antikoagulation

Schilddrüsenzintigraphie

- Beurteilung des Funktionszustandes der Schilddrüse
- **Kalte Knoten:** Geringe bis ausbleibende Anreicherung; malignomsuspekt (Differentialdiagnosen: Zyste, Entzündung, Einblutung, Verkalkungen, Narben)
- **Heiße Knoten:**
 - . starke Anreicherung: **Autonomie**
 - . Vergrößerte, **homogene** und **intensiv anreichernde** Schilddrüse: V.a. **Morbus Basedow**
- **Warme Knoten:** leicht erhöhte Anreicherung (intermediärer Befund). Sie schließen eine **Schilddrüsenautonomie** nicht aus, bei entsprechendem Verdacht ist daher eine Suppressions-szintigraphie indiziert. Über eine exogene Zufuhr von Schilddrüsenhormonen wird dabei eine TSH-Suppression bewirkt. Autonomes Schilddrüsen-gewebe zeigt auch unter Suppression eine Anreicherung und lässt sich auf diese Weise demaskieren.

Schilddrüsenchirurgie

- Aufgrund unterschiedlicher Krankheitsbilder der Schilddrüse (z.B. Malignome, Hyperthyreose oder mechanische Komplikationen durch große Struma) kann eine komplette oder teilweise Resektion der Schilddrüse indiziert sein.
- Präoperativ sollte insbesondere zur Vermeidung einer thyreotoxischen Krise eine euthyreote Stoffwechsellage eingestellt werden.
- **Komplikationen:**
 - . **Allgemeine Komplikationen:** **Nachblutung** (Risiko einer trachealen Kompression = umgehende operative Revision), **Infektion** **Verletzung umliegender Strukturen**
 - . **Spezielle Komplikationen:** **Verletzungen des N. recurrens**, substituionspflichtige Hypothyreose, Hypoparathyreoidismus (durch Entfernung der Nebenschilddrüsen) ⇒ **Hypokalzämie**

Kachexie

- **Kachexie:** Pathologisch starker Gewichtsverlust im Rahmen von schweren Systemerkrankungen.
- **Anorexie-Kachexie-Syndrom (AKS):** Multifaktorielles Syndrom, das gekennzeichnet ist durch ungewollten Gewichtsverlust $\geq 10\%$, Mangelernährung sowie einen systemischen Entzündungszustand.

Die Hauptbeschwerden unterscheiden sich bei ein- und beidseitigen Paresen.

Die einseitige Rekurrensparese verursacht durch den unvollständigen Schluss der Stimmlippen während der Stimmgebung Heiserkeit.[5] Dies ist an einer leisen, verhauchten, nicht steigerungsfähigen Stimme zu erkennen. Zusätzlich kommt es zu einer Kurzatmigkeit beim Sprechen (weil bei der Stimmbildung Luft ungenutzt entweicht). Die Atmung selbst ist meist nur durch eine ungünstige Stellung der gelähmten Stimmlippe beeinträchtigt, da die Öffnung der anderen, der gesunden Stimmlippe in Ruhe und bei leichter Belastung ausreichend ist. Wenn auch der Ursprungsnerv (Nervus vagus) betroffen ist, können Fehlschlucken und Schluckprobleme[6] hinzukommen.

Bei beidseitiger Rekurrensparese ist die verbleibende Stimmritze beim Ein- und Ausatmen äußerst schmal. Zusätzlich werden die kraftlosen Stimmlippen durch den Atemstrom noch weiter angesaugt (Bernoulli-Effekt). Der Fluss der Atemluft ist oft erheblich behindert. Dies verursacht vor allem unter Belastung, bei Atemwegsinfekten und nicht selten auch im Schlaf Atemnot sowie wahrzunehmende Atemgeräusche bei Ein- und Ausatmung (Stridor).[7] Die Patienten schnarchen oft sehr laut, teilweise mit gefährlichen Atemaussetzern (Schlafapnoe). Im Extremfall ist bei beidseitigen Lähmungen die Anlage einer Trachealkanüle erforderlich. Diese lebensnotwendige Maßnahme wird von den Patienten als soziale Stigmatisierung empfunden, worunter sie zusätzlich leiden. Durch den verminderten Luftaustausch der Lunge mit der Umgebung haben beidseitig Betroffene auch öfter Probleme mit Kurzatmigkeit.[8] Bei zusätzlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Grippe, kann dies vor allem bei beidseitig Betroffenen eine starke Atemnot bewirken. Ebenso kann auch Lachen oder eine emotionale Situation eine Atemnot verursachen. Betroffene leiden meist unter schlechter Schlafqualität und benötigen teilweise Schlafpausen tagsüber. Aufgrund der ständigen Unterversorgung mit ausreichend Luft können in Folge auch Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems auftreten (z. B. Bluthochdruck). Seltener sind Muskelschmerzen zu beobachten, die wohl ebenfalls mit der unzureichenden Atmung zusammenhängen. Es kommt auch zu starken Einbußen in der körperlichen Leistungsfähigkeit, speziell bei beidseitigen Rekurrensparesen. Sehr oft sind Betroffene im alltäglichen Leben stark eingeschränkt. Die meisten Patienten mit einer beidseitigen Rekurrensparese sind langfristig oder sogar dauerhaft arbeitsunfähig.

- **Ursachen** : fortgeschrittene Tumorerkrankungen, chronische Niereninsuffizienz, COPD, chronische Herzinsuffizienz. Die Ursachen können in drei Bereichen zusammengefasst werden: krankheitsbedingt, therapiebedingt, psychosozial.
- **Folgen** : Kraft- und Funktionsverlust mit zunehmender Einbuße (=Verlust) der Mobilität und Selbstständigkeit, Infektanfälligkeit, Dekubitus
- **Therapie** : Behandlung von Begleitsymptomen und reversiblen Ursachen. Ernährungsberatung, Zusatzernährung und medikamentöse Appetitsteigerung.

Bisphosphonate

- **Wirkung**: Minderung des Knochenabbaus durch Hemmung der Osteoklasten
- **Nebenwirkungen** : Hypokalzämie (durch Komplexbildung mit Calcium), akutes Nierenversagen, Kiefernekrose. Kontraindiziert bei Hypokalzämie und eingeschränkter GFR.

Nephrologie

Akutes Nierenversagen ++

Definition

- Akut einsetzende, potentiell reversible Abnahme der Nierenfunktion
- **Diagnosekriterien nach der KDIGO:**
 - Anstieg des Serumkreatinins um $\geq 0,3$ mg/dL innerhalb von 48 h
 - **oder** Anstieg des Serumkreatinins auf das $\geq 1,5$ -Fache innerhalb von 7 Tagen
 - **oder** Neu aufgetretene Reduktion der Urinmenge auf $< 0,5$ mL/kgKG/h über 6 h

Ätiologie

Prärenal (60%): durch renale Minderperfusion

- **Hypovolämie** (Unzureichende Flüssigkeitszufuhr. Erhöhte Flüssigkeitsverluste, durch Blutungen, Erbrechen/Durchfall, Akute Pankreatitis, Diuretika)
- **Abfall des arteriellen BD** (Herzinsuffizienz. Schock. Sepsis)
„Eine lang anhaltende, prärenale Genese führt durch die Minderperfusion der Niere zusätzlich zu einem intrarenalen Nierenversagen durch eine Tubulusnekrose“

Intrarenal (35%): durch direkte Schädigung der Nephronen

- **Tubulär**
 - **Akute Tubulusnekrose (85% der intrarenalen Formen)** : Ischämisch. Medikamentös (Aminoglykoside, NSAR). Toxisch (Kontrastmittel)
 - **Tubulo-interstitielle Nephritis** : Medikamentös (Antibiotika). Infektiös (Viren)
 - **Pigment-Nephropathie** : Myoglobininurie bei Rhabdomyolyse (Crush-Syndrom). Hämoglobinurie bei Hämolyse
- **Makrovaskulär** : Nierenarterienstenose. Nierenvenenthrombose. Niereninfarkte
- **Mikrovaskulär** : Cholesterinemolie-Syndrom. Thrombotische Mikroangiopathien
- **Glomerulär** : Glomerulonephritiden
- **Infektiös** : Pyelonephritis

Postrenal (5%) : durch Abflussbehinderung des Harns

- **Erworbene Abflussbehinderungen** :
 - **Nierenbecken**: Nierensteine
 - **Ureter**: Harnsteine, Tumoren, retroperitoneale Fibrose (Morbus Ormond)
 - **Blase**: Tumoren
 - **Urethra**: benigne Prostatahyperplasie
- **Angeborene Fehlbildungen**

Symptome/Klinik

- Generell **keine spezifischen Symptome**. Asymptomatische Verläufe sind möglich
- **Leitsymptom**: **Oligurie** (Urinausscheidung < 500 ml/Tag) bzw. **Anurie** (Urinausscheidung < 100 ml/Tag). Polyurische Verläufe sind möglich!
- Ggf. **Symptome der Grunderkrankung** : Flankenschmerzen (meist bei postrenalener Genese). Fieber (z.B. bei Pyelonephritis)
- Ggf. Zeichen der Überwässerung (Anasarka, Beinödeme)

Stadien (KDIGO-Klassifikation des ANV)

| Stadium | Serumkreatinin | Urinausscheidung |
|---------|--|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Anstieg um $0,3$ mg/dL (innerhalb von 48 h) oder • $1,5$- bis $1,9$-facher Anstieg (innerhalb von 7 d) | <ul style="list-style-type: none"> • $< 0,5$ mL/kgKG/h für 6–12 h |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • 2- bis $2,9$-facher Anstieg (innerhalb von 7 Tagen) | <ul style="list-style-type: none"> • $< 0,5$ mL/kgKG/h für ≥ 12 h |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 3-facher Anstieg (innerhalb von 7 Tagen) oder • Anstieg auf ≥ 4 mg/dL oder • Beginn einer Nierenersatztherapie | <ul style="list-style-type: none"> • $< 0,3$ mL/kgKG/h für ≥ 24 h oder • Anurie für ≥ 12 h |

Korrespondieren das Stadium nach der Serumkreatinin und die Urinausscheidung nicht miteinander, ist das jeweils höher erreichte Stadium entscheidend.

AKutes Nierenversagen

Prärenal 60%

- Hypovolämie
- Blutungen
- Diarrhö & Erbrechen
- AKute PanKreatitis
- Darmlähmung
- AKRR
- Shock
- Sepsis
- HI

Intrarenal 35%

- Tubulär 85%
 - AKute Tubulär Nekrose
 - ischämisch
 - medikamentöse
 - toxisch
 - Nephritis (Anaphylaxie)
- Mikrovasculär
 - Thromboembolisch, Cholesterinembolie
- Macrovasculär
 - Nierendarmsstenose, Nierenvenenthrombose, Infarkt
- Glomerulär
 - Glomerulonephritis
- Infektion
 - Pyelonephritis

Postrenal 5%

- Erworbene Abflussbehinderungen
 - Steine
 - Tumoren
 - BPH
- Angeborene Fehlbildungen

Diagnostik

Diagnosesicherung

Anhand des **Kreatininwertes** bzw. der **ausgeschiedenen Urinmenge** (s.o.)

Staging (s.o.)

Bestimmung der Ursache

Anamnese

- Hinweis auf prä-renalere Genese?
- Hinweis auf nephrotoxische **Medikamente**? **Kontrastmittelgabe**? ...

Körperliche Untersuchung

- Messung der **Vitalparameter**
- Zeichen einer **Hypovolämie** (z.B. **arterielle Hypotonie**, verminderte Halsvenenfüllung)
- Zeichen einer **Überwässerung** durch verminderte Ausscheidungsfunktion (z.B. Ödeme, Halsvenenstauung, arterielle Hypertonie)

Labor

- **Blut: Retentionsparameter** (Kreatinin, Harnstoff), **BGA** (Hyperkaliämie, Metabolische Azidose), **Blutbild** (Thrombopenie?), **Kreatinkinase** (Rhabdomyolyse?). **LDH** (Hämolyse?). **Lipase** (Pankreatitis?). **Blutkultur** (Sepsis?)
- **Urin :**
 - **U-Status** : Frage nach **Hämaturie** (Hinweis auf intra- oder postrenales Geschehen) und **Proteinurie** (Hinweis auf tubuläre oder glomeruläre Erkrankung)
 - **Urinsediment** : Hinweise auf entzündliche glomeruläre Erkrankung (Akanthozyten : deformierte Erythrozyten, Erythrozytenzylinder)

Sonographie

- **Harnstauung** (bei postrenalärer Genese)
- **V. cava inferior kollabiert** (bei prärenalärer Genese), **gestaut** (bei Überwässerung)
- Ggf. **Pleuraergüsse** (bei Überwässerung)

Ggf. Biopsie

- Bei V.a. rapid-progressive **Glomerulonephritis**
„Bei einem Patienten können mehrere Ursachen für ein akutes Nierenversagen gleichzeitig vorliegen!“

Differenzialdiagnose

- Harnverhalt: Palpation und Perkussion des Unterbauchs, Sonografie: gefüllte Harnblase.
- Chronische Nierenerkrankung: Anamnese, Sonografie

Sonderform : Kontrastmittel-Nephropathie

- Auftreten eines ANV nach intravasaler Applikation von iodhaltigem Kontrastmittel
- **Prophylaxe**
 - Möglichst geringe und niedrigkonzentrierte Kontrastmittelmenge
 - nephrotoxische Medikamente (NSAR,...) pausieren
 - Vermeiden einer Dehydratation!

Komplikationen

- Herz: Herzinsuffizienz durch Überwässerung, Arrhythmien (K+).
- Lunge: Lungenödem
- Gastrointestinaltrakt: Erosionen, Ulzera
- ZNS: Hirnödem (Bewusstseinsstörungen)
- Hämatopoetisches System: Anämie, Infektneigung

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- **Absetzen nephrotoxischer Medikamente** : Sartane, ACE-Hemmer, NSAID, Diuretika (Ausnahme: Überwässerung), Zytostatika, Aminoglykoside.
- **Ggf. Dosisanpassung** aller gegebenen Medikamente an die Nierenfunktion
- **Kontrolle des Wasser-, pH- und Elektrolythaushalts** (Bilanzierung: Einfuhr/Ausfuhr. Behandlung der metabolischen Azidose/ Hyperkaliämie)
- **Bei Überwässerung**: Therapieversuch mit Schleifendiuretika (Furosemid)
- **Ggf. Dialysetherapie**: Indikationen zur Akutdialyse :
 - Therapierefraktärer Anurie >12 Stunden
 - Kreatininanstieg >1mg/dL innerhalb von 24h
 - Harnstoff >200mg/dL oder Anstieg > 60 mg/dl innerhalb von 24h oder symptomatische Urämie (Perikarditis, Lungenödem, Hirnödem, Übelkeit/Erbrechen)
 - Therapierefraktäre Entgleisungen: $K^+ > 6,5 \text{ mmol/L}$ $\text{pH} < 7,2$

Kausale Therapie

- **Prärenale Genese** : Flüssigkeitssubstitution und Bilanzierung der Ein- und Ausfuhr. Ggf. Transfusion von EK bei hämorrhagischem Schock
- **Renale Genese**
 - Glomerulonephritis: Immunsuppressive Therapie
 - Ischämische Genese: Ggf. Revaskularisation
 - Toxische Genese: Ausreichende Hydrierung, ggf. Dialyse
- **Postrenale Genese** : Entfernung des Abflusshindernisses. Ggf. künstliche Harnableitung (durch perkutanes Nephrostoma)
 - „- Eine zeitgleiche Gabe von Schleifendiuretika und Flüssigkeit zur „Nierenspülung“ soll nicht erfolgen.
 - Die Gabe von Schleifendiuretika beim oligoanurischen Patienten mit ANV soll nicht erfolgen,,

Chronische Niereninsuffizienz +

Definition

Irreversible progrediente Funktionseinschränkung der Niere : exkretorisch (glomerulär, tubulär) und inkretorisch (endokrin), über mehr als 3 Monate

Ätiologie

- **Diabetische Nephropathie** : häufigste Ursache
- **Hypertensive Nephropathie**
- **Glomerulonephritiden** : Abakterielle, immunvermittelte, entzündliche Erkrankung der Glomeruli verschiedenster Genese, die beide Nieren betrifft. Urinuntersuchung: Proteinurie, Akanthozyten (deformierte Erythrozyten), Erythrozytenzylinder
 - Primäre Glomerulonephritis
 - Sekundäre Glomerulonephritis: Kollagenosen (Lupus erythematoses), Vaskulitiden
- **Polyzystische Nierenerkrankungen**
- **Tubulo-interstitielle Nierenerkrankungen** (rezidivierende Pyelonephritis, Analgetikanephropathie)
- **Weitere Ursachen**: Vesikoureteraler Reflux, Nephrolithiasis, Amyloidose,...

Symptome/Klinik

Exkretorisch

- **Überwässerung** : Hypertonie. Periphere Ödeme. Lungenödem
- **Urämie** :
 - **Allgemeinsymptome**: Müdigkeit, Appetitlosigkeit
 - **Typische Zeichen** : **Urämischer Foetor** **Pruritus**
 - **Weitere Folgen** : Hämolyse. Pleuritis. Perikarditis. Enzephalopathie (Vigilanzminderung, Krampfanfälle). Polyneuropathie. Gastroenteropathie (Übelkeit, Erbrechen). Thrombozytopenie bzw. -pathie.
- **Elektrolyte und pH** : Kalium, Phosphat↑. Calcium↓. Azidose

Inkretorisch

- **Renale Anämie** (*Normochrom, normozytär*) : durch Erythropoetin-Mangel
- **Renale Osteopathie** : v.a. durch einen sekundären Hyperparathyreoidismus (durch Hypokalzämie durch Vitamin D3-Mangel)

Stadien (nach glomerulärer Filtrationsrate: GFR)

- Männer: 95–145 mL/min/1,73 m²
- Frauen: 75–125 mL/min/1,73 m²

| Stadium | Glomeruläre Filtrationsrate |
|---------|---|
| 1 | ≥90 mL/min (bei bestehendem Nierenschaden) |
| 2 | 60–89 mL/min (bei bestehendem Nierenschaden) |
| 3 | 30–59 mL/min: Stadium 3a (GFR 45–59 mL/min). Stadium 3b (GFR 30–44 mL/min). |
| 4 | 15–29 mL/min |
| 5 | <15 mL/min |

Diagnostik

Labor

- **Blut**: Retentionsparameter↑. Hämoglobin↓. Kalium↑, Calcium↓, Phosphat↑. BGA (ggf. Azidose). Ggf. Erythropoetin, Vitamin D, PTH
- **Urin**: Auffälligkeiten im Urinsediment, Proteinurie

Sonographie

Größe der Nieren, Parenchymdicke

Ggf. Nierenbiopsie

Zur Ursachenklärung

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Ausgeglichene Flüssigkeitszufuhr (etwa 2 Liter/Tag)
- Kontrolle und Korrektur der Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalte
- Vermeidung nephrotoxischer Substanzen (NSAR, Nikotin, Aminoglykoside,...)
- **Blutdruckeinstellung**: ACE-Hemmer (alternativ AT1-Blocker) → nephroprotektiv

Speziell

- **Renale Anämie**: Gabe von Erythropoetin
- **Renale Osteopathie**: Vitamin-D-Substitution, Phosphatbinder (Calciumacetat)
- **Terminale dialysepflichtige Niereninsuffizienz**
 - Behandlungsmethode der Wahl: Nierentransplantation
 - Übergangslösung: Nierenersatzverfahren

Nierenersatzverfahren

Indikationen

• Akutdialyse

- ✓ Akutes Nierenversagen mit: Therapierefraktärer Anurie >12 Stunden. Kreatininanstieg >1mg/dL innerhalb von 24h. Harnstoff >200mg/dL oder Anstieg >60 mg/dl innerhalb von 24h oder symptomatische Urämie (Perikarditis, Lungenödem, Hirnödem, Übelkeit/Erbrechen)
- ✓ Therapierefraktäre Entgleisungen: Hyperkaliämie >6,5mmol/L. Hyperkalzämie ≥3,5 mmol/L. Hypervolämie (z.B. mit Lungenödem). Metabolische Azidose (Bei pH <7,2)


• Dauerdialyse

- Therapierefraktäre Entgleisungen: (s.o.) zusätzlich Renale Anämie (Hb <8,5g/dL trotz adäquater Therapie mit Eisen und Erythropoetin)
- Harnstoff >200mg/dL oder symptomatische Urämie (s.o.)
- Starke Verminderung der GFR <7mL/min

Verfahren

- **Hämodialyse** (Extrakorporales Dialyseverfahren, weiteste Verbreitung): Entfernung harnpflichtiger Substanzen und Wasser aus dem Blut über eine künstliche semipermeable Membran.
 - Gefäßzugang: Akut über ZVK der V. jugularis interna, dauerhaft über operativ angelegte arteriovenöse Fistel meist am Unterarm (Cimino-Shunt)
- **Peritonealdialyse** (Intrakorporales Dialyseverfahren): Entfernung harnpflichtiger Substanzen und Wasser aus dem Blut über eine körpereigene semipermeable Membran (Peritoneum).
 - **Vorteil**: Häusliche Selbstversorgung möglich
 - **Vorbereitung**: Operatives Einbringen eines Peritonealdialyse-Katheters in den Bauchraum
- **Hämofiltration** (Extrakorporales Dialyseverfahren): Entfernung harnpflichtiger Substanzen und Wasser aus dem Blut durch Ultrafiltration.
 - **Vorteil**: Wegen geringerer Kreislaufbelastung insbesondere für Patienten mit labiler Kreislaufsituation geeignet

Hyperkaliämie +



Definition

Serum-K⁺ > 5,5 mmol/l

Ursachen

- **Interne Bilanzstörung**: Azidose, Hämolyse, Myolyse
- **Externe Bilanzstörung**: exzessive K⁺-Zufuhr, verminderte renale Kaliumexkretion (akutes Nierenversagen, chronische Nierenerkrankung, Morbus Addison, NNR-Insuffizienz primär)
- **Medikamente**: K⁺-sparende Diuretika (Spironolacton), ACE-Hemmer, Angiotensin-II-Rezeptor-Blocker, β-Blocker,
- **Pseudohyperkaliämie**: Hämolyse der Blutprobe in vitro, zu lange anliegender Stauschlauch (im Glas)


Klinik

- Anfangs Reflexsteigerung, später Hypo- und Areflexie. Muskelschwäche bis zu Paresen. Parästhesien
- Herzrhythmusstörungen bis zum Kammerflimmern oder Asystolie

Diagnostik

- **Anamnese**: Besonders Medikamente und Grunderkrankungen
- **Labor**: Serum-K⁺ und Na⁺, K⁺ im 24-h-Urin. Kreatinin (Niereninsuffizienz?). BGA (Azidose?). CK, LDH (Zytolyse?)
- **EKG**: T-Wellen zeltförmig, QRS-Verbreiterung, Bradykardie, AV-Blockierung (bis Asystolie), Kammerflimmern

K⁺
BGA
CK, LDH
EKG



Bradykardie
zeltförmige T
QRS verbreiterung
Kammerflimmern

Kalium im Urin

- Renaler Kaliumverlust: Kalium im Urin >30 mmol/L
- Extrarenaler Kaliumverlust: Kalium im Urin <30 mmol/L

Therapie

Kausal

Symptomatisch

Leichte Hyperkaliämie (5,5-6 mmol/L)

Medikation prüfen

- K⁺-arme Kost (wenig Fleisch, Obst, Gemüse, Nüsse)
- Kationenaustauscher: Resonium A[®] oral oder rektal (Kontraindikation: Hyponatriämie, Hyperkalzämie)

Mittelschwere (6-6,5 mmol/L) und schwere Hyperkaliämie (> 6 mmol/L): Notfalltherapie

Monitorüberwachung

- **Kardioprotektion** bei bedrohlicher Hyperkaliämie: **Calciumgluconat 10 % 10ml i. v.** (Kontraindikationen: Hyperkalzämie, Digitalisierung)

Verschiebung von Kalium nach intrazellulär: Zeit gewinnen

- Glukose + Insulin: 200 ml G 20 % + 20 I.E. Normalinsulin über 20 Min.
- β2-Agonisten: Salbutamol 2 Hübe alle 2 h
- Natriumbikarbonat 8,4 %: 50 – 100 ml über 30 Min

Elimination von Kalium: Eigentliche Therapie der Hyperkaliämie!

- Schleifendiuretika: Furosemid 40 – 80mg i. v. / in 1L NaCl 9% / 2 Stunden
- Kationenaustauscher p.o. oder rektal
- Dialyse: Bei Hyperkaliämie infolge Nierenversagens oder als Ultima Ratio.

Ind.:

- Anurie
- Therapieversagen der anderen Maßnahmen

Car-Gluconat 10ml 10%
Glukose-Insulin 200 ml 20% + 20 I.E. Norminsulin / 20 min
Salbutamol 2 Hübe / 2 h
NaHCO₃ 8,4% 50-100 ml / 30 min
Furosemid 40 mg / 1L NaCl 9%
osf. Dialyse alle 4-6 h

15g x 4 / 7
Resonium A

Hyperkaliämie

- Bilanzstörung
 - Renal
 - Akute Nierenschädigung
 - Chronische Niereninsuffizienz
 - Endokrin
 - Hypocortisolismus
 - Hypoaldosteronismus
 - Insulinmangel
 - Medikamentös
 - Heparin
 - Kaliumsparende Diuretika
 - ACE-Hemmer und Angiotensin-Rezeptor-Blocker
 - NSAID
 - Cotrimoxazol
 - Ciclosporin A
 - Digitalisglykoside
 - Lithium
 - Gastrointestinal
 - Übermäßige Zufuhr (bspw. Verzehr großer Mengen von Bananen und Trockenfrüchten)
 - Erhöhte Kaliumfreisetzung
 - Rhabdomyolyse, Hämolyse, Tumorlyse-Syndrom
 - Verbrennung, Traumata
 - Massentransfusion bzw. Transfusion inadäquat gelagerter Erythrozytenkonzentrate
- Umverteilung
 - Azidose
 - Hyperglykämisches Koma

Hypokaliämie +

Definition

Serum-K⁺ < 3,5 mmol/l

Ursachen

- **Interne Bilanzstörung** : Alkalose, hormonelle Einflüsse (Insulin, Aldosteron, Katecholamine)
- **Externe Bilanzstörung** : verminderte K⁺-Zufuhr (selten). K⁺-Verlust (Renal: Hyperaldosteronismus, Hypercortisolismus. Gastrointestinal : Erbrechen, Diarrhö)
- **Medikamente** : Thiazid- und Schleifendiuretika, Glucocorticoide, Laxantien, Insulin, β -Sympathomimetika

Klinik

- Muskeleigenreflexe ↓. Muskelschwäche bis zu Paresen.
- Obstipation bis zum paralytischen Ileus.
- Polyurie, Polydipsie.
- Herzrhythmusstörungen bis zum Kammerflimmern

Diagnostik

- **Anamnese**: Besonders Medikamente und Grunderkrankungen
- **Labor**: Serum-K⁺ und Na⁺, K⁺ im 24-h-Urin. BGA (Alkalose?). Renin und Aldosteron bei Hypertonie
- **EKG**: T-Wellen-Abflachung, U-Welle, ST-Senkung. Extrasystolen, supraventrikuläre und ventrikuläre Tachykardien (bis Kammerflimmern)

Therapie

- **Kausal** *Medikamente prüfen, Ätiologie abklären*

- **Symptomatisch**

Leichte Hypokaliämie (3–3,5 mmol/L)

- kaliumreiche Kost (Obst, Gemüse, Nüsse etc.) *1–4/Tag 1tbl = 40 mmol, Einzeldosis soll 1 tbl nicht überschreiten*
- Orale Substitution: (z. B. Kalinor ^{Kaliumcitrat} Brause®) 40 – 100 mmol/d (Nebenwirkungen: Übelkeit, Erbrechen)

Mittelschwere (2,5–3 mmol/L) und schwere Hypokaliämie (< 2,5 mmol/L)

• Monitorüberwachung

- **i. v. Substitution** : mit Kaliumchlorid-Lösung (KCL):

- maximal 20 mmol/h, 80 mmol/d und 40 mmol/l über periphere Vene = venentoxisch und kann Herzrhythmusstörungen auslösen


- bei höherem Bedarf : Perfusor über ZVK (bis 20 mmol/h)

Niemals Bolusgabe von Kalium

Hypokaliämie

- Kaliumverluste
 - Renal
 - Endokrin: Hyperaldosteronismus, Hypercortisolismus
 - Medikamentös
 - Diuretika (exklusive kaliumsparenden Diuretika)
 - Glucocorticoide
 - Clindamycin
 - Aminoglykoside
 - Azol-Antimykotika und Amphotericin B
 - Renal tubuläre Azidose (Typen I und II)
 - Gastrointestinal
 - Erbrechen, Diarrhö (CAVE: Abführende Maßnahmen vor medizinischen Eingriffen!)
 - Medikamentös: Laxantien
 - Schwitzen
- Geringe Kaliumzufuhr mit der Nahrung
 - Essstörung
 - Fehlernährung und Mangelernährung
- Umverteilung
 - Alkalose
 - Insulintherapie
 - Katecholamine
 - Hypomagnesiämie

Hyponatriämie +



Definition

- Serum- Na^+ < 135 mmol/L.
- Mild: 135–130 mmol/L. Moderat: 129–125 mmol/L. Schwer: <125 mmol/L
- Abgrenzung zur Pseudohyponatriämie: Beeinflussung der Osmolalität bei Hyperglykämie, -lipidämie und -proteinämie

Ursachen

- **Hypervolämische Formen:** (häufig) mit Verdünnungseffekt **ohne Natriumverlust**: Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom, psychogene Polydipsie
- **Hypovolämische Formen:** mit Natrium- und Wasserverlust
 - **Renal** (Urin-Natrium >30 mmol/L): Diuretika (insb. Thiazide), Nebennierenrindeninsuffizienz
 - **Extrarenal** (Urin-Natrium <30 mmol/L): Erbrechen, Diarrhö, Pankreatitis
- **Normovolämische Formen:** Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion (Schwartz-Bartter-Syndrom)

Klinik

- Symptome der Hyponatriämie: Übelkeit/ Erbrechen, Kopfschmerzen, kognitive Funktionsstörungen, Verwirrtheit, Koma, Krampfanfälle
- Symptome der Grunderkrankung (s. o.)
- Symptome des jeweiligen Hydratationszustandes (s.o.)

Diagnostik

- Serum- und Urin-Natrium
- Serum- und Urinosmolalität, Kreatinin, Harnstoff, Serumkalium, Blutzucker, Hämatokrit (↓ bei Hypervolämie, ↑ bei Hypovolämie)

Therapie

Kausal (z. B. Diuretikum absetzen)

Symptomatisch

schwere neurologische Symptomatik


- vorsichtige Gabe von hypertoner Kochsalzlösung (NaCl 3%) 100ml über 30 min, dann Na^+ -Kontrolle und ggf. Wiederholung bis ein Anstieg des Serum- Na^+ um maximal 5 mmol/l in den ersten 5 h oder Besserung der Symptomatik
- dann Gabe von isotoner Kochsalzlösung (NaCl 0,9 %). Ziel: Anstieg des Serum- Na^+ um maximal 8 mmol/l pro 24 h bis zu einem Serum- Na^+ von 130 mmol/l
- Ein zu schneller Natriumanstieg kann eine zentrale pontine Myelinolyse auslösen (Tetraparesen, Bewusstseinsstörungen)

ohne schwere Symptomatik


- **hypovolämische Hyponatriämie:** Gabe von isotoner Kochsalzlösung (NaCl 0,9 %). Ziel: Anstieg des Serum- Na^+ um maximal 8 mmol/l pro 24 h
- **isovolämische Hyponatriämie:** Flüssigkeitsrestriktion (500-800 ml/d)
- **hypervolämische Hyponatriämie:** Flüssigkeitsrestriktion auf 500 mL/d, Schleifendiuretika (Furosemid). Evtl. orale NaCl-Sustitution

20mg iv

Einnalgabe



100 ml NaCl 3% / 30 min max 5 mmol/L / 5 h
NaCl 0,9% → 8 mmol/L / 24 h




Komplikationen

Osmotische Myelinolyse

- Definition: Zerstörung der Myelinscheiden bei zu schneller Korrektur einer Hyponatriämie, insb. in der zentralen Region des Pons (sog. „zentrale pontine Myelinolyse“) oder auch deutlich weniger häufig z.B. im Thalamus, Putamen oder Marklager (sog. „extrapontine osmotische Myelinolyse“)
- Pathophysiologie
 - Der parenterale Ausgleich der Hyponatriämie erhöht die Osmolarität des Blutes → Es kommt zum Ausstrom von Wasser aus dem Gewebe (hier speziell aus den Myelinscheiden) → Dehydratation führt zum Untergang der Myelinscheiden (= osmotische Demyelinisierung)
- Stadienhafter Verlauf
 - 1 Bewusstseinsbeeinträchtigung und Koma
 - Ggf. kurzfristige Erholung
 - 2 Nach einigen Tagen: Zunehmende Tetraparese
 - 3 Störung der Hirnstammfunktion mit Ausfall der Hirnnerven
- Risikofaktoren
 - ☞ Leberzirrhose
 - Malnutrition
 - ☞ Kaliummangel
- Diagnostik: Veränderungen im MRT häufig erst nach Wochen nachweisbar, daher klinische Diagnosestellung
- Prävention: Maximaler Anstieg der Natriumkonzentration im Serum um 6–8 mmol/L je 24 h

Hypernatriämie -



Definition

Serum- $\text{Na}^+ > 145 \text{ mmol/l}$ (Schwer : $> 160 \text{ mmol/l}$)

Ursachen

- **Hypovolämisch** (= hypertone Dehydratation):
 - **Renal**: Hyperglykämie, Mannitoltherapie, Diabetes insipidus
 - **Extrarenal**: Diarrhö, Erbrechen, Verbrennungen, unzureichende Wasserzufuhr
- **Hypervolämisch** (= hypertone Hyperhydratation) oder **isovolämisch**: i.d.R. iatrogen (Übermäßige Gabe von NaCl oder Natriumbicarbonat)

Klinik

- Symptome der Hypernatriämie: kognitive Funktionsstörungen, Verwirrtheit, Koma, Krampfanfälle
- Symptome der Grunderkrankung (s. o.)
- Symptome des jeweiligen Hydratationszustandes (s. o.)

Diagnostik

- Serum- und Urin-Natrium
- Serum- und Urinosmolalität, Kreatinin, Harnstoff, Serumkalium, Blutzucker, Hämatokrit

Therapie

Kausal

Symptomatisch

- **hypovolämische Hypernatriämie (oder auch normovolämisch)**: NaCl 0,45% 500–1000 mL über 60 min i.v., Kontrollen des Serumnatriums initial alle 2–4 h, im Verlauf alle 12–24 h bis ein Serumnatrium $\leq 150 \text{ mmol/L}$
- **hypervolämische Hypernatriämie**: Glucoselösung 5% 500 mL i.v. mit Furosemid 40 mg i.v.
- Eine zu schnelle Natriumsenkung kann ein Hirnödem auslösen.

- „Serumnatriumwerte $< 120 \text{ mmol/L}$ oder $> 160 \text{ mmol/L}$ bzw. jede schwer symptomatische Form einer natriumbezogenen Elektrolytstörung bedürfen einer intensivmedizinischen Behandlung!“

- „**Vorsichtiger Ausgleich** : In den ersten Stunden: Steigerung/Senkung des Serumnatriums um maximal 1 mmol/L stündlich. In den folgenden Tagen: Bis zum Erreichen eines Serumnatriums von 130 mmol/L (Hyponatriämie) bzw. 150 mmol/L (Hypernatriämie) sehr vorsichtige Steigerung/Senkung des Serumnatriums um max. 8 mmol/L je 24 Stunden“

Hirnödem bei Ausgleich einer Hypernatriämie

- Pathophysiologie
 - Intrazellulär gleicht sich die Osmolarität langsamer an
 - Bei zu schneller Senkung der extrazellulären Osmolarität bei einer Hypernatriämie kommt es zum Wassereinstrom in die Zellen
 - Im ZNS ist dies aufgrund der räumlichen Enge gefährlich → Gefahr des Hirnödems!
- Prävention
 - Langsame Korrektur des Serumnatriums bei langsam entwickelter Hypernatriämie (max. $0,5 \text{ mmol/L}$ stündlich)
 - Initial stündliche Kontrollen der Natriumkonzentration im Serum
- Ausnahme: Die hochakute Entstehung einer Natriumwert-Entgleisung erfordert einen schnellen Ausgleich, da sonst die genannten Komplikationen drohen

Calciumhaushalt +/-

- Der Calciumhaushalt ist von vielen Organen und Hormonen beeinflusst wird (Niere, Darm, Knochen, Nebenschilddrüse, Leber, Haut, Parathormon, Calcitonin, Vitamin-D₃).
- Wirksam ist der ionisierte Anteil (~ 50 %). Im Labor gemessen wird meist das Ges.-Ca²⁺ (normal: 2,2–2,6 mmol/l)

Parathormon (PTH)


- Der Serumcalciumgehalt wird hauptsächlich über PTH geregelt
- **Regelkreis** : Erniedrigte Calciumwerte führen zur Ausschüttung von PTH, erhöhte Werte hemmen die Ausschüttung
- **Wirkung** : erhöht den Serumspiegel von Ca^{++} und senkt den Serumspiegel von Phosphat
 - Stimulation der Calciumresorption in den Nieren sowie der Phosphatausscheidung
 - Gesteigerte Vitamin-D-Produktion
 - Freisetzung von Calcium aus dem Knochen

Vitamin D

- **Wirkung** : steigert zwar auch den Serumcalciumgehalt durch Effekte auf Nieren und Darm, fördert aber im Gegensatz zu PTH die Knochenmineralisation
- **Synthese**
 - Ausgangssubstanz: **Cholecalciferol** → Aufnahme durch Nahrung oder Bildung durch Einwirkung der Sonne in der Haut aus 7-Dehydrocholesterol
 - Zwischensubstanz: **25-Hydroxycholecalciferol** → Durch Hydroxylierung in der Leber
 - Endsubstanz/aktive Form von Vitamin D: **Calcitriol** (=1-25-Dihydroxycholecalciferol) → Durch Hydroxylierung in der Niere

Calcitonin

- kann als Gegenspieler von PTH gesehen werden
- Hemmt den Knochenabbau und führt somit zu einer Erniedrigung des Serumcalciums
- Bedeutsam für das medulläre Schilddrüsenkarzinom (Verwendung als Tumormarker)



Hypokalzämie +

Definition

Serum-Gesamt-Ca⁺⁺ < 2,2 mmol/l (von pH-Wert und Albuminkonzentration abhängig)

Ursachen

- **Echte Hypokalzämie** (Serum-Gesamt-Ca⁺⁺ und ionisiertes Serum-Ca⁺⁺ erniedrigt < 1 mmol/l):
 - **Malabsorptionssyndrom**, Alkoholismus
 - **Vitamin-D-Mangel** (Nieren- und Leberinsuffizienz, geringe Sonnenexposition)
 - **Hypoparathyreoidismus** (PTH erniedrigt, Serum-Phosphat erhöht): z. B. **postoperativ** nach Strumektomie
 - **vermehrter Bedarf**: Schwangerschaft, Stillzeit
 - **akute Pankreatitis**
 - **Medikamente** (Schleifendiuretika, Glucocorticoide)
- **Pseudohypokalzämie** (Serum-Gesamt-Ca⁺⁺ erniedrigt, normales ionisiertes Serum-Ca⁺⁺):
Hypalbuminämie (bei nephrotischem Syndrom, Leberzirrhose)

Klinik

- **Akut:**
 - **Tetanie** mit Hyperreflexie, Parästhesien, Krampfanfälle, Pfötchenstellung (Geburtshelferhand), Laryngospasmen
 - Herzrhythmusstörungen infolge einer QT-Zeit-Verlängerung (z.B. Torsade de pointes).
 - **Chvostek-Zeichen** (Beklopfen des N. Fazialis vor dem Kiefergelenk löst Mundwinkelzucken aus)
 - **Trousseau-Zeichen** (Aufpumpen einer Blutdruckmanschette führt nach einigen Minuten zur Pfötchenstellung)
- **Chronisch:** Hautveränderungen, Alopezie, Diarrhö, Herzinsuffizienz, Depression

Diagnostik

- **Labor:** Serumcalcium (inkl. ionisiertem Calcium), Phosphat, Kreatinin, Albumin, BGA, intaktes Parathormon, Vitamin D
- **EKG:** QT-Verlängerung, Arrhythmien (Torsade de pointes)
- **Differenzialdiagnose:** Hyperventilationstetanie (wenn bedingt durch respiratorische Alkalose)

Therapie

Kausal (s. o.)

Symptomatisch

- **Ca⁺⁺-reiche Kost** (Milchprodukte)
- **orale Substitution** : 1 – 3 g/d, ggf. zusätzlich Vitamin D
- **i. v. Substitution bei Tetanie:**
 - 20 ml Ca⁺⁺-Gluconat 10 % langsam i. v. über 10 min, b.B. Wiederholung (cave: nie bei digitalisierten Pat. = Risiko für Kammerflimmern)
 - Dann langsame Infusion von Ca⁺⁺-Gluconat 10 % in 100 mL NaCl 0,9 % oder G 5 %, b.B. Wiederholung, bis Symptomatik rückläufig
 - Engmaschige Serum-Ca⁺⁺-Kontrolle

Hyperkalzämie -

Definition

Serum-Gesamt- $\text{Ca}^{++} > 2,6 \text{ mmol/l}$

Ursachen

- **Primärer Hyperparathyreoidismus** (häufigste Ursache)
- **Maligne Erkrankungen** (Bronchial-, Prostata-, Mammakarzinom,...)
- **Medikamente**: Thiaziddiuretika, Vitamin D

Klinik

- **ZNS** : Depressionen, Psychosen, Verwirrtheit
- **Muskulatur**: Hyporeflexie, Muskelschwäche
- **Niere**: Polyurie, **Nephrokalzinose**, **Nephrolithiasis**
- **Magen-Darm-Trakt**: Übelkeit, Erbrechen, gastroduodenale Ulzera
- **Herz**: **Bradykardien** und **AV-Block**
- **Hyperkalzämische Krise** ($\text{Ca}^{++} > 3,5 \text{ mmol/l}$): Erbrechen, Polyurie, Fieber, Exsikkose, Verwirrtheit, Koma. Prognose: **Letal in 50 %!**

Diagnostik

- **Labor**: Serumcalcium, Phosphat, Kreatinin, intaktes Parathormon, Vitamin D
- **EKG**: **QT- und ST-Verkürzung**. Ggf. **Bradykardie**, **AV-Block**

Therapie

Kausal (z.B. Absetzen von Thiaziddiuretika)

Notfalltherapie einer hyperkalzämischen Krise (Bei Serumcalcium $> 3,5 \text{ mmol/L}$)

• Forcierte Diurese :

- Flüssigkeitsgabe **3 – 6 L NaCl 0,9 %** i.v. in 24 h (ggf. mit K^{+} -Zusatz)
- **Furosemid**, 40–80 mg/d
- unter Bilanzierung sowie engmaschige Ca^{++} -, Elektrolyt-, und Kreatinin-Kontrollen
- **Dialyse mit calciumfreiem Dialysat** : Bei Anurie bzw. Misserfolg der diuretischen Therapie

Ambulante Behandlung (Bei Serumcalcium $< 3,5 \text{ mmol/L}$)

- Reduktion der Calciumzufuhr
- Flüssigkeit oral mit Furosemid p.o.

3-6 L NaCl 0,9 % / 24h + K^{+}
Furosemide 40-80 mg/d

Dehydratation (Exsikkose) +/-

Definition

Zustand des verringerten Wasserhaushalts

Ätiologie

- **Mangelnde Zufuhr** (v.a. ältere Menschen, Schwerkranke)
- **Vermehrter Verlust**
 - **Renal**: Diuretika, ADH-Mangel/Resistenz, Hyperglykämie
 - **Extrarenal**: Fieber, Erbrechen, Diarrhö, Verbrennungen

Klassifikation (Formen der Dehydratation)

- **Isoton**: Verlust von Natrium und Wasser in gleichem Verhältnis (Serumnatrium unverändert)
- **Hypoton**: Natriumverlust stärker als Wasserverlust → Serumnatrium erniedrigt
- **Hyperton**: Wasserverlust stärker als Natriumverlust → Serumnatrium erhöht

Symptome/Klinik

- **Durst, Oligurie**
- **Trockene Haut und Schleimhäute**. Halonierte Augen (Dunkelfärbung der periorbitalen Region)
- **Kopfschmerzen**, Benommenheit, Desorientierung
- **Schwäche, Kreislaufinstabilität**
- **Kinder**: Weinen ohne Tränen
- **Säugling**: Eingefallene Fontanelle

Diagnostik

- **Körperliche Untersuchung**: Tachykardie, Hypotonie. Schwacher Puls. Verminderte Venenfüllung. Verlangsamte Rekapillarisationszeit (>2 Sekunden). Stehende Hautfalten. Körpergewicht messen
- **Urinmenge und -farbe** : Harnmenge gibt Hinweise auf Genese der Exsikkose
- **Labor**: Hämatokrit↑. Serumnatriumwert. Blutzucker

Komplikationen

- Hypovolämischer Schock
- Prärenales Nierenversagen
- Infektionen (v.a. Harnwegsinfektion)
- Thrombose

Therapie

- **Isotone Dehydratation**: Flüssigkeitsgabe durch isotoner Lösungen (Initial intravenös, insbesondere bei schwerer Dehydratation. Optimalerweise oral)
- **Hypo- oder hypertone Dehydratation**: Langsamer Ausgleich unter strenger Kontrolle des Serumnatriums wichtig! (siehe Hypo- und Hypernatriämie)
- Engmaschige Kontrolle Natrium- und Kaliumwert

„Vorsichtiger Ausgleich bei Herzinsuffizienz - zu rasche Flüssigkeitsgabe kann zu einer kardialen Dekompensation führen“

Sonstiges

Nephrotisches Syndrom +/-

- **Definition :** Proteinurie $> 3,5$ g/d, Hypoproteinämie, Hyperlipoproteinämie, Ödeme.
- **Ursachen :** Glomerulonephritiden++, Diabetes mellitus, Amyloidose
- **Klinik :** Ödeme (Albumin ↓), Infektanfälligkeit (Immunglobuline ↓), erhöhtes Thromboserisiko (AT III ↓). Im Spätstadium Symptome einer chronischen Niereninsuffizienz
- **Diagnostik :** Klinik (Ödeme). Gesamteiweiß und Albumin ↓, Triglyzeriden und Cholesterin ↑. Serum-Elektrophorese (Albumin und γ -Globuline ↓). Kreatinin, Harnstoff. 24-h-Urin auf Eiweiß. Ggf. Nierenbiopsie
- **Therapie :** Kausal. Eiweißbeschränkung. Ödemtherapie (Diuretika). Thrombose-Prophylaxe (Heparin). Hyperlipidämietherapie (Statine). Hypertonietherapie (ACE-Hemmer)

Hämatologie

Milzruptur ++

Verletzungen der Milz werden meist durch stumpfe Bauchtraumen verursacht. Selten kann es auch zu Spontanrupturen kommen.

Ätiologie

- **Traumatische Milzruptur** (Häufigste abdominelle Beteiligung bei Patienten mit Polytrauma)
 - Stumpfes (geschlossenes) Bauchtrauma: **Hauptursache Verkehrsunfälle**
 - Direktes (penetrierendes) Bauchtrauma, bspw. **Messerstich**
 - **Iatrogen**, bspw. bei Operationen
- **Spontane Milzruptur**: Bei Erkrankungen mit Splenomegalie (Malaria, Mononukleose, hämatologische Erkrankungen)

„Jedes Trauma des Abdomens kann eine Milzruptur verursachen!“

Klassifikation

Klassifikation der Milzverletzungen nach der American Association for the Surgery of Trauma (AAST)

| AAST-Grad | Verletzung | |
|-----------|---|---|
| | Lazeration | Hämatom |
| I | <ul style="list-style-type: none"> • Kapselriss <1 cm tief • <u>Keine</u> aktive Blutung | <ul style="list-style-type: none"> • Subkapsulär, <10% der Oberfläche betreffend • Nicht progredient |
| II | <ul style="list-style-type: none"> • Kapselriss 1–3 cm tief • <u>Aktive</u> Blutung • <u>Keine</u> Verletzung von Trabekelgefäßen | <ul style="list-style-type: none"> • Subkapsulär, 10–50% der Oberfläche betreffend • Intraparenchymal <2 cm Durchmesser • Nicht progredient |
| III | <ul style="list-style-type: none"> • >3 cm tief oder Verletzung von <u>Trabekelgefäßen</u> • Aktive Blutung | <ul style="list-style-type: none"> • Subkapsulär, >50% der Oberfläche betreffend • Intraparenchymal >2 cm Durchmesser • <u>Progredient</u> |
| IV | <ul style="list-style-type: none"> • Verletzung von <u>Segment- oder Hilusgefäßen</u> • ausgedehnte <u>Durchblutungsstörungen</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Intraparenchymal, <u>rupturiert mit aktiver Blutung</u> |
| V | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Vollständige Zerstörung der Milz</u> • Abriss der Hilusgefäße, aufgehobene Durchblutung | |

nicht progredient

Pathophysiologie

Anatomische Grundlagen


- **Lage der Milz**: Intraperitoneal im linken Oberbauch auf Höhe der **9.–11. Rippe**
- **Durchblutung**:
 - Arterielle Gefäßversorgung v.a. aus dem **Truncus coeliacus** über die **A. splenica**
 - Venöse Drainage über die **V. splenica**

Funktion der Milz

- **Sekundär lymphatisches Organ**
- **Abbau alter Erythrozyten und Thrombozyten**
 - Speichert bis zu **25%** der Thrombozyten als Reserve
 - Splenektomie → Thrombozytose

Pathomechanismus (Bei Traumatische Milzruptur)

- **Einzeitig**: Verletzung der Milzkapsel und ggf. des Milzparenchyms → Akute intraabdominelle Blutung



Grade I

- laceration or capsular tear
- subcapsular haematoma

Grade II

- laceration
- intraparenchymal haematoma
- subcapsular haematoma

Grade III



- laceration
- intraparenchymal or ruptured subcapsular haematoma
- subcapsular haematoma

A pseudoaneurysm or AV fistula constitutes a splenic vascular injury

Confined active parenchymal bleed

Vascular injury and active bleed into the peritoneum

*Verletzung
einer Hilusgefäß
o. Segmentgefäß*



Grade IV

- laceration
- vascular injury
- intraparenchymal haematoma

Grade V


- vascular injury
- shattered spleen


*Advance one grade for each additional injury upto grade III.

SHapu

CC NC BY SA
Radiopaedia.org

Grad I





Grade II

Spin: -0
Tilt: 0



R

H

A

F

L

Grade II



Grade III




Grade IV



Grade V



Crad II



- **Zweizeitig:** Verletzung des Milzparenchyms bei zunächst noch intakter Milzkapsel → Zentrales oder subkapsuläres Hämatom → **Symptomfreies Intervall** → Anschließend Ruptur der Kapsel mit intraabdomineller Blutung

Symptome/Klinik

- **Einzeitige Milzruptur:** Klinische Symptomatik variabel (v.a. abhängig vom Blutverlust)
 - Kreislauf: Stabil oder nicht stabil, bis zum **hämorrhagischen Schock**
 - Diffuse leichte bis starke **Schmerzen insb. im linken Oberbauch**
 - Ggf. **Abwehrspannung**
 - Ggf. **Schmerzausstrahlung** in die linke Schulter (**Kehr-Zeichen**) oder **Druckschmerz** an der linken Halsseite (**Saegesser-Zeichen**)
 - Schmerzbedingte **Schonatmung**
- **Zweizeitige Milzruptur**
 - Direkt nach Trauma **beschwerdefreies Intervall** über Stunden **bis Wochen**
 - **Plötzlich einsetzende Schocksymptomatik**, linksseitige Oberbauchschmerzen sowie weitere Symptome der einzeitigen Milzruptur

„Bei zweizeitiger Ruptur ist eine verzögerte bzw. abgeschwächte Symptomatik typisch!“

Diagnostik

Anamnese und körperliche Untersuchung

- Zügig, fokussiert auf Unfallhergang. Insb. achten auf :
 - **Penetrierende** Verletzung
 - **Hämatome**
 - **Palpable Raumforderung** im linken Oberbauch
 - **Druck- und Klopfschmerz** im linken Oberbauch
 - **Abwehrspannung**

Diagnostik

- **Vitalparameter und Monitoring**
- **FAST (Sonographie):** Goldstandard zur Diagnosesicherung, engmaschige Verlaufskontrollen obligat
 - Hämatom in der Milz oder subkapsulär
 - **Freie intraabdominelle Flüssigkeit**, Prädilektionsstellen
 - **Koller-Pouch** (Recessus splenorenalis)
 - **Morison-Pouch** (Recessus hepatorenalis)
 - ♀: **Douglas-Raum**
 - ♂: **Proust-Raum**
- **Labor :** Blutbild (Ggf. Hb-Abfall), Nieren- und Leberwerte, **Gerinnungsparameter**
- **Fakultative apparative Diagnostik**
 - **CT Abdomen**
 - Indikation: **Stabiler** Patient mit Polytrauma, eingeschränkte Untersuchungsbedingungen, unklare Befunde
 - Befund : Laceration, Hämatom
 - **Röntgen-Thorax:** Ggf. **Rippenserienfraktur**
 - **Röntgen-Abdomen**

„- Der klinische V.a. eine Milzruptur ist ein Notfall! Im Vordergrund steht die Diagnosesicherung durch FAST, weiterführende Diagnostik sollte kritisch gegenüber dem Zeitverlust abgewogen werden!

- Insb. bei konservativer Behandlung müssen engmaschige sonographische Verlaufsuntersuchungen durchgeführt werden!

- **Bei penetrierendem Trauma darf der Gegenstand nicht präoperativ entfernt werden**, da sonst unkontrollierbare Blutungen drohen!“

Therapie

Therapeutisches Vorgehen

| AAST-Grad | Verletzungsmuster | Therapie | |
|------------|---------------------------------------|---|--|
| | | Hämodynamisch stabil | Hämodynamisch instabil/ nicht stabilisierbar |
| I | Subkapsuläres Hämatom/Kapselriss | Konservativ | Operative Therapie, möglichst milzerhaltend |
| II | Oberflächlicher Parenchym-/Kapselriss | • Konservativ unter intensivmedizinischer Überwachung | |
| III | Tiefer Parenchymriss | • Ggf. Angioembolisation | |
| IV | Organfragmentierung | Splenektomie | + Thromboseprophylaxe + Impfung |
| V | Abriss am Hilus/Milzberstung | | |

Nicht-operative Therapie

Konservativ

Vorteile:- Kein OP, ↓ OPST-Syn, ↓ Morbidität, Erhalten der Immunfunktion
Voraussetzung:- Stabile Patienten
Stabile Pt.

- **Indikation:** Goldstandard bei **AAST-Grad I**, jedoch Grad II und III bei stabile Patienten können konservativ behandelt werden
- **Durchführung**
 - Stationäre, ggf. intensivmedizinische Überwachung
 - Engmaschige Sonographie- und Laborkontrollen

Interventionell: Angiographie und Embolisation von Milzgefäßen

- **Indikation:** Z.n. zahlreichen Voroperationen, portale Hypertension, Lebererkrankung
- **Durchführung**
 - Angioembolisation mittels Schaum oder Coils
 - Einsetzen von Stents

Operative Therapie

- **Indikation**
 - AAST-Grad > I *Jedoch können Milzrupturen Grad 2 und 3 konservativ behandelt werden*
 - Hämodynamisch instabiler Patient
 - Gestörte Blutgerinnung
- **Durchführung:** Mediane Laparotomie oder quere linksseitige Oberbauchlaparotomie

Milzerhaltende Verfahren

- **Indikation:** Periphere Rupturen
- **Splenorrhaphie:** Blutstillung ohne Resektion
- **Gefäßligatur**
- **Partielle Milzresektion**

Offene Splenektomie

- **Indikation:** Hilusrupturen oder vollständige Berstung (Éclatement)
- Lebensgefährliche Komplikationen meist innerhalb der ersten 24 Stunde
- Nach Splenektomie kann das meist tödlich verlaufende OPSI-Syndrom auftreten!

Komplikationen

- **Hämorrhagischer Schock**
- **Intraoperative Komplikationen**
 - Lebensbedrohliche Blutungen
 - Verletzung von Pankreasschwanz, Magen, Kolon
- **Postoperative Komplikationen**
 - **Pulmonal:** Pleuraerguss, Lungenatektase, Pneumonie
 - **Im OP-Gebiet:** Infektion des Milzbettes, Pseudozysten, subphrenischer Abszess, Pankreatitis

Überwärmung Post Splenektomie Infektion

- **Immunologisch:** Nach Splenektomie **erhöhte Infektanfälligkeit**, erhöhte Sepsisanfälligkeit, **OPSI** (s.u.)
- **Hämatologisch:** **Passagere Thrombozytose**, **thromboembolische Komplikationen**

Prognose

- **Letalität:** 0–15%
 - Insb. abhängig von Begleitverletzungen (Multiorganverletzungen, Polytrauma)
 - Bei isolierten Verletzungen der Milz: Prognose v.a. abhängig vom Alter des Patienten, Blutverlust

Asplenie

Die Milz ist der primäre Ort des Erythrozytenabbaus und spielt im Immunsystem eine wichtige Rolle. Insbesondere für eine adäquate immunologische Reaktion gegen bekapselte Bakterien sowie Parasiten ist dieses Organ essentiell.

Ursachen

- ⊙ **Zustand nach Splenektomie**
- ⊙ **Funktionelle Asplenie:** Sichelzellenanämie,...

Folgen

Erhöhte Infektanfälligkeit

- **Komplikation: OPSI** (overwhelming postsplenectomy infection)
 - = Postsplenektomie-sepsis : Bekapselte **Pneumokokken, Meningokokken** oder **Haemophilus Influenzae** werden normalerweise nach Antikörperbindung durch spezielle Makrophagen in der Milz phagozytiert. Bei Asplenie fehlt dieser Abwehrmechanismus und die Gefahr einer Sepsis mit hoher Letalität ist massiv erhöht
 - **Prophylaxe**
 - **Impfung** gegen Pneumokokken, Meningokokken und Haemophilus influenzae Typ B
 - **Impfplan:** Impfungen generell **bis 3 Tage vor (!)** elektiver OP bzw. postoperativ **nach ausreichender AZ-Stabilisierung** *innerhalb von 2 W*
 - **Pneumokokken:** Boosterung nach frühestens 2 Monaten, Auffrischungsimpfungen dann alle 5 Jahre
 - **Meningokokken:** Boosterung nach Empfehlungen der STIKO nur bei erhöhtem Umgebungsrisiko, keine Auffrischungsimpfungen notwendig
 - **Haemophilus influenzae:** Keine Boosterung oder Auffrischungsimpfung notwendig
 - **Impfung gegen Influenza** *Täglich*
- **Therapie:** Frühe und sofortige **antibiotische Therapie** bei Fieber bzw. Infektverdacht
- **Prävention :**
 - Betroffene sollten einen Notfallausweis mit sich tragen (mit dokumentiertem Impfstatus)
 - Strengere Vorsichtsmaßnahmen bei Aufenthalt in Malaria-Risikogebieten


Laborveränderungen

- **Passagere Thrombozytose** → Im ersten Halbjahr **erhöhtes Risiko einer Pfortaderthrombose** *NMH*
 - Prophylaxe: **Mindestens 4-wöchige low-dose-Heparinisierung**, ggf. für **1 Jahr ASS (100mg/d)** *ins. besonders bei Thrombozytenzahl > 100.000*
- Lymphozytose
- Verminderte Bildung von Immunglobulinen (IgG, IgM)

Prävention von Infektionen

1. Antibiotikaprophylaxe
 - Indikation: Kinder und Patienten mit hohem OPSI-Risiko
 - Wirkstoffe
 - Penicillin V
 - Kinder < 5 Jahre
 - Kinder > 5 Jahre
 - Erwachsene
 - Alternativ Amoxicillin
 - Kinder
 - Erwachsene
 - Bei Penicillin-Allergie: Makrolide, z.B. Erythromycin oder Cephalosporine p.o.
 - Kinder
 - Erwachsene
 - Dauer: Mind. 1–2 Jahre nach subtotaler Splenektomie Dauer individuell anpassen
2. Frühzeitige Antibiotika-Therapie bei fieberhaften Infekten [10]
3. Immunisierung innerhalb von ca. 2 Wochen nach dem Eingriff (nach Stabilisierung des Allgemeinzustandes)
 - Haemophilus-influenzae-B(HIB)-Impfung
 - Meningokokken-Impfung
 - Pneumokokken-Impfung
4. Jährliche Influenza-Impfung aufgrund des Risikos für bakterielle Superinfektionen (insb. Pneumokokken)

Prävention von Thrombosen nach Splenektomie

- Konsequente post- und perioperative Thromboseprophylaxe
 - Dauer: Mind. 4 Wochen lang durchführen
 - Wirkstoff und Dosierung: Mit NMH, siehe Thromboseprophylaxe – Operative Indikationen
 - Verlaufskontrolle: Risikopatienten mittels Doppler-Ultraschall überwachen, ggf. D-Dimere bestimmen
 - Behandlung mit ASS
 - Umstritten, da es keine Evidenz für eine erhöhte Inzidenz von Thrombosen im arteriellen System gibt
-  Einige Autoren empfehlen ASS zur Thrombozytenaggregationshemmung, insb. bei Thrombozytose >1.000.000/μL [4]

Anämie ++

Definition

Verminderung des Hämoglobinwertes, der Erythrozytenzahl und/oder des Hämatokrits
Normwerte für Erwachsene

| | ♂ | ♀ |
|------------------|------------|-----------|
| Hämoglobin | 13-17 g/L | 12-15 g/L |
| Erythrozytenzahl | 4,5-5,9/pL | 3,5-5/pL |
| Hämatokrit | 40 – 50 % | 35 – 45 % |

Ätiologie

Verlust

- **Akute oder chronische Blutung :**
 - Bei hochakutem Blutverlust sind Hb-, Hämatokrit- und Erythrozytenwerte normal, eine Anämie kann laborchemisch noch nicht festgestellt werden
 - Durch Einstrom von Gewebsflüssigkeit entwickelt sich laborchemisch eine Anämie → **normozytär, normochrom**
 - Im Verlauf (bei chronischer Blutung) kommt es meist zu einem Eisenverlust → **mikrozytär, hypochrom**
- **Vermehrter Abbau**
 - Hämolytische Anämie
 - Hypersplenismus

Verminderte Bildung

Verminderte Hämoglobinsynthese

- **Eisenmangel : häufigste Ursache einer Anämie**
- **Chronische Erkrankung** → "anemia of chronic disease" (ACD)
 - **Zweithäufigste Anämieursache!**
 - **Definition:** Eisenverwertungsstörung und verringerte Erythrozytenbildung bei chronischer Erkrankung
 - **Ätiologie**
 - Tumor, Entzündung (wie Infektionen, Autoimmunerkrankungen)
 - Folge: Normo- oder mikrozytäre Anämie

Verminderte Zellbildung

- **Renale Anämie** (durch Erythropoetinmangel)
- **Myelodysplastisches Syndrom**
- **Aplastische Anämie** idiopathisch, Medikamentös (NSAR, Sulfonamid), Primärinfektion (EBV, Parvovirus B19, Hepatitis)
- **Megaloblastäre Anämie** : Folsäuremangel, Vitamin B₁₂-Mangel


Symptome/Klinik

- (Belastungs-)Dyspnoe, Müdigkeit
- **Blässe** (gut an den Schleimhäuten zu erkennen)
- Evtl. Tachykardie
- **Begünstigtes Auftreten von Angina pectoris**

Therapie

- **Kausale Therapie :**
 - Substitution bei Eisen-, Folsäure- oder Vitamin B₁₂-Mangel
 - Absetzen von schädigenden Medikamenten bei aplastischer Anämie (z.B. Zytostatika)
 - Interventionelle oder operative Blutstillung bei akutem Blutverlust
- **Evtl. Bluttransfusion**

Anämie




Diagnostik mean Cell Volume

| Anämie | MCV, MCH | Mögliche Erkrankungen | Weitere Befunde | Anmerkung |
|------------------------|----------|-----------------------------------|--|---|
| Mikrozytär, hypochrom | | Eisenmangel | <u>Ferritin↓</u> Transferrin-Sättigung↓ (Serum-Eisen↓) <u>Transferrin↑, sTfR↑</u> | Abklärung (z.B. Ausschluss gastrointestinale Verluste → <u>Haemocult®</u> , <u>Endoskopie</u>) |
| | | ACD ("anemia of chronic disease") | <u>Ferritin↑</u> (Serum-Eisen↓) Ggf. <u>CRP, BSG↑</u> | . Bekannte Tumorerkrankung, entzündliche Erkrankung? . Wichtige Differentialdiagnose der Eisenmangelanämie, aber <u>häufiger normozytär</u> |
| | | Thalassämie | <u>Hämolysezeichen</u> . Kann auch normozytär sein | . Herkunft? (Mittelmeerraum) . Diagnosesicherung durch Hb-Elektrophorese |
| Normozytär, normochrom | | Akute Blutung | <u>Retikulozyten↑</u> (im Verlauf) | <u>Keine Hämolysezeichen</u> Klinische Hinweise (Blutabgänge, Teerstuhl, Trauma, postoperativ) Evtl. mit stärkerer klinischer Symptomatik |
| | | Hämolytische Anämie | | <u>Hämolysezeichen</u> <u>Coombs-Test</u> Autoantikörper? |
| | | Renale Anämie | <u>Retikulozyten↓</u> | . Retentionsparameter↑ . EPO↓ <u>Erythropoetin</u> Tlw. zusätzliche Eisenmangelanämie → EPO-Gabe + Eisensubstitution |
| | | Aplastische Anämie | | Ggf. weitere Zellreihen↓ <u>Chemotherapie, NSAR?</u> <i>Panzytopenie</i> |
| Makrozytär, hyperchrom | | Megaloblastäre Anämie | Ggf. weitere Zellreihen↓ | <u>Folsäure↓</u> Alkoholabusus, Malassimilation? <u>Vitamin B12↓</u> A-Gastritis? "Ileumschaden"? (z.B. M. Crohn) |
| | | Myelodysplastisches Sd | Ggf. weitere Zellreihen↓ | Kann auch normo- oder selten mikrozytär sein |

• Weitere diagnostische Schritte

- Auskultation: Funktionelles Systolikum
- Blutausstrich: auffällige Erythrozytenmorphologie
- Knochenmarkpunktion



Anämie

MCV ↓

MCV ↔

MCV ↑

Ferritin
♂ 15-100 µg/L
♀ 30-100 µg/L

Eisenmangel

↑ Transferrin / sTfR ↑

CRP / BSG ↑

ACD

(bekannte Tumorerkrankung
Infekt)

Hämolyse

Zeichen


Hb-Elektrophorese

Thalassämie


↓ Haptoglobin
↑ LDH
↑ Bilirubin (indirekt)
↑ Retikulozyten

Bei gleichzeitiger chronischer Entzündung und Eisenmangelanämie kann Ferritin erhöht sein → Bestimmung des sTfR (erhöhte Ferritin schließt eine Eisenmangelanämie nicht aus)

Anämie



Anämie



Hämolysezeichen

- **Haptoglobin ↓**: Es wird nur das freie ungebundene Haptoglobin gemessen; dieser empfindliche Parameter ist bei Hämolyse erniedrigt, weil Haptoglobin frei gewordenen Hämoglobin bindet
 - Die Erniedrigung tritt i.d.R. nur bei intravasaler Hämolyse auf!
 - Erkrankungen, bei denen die Anämie auf einem Abbau der Erythrozyten in der Milz beruht (extravasale Hämolyse), gehen nur bei hämolytischen Krisen mit einer Erniedrigung des Haptoglobins einher
 - Extravasale Hämolyse: Überwiegend immunhämolytische Anämien, einige korpuskuläre Anämien
 - Intravasale Hämolyse: Mikroangiopathische hämolytische Anämien, einige korpuskuläre Anämien
 - CAVE! Erhöhte bzw. "falsch-normale" Haptoglobinwerte bei Vorliegen einer Entzündungsreaktion
- **LDH ↑**: Unspezifischer Parameter, der einen erhöhten Zelluntergang (wie z.B. bei der Hämolyse) widerspiegelt
- **Indirektes Bilirubin ↑**: Das bei der Hämolyse frei werdende Hämoglobin wird zu (indirektem) Bilirubin abgebaut, welches in der Leber (zu direktem Bilirubin) konjugiert werden muss
 - Durch die erhöhten Spiegel kann es zum hämolytischen Ikterus kommen
 - Urobilinogenurie
- **Retikulozyten ↑**: Unreife Erythrozyten, die aufgrund einer kompensatorischen Erythropoese reaktiv vermehrt im Blut zu finden sind
- **Ggf. freies Hämoglobin ↑**
 - Brauner Urin aufgrund einer Hämoglobinurie

Mentzer-Index

1 Definition

Der **Mentzer-Index** dient der schnellen Abschätzung zur Unterscheidung zwischen **Eisenmangelanämie** und **Beta-Thalassämie**.

2 Berechnung

Dieser Index berechnet sich aus Laborwerten des kleinen **Blutbilds** und ist durch den Quotienten aus **MCV** (in fl) und **Erythrozytenzahl** (in Millionen pro Mikroliter) definiert. Die Berechnung ist nur sinnvoll, wenn der Patient eine **Mikrozytose** hat.

3 Interpretation

| Mentzer-Index | Anämie |
|---------------|---|
| > 13 | Eisenmangelanämie, Anämie bei chronischer Erkrankung |
| < 13 | Beta-Thalassämie |

Der Mentzer-Index ist eine einfache und schnelle Methode, eine Einschätzung der Ursache einer vorliegenden **mikrozytären, hypochromen Anämie** zu treffen. Zur Absicherung der Diagnose bedarf es dann weiterführender Diagnostik, zum Beispiel durch eine **Hb-Elektrophorese** oder eine **molekulargenetische Untersuchung**.

Eine moderne Abwandlung des Mentzer-Index ist der **Quotient** aus der Zahl mikrozytärer und hypochromer Erythrozyten (**M/H-Quotient**), den einige **Hämatologiegeräte** berechnen können.


Coombs-Test

Der Coombs-Test dient bei extrakorpustkulären Anämien dem **Nachweis von Antikörpern (IgG und IgM) und/oder Komplementfaktoren gegen Erythrozyten**. Dabei werden Antikörper gegen Humanglobuline und/oder Komplement genutzt (Coombs-Serum).


Durchführung

- Direkter Coombs-Test:** Nachweis von an Erythrozyten gebundenen Antikörpern und/oder Komplementfaktoren
 - Dem Patienten wird eine **Blutprobe entnommen**; diese wird **gereinigt**, so dass nur noch die ggf. mit **Antikörpern und/oder Komplement beladenen Erythrozyten** vorhanden sind
 - Dieser Blutprobe wird **Coombs-Serum hinzugefügt**, das **Antikörper gegen Humanglobuline und/oder Komplementfaktoren beinhaltet**
 - Kommt es zur Agglutination der Erythrozyten, gilt der Test als positiv
- Indirekter Coombs-Test:** Nachweis von frei zirkulierenden Antikörpern und/oder Komplementfaktoren gegen Erythrozyten
 - Dem Patienten wird eine **Serumprobe entnommen**, die seine Antikörper und/oder Komplementfaktoren enthält
 - Serumprobe des Patienten **wird zu einer Spenderblutprobe mit Erythrozyten gegeben**
 - Antikörper aus der Serumprobe binden an die Oberfläche der Spendererythrozyten
 - Zu der Blutprobe wird **Coombs-Serum gegeben**, das Antikörper gegen Humanglobuline und/oder Komplementfaktoren beinhaltet
 - Kommt es zur Agglutination der Erythrozyten, gilt der Test als positiv

Direct Coombs test / Direct antiglobulin test



Indirect Coombs test / Indirect antiglobulin test



Haptoglobin

Englisch: haptoglobin

1 Definition

Haptoglobin ist ein Plasmaprotein und gehört zu den α_2 -Globulinen. Es ist ein Transportprotein und spielt ebenfalls im Rahmen einer Entzündungsreaktion eine Rolle als Akute-Phase-Protein.

2 Biochemie

3 Funktion

Haptoglobin bindet freies Hämoglobin. Dieses ist toxisch und kann vor allem die Glomeruli der Nieren schädigen. Der Hämoglobin/Haptoglobin-Komplex wird mit einer kurzen Halbwertszeit von ca. 10 min in das retikuloendotheliale System der Milz und der Leber transportiert und abgebaut. Haptoglobin wirkt auf diese Weise auch antibakteriell, da viele Bakterien Eisen für den Stoffwechsel benötigen.

Haptoglobin wird auch in der Lunge synthetisiert und gilt als antibakterielle Komponente in der Alveolarflüssigkeit.

Die verschiedenen Haptoglobin-Typen sind auch funktionell unterschiedlich. Hp 1-1 bindet besonders effektiv an Hämoglobin, Hp 2-2 hat dagegen eine höhere antibakterielle Funktion. Es bestehen Assoziationen zwischen dem Haptoglobin-Typ und verschiedenen Krankheiten, wie Diabetes mellitus und Atherosklerose.

4 Labormedizin

4.1 Material

Für die Untersuchung wird 1 ml Serum benötigt.

4.2 Methode

Die Messung der Haptoglobin-Konzentration erfolgt üblicherweise durch Immunturbidimetrie oder Immunelektrophorese.

4.3 Referenzbereich

| Klientel | | Normwert [mg/dl] |
|----------|--------------------|------------------|
| Kinder | 12 Monate | 2 bis 300 |
| | 10 Jahre, männlich | 8 bis 172 |
| | 10 Jahre, weiblich | 27 bis 183 |
| | 16 Jahre, männlich | 17 bis 213 |
| | 16 Jahre, weiblich | 38 bis 205 |
| Männer | 25 Jahre | 34 bis 227 |
| | 50 Jahre | 47 bis 246 |
| | 70 Jahre | 46 bis 266 |
| Frauen | 25 Jahre | 49 bis 218 |
| | 50 Jahre | 59 bis 237 |
| | 70 Jahre | 65 bis 260 |

4.4 Interpretation

4.4.1 Erniedrigtes Haptoglobin

Haptoglobin ist der empfindlichste labordiagnostische Marker einer intravasalen Hämolyse (Hämolyseparameter). Im Falle einer intravasalen Hämolyse ist die Serumhaptoglobin-Konzentration auf Grund der Bindung von Hämoglobin stark erniedrigt. Die Hämolyse von 1-2 % der Erythrozyten im Körper verbraucht das gesamte Haptoglobin. Die Serumkonzentration von Haptoglobin kann außerdem bei Hämoglobinurien, perniziöser Anämie, EBV-Infektionen, Patienten mit künstlichem Herzklappenersatz und bei sehr seltenen Erkrankungen (z.B. der Ahaptoglobinämie) erniedrigt sein.

4.4.2 Erhöhtes Haptoglobin

Da Haptoglobin ein Akute-Phase-Protein ist, zeigen sich im Rahmen von akuten Entzündungen deutlich erhöhte Serumspiegel. Kommt es während einer akuten Erkrankung (z.B. schwere Infektion, Sepsis) zu einer Hämolyse, kann die Serumhaptoglobin-Konzentration trotz hohem Verbrauch normwertig sein. In diesem Falle sollten bei klinischem Verdacht auf eine Hämolyse weitere Hämolyseparameter, wie z.B. LDH, unkonjugiertes Bilirubin oder Hämopexin, herangezogen werden. Weiterhin kann der Serumspiegel von Haptoglobin im Rahmen von Tumorerkrankungen, Cholestase und Nekrosen erhöht sein.

4.4.3 Hinweise

Bei extravasaler Hämolyse tritt eine Erniedrigung des Haptoglobinspiegels nur im Rahmen von hämolytischen Krisen auf.

Für die Beurteilung des Ausmaßes einer Hämolyse ist das Hämopexin besser geeignet.

Eisenmangel ++

- **Eisenmangel:** Weltweit häufigste Mangelkrankung
- **Eisenmangelanämie:** Häufigste Anämieform (80%)

Stadien

- **Eisenmangel:** Verminderung des Gesamtkörpereisens
- **Eisendefizitäre Erythropoese:** bei noch normwertigen Hämoglobinwerten
- **Eisenmangelanämie**

Ätiologie

Mangelhafte Eisenaufnahme

- **Mangelhafte Zufuhr:** Mangelernährung oder vegane bzw. vegetarische Ernährungsweise
- **Mangelnde Resorption**
 - Bei Achlorhydrie: z.B. nach Magenresektion
 - Bei Ausschaltung des Duodenums: z.B. nach Y-Roux-Rekonstruktionen
 - Bei Malabsorption: z.B. Morbus Crohn und Zöliakie
- **Physiologisch erhöhter Eisenbedarf:** Schwangerschaft und Stillzeit. Wachstumsphase

Als **Erythropoese** bezeichnet man die Bildung von reifen Erythrozyten aus hämatopoetischen Stammzellen des blutbildenden Knochenmarks. Die Erythropoese ist ein Teil der Hämatopoese.

Eisenverluste durch Blutungen

- Gastrointestinale Blutungen
- Hypermenorrhö oder Menorrhagie bei Frauen

Eisenverwertungsstörung (Anämie des chronisch Kranken)

- Bei chronischen Erkrankungen: Morbus Crohn, Chronische Herzinsuffizienz, Chronische Niereninsuffizienz, Malignome

Pathophysiologie

- **Enterale Eisenaufnahme:** Eisen kommt sowohl zweiwertig (Fe^{2+}) als auch dreiwertig (Fe^{3+}) vor. Resorption fast ausschließlich in Form von zweiwertigem Eisen (Fe^{2+})
- **Eisenmangelanämie:** Verminderte Hämoglobinsynthese durch verminderten Einbau von Eisen in die Häm-Moleküle des Hämoglobins

Symptome/Klinik

- **Allgemeine Symptome der Anämie:**
 - Blässe der Haut und Schleimhäute
 - Ermüdbarkeit; Belastungsdyspnoe; Tachykardie
- **Spezifische Symptome der Eisenmangelanämie:**
 - Mundwinkelrhagaden
 - Rezidivierende Aphthen der Mundschleimhaut
 - **Plummer-Vinson-Syndrom:** Atrophie der Schleimhaut von Mund, Pharynx und Ösophagus mit brennender Zunge und Dysphagie
 - Nagelbrüchigkeit (fragilité) und Haarausfall
 - Ggf. Kognitive Defizite (insb. bei Kindern)

Diagnostik

Labor

- **Mikrozytäre, hypochrome Anämie:** Hämoglobin↓, MCV↓, MCH↓
- **Ferritin↓:** (Normal: 15 – 100 µg/L bei Frauen, 30 – 100 µg/L bei Männern)
 - sensitiver als Serumeisen
 - Erlaubt eine Unterscheidung zwischen einer Eisenmangelanämie (Ferritin↓) und einer Anämie des chronisch Kranken (Ferritin↑)!
- Bei gleichzeitiger chronischer Entzündung und Eisenmangelanämie kann Ferritin erhöht sein → Bestimmung des **sTfR** (erhöhte Ferritin schließt eine Eisenmangelanämie nicht aus)
- **Transferrinsättigung↓**
- **Transferrin↑**
- **sTfR↑ (löslicher Transferrinrezeptor).** Soluble transferrin receptor
- **Retikulozytenzahl↓**

Blutausstrich

Poikilozytose (unterschiedlich geformte Erythrozyten), **Anisozytose** (unterschiedlich große Erythrozyten)

Die TfS gibt an, wie viel Eisen an Transferrin gebunden ist. Eine hohe TfS ist ein Hinweis für die Überladung mit Eisen, eine niedrige für einen Eisenmangel.

Als **mittleres korpuskulares Volumen** oder kurz **MCV** bezeichnet man das durchschnittliche **Volumen** der Erythrozyten. *mean corpuscular volume*

Als **mittleren korpuskulären Hämoglobingehalt**, kurz **MCH**, bezeichnet man die absolute Menge an Hämoglobin in einem Erythrozyten. *mean corpuscular hemoglobin*

Transferrinsättigung ↓: Gibt an, wieviel Prozent des Transferrins im Serum mit Eisen beladen sind, bei Eisenmangel entspr. erniedrigt

- CAVE: Die Transferrin-Konzentration ist bei Eisenmangel erhöht!

Löslicher Transferrinrezeptor (sTfR)

- Bruchstück des zellulären Transferrinrezeptors, der bei Unterversorgung der Zellen mit Eisen vermehrt exprimiert wird

Eisenmangelanämie Ätiologie



Befundkonstellationen nach Stadien

| | Befund im Labor |
|------------------------------|---|
| Eisenmangel | Ferritin↓ |
| Eisendefizitäre Erythropoese | Ferritin↓, Transferrinsättigung↓, sTfR↑, <u>Retikulozytenzahl↓</u> |
| Manifeste Eisenmangelanämie | . Hb, Erythrozyten, Hämatokrit↓, MCV↓, MCH↓ . Poikilozytose, Anisozytose |

Abklärung eines Eisenverlustes

- Anamnese
- Körperliche Untersuchung
- Basisdiagnostik: Stuhltest auf okkultes Blut, Abdomensonographie, Urin-Stix
- Weiterführende Diagnostik
 - Gastrointestinale Blutung: ÖGD, Koloskopie
 - Urologische Blutung: Zystoskopie
 - Gynäkologische Blutung: Vaginale Sonographie

Differentialdiagnosen (bei hypo- und normochromen Anämien)

| | Eisenmangel <i>MCV ↓</i> | Anämie des chronisch Kranken <i>MCV ↓ ↔</i> | Thalassämie <i>MCV ↓</i> | Myelodysplastisches Syndrom <i>MCV ↑ ↔</i> |
|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| Ferritin | ↓ <i>↑ bei Infekt</i> | ↔ / ↑ | ↔ / ↑ | ↔ / ↑ |
| Transferrin-Sättigung | ↓ | ↔ / ↓ | ↔ / ↑ | ↓ |
| sTfR | ↑ | ↔ | ↑ | ↔ / ↑ |

Therapie

Kausale Therapie

- Therapie der Grunderkrankung (z.B. gastroduodenale Ulkuskrankheit)
- Ggf. Umstellung auf eisenreiche Ernährung (Linsen, Rindfleisch)

Eisensubstitution

Eisensubstitution per os (Zweiwertiges Eisen)


- Nüchterneinnahme oder Einnahme mit ausreichendem Abstand zur Mahlzeit
- Dauer der Einnahme: 3–6 Monate nach Normalisierung des Hb-Wertes
- Nebenwirkungen: Bauchschmerzen, Übelkeit, Obstipation, Schwarzfärbung des Stuhls

Parenterale Eisensubstitution (Dreiwertiges Eisen)

- Als i.v. Infusion bei Unverträglichkeit oder Eisenresorptionsstörung
- Nebenwirkungen: allergische Reaktionen (bis zum anaphylaktischen Schock), Phlebitis, Hypotonie

Therapiekontrolle und Therapieziele

- Hb: vierwöchentlich bis zur Normalisierung (Nach 4 Wochen: Anstieg des Hb um 2 g/dL)
- Ferritin: 4 Wochen nach letzter Eiseneinnahme (Zielwert: 100 µg/L)
- Blutbild und Ferritin: alle 3 Monate für 1 Jahr



•

Therapie

Die Therapie des Eisenmangels sollte einerseits die Behandlung der Ursache des Eisenmangels und andererseits die medikamentöse Eisensubstitution mit einschließen.

Kausale Therapie

- Therapie der Grunderkrankung, z.B.
 - Umstellung einer NSAR-Therapie und Gabe von PPI bei gastroduodenaler Ulkuskrankheit
 - Operative Entfernung oder medikamentöse Behandlung von Myomen
- Ggf. Umstellung auf eisenhaltigere Ernährung bei voriger eisenarmer Diät

Ohne eine Abklärung der Ursachen sollte nicht wiederholt Eisen substituiert werden!

Eisenreiche Ernährung

- Eisenbedarf: 10 (♂) bzw. 15 mg/Tag (♀)
- Besonders eisenhaltige Nahrungsmittel (auszugsweise): Diese Nahrungsmittel können Patienten additiv zu ihrer bisherigen Diät empfohlen werden, wenn sie sich bewusst eisenreich ernähren möchten
 - Tierische Erzeugnisse (Menge in Gramm, um den Tagesbedarf zu decken)
 - Kalbsleber (200 g)
 - Blutwurst (50–100 g)
 - Rind- und Schweinefleisch (700–1000 g)

Therapie

Die Therapie des Eisenmangels sollte einerseits die Behandlung der Ursache des Eisenmangels und andererseits die medikamentöse Eisensubstitution mit einschließen.

Kausale Therapie

- Therapie der Grunderkrankung, z.B.
 - Umstellung einer NSAR-Therapie und Gabe von PPI bei gastroduodenaler Ulkuskrankheit
 - Operative Entfernung oder medikamentöse Behandlung von Myomen
- Ggf. Umstellung auf eisenhaltigere Ernährung bei voriger eisenarmer Diät

Ohne eine Abklärung der Ursachen sollte nicht wiederholt Eisen substituiert werden!

Eisenreiche Ernährung

- Eisenbedarf: 10 (♂) bzw. 15 mg/Tag (♀)
- Besonders eisenhaltige Nahrungsmittel (auszugsweise): Diese Nahrungsmittel können Patienten additiv zu ihrer bisherigen Diät empfohlen werden, wenn sie sich bewusst eisenreich ernähren möchten
 - Tierische Erzeugnisse (Menge in Gramm, um den Tagesbedarf zu decken)
 - Kalbsleber (200 g)
 - Blutwurst (50–100 g)
 - Rind- und Schweinefleisch (700–1000 g)
 - Pflanzliche Erzeugnisse (Menge in Gramm, um den Tagesbedarf zu decken)
 - Weizenkleie (100 g)
 - Getrocknete Sojabohnen, Kichererbsen oder Linsen (200 g)
 - Vollkornbrot (350 g)

Die ausreichende Deckung des Eisenbedarfs kann nicht alleine durch ein einzelnes Nahrungsmittel erfolgen – auf eine ausgewogene Mischung kommt es an!

Indikationen zur Eisensubstitution

- Jeder gesicherte Eisenmangel (Ferritin ↓, Transferrinsättigung ↓, sTfR ↑, Retikulozyten-Hämoglobin ↓)
- Grobzügige Indikationsstellung: Bereits ein alleiniger Speichereisenmangel sollte unter folgenden Bedingungen behandelt werden
 - Schwangerschaft
 - Dialysepatienten
 - Patienten mit zuvor behandelter Eisenmangelanämie bei rezidivierendem Speichereisenmangel
 - Hochleistungssportler
- Eisensubstitution in speziellen Fällen: Hierbei gelten andere Grenzwerte des Eisenstoffwechsels für eine therapeutische Intervention
 - Eisensubstitution in der Schwangerschaft
 - Eisensubstitution bei chronisch-entzündlicher Darmerkrankung
 - Eisensubstitution bei Herzinsuffizienz
 - Eisensubstitution bei chronischer Niereninsuffizienz
 - Eisensubstitution bei Tumoranämie
 - Eisensubstitution bei präoperativer Anämie

Berechnung des Eisenbedarfs

- Formel zur Berechnung des Eisenbedarfs: $\text{Eisenbedarf (mg)} = \text{Hb-Defizit} \times 200 + \text{Speichereisen (250 mg)}$
 - Beispiel: Eine Patientin mit einem Hb von 9 g/dL hat ein Hb-Defizit von 3 (Sollwert 12 g/dL). $3 \times 200 + 250 = 850$. Ihr Eisenbedarf beträgt daher insgesamt 850 mg.

Bei Erwachsenen ist ein Eisenmangel i.d.R. durch eine intravenöse Substitution von 1000–2000 mg Eisen ausgleichbar!

Orale Eisensubstitution

- Zweiwertiges Eisen (Fe^{2+}) als Tabletten, Kapseln oder Tropfen zubereitet, i.d.R. als Salz mit Sulfat, Chlorid, Fumarat oder Gluconat Eisen(II)-Sulfat Filmtablette (z.B. Eisentabletten-ratiopharm®) 50 mg p.o. 1-0-0-(1) für mehrere Monate bis zur Normalisierung des Hb-Wertes bzw. der Eisenstoffwechselparameter und ca. 6 Monate darüber hinaus
 - Durchführung
 - Nüchtereinnahme oder Einnahme mit ausreichendem Abstand zur Mahlzeit empfohlen (größere Bioverfügbarkeit)
 - Werden die Präparate nach einwöchiger Einnahme auf nüchternen Magen noch immer schlecht vertragen, wird eine Einnahme zu den Mahlzeiten empfohlen
 - Formel zur Berechnung der erforderlichen oralen Eisengabe: $\text{Orale Eisengabe (mg)} = \text{Eisenbedarf (mg)} \times 10$
 - Nebenwirkungen
 - Gastrointestinale Beschwerden, insb. Bauchschmerzen und Übelkeit
 - Obstipation oder Diarrhoen (seltener)
 - Schwarzfärbung des Stuhls
 - Wechselwirkungen: Verringerte Resorption bei gleichzeitiger Einnahme
 - Bestimmte Nahrungsmittel, z.B. Kaffee, Tee, Milch, bestimmte Gemüse und Getreideprodukte
 - Phosphatreiche Lebensmittel
 - Insb. industriell hergestellte Fertigprodukte und Fast-Food-Zubereitungen
 - Vielzahl an Fleisch-, Milch-, und Käseprodukten
 - Nüsse und Kerne von Sonnenblumen und Kürbis
 - Oxalatreiche Lebensmittel: Insb. Spinat, Mangold, Rhabarber und Rote Beete
 - Medikamente, insb. Antazida, PPI, Tetracycline u.a.
 - Dauer der Einnahme: Nach Normalisierung des Hb-Wertes Fortführung der Einnahme für 3–6 Monate (zum Auffüllen des Eisenspeichers)

Parenterale Eisensubstitution

- Dreiwertiges Eisen (Fe^{3+}) in unterschiedlichen Komplexen
- Indikation zur parenteralen Therapie bei
 - Unverträglichkeit oder Ablehnung oraler Eisenpräparate
 - Eisenresorptionsstörung
 - Insuffizienz der Substitution p.o.
 - Vorliegen einer chronischen bzw. entzündlichen Erkrankung mit Anämie des chronisch Kranken (gestörte Resorption!)

⊙ EPO-Gabe bei Tumoranämie

Erythropoetin

Durchführung

- Bevorzugtes Präparat
 - Eisencarboxymaltose aufgrund der Verträglichkeit
 - Applikation i.d.R. durch Infusion einer verdünnten Lösung
- Verdünnungsschemata und Mindestinfusionsdauer
 - 2–4 mL (\triangleq 100–200 mg Eisen) auf max. 50 mL NaCl 0,9%, keine

vorgeschriebene Mindestinfusionsdauer

- 4–10 mL (\triangleq 200–500 mg Eisen) auf max. 100 mL NaCl 0,9%,

Mindestinfusionsdauer 6 min

- 10–20 mL (\triangleq 500–1.000 mg Eisen) auf max. 250 mL NaCl 0,9%,

Mindestinfusionsdauer 15 min

- Dosierung: Eisencarboxymaltose (Ferinject®)

Probleme der intravenösen Eisengabe

- Meiden dextranbasierter bzw. älterer Präparationen, da schwere Nebenwirkungen und Unverträglichkeitsreaktionen möglich
 - Bei Eisencarboxymaltose (Ferinject®) erheblich seltener, dennoch möglich
- Mögliche Nebenwirkungen (auszugsweise)
 - Hypophosphatämie bei Eisencarboxymaltose-Präparaten
 - Phlebitis
 - Flush-Symptomatik
 - Hypotonie
 - Schwindel
 - Übelkeit
 - Gefahr von Überempfindlichkeits- und anaphylaktischen Reaktionen mit

tödlichem Ausgang

■ Besondere Hinweise

■ Auch nach stattgehabten unkomplizierten parenteralen Eisengaben in der Vorgeschichte!

■ Erhöhtes Risiko bei Patienten mit bekannten Allergien, immunologischen oder inflammatorischen Erkrankungen (rheumatoide Arthritis) oder Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis (z.B. Asthma bronchiale)

■ i.v. Gabe von Eisen nur im Beisein von (mit Anaphylaxie) erfahrenem Personal und Ausrüstung zur Reanimation

■ Überwachung des Patienten für mind. 30 min nach der Gabe

Die intravenöse Eisenapplikation birgt die Gefahr einer anaphylaktischen Reaktion bis hin zum Tod!

Eisensubstitution - Therapiekontrolle und Therapieziele

- Nach 2 Wochen: Bestimmung von Retikulozyten und Hb
 - Anstieg der Retikulozyten schon nach 1 Woche
 - Ursachen fehlenden Ansprechens
 - Mangelnde Compliance bei oraler Gabe
 - Ursache des Eisenmangels nicht behoben (Resorptionsstörung bei oraler Gabe, chronische Blutung)
 - Vorliegen einer anderen Anämieform (Eisenmangelanämie war Fehldiagnose) → Ggf. weitere Diagnostik einleiten
- Nach 4 Wochen: Angestrebter Anstieg des Hb um 2 g/dL
- Vierwöchentlich: Weitere Kontrollen bis zur Normalisierung des Hb
- 4 Wochen nach letzter Eiseneinnahme: Beurteilung der Eisenspeicher, Ferritinzielwert: 100 µg/L
- Alle 3 Monate: Kontrolle von Blutbild und Ferritin für ca. 1 Jahr

2 W Retikulozyten & Hb

4 W Hb

Vierwöchentlich → bis NL Hb

4 W nach letzter Gabe von Eisen Ferritinwert

alle 3 M Blutbild + Ferritin für 1 Jahr

Vitamin-B12-Mangel +-

Folsäure und Vitamin B₁₂ sind für die Zellteilung essentiell. Bei einem Mangel kommt es zu einer beeinträchtigten Zellteilung, wovon alle Zellreihen betroffen sein können (Panzytopenie).

Ein Folsäuremangel tritt schneller zutage, da die Körperspeicher ohne weitere Zufuhr nur etwa 3 Monate ausreichen, die körpereigenen Vitamin B₁₂-Speicher den Bedarf dagegen für 2-3 Jahre decken können

Ätiologie

- Zu geringe Zufuhr (z.B. Mangelernährung oder vegane Ernährung)
 - Quellen: Fleisch, Milchprodukte, Eier
- Zu geringe Aufnahme (z.B. Resorptionsstörungen)
- Erhöhter Bedarf (z.B. in der Schwangerschaft)

Symptome/Klinik

- Antriebslosigkeit, Depression
- **Funikuläre Myelose**: Spinale Demyelinisierung
 - distale symmetrische Parästhesien
 - Spastische Paraparese
- **Megaloblastäre Anämie**: Blässe, Müdigkeit. Ggf. Ikterus
- **Glossitis**

Unter der **funikulären Myelose** subsumiert man eine Degeneration des Hinterstranges und des Seitenstranges und eine Polyneuropathie, die durch einen Vitamin-B12-Mangel ausgelöst werden.

Diagnostik

- **Blutbild**
 - Hämoglobin↓
 - MCV, MCH↑ (makrozytär, hyperchrom)
 - Hämolysezeichen: LDH↑, indirektes Bilirubin↑, Haptoglobin↓, aber Retikulozyten↓
 - Häufig Thrombozytopenie und Leukopenie (ggf. Panzytopenie)
- **Vitamin-B₁₂-Serumspiegel↓**
- **Holo-Transcobalamin↓** und **Methylmalonsäure (MMA)↑** bestätigen den manifesten Vitamin-B₁₂-Mangel bei unklarem Befund des Vitamin-B₁₂-Serumspiegels

↓ Hb
↑ MCV, MCH
↓ B12
Händeszeichen

Differentialdiagnosen

der funikulären Myelose

- Malignome des Rückenmarks
- Multiple Sklerose ←
- Neuroborreliose

Methylmalonsäure (MMA) ↑ und Homocystein ↑ : Funktionelle Marker und Verlaufsp Parameter unter Therapie

- Methylmalonsäure

■ Teuer und aufwendig

■ Spezifischerer Marker für Vitamin B₁₂

der megaloblastären Anämie : Folsäuremangel

- Häufigste Hypovitaminose in westlichen Ländern
- **Ätiologie**
 - Mangelernährung: z.B. chronischer Alkoholabusus (Häufigste Ursache)
 - Erhöhter Bedarf : z.B. Schwangerschaft, hämolytische Anämie
 - iatrogen: Methotrexat, Azathioprin
- **Differentialdiagnostische Merkmale**
 - Seltene neurologische Symptome
 - MMA meist nicht erhöht
- **Therapie**
 - Kausale Therapie
 - Folsäuresubstitution : Folsäure 5 mg/d p.o.

Eine Folsäuresubstitution sollte nie ohne Ausschluss eines Vitamin-B₁₂- Mangels erfolgen. Sie kann eine sonst aufgetretene megaloblastäre Anämie maskieren. Neurologische Schäden können aber dennoch auftreten und sogar aggravierern!

Therapie


Kausale Therapie

Vitamin-B₁₂-Substitution

- Vitamin-B₁₂-Injektionen i.m., s.c. : 1000 µg. 1×/Tag in der 1. Woche, 2×/Woche in der 2. Woche, 1×/Woche in der 3.-6. Woche. Dann einmal alle 3-6 Monate.

Prognose

- **Unbehandelt**: schwere irreversible neurologische Schäden
- **Bei frühzeitiger Therapie**: Komplette Remission möglich



Megalozyten

Megalozyten (einige exemplarisch rot umkreist) haben häufig eine unregelmäßige, ovale Form und zeichnen sich durch eine deutliche Hyperchromasie (verstärkte Anfärbbarkeit) aus. Exemplarisch sind einige normale Erythrozyten grün umkreist.



B12

Zu geringe Aufnahme

Ursachen der Maldigestion

- Verringerte Magensäureproduktion: PPI, H₂-Rezeptorantagonisten und Zustände mit Achlorhydrie
- Exokrine Pankreasinsuffizienz

Ursachen der Malabsorption

Perniziöse Anämie

- Autoantikörper-vermittelter Intrinsic-Faktor-Mangel (siehe auch Typ-A-Gastritis)
 - Autoantikörper gegen Parietalzellen (Belegzellen) der Magenschleimhaut → Zerstörung der Parietalzellen → Atrophische Gastritis mit Achlorhydrie und Intrinsic-Faktor-Mangel
 - Autoantikörper gegen Intrinsic-Faktor → Blockierung der Vitamin-B₁₂-Bindungsstelle und konsekutiv der Aufnahme des Vitamin-B₁₂-Intrinsic-Faktor-Komplexes

Gastrointestinale Eingriffe

- Z.n. Magenresektion: Reduzierte Intrinsic-Faktor-Produktion
 - Bariatriische OP (z.B. Roux-Y-Magenbypass, Schlauchmagen)
 - OP eines Magenkarzinoms
- Z.n. Darmresektion: Reduzierte Resorptionsfläche oder Blind-Loop-Syndrom
 - Ileus
 - Kolonkarzinom
 - Volvulus

(Chronische) Entzündungen des Darms

- Reduzierte Resorptionsfläche
 - Zöliakie
 - Morbus Crohn, Colitis ulcerosa
 - Fischbandwurmbefall (Diphyllobothriasis durch Diphyllobothrium latum)
 - Intestinale Tuberkulose
 - Amyloidose, Kollagenose

Medikamente

- Dauertherapie mit Metformin : Gestörte Resorption
- Weitere Arzneimittelinteraktionen: Biguanide, Zytostatika, Antikonvulsiva, Malariamittel, Paraaminosalizylat, Barbiturate

Genetische Prädisposition

Hämolytische Anämie +-^{early}

Definition

Anämie, bei der es zu einer Zerstörung oder einem verfrühten Abbau von Erythrozyten kommt

Klinik

Akute hämolytische Krise

- Fieber, Schüttelfrost, Blutdruckabfall, Gefahr des Kreislaufschocks
- Ikterus, brauner Urin
- Kopf-, Rücken- und Bauchschmerzen.

Chronische Hämolyse

- Allgemeine Anämiesymptome, (Sub-)ikterus, gehäuft Gallensteine
- Splenomegalie oder Hepatosplenomegalie.

Diagnostik

Anämiezeichen

Hämoglobin, Erythrozytenzahl und Hämatokrit vermindert

Hämolysezeichen

- **Haptoglobin↓**: Erniedrigt nur bei intravasaler Hämolyse. Erhöht bzw. falsch-normal bei Entzündungsreaktion
- **LDH↑**: unspezifisch
- **Indirektes Bilirubin↑**
- **Retikulozyten↑**

Coombs-Test

dient bei extrakorpustkulären Anämien dem Nachweis von Antikörpern (IgG und IgM) und/oder Komplementfaktoren gegen Erythrozyten.

- **Direkter Coombs-Test**: Nachweis von an Erythrozyten gebundenen Antikörpern und/oder Komplementfaktoren
- **Indirekter Coombs-Test**: Nachweis von frei zirkulierenden Antikörpern und/oder Komplementfaktoren gegen Erythrozyten

Ätiologie


Korpuskulär

Membrandefekte der Erythrozyten

- **Hereditäre Sphärozytose (Kugelfellanämie)** ^{AD}
 - Häufigste angeborene hämolytische Anämie in Europa. Verminderte osmotische Resistenz der Erythrozyten infolge Membranproteindefekt. Meistens autosomal-dominant
 - **Klinik**: Hämolytische Krisen oft durch Virusinfekt ausgelöst.
 - **Diagnostik**: Verminderte osmotische Resistenz der Erythrozyten. Nachweis der charakteristischen Kugelfellen im Blutaussch
 - **Therapie**: Splenektomie
- **Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie**:
 - Erworbene Form der hämolytischen Anämie infolge Membranproteindefekt
 - **Klinik**: Hämolytische Krisen meistens nachts. Thromboembolien

Enzymdefekt der Erythrozyten

- **Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PD)-Mangel**
 - X-chromosomal rezessiv vererbte Form der hämolytischen Anämie.
 - **Klinik**: Auslösung hämolytischer Krisen durch Infektionen, Medikamente (ASS, Sulfonamide), Fava-Bohnen (Favismus). Häufig im Mittelmeerraum, Afrika, Asien.
 - **Diagnostik**: Bestimmung der G6PD-Aktivität der Erythrozyten
 - **Therapie**: Auslösende Noxen meiden
- **Pyruvatkinasemangel**
 - Erbliche Form der hämolytischen Anämie.
 - **Diagnostik**: Bestimmung der Pyruvatkinase-Aktivität der Erythrozyten
 - **Therapie**: Transfusionen, evtl. Splenektomie



Sphärozytose

Peripherer Blutausstrich mit Sphärozyten, die auch als Kugelzellen bezeichnet werden (einige beispielhaft rot umkreist). Es handelt sich um Erythrozyten, die nicht bikonkav, sondern rundlich sind. Eine zentrale Aufhellung ist daher nicht mehr vorhanden. Als weiteres diagnostisches Kriterium fällt in dem Bild eine Anisozytose auf (erhöhte Spannweite der kleinsten zu den größten Erythrozyten, jeweils ein Beispiel mit Pfeil markiert). Rechts oben: Skizze einer elektronenmikroskopischen Aufnahme eines Sphärozyten (1) und zum Vergleich eines normal (also bikonkav) geformten Erythrozyten (2).



Veränderte Hämoglobinmoleküle: Hämoglobinopathien

- **Sichelzellanämie**
 - Erbliche, quantitative Hämoglobinsynthesestörung (v. a. Schwarzafrikaner).
 - **Klinik:** Bei Homozygotie schwere hämolytische Anämie, Hepatosplenomegalie und schmerzhafte Organinfarkte. Bei Heterozygotie erhöhte Malariaresistenz.
 - **Diagnostik:** Hb-Elektrophorese (Nachweis von HbS), Sichelzellen im Blutaussstrich.
 - **Therapie:** Hypoxie vermeiden, Flüssigkeits- und Transfusionstherapie bei hämolytischen Krisen. Kausal: allogene Stammzelltransplantation bei homozygoten Patienten
- **Thalassämie**
 - Erbliche, quantitative Hämoglobinsynthesestörung. Einteilung in β -Thalassämie (Störung der β -Globinketten, v.a. in Mittelmeerländer) und α -Thalassämie (Störung der α -Globinketten, seltener, v.a. im Südostasien)
 - **Klinik:** Bei Homozygotie (*Thalassämia major*) hämolytische Anämie, Wachstumsstörungen und Hepatosplenomegalie. Bei Heterozygotie (*Thalassaemia minor*) leichte hypochrome Anämie und normaler bis erhöhter Ferritin.
 - **Diagnostik:** Hb-Elektrophorese, Targetzellen im Blutaussstrich
 - **Therapie:** *Majorform:* Bluttransfusionen, Vermeidung einer Transfusionshämosiderose (mit Deferoxamin) kurativ: allogene Stammzelltransplantation. *Minorform:* keine Therapie.

Extrakorpuskulär

Alloimmunhämolytische Anämien

- ABO-Inkompatibilität
- Rhesus-Inkompatibilität

Autoimmunhämolytische Anämie

- **Medikamenten-induzierte Antikörper:** Bspw. durch NSAR oder Penicillin
- **Kälteantikörper (Kälteagglutinin-Syndrom)**
 - Kälteantikörper binden bei niedrigen Temperaturen an der Erythrozytenoberfläche und bewirken eine Hämolyse.
 - **Ätiologie:** Meist idiopathisch
 - **Diagnostik:** Direkter Coombs-Test Positiv
 - **Therapie:** Vermeidung von Kälteexposition, ggf. Bluttransfusion
- **Wärmeantikörper**
 - Wärmeantikörper binden bei Körpertemperatur an der Erythrozytenoberfläche und bewirken eine Hämolyse
 - **Ätiologie:** Meist idiopathisch
 - **Diagnostik:** Direkter Coombs-Test Positiv
 - **Therapie:** Prednisolon, ggf. Bluttransfusion

Mikroangiopathische hämolytische Anämien

- **Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS):** Thrombotische Mikroangiopathie mit Nierenbeteiligung, meistens durch Infektion mit enterohämorrhagischen E. coli (EHEC).
- **Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP):** Thrombotische Mikroangiopathie mit schwerer Thrombozytopenie.

Mechanische Schädigung

- Herzklappenersatz
- Extrakorporale Hämodynamik (z.B. bei Dialyse)

Infektiös bedingte Hämolyse

- Malaria

Komplikationen chronisch hämolytischer Anämien

- Hämolytische Krise : Meist ausgelöst durch virale Infekte
- Aplastische Krise : Meist ausgelöst durch eine Infektion mit Parvovirus B19
- Megaloblastäre Krise : Aufgrund mangelhafter Zufuhr von Folsäure
- Eisenüberladung : Aufgrund von Bluttransfusionen
- Gallensteine : Aufgrund gesteigerter Bilirubinproduktion

verminderte Aktivität ADAMST13 (auto-Antikörper) \Rightarrow Thrombinbildung

Ätiologie des Mikrozytäre Anämie

Korpuskulär

Extrakorpulär

Hälozytose

Anämie

Mikrozytose

Mechanisch

Infekt

Membrandefekt

Enzymdefekt

Hämoglobinopathie

Sphärozytose

Kugelzellen im Blutausstrich
Splenektomie

Proxymale nächtliche
Hämoglobinurie

G6PD-Mangel

X-Chromosomal rezessiv vererbt
durch infekt., med. (AS5-Sulfonamide) und
Reizen ausgelöst
Di: Bestimmung der G6PD-Aktivität

Pyruvatmangel

Trf.-Transfusionen
evtl. Splenektomie


Sichelzellanämie qualitativ

Homo- und heterozygotie
Hb-Elektrophorese (HbS)
Sichelzellen im Blutausstrich
O₂-JVP-Bluttransfusion (Krise)
Stammzelltransplantation (Homozygotie)

Thalassämie quantitativ

α und β
Homo- und heterozygotie
Hb-Elektrophorese
Targetzellen im Blutausstrich
bei Major (Homozygotie)
Transfusion
Deferoxamin
Stammzelltransplantation

Ätiologie des
Marsupitale Anämie



Transfusionen ++

Allgemein

AB0-System und Rhesus-System

| | Häufigkeit | AB0-Antigen auf Erythrozyten | Antikörper im Plasma |
|----------------|---------------------|------------------------------|---|
| Blutgruppe 0 | 40% | Nicht vorhanden | A- und B-Antikörper |
| Blutgruppe A | 45% (am häufigsten) | A-Antigen | B-Antikörper |
| Blutgruppe B | 10% | B-Antigen | A-Antikörper |
| Blutgruppe AB | 5% | AB-Antigen | Keine A- oder B-Antikörper |
| Rhesus-negativ | 15% | - | Rhesus-Antikörper bei vorheriger Sensibilisierung |
| Rhesus-positiv | 85% | D-Antigen | Keine Rhesus-Antikörper |

كولون

Verträglichkeitsprüfung

Vor jeder Transfusion durchzuführen, um Unverträglichkeit zwischen Empfänger und Spender auszuschließen

- **Kreuzprobe:** Empfängerplasma und Spendererythrozyten werden auf Verträglichkeit getestet
- **Antikörpersuchtest:** Direkter und indirekter Coombs-Test
 - **Indirekter Coombs-Test:** Empfängerplasma wird mit Test-Erythrozyten versetzt, um ggf. Antikörper gegen Erythrozytenantigene nachzuweisen
 - **Direkter Coombs-Test:** Empfängererythrozyten werden mit einem Testserum vermischt, um ggf. an Erythrozyten gebundene Antikörper und Komplementfaktoren nachzuweisen

„- Kreuzprobe und Antikörpertest sind **3 Tage** gültig und müssen im Falle von nicht verwendeten EKs beide nach diesem Zeitraum wiederholt werden.“

- Im Notfall kann bei unbekannter Blutgruppe des Empfängers bis zum Ergebnis der serologischen Verträglichkeitsprobe auf EK der **Blutgruppe 0 Rhesus-negativ** zurückgegriffen werden!“

Bedside-Test

Der Bedside-Test prüft, ob die Empfänger-Antigene des Patienten der deklarierten Blutgruppe entsprechen. Dies ist die letzte Möglichkeit, einen hämolytischen Transfusionszwischenfall aufgrund einer AB0-Unverträglichkeit zu verhindern.

- **Indikation:** Unmittelbar vor Transfusion ist vom Arzt bzw. in seiner direkten Aufsicht der Bedside-Test durchzuführen und das Ergebnis schriftlich zu dokumentieren
- **Durchführung:** Injektion von „Patientenblut“ in die Testfelder „Anti-A“ und „Anti-B“
- **Ergebnis:** Agglutination (Verklumpung) eines Testfeldes → Nachweis des betreffenden Antigens
 - Verklumpung im Anti-A-Testfeld → Patient hat Blutgruppe A
 - Verklumpung im Anti-B-Testfeld → Blutgruppe B
 - Verklumpung im Anti-A und Anti-B-Testfeld → Blutgruppe AB
 - keine Verklumpung → Blutgruppe 0

المعلنة

تخالف الدم ، تفاعل الدم

Rechtliche Voraussetzungen

- **Aufklärung** des Patienten: Komplikationen, Notwendigkeit, Risiken bei Unterlassung, Alternativen (z. B. präoperative Eigenblutspende).
- **Dokumentiertes Einverständnis des Patienten**
- Bei nicht bewusstseinsklaren Patienten und vitaler Indikation zur Transfusionsbehandlung **Berücksichtigung der Patientenverfügung** oder des **mutmaßlichen Willens**. **Angehörige ohne Vollmacht haben kein Bestimmungsrecht.**
- Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien zur Bluttransfusion: **Blutgruppenbestimmung, Verträglichkeitsprüfung, Bedside-Test.**

Erythrozytentransfusion

Präparate und Indikationen

- **Erythrozytenkonzentrat (EK):** Durch Zentrifugation geringer Plasma- und hoher Erythrozytenanteil
 - Indikationen: Akute und chronische Anämien
 - pro EK meist Hämoglobinanstieg von ca. 1 g/dl zu erwarten
 - erwünschter Ziel-Hämoglobinwert abhängig von der Geschwindigkeit des Auftretens der Anämie: bei akuten Anämien meist 8 – 10 g/dl, bei chronischen Anämien niedriger (6 – 8 g/dl)
 - Haltbarkeit : i.d.R. ca. 1 Monat
 - Kompatibilität: AB0-Kompatibilität muss unbedingt beachtet werden. Rhesus-Kompatibilität muss ebenfalls beachtet werden
 - **Universalspender:** Blutgruppe 0 negativ
 - **Universalempfänger:** Blutgruppe AB positiv

| Hb-Wert | Indikationseinschätzung |
|--------------------|--|
| Hb-Wert < 7 g/dl | Transfusion notwendig |
| Hb-Wert 7 – 9 g/dl | Transfusionsindikation abhängig von der klinischen Einschätzung des Patienten (Kreislaufstabilität, kardiopulmonale Begleiterkrankungen) |
| Hb > 9 g/dl | in der Regel keine Transfusion notwendig |

- **bestrahlte EK:** bei Immunsuppression und Transplantationspatienten
- **gewaschene EK:** bei chronischer Erythrozytensubstitution
- **Frischblut:** zur Austauschtransfusion z. B. bei schweren Hämolysen

Komplikationen

Transfusionsreaktionen

- **nicht hämolytische Reaktionen** (am häufigsten):
 - **Klinik:** Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, Kopfschmerzen, Blutdruckabfall
 - **Therapie:** Transfusion abbrechen, Überwachung, symptomatische Behandlung
- **hämolytische Reaktionen :**
 - bei Fehltransfusion oder anderen Antikörperreaktionen
 - **Klinik:** Akute hämolytische Krise mit Fieber, Schüttelfrost, Kopf-, Rücken- und Bauchschmerzen, Ikterus, brauner Urin, Blutdruckabfall (mit Gefahr des Kreislaufschocks)
 - **Therapie:** Transfusion stoppen, 1 g Prednisolon i. v., ggf. Schockbehandlung, sofortige Information des zuständigen Labors
- **allergische Reaktionen:**
 - durch Antikörper gegen lösliche Bestandteile in den Erythrozytenkonzentraten
 - **Klinik:** Urtikaria bis zur Anaphylaxie
 - **Therapie:** Transfusion stoppen, 1 g Prednisolon i.v. Clemastin i.v. (Antihistaminika)
- **bakteriell bedingte Reaktionen:** v. a. durch endotoxinbildende gramnegative Keime

Clemastin ist ein **H1-Rezeptor-Antagonist** und **Antihistaminikum**, welches bei der **Behandlung** von **Allergie** eingesetzt wird.

Infektionen

- Durch Spender-Screening gemindert, aktuell sehr selten
- Hepatitis C > Hepatitis B > HIV

Volumenüberlastung

- bei Herz- oder Niereninsuffizienz
- Prophylaxe durch längere Transfusionsdauer, evtl. Diuretika.

Komplikationen bei Massivtransfusion

- **Körpertemperaturabfall:** Konserven erwärmen (nicht > 37 °C)
- **Blutgerinnungsstörungen:** Fresh Frozen Plasma infundieren, bei Thrombozytenabfall Gabe von Frischblut oder Thrombozytenkonzentraten
- **Hypokalzämie** (Zitratintoxikation)
- **Hyperkaliämie** (v. a. bei älteren Konserven)
- **Transfusionsazidose** (v. a. bei älteren Konserven)

Durchführung (ärztliche Maßnahme!)

- sorgfältige **Identitätssicherung** (Name, Vorname, Geburtsdatum) aller Blutproben, Konserven und Begleitpapiere
- **Abnahme von Patientenblut** für serologische Untersuchungen (Blutgruppe, Rhesusfaktor, Kreuzprobe, Antikörpersuchtest)
- bei nicht erfolgter Transfusion ggf. **Wiederholung der Kreuzprobe alle 72 Std.**
- im Notfall kann bei vitaler Indikation „ungekreuztes“ Blut transfundiert werden, je nach folgende Regeln:

| Blutgruppe | Kompatible EKs |
|-----------------------|--|
| Blutgruppe 0 | 0 |
| Blutgruppe A | A oder 0 |
| Blutgruppe B | B oder 0 |
| Blutgruppe AB | AB, A, B oder 0 |
| Rhesus-negativ | Rhesus-negativ (Rhesus-positiv im Notfall möglich) |
| Rhesus-positiv | Rhesus-positiv + Rhesus-negativ |
| Unbekannte Blutgruppe | 0, Rh-negativ |

- unmittelbar vor Transfusion
 - Überprüfung der **Daten** auf dem Konservenbegleitschein und der Konserve
 - Überprüfung der **Identität** des Empfängers
 - **Bedside-Test:** AB0-Identitätstest
- Transfusion
 - in den ersten Minuten **Reaktion des Patienten beobachten**
 - regelmäßige **RR- und Pulskontrollen** während der Transfusion
 - Dauer der Transfusion (außer im Notfall) **ca. 1 – 2 Std.**

Thrombozytentransfusion

Indikationen

- **Thrombozytopenie** bei Bildungsstörung ($< 20\,000/\mu\text{l}$ und Blutungszeichen) oder **akuten Blutverlusten** ($< 30\,000/\mu\text{l}$). **Präoperative Prophylaxe** ($< 50\,000/\mu\text{l}$).

Präparat

- **Thrombozytenkonzentrat**
 - Haltbarkeit : i.d.R. **4 Tage**
 - Transfusion von einem Thrombozytenkonzentrat führt zu einem Anstieg von ca. **$20\,000/\mu\text{l}$** im Blut
 - Kompatibilität: **AB0-Kompatibilität muss beachtet werden. Rhesusfaktor sollte berücksichtigt werden**

Komplikationen

allergische Reaktionen, Infektionen

Gefrorenes Frischplasma (Fresh Frozen Plasma = FFP)

- Ersatz von Plasma einschließlich **Gerinnungsfaktoren und -inhibitoren**.
- Kompatibilität : **AB0-Kompatibilität muss unbedingt beachtet werden**. Rhesus-Kompatibilität muss **nicht** berücksichtigt werden
- **Universalspender: Blutgruppe AB**
- **Universalempfänger: Blutgruppe 0**

Indikationen

- **Massivtransfusionen**: FFP-Gabe je nach Kontrolle des Gerinnungsstatus.
 - **Kriterien: Quick $< 40\%$ bzw. INR $> 2,0$, PTT > 60 Sek.**
- Notfalltherapie bei klinisch relevanter **Blutungsneigung** infolge Störungen des Gerinnungssystems (z. B. Überdosierung oraler Antikoagulanzen).

Durchführung

- AB0-Kompatibilität erforderlich :

| Empfängerblutgruppe | Kompatible Plasmakonzentrate |
|---------------------|------------------------------|
| Blutgruppe 0 | 0, A, B oder AB |
| Blutgruppe A | A oder AB |
| Blutgruppe B | B oder AB |
| Blutgruppe AB | AB |

- **nach Wärmung sofortige Transfusion.**

Komplikationen

Transfusionsreaktion, Infektionen

Spezielle Gerinnungspräparate

- **PPSB** (Prothrombin-Komplex): Ersatz der Faktoren II, VII, IX und X insbesondere bei Blutungen im Zusammenhang mit Leberfunktionsstörungen oder **Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten**
- **Antithrombin III**: Notfallsubstitution bei AT-III-Mangel zur Optimierung der Thromboseprophylaxe mit Heparin (Wirkungswiederherstellung von Heparinen)

Humanalbumin

- **Indikationen**: ausgeprägte Hypoalbuminämie.
- **Kontraindikationen**: Vorsicht bei Herzinsuffizienz
- **Komplikationen**: Allergische Reaktionen, Volumenüberlastung bei Herz- oder Niereninsuffizienz

- PPSB**
- Faktor II – **P**rothrombin
 - Faktor VII – **P**rokonvertin
 - Faktor IX – antihämophiler Faktor **B**
 - Faktor X – **S**tuart-Prower-Faktor

1972

ABO Rhusus Kompatibilität
Aufklärung & Einwilligung

Blutgruppenbestimmung ABO, Rh

Kreuzprobe Verträglichkeitsbestimmung Coombs

Antikörpersuchtest \Rightarrow ist Differenzierung

Bedürftige Test

Grundlagen der Hämatologie +-

Einführung

- **Zusammensetzung des Blutes**
 - Ca. 5 L Blut bei einem 70 kg schweren Menschen
 - Ca. 45% zelluläre Bestandteile (→ Hämatokrit), ca. 55% Blutplasma
- **Funktion des Blutes** : Stofftransport (z.B. Sauerstoff), Abwehr, Signalübermittlung
- **Blutbildung** : bei Erwachsenen im **Knochenmark**, beim Fetus in Milz und Leber

Erythrozyten

- **Erythropoese**: Entstehung der Erythrozyten
- **Retikulozyt** : 1-3%
 - ↑: Gesteigerte Erythropoese (z.B. bei Hämolyse) *Blutung*
 - ↓: Verminderte Erythropoese (z.B. aplastischer Anämie)
- **Erythrozyt**
 - **Lebensdauer**: ca. 120 Tage
 - **Funktion** : Sauerstofftransport

Diagnostische Parameter

- **Hämoglobin** :
 - **Bestandteile**
 - „Häm“ : Porphyrin-Gerüst (*tram*), das ein Eisenatom trägt
 - „Globin“ : Im Erwachsenenalter physiologischerweise bestehend aus jeweils zwei **α-Ketten** und zwei **β-Ketten**.
 - **Normwert**: ♂ 13-17 g/dL; ♀ 12-15 g/dL
- **Hämatokrit** : Anteil der zellulären Bestandteile des Blutes (99% sind Erythrozyten)
 - Normwert: ♂ 0,40-0,50; ♀ 0,35-0,45

| | Bedeutung | Normwert | Erniedrigung | Erhöhung |
|-------------------|---|------------------------|---|---|
| MCV | Volumen eines Erythrozyten | 80-100 fL (normozytär) | Mikrozytäre Erythrozyten (z.B. Eisenmangel) | Makrozytäre Erythrozyten (z.B. bei Vitamin-B ₁₂ -Mangel) |
| MCH | Hämoglobingehalt eines Erythrozyten | 27-34 pg (normochrom) | Hypochrome Erythrozyten (z.B. Eisenmangel) | Hyperchrome Erythrozyten (z.B. bei Vitamin-B ₁₂ -Mangel) |
| MCHC | Mittlere Hämoglobinkonzentration aller Erythrozyten | 30-36 g/dL | Evtl. bei Eisenmangel, Thalassämie | Z.B. bei Sphärozytose |
| Retikulozytenzahl | | 1-3% | Erythropoetische Insuffizienz (z.B. aplastische Anämie) | Kompensatorisch gesteigerte Erythropoese (z.B. bei Hämolyse oder Blutverlust) |

Leukozyten

- Leukozytenzahl : Ca. 4000–10000/μL Blut
- Leukozytose : Infektionen. Tumorerkrankungen. Autoimmune Reaktionen.
- Leukozytopenie : Knochenmarksschädigung (Medikamente wie Metamizol, Allopurinol, Azathioprin, Bestrahlung). Infektion

Granulozyten

- Anzahl von Granulozyten: 2000–7000/μL
- <500/μL = Agranulozytose ADP-Rezeptor antagonist (Clopidogrel), Metamizol, Thyrostatika, Colchicin,

| Zelle Granulozyten | Funktion | Erhöhung der Zellzahl | Verringerung der Zellzahl |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Neutrophiler Granulozyt 50–65% | Phagozytose | Neutrophilie : Entzündung Cortisontherapie 75% | Neutropenie Knochenmarksschädigung Infektionen Hepatitis, Typhus <1500 Zellen/μL |
| Eosinophiler Granulozyt 1–4% | Abwehr von Parasiten Asie | Eosinophilie Allergie Parasitäre Erkrankungen >6% ^{neutroph} NHL | Typhus Cushing Sepsis |
| Basophiler Granulozyt 1% | allergische Reaktion | Basophilie Häufig mit Eosinophilie Allergie CML | |
| Monozyt 3–7% | Phagozytose Nach Einwanderung ins Gewebe differenzieren sie zu Makrophagen | Monozytose Infektion 77%, 500/μL | Chemo |
| Mastzelle | allergische Reaktion | Urkinase | |

Lymphozyten

- Sie befinden sich überwiegend in den lymphatischen Organen

| | Ursachen |
|-----------------|---|
| Lymphozytose | Infektionen (z.B. Tuberkulose) Chronisch lymphatische Leukämie (CLL) |
| Lymphozytopenie | Bestimmte Virusinfektionen (z.B. HIV) Neoplasien (z.B. Morbus Hodgkin) |

Natürliche Killerzellen (NK-Zellen)

T-Lymphozyten (T-Zellen)


- zytotoxische T-Zellen (Oberflächenmarker : CD8) : lösen Apoptose
- T-Helferzellen (Oberflächenmarker : CD4) : Leiten die zelluläre Immunantwort ein
- T-Gedächtniszellen (Oberflächenmarker : CD4-CD8) : Speicherung

B-Lymphozyten (B-Zellen)

- Oberflächenmarker: CD20
- Wenn aktiviert, entwickelt sie sich zur :
 - Plasmazelle: Sezerniert (sécréter) Immunglobuline (= primäre Antwort) insbesondere IgM.
 - oder B-Gedächtniszelle: Differenzierung zur Plasmazelle bei erneuten Antigenkontakt (= Sekundärantwort) → Sezerniert insbesondere IgG



Agranulozytose - < 500

- **Störung auf Knochenmarkebene**
 - **Maligne hämatologische Erkrankungen**
 - Aplastische Anämie
 - Myelodysplastisches Syndrom
 - **Vitaminmangel**
 - Vitamin-B12-Mangel
 - Folsäuremangel
- **Periphere Zellzerstörung**
 - **Hypersplenie-Syndrom**
 - **Autoimmunerkrankung mit Antikörperbildung**
- **Medikamenteninduzierte Agranulozytose**
 - **Allergisch** (Typ-II-Reaktion)
 - Periphere Analgetika: Metamizol, NSAR
 - Clozapin
 - Thyreostatika: Carbimazol, Thiamazol
 - Sulfonamide, Sulfonylharnstoffe
 - Thienopyridine: Clopidogrel, Ticlopidin
 - **Toxisch** : Zytostatika




Neutrophile Granulozyten

- Steckbrief
 - Häufigkeit: 40–60% der Leukozyten
 - Größe: 12–15 μm
 - Zellkern: Segmentiert (3–4 Segmente)
- Granula
 - Färbung (namensgebend): Schwach rosa (eher neutral)



Eosinophile Granulozyten

- Steckbrief
 - Häufigkeit: 1–3% der Leukozyten
 - Größe: 12–17 μm
 - Zellkern: Zweig gelappt (brillenförmig)
- Granula
 - Färbung (namensgebend): Eosinophil (rot)



Eosinophile Granulozyten

Basophile Granulozyten

- Steckbrief
 - Häufigkeit: 0–1% der Leukozyten
 - Größe: 14–16 μm
 - Zellkern: Segmentiert (hantelförmig)
- Granula
 - Färbung (namensgebend): Basophil (dunkelblau/violett)

Monozyten und Makrophagen




- Häufigkeit: 4–8% der Leukozyten
- Aufbau
 - Größe: 10–20 μm
 - Zellkern: Groß, nierenförmig, teils gelappt
 - Granula: Lytische bzw. zytotoxische Enzyme (z.B. Lysozym, saure Phosphatase)


Mastzellen

Mastzellen sind klinisch äußerst relevant, da sie eine zentrale Rolle bei allergischen Reaktionen spielen.

Steckbrief

- Größe: 8–20 μm
- Granula
 - Färbung: Basophil (dunkelblau/violett)





1 Monozyt
große Kern, nierenförmig
Zytoplasma ist dunkel

2 Granulozyte
segmentierten Zellkern

3 Erythrozyte
rund, rot gefärbtes Zytoplasma, hellen Kern

4 Lymphozyten
runden Kern
sehr schmalen Zytoplasma


5 Thrombozyte
kleiner RBC
dunkel blaue Zytoplasma
Kernlos

Die größte Zelle, die man in einem Blutaussstrich sehen kann, ist der Monozyt (1). Diese Vorläuferzelle der Makrophagen hat einen nierenförmigen Zellkern und dunkelblaues Zytoplasma. Neutrophile Granulozyten (2) weisen dagegen einen segmentierten Zellkern und kleine, dunkle Granula im Zytoplasma auf. Die mit Abstand am häufigsten vorkommende Zelle im Blutaussstrich ist der Erythrozyt (3), den man am rot gefärbten Zytoplasma mit zentraler Aufhellung erkennt (aufgrund geringerer Anfärbbarkeit durch bikonkave Form). Die Lymphozyten (4) fallen durch einen runden Kern auf, der nur von einem sehr schmalen Zytoplasmasaum umgeben wird. Die kleinste Zelle im Blutaussstrich ist der Thrombozyt (5). Er ist deutlich kleiner als ein Erythrozyt und hat meist eine runde Form sowie dunkelblau angefärbtes, kernloses Zytoplasma (Pappenheim-Färbung, ca. 1200-fache Vergrößerung).

Sonstiges +-


Hämostase, Blutgerinnung

- Die Hämostase (Blutstillung) ist ein Prozess, der eine Blutung beendet.
- **Zwei Phasen:**
 - * **primäre Hämostase:** dabei entsteht ein Netzwerk aus Thrombozyten, welches den Bereich des Endotheldefekts abdeckt (sog. weißer Thrombus). Die primäre Hämostase besteht aus drei Schritten: Thrombozytenadhäsion (Anheften an den Endotheldefekt mit Hilfe des von-Willebrand-Faktors), Thrombozytenaktivierung (Freisetzung gerinnungsfördernder Substanzen ins Blut) und Thrombozytenaggregation (Vernetzung untereinander durch Fibrinogenmoleküle).
 - * **sekundären Hämostase:** dabei werden bestimmte Plasmaproteine (sog. Gerinnungsfaktoren) aktiviert. Die Gerinnungskaskade kann auf zwei verschiedenen Wegen in Gang gesetzt werden: durch den intrinsischen und das extrinsischen Weg. Im Verlauf der Hämostase laufen beide Wege parallel und münden in der Aktivierung der Thrombin. Thrombin bildet schließlich den stabilen Thrombus (sog. roter Thrombus), indem es Fibrinogen in Fibrin umwandelt.
- Um überschießende Gerinnung zu verhindern, existieren im Körper auch Mechanismen zur Hemmung der Hämostase: Im Blut zirkulieren Antithrombin, Protein C und S, welche Thrombin und andere Gerinnungsfaktoren hemmen können. -ve
- Nach abgeschlossener Wundheilung wird der Fibrinthrombus durch Plasmin wieder abgebaut (sog. Fibrinolyse).



Gerinnungsfaktoren : I (Fibrinogen bzw. Fibrin), II (Prothrombin bzw. Thrombin), III (Gewebe-faktor = Thromboplastin), IV (Ca²⁺), V (Proakzelerin bzw. Akzelerin), VI (= Faktor Va), VII (Prokonvertin), VIII (Antihämophiliefaktor A), IX (Antihämophiliefaktor B), X (Stuart- Faktor), XI (Rosenthal-Faktor), XII (Hageman-Faktor), XIII (Fibrin-stabilisierender Faktor)

Hämostase



Primäre Hämostase

Vaskuläre Blutstillung

Vasokonstriktion

Spasmus (muskuläre Kontraktion)

Thrombozytäre Blutstillung

Thrombozytenadhäsion (Kollagen - vWF) - Thrombozytenaktivierung - Thrombozytenaggregation (Fibrinogen)

Störungen der Thrombozytenadhäsion


* VW-Jürgens Syn

vWF-Mangel \Rightarrow Störung der Thrombozytenadhäsion und Blutungsneigung


* TTP Thrombotisch Thrombozytopenisch Purpura

verminderte Aktivität ADAMST13 (auto-Antikörper) \Rightarrow Thrombinbildung

* Thrombozytopenie



⇒ Weißer Thrombus



Arteriellen System → Thrombozytenaggregationshemmer

Venösen System → Antikoagulation (z.B. Heparin)

Gerinnungsfaktoren

Entdeckung
↓

| | | |
|------|-------|--------------|
| I | Ia | Fibrin |
| II | IIa | Thrombin |
| III | | Gewebefaktor |
| IV | | Kalzium |
| V | Va | |
| VI | | |
| VII | VIIa | III VII |
| VIII | VIIIa | |
| IX | IXa | VIII IX |
| X | Xa | V X |
| XI | XIa | |
| XII | XIIa | |
| XIII | XIIIa | |

2+ geladenes Kalzium
2+ 2+ 2+

Antihämophilles
Globulin A
Antihämophilles
Globulin B


Fibrinstabilisierender
Faktor

Gerinnungskaskade

Extrinsischer Weg

Intrinsischer Weg

Wechselwirkung
↓



Thrombozytopenie

- Mangel an Thrombozyten im Blut.
- **Ätiologie**
 - * **Störung der Thrombozytenproduktion**
 - **Verminderte Produktion:** Toxische Schädigung (Medikamente wie Zytostatika, ionisierende Strahlen). Malignome (akute Leukämien)
 - **Ineffektive Produktion:** Vitamin B12-Mangel und/oder Folsäuremangel (panmytopenie)
 - * **Vermehrter peripherer Umsatz**
 - **Antikörper gegen Thrombozyten:** Idiopathisch immunthrombozytopenische Purpura. Sekundäre Ursachen (Medikamenteninduziert wie bei HIT, Malignome wie bei CLL).
 - **Erhöhter Verbrauch:** Mechanische Herzklappen, Hämolytisch-urämisches Syndrom, Disseminierte intravasale Gerinnung **DIC** **HUS**
- Eine erniedrigte Megakaryozytenzahl im Knochenmark spricht dabei für eine Bildungsstörung, eine reaktiv gesteigerte für einen erhöhten Umsatz.
- **Klinik:** petechiale Blutungen an Haut und Schleimhaut

Idiopathisch immunthrombozytopenische Purpura (ITP, Morbus Werlhof)

- **Definition:** Isolierte Immunthrombozytopenie unklarer Genese.
- **Diagnose:**
 - Ausschluss von Thrombozytopenien anderer Genese (s. o.)
 - Ggf. Nachweis von IgG-Antikörpern gegen Thrombozyten
 - Ggf. Knochenmarkpunktion: megakaryozytäre Hyperplasie
- **Formen:**
 - *Akute ITP:* Nach Virusinfekten bei Kindern
 - *Chronische ITP:* v. a. bei Erwachsenen
- **Therapie:**
 - bei akuter Form ohne Blutungen Spontanheilung abwarten
 - bei Thrombozytenzahl $< 20\,000/\mu\text{l}$: Steroide (Prednison)
 - bei Erfolglosigkeit der Steroidtherapie über 12 Monate: Splenektomie
 - Vor operativen Eingriffen: Immunglobuline
 - Plättchentransfusionen nur bei bedrohlichen Blutungen

Hämophilie (Bluterkrankheit)

- X-chromosomal-rezessiv vererbte Erkrankung, bei der es aufgrund eines Mangels an Gerinnungsfaktoren zu einer Störung der Hämostase kommt.
- Es wird dabei ein hereditärer Faktor VIII-Mangel (Hämophilie A) von einem Faktor IX-Mangel (Hämophilie B) unterschieden.
- Durch den Faktor VIII- bzw. IX-Mangel ist die sekundäre Blutstillung (plasmatische Gerinnung) im intrinsischen Schenkel (Verlängerung der aPTT) gestört.
- Wie bei allen Störungen der plasmatischen Gerinnung sind klinisch großflächige Blutungen und Gelenkeinnblutungen zu erwarten. Zu diesen Blutungen kommt es aber in der Regel erst ab deutlich reduzierten Restaktivitäten der Faktoren.
- Bei schwerer Hämophilie (Restaktivität $< 1\%$) ist eine regelmäßige Substitution der Gerinnungsfaktoren indiziert.

Disseminierte intravasale Gerinnung

- **Definition und Klinik:** Intravasale Aktivierung des Gerinnungssystems → Mikrothromben → Durchblutungsstörungen und Nekrosen *Gleichzeitig Verbrauch der Gerinnungsfaktoren* → *und Blutung*
 - **Ätiologie:** Schock, Sepsis, Hämolyse, OP an Pulmo, Prostata, Pankreas, Plazenta („4P“)
 - **Diagnostik:** Blutbild (Thrombozyten↓, früher sensitiver Parameter), Gerinnungsparameter (Fibrinogen↓, AT-III↓, aPTT verlängert, INR ↑, D-Dimere zunächst negativ, im Verlauf positiv)
- aktiviert Partial Thromoplastin
Clotting Time*
- Thrombozyten
Fibrinogen
Anti Thrombin III*
- aPTT
INR
DDimere*

Thrombozytopenie

↓ Produktionsstörung

↓ Produktion

- Toxisch Schädigung
(Strahlung, Medikamentös)
Zytostatika
- Malignom (akute Leukämien)

Ineffektive Produktion

- B₁₂
- Folsäure

↑ Umsatz

Antikörper

- idiopathisch
(ITP)
- Sekundär
(HIT, CLL)

↑ Verbrauch

- HUS
- mechanische Herzklappen
- DIC

- Heparin
- PPP (Gerinnungsfaktoren)
- AT III

- **Therapie:** **DIC**
 - Kausale Therapie
 - **Frühphase und nach DIC:** **Heparin** (bei manifester DIC jedoch keine Heparin
 - **Manifeste DIC:** Gabe von **Plasmakonzentraten**, **AT-III-Substitution**, ggf. Gabe von **Thrombozytenkonzentraten**, ggf. **Fibrinogen-Substitution**
- **Prävention:** **Prophylaktische Heparinisierung** (Low Dose) bei Zuständen oder Erkrankungen mit erhöhtem Risiko

Akute Leukämien

Maligne Erkrankungen der hämatopoetischen Stammzellen mit **klonaler Expansion** myeloischer oder lymphatischer Blasten (unreife, nicht funktionstüchtige Zellen) im Knochenmark, ggf. im peripheren Blut.

- Die akute lymphatische Leukämie (**ALL**) ist die häufigste maligne Tumorerkrankung im Kindesalter, die akute myeloische Leukämie (**AML**) trifft vor allem Erwachsene. >70

- **Risikofaktoren:** Trisomie 21, exogenen Schädigung des Knochenmarks (z.B. durch Strahlen oder Chemotherapie)

- **Klinik:** Zeichen der Knochenmarkinsuffizienz (Infektneigung, Anämie und Gerinnungsstörungen). Ggf. **Lymphknotenvergrößerung**, **Splenomegalie**.

- **Diagnostik:** Leukozytenzahlen können erhöht, erniedrigt oder normal, daher ist der Nachweis von Blasten im Knochenmark entscheidend für die Diagnosestellung.

- **Therapie:** **Chemotherapie** (Hochdosiszyklen zur massiven Reduktion der Tumorzellzahl und anschließende Niedrigdosiszyklen zur Erhaltungstherapie). Ggf.

Stammzelltransplantation

Plättchen
Erythrozyten ↓
WBCs 96 → (unreif)

Chronische lymphatische Leukämie (CLL)

- **Non-Hodgkin-Lymphom** mit **niedrigem Malignitätsgrad**, gekennzeichnet durch eine Akkumulation immuninkompetenter **B-Lymphozyten** in Blut, Knochenmark, Milz und Lymphknoten.

- Sie manifestiert sich als **B-Zell-Lymphom** mit lymphozytärer Leukozytose im Blutbild, weshalb sie historisch den Leukämien zugeordnet wurde.

- **Klinik:** schmerzlose **Lymphknotenschwellungen**, Schwäche und **Infektanfälligkeit**. Die CLL ist eine Erkrankung des **höheren Lebensalters**.

- **Diagnostik:** Reife, kleine Lymphozyten ↑ im **Blutausstrich** (ggf. im Knochenmark bei Unklarheit). Der Nachweis der typischen **Antigene in der Immunphänotypisierung** der Lymphozyten sichert die Diagnose.

- **Stadieneinteilung nach Binet** (A, B, C): je nach Hämoglobinwert, Thrombozytenzahl und Befall von Lymphknotenregionen.

- **Therapie:** Chemotherapie

- **Prognose:** gut im Stadium Binet A, schlecht im Stadium Binet C.

Hodgkin-Lymphom

- **B-Zell-Lymphom**, das häufig **junge Erwachsene** betrifft.

- **Ursache:** unbekannt (Risikofaktor: Infektion mit **EBV**)

- **Klinik:** indolente **Lymphknotenschwellung** (meist **zervikal**). **B-Symptomatik**

- **Diagnostik:** **Histologische** Diagnosesicherung nach Extirpation eines Lymphknotens (Reed-Sternberg-Zellen)

- **Ann-Arbor-Klassifikation:** **I:** Lokaler Befall, **II:** Befall einer Seite des Zwerchfells, **III:** Befall beider Seiten des Zwerchfells, **IV:** Disseminierter Befall

- **Therapie:** kombinierte **Radio-Chemotherapie**


- **Prognose:** gut




























































Non-Hodgkin-Lymphome (NHL)

- heterogene Gruppe maligner Erkrankungen, die von den Zellen des lymphatischen Systems (B- und T-Zellen) ausgeht.
- **Ursachen:** meistens **unbekannt** (Risikofaktoren : Strahlen, Chemotherapie. Infektion mit EBV bei Burkitt-Lymphom)
- **Klinik:** Lymphknotenschwellung. B-Symptomatik
- **Diagnostik:** **Histologische** Diagnosesicherung nach Extirpation eines Lymphknotens
- Es gibt zwei Kriterien, nach denen Lymphome eingeteilt werden: Zelltyp und Malignität.
 - . Ein typisches niedrigmalignes B-Zell-Lymphom ist z.B. die CLL, während man u.a. bei Mycosis fungoides von niedrigmalignen T-Zell-Lymphomen spricht.
 - . Ein typisches hochmalignes Lymphom ist z.B. das Burkitt-Lymphom (B-Zell).
- **Therapie:** **Radiotherapie, Chemotherapie**
- Generell wachsen niedrigmaligne Lymphome langsamer, sind aber wegen der niedrigen Teilungsraten bei systemischem Befall nur in palliativer Intention therapierbar. Hochmaligne Lymphome haben zwar untherapiert eine schlechtere Prognose, sind aber prinzipiell heilbar.

Multiples Myelom (MM, Morbus Kahler)

- B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom, charakterisiert durch eine monoklonale **Plasmazellvermehrung** im Knochenmark. Die entarteten Plasmazellen produzieren **abnorme monoklonale Antikörper (IgG, IgA) bzw. deren Leichtketten (Bence-Jones-Protein)**.
- **Ursache:** unbekannt
- **Klinik:** B-Symptomatik, **Osteolysen mit Knochenschmerzen**. Ein MM kann auch als Zufallsbefund einer Serumweißelektrophorese auffällig werden.
- **Komplikationen:** Verdrängung des Knochenmarks (**Anämie, Infekt- und Blutungsneigung**). Progrediente Niereninsuffizienz (Myelomniere). Hyperkalzämische Krise.
- **Therapie:** **Chemotherapie**. Ggf. mit autologer **Stammzelltransplantation**





| Behandlungsschema bei Anaphylaxie | | |
|---|--|--|
| Sechs Szenarien in Abhängigkeit des Schweregrades | | |
| Grad | Leitsymptome | Therapie |
| I | <ul style="list-style-type: none"> Systemisch vermittelte, generalisierte Hautmanifestation (Juckreiz, Urtikaria, Flush, Angioödem) | <ul style="list-style-type: none"> H₁-Antagonist i.v. (bspw. Dimetinden ) Clemastin ) Glucocorticoid i.v. (bspw. Prednisolon 500–1000 mg i.v. als Bolus) Reevaluation und ggf. symptomorientierte Therapieeskalation bzw. -ergänzung <ul style="list-style-type: none"> H₂-Antagonist i.v. (bspw. Ranitidin )  |
| II–III | <ul style="list-style-type: none"> Gastrointestinal (Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen) | <ul style="list-style-type: none"> H₁-Antagonist i.v. (bspw. Dimetinden ) Clemastin ) Glucocorticoid i.v. (bspw. Prednisolon ) Reevaluation und ggf. Therapieeskalation <ul style="list-style-type: none"> Spasmolytika i.v. (bspw. Butylscopolamin ) Und/oder Antiemetika i.v. (bspw. Dimenhydrinat ) H₂-Antagonist i.v. (bspw. Ranitidin ) |
| | <ul style="list-style-type: none"> Obstruktion der unteren Atemwege (Dyspnoe, bronchiale Obstruktion, Bronchospasmus) | <ul style="list-style-type: none"> Adrenalin i.m. ^{[2][3][4]}  <ul style="list-style-type: none"> Dosierung mittels Adrenalinlösung  Dosierung mittels Fertigspritze <ul style="list-style-type: none"> Kinder/Erwachsene 30–60 kgKG  Kinder 15–30 kgKG  Sauerstoff inhalativ  β₂-Sympathomimetika inhalativ (bspw. Salbutamol ) H₁-Antagonist i.v. (bspw. Dimetinden ) Clemastin ) Glucocorticoid i.v. (bspw. Prednisolon ) Reevaluation und ggf. Therapieeskalation <ul style="list-style-type: none"> Adrenalin ^{[2][3][4]} <ul style="list-style-type: none"> Bevorzugt i.m. <ul style="list-style-type: none"> Dosierung mittels Adrenalinlösung  Dosierung mittels Fertigspritze <ul style="list-style-type: none"> Kinder/Erwachsene 30–60 kgKG  Kinder 15–30 kgKG  Ggf. i.v./intraosär <ul style="list-style-type: none"> Erwachsene  ^[5] Kinder  β₂-Sympathomimetika s.c./i.v. (bspw. Reproterol ) H₂-Antagonist i.v. (bspw. Ranitidin ) Atemwegssicherung in Narkose bei drohender respiratorischer Insuffizienz |
| | <ul style="list-style-type: none"> Obstruktion der oberen Atemwege (Uvulaschwellung, Dysphonie, inspir. Stridor) | <ul style="list-style-type: none"> Adrenalin i.m. ^{[2][3][4]} <ul style="list-style-type: none"> Dosierung mittels Adrenalinlösung  Dosierung mittels Fertigspritze <ul style="list-style-type: none"> Kinder/Erwachsene 30–60 kgKG  Kinder 15–30 kgKG  Sauerstoff inhalativ  Legen eines i.v. Zugangs Adrenalin inhalativ  H₁-Antagonist i.v. (bspw. Dimetinden ) Clemastin ) Glucocorticoid i.v. (bspw. Prednisolon ) Reevaluation und ggf. Therapieeskalation <ul style="list-style-type: none"> H₂-Antagonist i.v. (bspw. Ranitidin ) Koniotomie in Narkose bei persistierendem Larynxödem |
| | <ul style="list-style-type: none"> Herz-Kreislauf-Reaktion (Hypotonie, Bewusstlosigkeit, Anaphylaktischer Schock) | <ul style="list-style-type: none"> Adrenalin i.m. ^{[2][3][4]} <ul style="list-style-type: none"> Dosierung mittels Adrenalinlösung  Dosierung mittels Fertigspritze <ul style="list-style-type: none"> Kinder/Erwachsene 30–60 kgKG  Kinder 15–30 kgKG  Sauerstoff inhalativ  Legen eines i.v./intraosären Zugangs  Forcierte Volumensubstitution i.v./intraosär   H₁-Antagonist i.v./intraosär (bspw. Dimetinden ) Clemastin ) Glucocorticoid i.v./intraosär (bspw. Prednisolon ) Reevaluation und ggf. Therapieeskalation <ul style="list-style-type: none"> Adrenalin i.v./intraosär (i.m.) ^{[2][3][4]} <ul style="list-style-type: none"> Erwachsene  ^[5] Kinder  ODER Dopamin i.v./intraosär   ODER Noradrenalin i.v./intraosär   H₂-Antagonist i.v. (bspw. Ranitidin ) |
| IV | <ul style="list-style-type: none"> Herz-Kreislauf-Versagen | <ul style="list-style-type: none"> Reanimation (Advanced Life Support) <ul style="list-style-type: none"> Legen eines i.v./intraosären Zugangs Adrenalin i.v./intraosär   Atemwegssicherung, ggf. Intubation Sauerstoff inhalativ  Forcierte Volumensubstitution i.v./intraosär  Ggf. Defibrillation H₁-Antagonist i.v. (bspw. Dimetinden ) Clemastin ) Glucocorticoid i.v. (bspw. Prednisolon ) Reevaluation und Therapieergänzung entsprechend des Leitsymptoms (s.o.) |

Serumelektrophorese

- Analyse des Serums durch quantitative Auftrennung der Serumeiweiße nach Größe und Ladung. Hierbei können sich charakteristische Konstellationen als Hinweise auf das Vorliegen bestimmter Erkrankungen (z.B. Plasmozytom) ergeben.
- Elektrophorese (von griech. phoresis = "das Tragen") bezeichnet den Transport elektrisch geladener Teilchen durch ein Medium mit Hilfe einer angelegten Spannung. Je nach Ladung und Größe geschieht dieser Vorgang schneller oder langsamer, sodass aus der Laufstrecke der Teilchen auf ihre Art rückgeschlossen werden kann.
- Serum enthält Proteine unterschiedlicher Größe und Ladung
 - Werden durch die Elektrophorese aufgetrennt → Charakteristische Konstellationen als Hinweise auf das Vorliegen bestimmter Erkrankungen (z.B. Plasmozytom)

Durchführung



- 1 Auftragen der Serumproben auf ein Agarosegel und Anlegen eines Stromes
- 2 Durch den angelegten Strom wandern die Proteine je nach Größe und Ladung innerhalb des Gels
- 3 Proteine mit unterschiedlichen Funktionen, aber ähnlichen Größen und Ladungen lagern sich in sogenannten "Banden" zusammen
- 4 Die Banden können photometrisch ausgewertet werden wodurch eine Extinktionskurve entsteht
- 5 Durch Integration der Fläche unter der Kurve kann der relative Anteil der jeweiligen Protein-Fraktion bestimmt werden
- 6 Kennt man nun die Gesamtproteinmenge, kann man die absoluten Werte errechnen



Auswertung

- Durch die photometrische Auswertung wird eine Aussage über die Größe der einzelnen Proteinbanden möglich
- Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in den meisten Fällen über ein **Diagramm**, dessen Kurvenmuster Hinweise auf bestimmte Veränderungen geben kann (z.B. M-Gradient bei multiplem Myelom)

| Bandenbezeichnung und Anteil an Gesamtprotein | Bande beinhaltet | Erhöht bei | Erniedrigt bei |
|---|---|--|---|
| Albumin (59–72%) | <ul style="list-style-type: none">• Albumin | <ul style="list-style-type: none">• Dehydratation | <ul style="list-style-type: none">• Verminderte Syntheseleistung der Leber (z.B. bei Leberzirrhose)• Verminderte Proteinaufnahme (z.B. bei Malnutrition)• Proteinverlust (z.B. nephrotisches Syndrom) |
| α_1 -Globuline (1,3–4,5%) | <ul style="list-style-type: none">• α_1-Antitrypsin• HDL• TBG• α_1-Fetoprotein^[1] | <ul style="list-style-type: none">• Akute-Phase-Reaktion• Schwangerschaft | <ul style="list-style-type: none">• α_1-Antitrypsin-Mangel |
| α_2 -Globuline (4,0–10,5%) | <ul style="list-style-type: none">• VLDL• Haptoglobin• α_2-Makroglobulin• Coeruloplasmin | <ul style="list-style-type: none">• Akute-Phase-Reaktion• Schwangerschaft• Nephrotisches Syndrom | <ul style="list-style-type: none">• Kein charakteristischer Befund einer Erkrankung |
| β -Globuline (6,5–13,0%) | <ul style="list-style-type: none">• Transferrin• LDL• C3- und C4-Komplement (→ siehe "Komplementsystem") | <ul style="list-style-type: none">• Nephrotisches Syndrom• Chronische Infektionen | |
| γ -Globuline (10,5–18,0%) | <ul style="list-style-type: none">• Immunglobuline• CRP^[2] | <ul style="list-style-type: none">• Chronische Infektionen (z.B. Hepatitis)• Plasmozytom | <ul style="list-style-type: none">• Proteinverlust (z.B. durch nephrotisches Syndrom)• Verminderte Proteinaufnahme (z.B. bei Malnutrition)• Antikörpermangel-Syndrom |



Infektiologie

Sepsis ++

Definition

Lebensbedrohliche Organdysfunktion infolge einer dysregulierten Immunantwort auf eine mütterliche Infektion

- **Kriterien der Organdysfunktion:** Definiert als Anstieg des SOFA-Score um ≥ 2 Punkte
- **Maximalform: Septischer Schock**
 1. Sepsis mit Erforderlichkeit einer Katecholamintherapie bei Hypotonie (MAP < 65 mmHg) trotz adäquater Volumengabe
 2. und Serum-Laktat > 2 mmol/L

„Der Nachweis einer Infektion ist für die Diagnose Sepsis nicht zwingend, die Vermutung ist ausreichend!“

SOFA-Score (zur Erkennung einer akuten Organdysfunktion)

- **Parameter:** mittlerer arterieller Druck (MAP), PaO₂/FiO₂, Kreatinin, Bilirubin, Thrombozytenzahl, Glasgow Coma Scale

quick → qSOFA-Score (Vereinfachte Sepsis-Kriterien)

- **Kriterien:** Atemfrequenz $\geq 22/\text{min}$. Systolischer Blutdruck < 100 mmHg. Vigilanzminderung (bzw. veränderter mentaler Status)
- Bei Zutreffen von ≥ 2 Kriterien → septische Organdysfunktion mit schlechter Prognose

SOFA
• MAP
• PaO₂/FiO₂
• Kr.
• Bill.
• Thrombozytenzahl
6. GCS

qSOFA
• AF
• RR
• Vigilanzminderung

Ätiologie

- Sequenz aus Infektion, Immunreaktion und systemischer Entzündungsreaktion
- **Fokus:** Prinzipiell kommt jeder Infektionsfokus infrage (z.B. Spondylodiszitis, Endokarditis, Osteomyelitis, Pneumonie, Abszess, Urozystitis)

Pathophysiologie

- **Auslöser der Sepsis:** I.d.R. Bakterien, selten auch Pilze, Viren oder Parasiten
- **Dysregulierte Immunantwort**
- **Effekte der Immunantwort:**
 - Endothelzelldysfunktion und Kapillarleck (Volumenmangel)
 - Störungen der Blutgerinnung: mit Gefahr einer disseminierten intravasalen Gerinnung (DIC)

Symptome/Klinik

- **Kardinalsymptome nach qSOFA**
- **Weitere klinische Hinweise**
 - Fieber, Schüttelfrost, seltener Hypothermie
 - Zentralisation: Zu Beginn oft warme Akren, im Verlauf ggf. Zeichen der Kreislaufzentralisation mit kalten Akren und „marmorierter“, kühler Haut
 - Ggf. Petechien bei Thrombopenie (Waterhouse-Friderichsen-Syndrom)
- **Symptome nach Fokus**
 - Urosepsis (Pyelonephritis): Dysurie, Pollakisurie, Algurie, Flankenschmerzen
 - Pneumonie: Dyspnoe und Husten
 - Meningitis: Meningismus, Eintrübung ^{Wasserlassen in kleinen Mengen}
 - Katheter- und Fremdkörperinfektion: Entzündungszeichen an der Einstichstelle
 - Abdomineller Fokus: Akutes Abdomen

Diagnostik (drei Säulen)

Mikrobiologische Diagnostik

- **Blutkultur:** Abnahme von mindestens zwei Blutkulturpaaren **vor Einleitung einer antibiotischen Therapie.**
- **Weitere Materialien:** Trachealsekret, Urin, Wundabstriche, Drainagesekret, Liquor cerebrospinalis (nach Liquorpunktion), Fremdmaterialien (z.B. Katheter)

Fokussuche

- **Atemwege** (pneumogene Sepsis)
 - Röntgen-Thorax und/oder CT-Thorax: Ggf. Nachweis von pneumonischen Infiltraten
 - Bronchoskopie: Zur Bronchiallavage und erweiterten Erregersuche

- **Urogenitaltrakt** (Urosepsis)
 - Sonographie (Harnstau?)
 - Makroskopischer Aspekt des Urins (trüb? eitrig?) und Urindiagnostik
- **Fremdmaterial** (ZVK, Portkatheter)
 - Implantations- bzw. Einstichstelle inspizieren
 - Mikrobiologische Untersuchung von Fremdmaterialien
 - Im Zweifel großzügige Indikation zu Entfernung und Neuanlage

Labordiagnostik

- **Laktat**: >2 mmol/L (Marker für Organdysfunktion bei Sepsis; Messung wiederholen bis <2)
- **Blutbild**: Leukozytose oder Leukopenie. Ggf. Anämie, Thrombozytopenie
- **Procalcitonin**: spezifischster Marker für eine bakterielle Sepsis
($>0,5$ – <2 ng/mL: mäßiges Risiko einer bakteriellen Infektion. >2 ng/mL: hohes Risiko)
- **CRP** >5 mg/L
- Parameter einer Verbrauchskoagulopathie: **Fibrinogen** und **Antithrombin III** ↓.
Im Verlauf D-Dimere ↑
- **Leberparameter** (Transaminasen, GGT, AP, **Bilirubin**, INR). Nierenparameter (**Kreatinin**, Harnstoff).
- **BGA**

Therapie

frühe antibiotische Therapie binnen einer Stunde nach Diagnosestellung +++

Antibiotische Initialtherapie

- **Kalkulierte Antibiotikatherapie**: möglichst unter Beachtung des (wahrscheinlichen) Fokus
- **Eingesetzte Substanzen**: **Piperacillin/Tazobactam** bzw. Meronem
 - Bei Verdacht auf MRSA-Infektion: **Linezolid** oder **Vancomycin**
- **Therapiedauer**: Je nach Klinik, i.d.R. **max. 7–10 Tage**
- **Reevaluation der antibiotischen Therapie**: **Alle 48–72 h**
 - **Nachweis eines Erregers**: Deeskalation und Umstellung auf gezielte Antibiotikatherapie

Kreislaufstabilisierung

- **Volumentherapie** (Kristalloide Lösungen)
- **Katecholamine** (wenn unter bzw. nach Flüssigkeitssubstitution $MAP < 65$ mmHg):
Noradrenalin. Ggf. **Dobutamin** (bei eingeschränkter kardialer Pumpfunktion)

Fokussanierung

- Entfernung von Fremdmaterial (z.B. ZVK, Port)
- Chirurgische Behandlung von Abszessen und infizierten Wunden
- Behandlung von abdominalchirurgischen Komplikationen (z.B. Ileus, Peritonitis)

Weitere Therapiemaßnahmen

- **Sauerstoffgabe**: per Nasensonde bzw. Maske (Ziel: $S_pO_2 > 90\%$)
- **Thromboseprophylaxe** und **Stressulkusprophylaxe**
- **Gabe von Erythrozytenkonzentraten** (bei $Hb \leq 7$ g/dL)
- **Glucocorticoide**: lediglich bei Patienten im therapierefraktären septischen Schock empfohlen

SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome)

- Systemische inflammatorische Reaktion des Körpers
- **Kriterien**: Körpertemperatur $\geq 38^\circ C$ oder $\leq 36^\circ C$. Herzfrequenz $\geq 90/min$. Atemfrequenz $\geq 20/min$. Leukozyten $> 12.000/\mu L$ oder $< 4.000/\mu L$
 - **SIRS**: Mindestens zwei der Kriterien erfüllt
- Ein **SIRS ist unspezifisch**, kann also insb. auch durch nicht-infektiöse Ursachen ausgelöst werden (Polytraumata. Schwere Operationen. Verbrennungen, akute Pankreatitis,...)

$T > 38^\circ, < 36^\circ$
 $HF > 90/min$
 $AF > 20/min$
 $Leuko > 12.000/\mu L$
 $< 4.000/\mu L$

Nosokomiale Infektionen ++

Definition

Infektion, die frühestens 48 h nach Hospitalisierung auftritt (auch in Pflegeeinrichtungen, Altenheim)

Charakteristika

- Anderes Keimspektrum (Anpassung der kalkulierten antibiotischen Therapie notwendig)
- Komplikation : Sepsis

Allgemeine prädisponierende Faktoren

- Hohes Alter
- Langer stationärer Aufenthalt
- Diabetes mellitus und Immunsuppression
- Katheter, Venenverweilkanülen, Endotrachealtubus, ... *Dialyse*

Erreger

- **Pfützenkeime**: Pseudomonas, E. coli, Klebsiellen, Proteus, ...
- **Luftkeime**: S. epidermidis (Koagulase negativ) und S. aureus (Koagulase positiv), Enterococcus, ...

Multiresistente Erreger (MRE)

Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA)

- MRSA ist durch Bildung eines modifizierten Penicillin-Bindeproteins (PBP) gegen nahezu alle Beta-Laktam-Antibiotika resistent
- Bei stationärer Aufnahme: Entnahme eines Nasen-Rachen-Abstriches und Untersuchung auf MRSA

Hygiene-Aspekte (Im Krankenhaus)

- Isolation in einem Einzelzimmer
- Hygienemaßnahmen (für Personal und Besucher)
 - Händedesinfektion vor Betreten und Verlassen des Patientenzimmers
 - Schutzkleidung: Schutzkittel, Handschuhe, Mund- und Nasenmaske, Kopfhaut
 - Abwurf für Schutzkleidung im Patientenzimmer
 - Patientenbezogene Verwendung medizinischer Utensilien (Stethoskop, Stauschlauch, Sprühdessinfektion)
 - Nach Entlassung des Patienten : Abschlussdesinfektion des Zimmers
- Dekolonisation („Sanierung“): Indiziert bei jedem MRSA-Träger im Krankenhaus (Patienten und Personal)
 - *asymptomatisch* → Nasale Besiedlung: Mupirocin-Salbe 1-1-1 / 5 Tage
 - Oropharyngeale Besiedlung: Mundspülung und Gurgeln mit Chlorhexidin
 - Hautbesiedlung: Ganzkörperwaschungen mit antiseptischen Waschlösungen *Deisenan*
 - Erfolgskontrolle/Aufhebung der Isolierung: nach 3 negativen Abstrichen
 - Bei frustrierender Dekolonisation: Wiederholung der Dekolonisation

Therapie einer MRSA-Infektion

Vancomycin i.v. (Alternativen: Linezolid *600mg 1-0-1* i.v. oder Daptomycin i.v.)

Multiresistente gramnegative Stäbchen (MRGN)

Acylureidopenicilline

- MRGN, wenn eine Resistenz gegenüber mind. 3 der 4 Antibiotikaklassen vorliegt : Piperacillin. Cephalosporine der Generationen 3 und 4. Fluorchinolone. Carbapeneme
- **Unterteilung** :
 - **3-MRGN** = Bei Resistenz gegen 3 der 4 Leitsubstanzen (i.d.R. Carbapeneme noch wirksam)
 - **4-MRGN** = Bei Resistenz gegen alle 4 Leitsubstanzen
- **Erreger**: Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, ...

Hygiene-Aspekte

- **Isolationsmaßnahmen**
 - **Patienten mit 3-MRGN** : Keine Isolierung bei Verdacht. Ggf. Isolierung bei Nachweis
 - **Patienten mit 4-MRGN** : Ggf. Isolierung bei Verdacht. Isolierung bei Nachweis

- **Dekolonisation:** nein (Kolonisation im Verdauungstrakt)

Therapie einer MRGN-Infektion

- **Bei 3-MRGN:** Carbapeneme *Meropenem 3g/24h od. imipenem/cilastatin 500/500mg 1-1-1*
- **Bei 4-MRGN:** Colistin *3 Mio-1E IV 1-1-1*
- „4-MRGN sind meldepflichtig“

Nosokomiale Pneumonie

- Dritthäufigste nosokomiale Infektion
- **Antibiotische Therapie:**
 - Keine Risikofaktoren für MRE: Ampicillin + Sulbactam
 - Risikofaktoren für MRE oder septischer Schock: Piperacillin + Tazobactam
- **Prophylaxe:** Hände- und Gerätedesinfektion. Mobilisation/Atemtherapie

Nosokomiale Harnwegsinfektion

- Zweithäufigste nosokomiale Infektion (Häufigster Erreger: Escherichia coli)
- **Risikofaktoren:** Blasenkatheter ++
- **Antibiotische Therapie**
 - Kalkuliert (→ Analog zur ambulanten Urozystitis)
 - Risikofaktoren für MRE oder septischer Schock: Piperacillin + Tazobactam
- Bei einliegendem Blasenkatheter: Wechsel des Katheters möglichst vor Beginn der antibiotischen Therapie
- **Prophylaxe:** Strenge Indikationsstellung bezüglich eines Dauerkatheters.
Hygienevorschriften hinsichtlich Anlage und Wechsel von Dauerkathetern beachten

Nosokomiale Wundinfektion

- Häufigste nosokomiale Infektion (Häufigste Erreger: *S. aureus, S. epidermidis*)
- **Therapie:** siehe Wundbehandlung

Erysipel +

Definition

Das Erysipel ist eine bakterielle Infektion der Haut.

Ätiologie

- **Erreger** : Meist **β -hämolysierende Streptokokken**
- **Übertragungsweg**
 - **Eintrittspforte** : meistens kleine Hautläsion (Interdigitalmykose++, Rhagaden, Ulzera, Einstichstellen bei i.v. Drogenabusus)
 - **Verbreitung** erfolgt über die Lymphgefäße
- **Risikofaktoren**
 - Diabetes mellitus
 - Immunschwäche
 - Paraneoplasien
 - Adipositas mit chronisch-venöser Insuffizienz
 - Chronisches Lymphödem

Symptome/Klinik

- Typische ^{extensive} flächige, scharf begrenzte, flammenförmige Rötung
- Schmerzhafte Schwellung und Überwärmung der Haut
- Lymphadenitis (Schwellung der regionalen Lymphknoten)
- Fieber, Schüttelfrost sowie weitere Allgemeinsymptome
- Befund typischerweise einseitig
- Prädispositionsstellen: Untere Extremitäten und Gesicht

Diagnostik

- Blickdiagnose (Lokalbefund)
- Anamnese und Allgemeinsymptome
- Suche nach der Eintrittspforte!
- Labor: Blutbild, CRP/BSG *Leukos ↑*

Differentialdiagnosen

- Phlegmone
- Thrombophlebitis
- Erythema nodosum
- Dermatitis: Stauungsdermatitis, Kontaktdermatitis

Therapie

- **Physikalische Maßnahmen**
 - Ruhigstellung und Hochlagerung der Extremität
 - Kühlung
- **Antibiotische Therapie bei Erysipel:**
 - **1. Wahl: Penicilline** (insb. bei Streptokokkennachweis)
 - Bei Penicillinallergie : Makrolide oder Clindamycin

Komplikationen

- Rezidiv
- Lymphödem
- Thrombophlebitis
- Nekrotisierende Faszitis *↳*

Weichteilinfektion +

Allgemein

- **Entzündungszeichen (nach Galen):**
 - Rubor = Rötung
 - Calor = Überwärmung
 - Tumor = Schwellung/Ödem
 - Dolor = Schmerz
 - Functio laesa = eingeschränkte Funktion
- **Risikofaktoren:** Immunschwäche, Diabetes mellitus, Durchblutungsstörungen, Stase
- **Komplikationen:** Lokale Ausbreitung der Infektion. Lymphangitis. Lymphadenitis. Systemische Beteiligung mit Fieber und Gefahr der Sepsis

Follikulitis, Furunkel und Karbunkel

Definitionen

- **Follikulitis:** Haarfollikelentzündung
- **Furunkel:** eitrige und ausbreitete Haarfollikelentzündung
- **Karbunkel:** mehrere Konfluierende Furunkel

Erreger

Meist *Staphylococcus aureus*

Sonderform:

- **Gesichtsfurunkel:** erhöhtes Komplikationsrisiko, deshalb immer i.v. antibiotische Therapie
 - Komplikationen: Orbitalphlegmone, Meningitis, Sinus-cavernosus-Thrombose

Diagnostik

- Klinische Diagnose (Blickdiagnose)
- Ggf. Abstrich mit Kultur und Antibiogramm

Therapie

- **Allgemeine Maßnahmen:** Ruhigstellung, Vermeidung unnötiger Manipulation. Ggf. lokale Kühlung
- **Topische Antiseptika** (Chlorhexidin)
- **Ggf. topische Antibiotika** (Fusidinsäure)
- **Ggf. systemische Antibiotika** (Cephalosporine der 1. Generation i.v. Bei Penicillinallergie: Clindamycin i.v.)

Abszess

Definition

Abgekapselte Eiteransammlung (in einer nicht-existing Körperhöhle)

Erreger

Meist *Staphylococcus aureus*

Klinik

- 5 Entzündungszeichen
- Ggf. Allgemeinsymptome: Fieber, Lymphknotenschwellung, reduzierter Allgemeinzustand

Diagnostik

- Klinik (insb. bei kutanem Abszess)
- Sonographie. Ggf. MRT oder CT bei tiefer gelegenen Abszessen
- Ggf. Abstrich
- Ggf. Labor

Therapie

- **Kutaner Abszess**
 - **Chirurgische Sanierung:** Inzision, Spülung, Drainage
 - **Ggf. zusätzlich systemische Antibiotika**
 - Bei Allgemeinsymptome, Abwehrschwäche, Lokalisation Gesicht, Genital- bzw. Analregion und/oder Hände
 - Cephalosporine der 1. Generation i.v. Clindamycin i.v. bei Penicillinallergie
- **Tiefer gelegener Abszess**
 - **Systemische Antibiotika:** in Abhängigkeit von der Lokalisation
 - **Plus perkutane Punktion mit Drainage oder offene Ausräumung**

Phlegmone

Definition

- **Phlegmone:** Tiefe, diffuse, nicht-abszedierende, eitrige Infektion (bis zur Faszie oder Muskulatur reichend)
- **Begrenzte Phlegmone:** Begrenzte Infektion von Dermis und Subkutis

Erreger

Meist *Staphylococcus aureus* und/oder hämolysierende Streptokokken der Gruppe A (Mischinfektionen häufig)

Klinik

- 5 Entzündungszeichen bei der begrenzten Phlegmone
- Bei der Phlegmone zusätzlich: Eiter
- Keine Allgemeinsymptome bei der begrenzten Phlegmone, ausgeprägte Allgemeinsymptome bei der Phlegmone

Diagnostik

- Klinik
- Abstrich
- Sonographie

Differentialdiagnosen

- Erysipel
- Nekrotisierende Fasziitis

Therapie

- **Begrenzte Phlegmone:** Systemische Antibiotikatherapie
 - Clindamycin i.v. oder Flucloxacillin i.v.
- **Phlegmone**
 - Systemische Antibiotikatherapie: Flucloxacillin i.v.
 - und chirurgische Sanierung

Empyem

Definition

Eiteransammlung in einer schon bestehenden Körperhöhle (bspw. Pleuraempyem, Gelenkempyem, Gallenblasenempyem)

Erreger

Je nach Lokalisation, z.B. *Staphylococcus aureus*, *E. coli*,...

Klinik

- Reduzierter Allgemeinzustand
- Fieber
- Lymphknotenschwellung

Therapie

Pleuraempyem

- **Chirurgische Sanierung** : Thoraxdrainage oder Thorakoskopie (mit Ausräumung der Empyemhöhle)
- **Systemische Antibiotikatherapie** : Ampicillin/Sulbactam i.v. Unacid

Gelenkempyem

- Operative Sanierung und Drainage
- Systemische Antibiotikatherapie mit : Cefazolin i.v. ^{G⁺} plus Gentamicin i.v. ^{G⁻}

Gallenblasenempyem

- Cholezystektomie
- Systemische Antibiotikatherapie

1. Generation
Cefalosporin

Nekrotisierende Faszitis

Definition

Nekrotisierende, tiefe Weichteilinfektion bis unter die Faszie mit fulminantem, lebensbedrohlichem Verlauf

Erreger

β -hämolisierende Streptokokken der Gruppe A (Ggf. Mischinfektion)

Klinik

- Schnell fortschreitende, ausgedehnte Nekrose der Subkutis mit Zerstörung von Faszien und Muskulatur
- Bild einer Sepsis
- Prädispositionsstellen: Extremitäten, Gesicht, Genitale (Fournier-Gangrän)

Diagnostik

- Klinik
- Labor: Leukozytose, CRP-Erhöhung
- Mikrobiologie : Blutkulturen, Gewebebiopsien

Therapie

- Allgemeine Maßnahmen : intensivmedizinische Betreuung, Volumentherapie (= Sepsis)
- Radikales chirurgisches Débridement (schnellstmöglich)
- Systemische Antibiotikatherapie (sofort) : Piperacillin/Tazobactam i.v. plus Clindamycin i.v.

Prognose

Letalität: 25%

COVID-19 +

Definition

- Akute infektiöse Lungenerkrankung bzw. akutes respiratorisches Syndrom, ausgelöst durch Infektion mit dem erstmalig im Dezember 2019 in Wuhan/China nachgewiesenen Coronavirus-Untertyp SARS-CoV-2
- Inzwischen globale Ausbreitung mit sehr dynamischer Entwicklung der Infektionsraten

Übertragung

- **Mensch-zu-Mensch-Übertragung:** Tröpfcheninfektion durch Sekrete des Respirationstraktes („Niesen und Husten“) bzw. deren Aufnahme in aerosolisierte Form
 - **Übertragung über Hände:** nach Kontakt mit respiratorischen Sekreten und bspw. Berührungen im Gesicht
 - **Übertragung über unbelebte Flächen:** möglich

„Eine Übertragung von SARS-CoV-2 durch asymptomatische oder minimal symptomatische Infizierte ist beschrieben und findet auch in der Inkubationszeit von max. 14 Tagen statt!“

Inkubationszeit

Max. 14 Tage

Meldepflicht

namentliche Meldepflicht bei Krankheitsverdacht, Erkrankung und Tod an das Gesundheitsamt

Symptome/Klinik

Klinische Präsentation

- (trockener) Husten und Fieber, Abgeschlagenheit
- Ggf. Gliederschmerzen, Hals- oder Kopfschmerzen, Schnupfen
- Ggf. Luftnot als Hinweis auf beginnenden schweren Verlauf mit ausgeprägter interstitieller Pneumonie
 - Bei älteren Pat. ggf. „stille Hypoxie“, Pulsoxymetrie als Screening zu empfehlen!
- Ggf. gastrointestinale Begleitsymptome (Übelkeit/Erbrechen, Diarrhö, unkomplizierte Bauchschmerzen)
- Ggf. Anosmie und/oder Ageusie

„- Die klinische Präsentation ist unspezifisch und variabel. Je nach Schwere und Fortschritt der Erkrankung reicht das Spektrum von asymptomatisch bis stark ausgeprägt!

- Auch Pat. mit initial mildem Verlauf können im Krankheitsverlauf nach ca. einer Woche eine Verschlechterung erleiden!“

Verlauf und Prognose

- **Milde Verläufe als Regelfall (80%)**
- **Schwere Verläufe:** Bei bis zu 15% der Infektionen, bei 5% Auftreten einer kritischen Krankheit mit akuter Lebensgefahr
 - Vollbild einer interstitiellen Pneumonie mit respiratorischer Insuffizienz bei ARDS, Notwendigkeit einer Intubation und maschinellen Beatmung etwa 8-10 Tage nach Infektion
 - **Komplikationen**
 - Myokarditis, Herzrhythmusstörungen
 - Akutes Nierenversagen
 - Orchitis
- **Sterblichkeit:** ca. 5 %
- **Risikogruppen für schwere Verläufe:** Alte Pat., Pat. mit chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Lungenerkrankungen oder Immunsuppression. Rauchende Pat. ♂ > ♀

COVID-19-Diagnostik

Direkter Nachweis von SARS-CoV-2

- **PCR: Goldstandard** zum Nachweis einer Infektion mit SARS-CoV-2 in der Akuten Phase
 - Schutzkleidung anlegen vor Entnahme der Abstriche!
 - **Untersuchungsmaterial:**
 - **Oberer Respirationstrakt** : Nasopharynx-Abstrich. Oropharynx-Abstrich
 - **Unterer Respirationstrakt** : Bronchial- und Trachealsekret. Bronchoalveoläre Lavage. Sputum
- „Bei Patienten im späteren Verlauf der Erkrankung (Pneumonie, ARDS) kann der Rachenabstrich bereits wieder virenfrei sein, während noch infektiöse Viruslast in den unteren Atemwegen besteht!“
- „Die PCR kann initial negativ sein. Wiederholungen der PCR alle 2–3 Tage bei begründetem Verdacht und Bild eines schweren Verlaufes erscheinen sinnvoll, dann auch am ehesten mit zusätzlicher Analyse geeigneter Sekrete der unteren Atemwege!“

Indirekter Nachweis von SARS-CoV-2

- **Antikörper-Nachweis aus Serum:** In der Akutdiagnostik unbedeutend (erst 7–10 Tage nach Infektion detektierbar)
- „Kommerziell verfügbare Schnelltests sind aktuell noch nicht ausreichend validiert“

Klinisches Management milder Verläufe

Verdachtsfalldefinitionen

- **Begründeter Verdachtsfall:** Umgehende Meldung an das örtliche Gesundheitsamt und Veranlassung einer COVID-19-Diagnostik bei folgenden Konstellationen
 1. Akute respiratorische Symptome UND Kontakt zu einem labordiagnostisch bestätigten Krankheitsfall
 2. Klinisches bzw. radiologisches Bild einer viralen Pneumonie UND Häufung von Pneumonien in einer Einrichtung (Krankenhaus/Altenpflegereinrichtung)
- **Fälle zur differentialdiagnostischen Abklärung:** Keine umgehende Meldung an das örtliche Gesundheitsamt, Einleitung einer COVID-19-Diagnostik und Meldung nur bei Laborbestätigung
 1. Klinisches bzw. radiologisches Bild einer viralen Pneumonie UND kein Kontakt zu einem labordiagnostisch bestätigten Krankheitsfall
 2. Akute respiratorische Symptome UND kein Kontakt zu einem labordiagnostisch bestätigten Krankheitsfall
- **Kontaktpersonen-Management:** Nach Erfassung bzw. Meldung durch das Gesundheitsamt, ggf. Einleitung einer COVID-19-Diagnostik (insb. bei medizinischem Personal in Krankenhäusern und Altenpflegereinrichtungen)

Versorgung von Verdachtsfällen und Kontaktpersonen

- Ambulante Behandlung mit symptomatischen Maßnahmen, häusliche Quarantäne für 14 Tage nach Maßgabe der Gesundheitsämter und des RKI
- Stationäre Einweisung: Nur bei klinischer Verschlechterung

Klinisches Management schwerer Verläufe

Diagnostik

- **Labor**
 - **Differentialblutbild:** evtl. Leukopenie, Lymphopenie, Thrombopenie
 - **Entzündungszeichen:** CRP, PCT i.d.R. normwertig außer bei bakterieller Koinfektion mit Sepsis
- **Bildgebung:**
 - **Röntgen-Thorax:** Häufig bds. Infiltrate bei intensivmedizinischer Behandlungspflichtigkeits nachweisbar
 - **Notfallsonographie der Lunge:** Ggf. früher aussagekräftig als die Röntgenuntersuchung
 - Zunehmender Nachweis von B-Linien (Sonographie) im frühen pulmonalen Verlauf
 - Konsolidierung von Lungenfeldern bei Progression der pulmonalen Erkrankung
 - **CT-Thorax:** Durchführung nur bei therapeutischer Konsequenz zu empfehlen, da Infektionsrisiken bei Durchführung hoch

Therapie

- **Intensivmedizinische Therapie:** **Aufnahmekriterien** sind i.d.R. **schwere Dyspnoe** mit **Hypoxämie, Tachypnoe mit AF >30/min**
 - **Intubation**
 - **Maschinelle Beatmung**
 - **Antibiotikagabe:** Bei Nachweis einer bakteriellen Infektion
 - **Flüssigkeitsmanagement:** Eher restriktive Volumentherapie
 - **Keine routinemäßige Gabe von Glukokortikoiden!**
- **Medikamentöse Therapieformen:** Bisher ist keine nachweislich wirksame Therapieform etabliert, daher stets experimentell, ein Einsatz kann unter Nutzen-Risiko-Abwägung in Einzelfällen erwogen werden
 - **Hydroxychloroquin**
 - **Protease-Inhibitoren:** Lopinavir/Ritonavir
 - **Nukleotidanaloga:** Remdesivir

*Dyspnoe
Tachypnoe > 30
Hypoxämie*

Hygiene und Prävention

Ambulantes Management

Begründete Verdachtsfälle sollten umgehend mit einer **Mund-Nasen-Maske** versorgt und in einen **separaten Raum** gebracht werden, anschließend sollte medizinisches Personal die Behandlung in **Infektionsschutz-kleidung** durchführen (**FFP-2-Maske, Schutzkittel, Handschuhe, Schutzbrille, Kopfhabe**)


Stationäre Hygienemaßnahmen

- **Unterbringung:** In einem **Isolierzimmer**, möglichst mit Vorraum
- **Versorgung:** Nur mit Schutzbrille, Schutzkittel, Handschuhen, Haube und mind. FFP2-Maske (FFP-3-Masken bei invasiver Diagnostik und Therapie. z.B. Intubation, NIV, Bronchoskopie, Absaugen von Trachealsekret bei Beatmeten)

Entlassungskriterien bei stationärer Behandlung

Frühestens **nach 10 Tagen** bei Erfüllung **ALLER** folgenden Kriterien

1. **Fieberfreiheit seit mind. 48 Stunden**
2. **Symptombefreiheit seit mind. 24 Stunden**
3. **Zwei negative SARS-CoV-2-PCR-Untersuchungen im Abstand von 24 Stunden**




Vor Anlegen der persönlichen Schutzausrüstung sollte eine hygienische Händedesinfektion durchgeführt werden.

Aufklärungsmaßnahmen zu Infektionsschutz und Prävention

- **Händehygiene:** Nach jedem Kontakt mit potentiell viruskontaminierten Gegenständen und Personen
 - Waschen der Hände mit Wasser und Seife und/oder
 - Hygienische Händedesinfektion mit einem viruziden Händedesinfektionsmittel
- **Beim Husten oder Niesen**
 - Nicht in die Richtung anderer Personen husten oder niesen!
 - Ein Taschentuch benutzen und zeitnah sicher entsorgen! (Alternativ in die Armbeuge husten oder niesen)
 - 1–2 m Abstand von hustenden und niesenden Personen halten
- **Exposition vermeiden:** Öffentliche Menschenansammlungen meiden. Reisen in Risiko-Gebiete vermeiden
- **Mund- und Nasenschutzmasken:** bei Menschenansammlungen, Supermärkten,...

Hygienische Händedesinfektion



Sonstiges +-

Panaritium

- **Definition** : Lokalisierte, eitrige Entzündung im Bereich der Finger oder (seltener) Zehen (Paronychie : Nagelwallentzündung)
- **Erreger** : Meistens Staphylococcus aureus und/oder Streptokokken
- **Symptome** : 5 Entzündungszeichen
- **Diagnostik** : Klinik. Ggf. Labor. Ggf. Abstrich
- **Therapie** : Ruhigstellung, Hochlagerung, Kühlung. Topische Antiseptika (Chlorhexidin). Ggf. systemische Antibiotikatherapie (Clindamycin p.o. oder i.v.). **Chirurgische Sanierung** bei Abszedierung (Inzision, Spülung, Drainage). **Tetanusschutz**
- **Komplikationen** : Phlegmone. Lymphangitis/Lymphadenitis. Sepsis

Antibiotika

- **Penicilline** :
 - **Wirkmechanismus** : **Hemmung der Zellwand-synthese** (bakterizid)
 - **Nebenwirkungen**: Penicillin-**Allergie**, **Neurotoxizität** bei hoher Dosierung. Jarisch-Herxheimer-Reaktion (immunologische Reaktion) bei Syphilis-Therapie. Speziell Aminopenicilline: **Arzneimittlexanthem** (bei infektiöse Mononukleose → **Gabe kontraindiziert**)
 - **Kontra-indikationen**: . Penicillin-Allergie. Schwere Niereninsuffizienz
- **Fluorchinolone** :
 - **Wirkmechanismus** : **Hemmung der bakteriellen Gyrase** (bakterizid)
 - **Nebenwirkungen**: **Hepatotoxizität** . **Neurotoxizität** . Hyper-/Hypoglykämien. **QT-Zeit-Verlängerung** . **Tendinitis**, **Achillessehnenruptur**. Muskuläre **Beschwerden**, **Photosensibilität** *Aortendissektion* *verwirrtheit bei alte Menschen*
 - **Kontra-indikationen**: Schwangerschaft, Stillzeit. Kinder/Jugendliche

Impfungen

- **STIKO** : Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut (Kommission von Experten, die Richtlinien und Empfehlungen zu Schutzimpfungen und Infektionskrankheiten abgibt)

Formen

Aktivimpfung

Sie **stimuliert das Immunsystem zur Antikörperproduktion** (hält länger)

- **Lebendimpfstoffe**: **Attenuierte Erreger**. Die einmalige Impfung bietet bereits einen Impfschutz. Eine zweite Impfung dient nicht der Auffrischung, sondern soll vereinzelte Impfversager erreichen.
- **Totimpfstoffe**: Einzelne Partikel oder ganze Erreger. Die einmalige Impfung reicht i.d.R. nicht aus. Um einen langanhaltenden Impfschutz zu gewährleisten, werden Totimpfungen in mehreren Teilimpfungen durchgeführt und ggf. aufgefrischt.

| Lebendimpfungen | Totimpfungen |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mumps • Masern • Röteln • Varizellen <i>MMR-V</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Hepatitis A, B • Haemophilus-influenzae Typ b, <i>Hib</i> <u>Pneumokokken</u>, <u>Meningokokken</u> • Influenza • <u>Tetanus</u>, Diphtherie |

Passivimpfung

Antikörper werden direkt injiziert (streng genommen ist keine Impfung)

Simultanimpfung

- Gleichzeitige Impfung mit einem Aktiv- und Passivimpfstoff
- **Indikation**: Als Postexpositionsprophylaxe, z.B. gegen Hepatitis B, Tollwut und Tetanus

Grippe-Impfung

- **Impfempfehlung:** Die STIKO empfiehlt die saisonale Influenzaimpfung
 - Als Standardimpfung für **alle Personen über 60 Jahre**
 - Als Indikationsimpfung für **Risikogruppen** : Schwangeren. Alle Personen mit chronischen Krankheiten (Lungen-, Herz-, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes mellitus). Bewohner von Alters- und Pflegeheimen. Medizinisches Personal
- **Durchführung:** Jährliche Impfung, optimalerweise im Herbst
- **Impfstoff:** inaktivierter quadrivalenter **Totimpfstoff**

Impfkalender der STIKO

Tetanus, Diphtherie, Pertussis. Haemophilus influenzae Typ b (Hib). Poliomyelitis. Hepatitis B. Pneumokokken. Rotaviren. Meningokokken Serotyp C. Masern, Mumps, Röteln (MMR). Varizellen (V). Influenza. Humane Papillomviren (HPV). Herpes zoster (ab 60 Jahre)
„Nur Masern-Impfung ist aktuell pflichtig“

Blutkulturen

Material

Stauschlauch. Desinfektionsmittel. Keimarme Tupfer. Handschuhe. Blutkultursets. Punktionsnadel. Abwurf. Pflaster

Durchführung

- Vor Beginn der antibiotischen Therapie. **Kein Warten auf einen Fieberanstieg!**
- Hygienische Händedesinfektion. Handschuhe benutzen. Einstichmembran der Blutkulturflaschen desinfizieren und **trocknen lassen**.
- Punktionsstelle desinfizieren, Einwirkzeiten des verwendeten Hautdesinfektionsmittel beachten. **Keine erneute Palpation der Vene!**
- Blutentnahme (**Mindestens zwei Blutkultursets**). Abnahme eines Blutvolumens von **10ml** pro Blutkulturflasche.
- Entnahmeort aus peripheren Venen. **Entnahme aus liegenden Kathetersystemen vermeiden**.

Meldepflichtige Krankheiten (Bei Krankheitsverdacht, Erkrankung und Tod)

Botulismus, Cholera, Clostridium-difficile-Infektion (nur bei schwerem klinischem Verlauf), Diphtherie, Hepatitis (A, B, C, D, E), Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS), Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber, Masern, Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis, Milzbrand, Mumps, Pertussis, Poliomyelitis, Pest, Röteln, Tollwut, Typhus, Varizellen **COVID 19**

Antisepsis

- Antisepsis bezeichnet **alle Maßnahmen zur Verminderung von Keimzahlen, um somit einer Infektion vorzubeugen**.
- Die häufigste antiseptische Maßnahme ist die **Desinfektion mit bioziden Substanzen**.
- Zur Haut- und Schleimhautreinigung werden vor allem **Alkohole** verwendet.
- Zur Flächendesinfektion kommen bevorzugt **Aldehyde** zum Einsatz.
- In medizinischen Einrichtungen hat die Händedesinfektion eine besondere Bedeutung, wobei die alltägliche hygienische Händedesinfektion von der chirurgischen unterschieden wird.

KISS (Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System)

Erhebung und Erfassung **hygienebezogener Daten** in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen des deutschen Gesundheitssystems. KISS besteht aus mehreren Modulen : ITS-KISS, Hand-KISS (ermittelt den Verbrauch von Händedesinfektionsmitteln in stationären und ambulanten Einrichtungen), OP-KISS, Stations-KISS

Fieber und Entzündung

- **Der Hypothalamus reguliert die Körperkerntemperatur.**
- **Fieber:** Erhöhung der Körperkerntemperatur durch veränderte hypothalamische Wärmeregulation (Sollwertverstellung), **> 38 °C rektal**
- **Schüttelfrost** : Kältegefühl, das mit Muskelzittern am gesamten Körper einhergeht und bei fiebrigen Erkrankungen auftritt. Das Zittern bewirkt eine relativ **schnell** ansteigende Körpertemperatur.

Sollwert نقطة الضربة

Handwritten signature

- **Ursachen von Fieber unklarer Genese** : Infektionen (bakterielle Endokarditis, Tuberkulose, urogenitale Infektionen, hepatobiliäre Infektionen, Abdominalabszesse, ...). Malignome (Lymphome, Leukämie,...). Autoimmunkrankheiten: Kollagenosen (Lupus erythematodes, ...), Vaskulitiden (Riesenzellarteriitis,...). ...

- **Akute-Phase-Proteine** : typische „Entzündungskonstellation“ im Labor: CRP↑, Leukozyten↑, ESR = BSG Blutsenkungsgeschwindigkeit↑. Zunehmende Bedeutung in der Verlaufskontrolle bei septischen Prozessen besitzt darüber hinaus das Procalcitonin.

Tetanus (Wundstarrkrampf)

- Infektion durch Clostridium tetani ausgelöst, dessen resistente Sporen ubiquitär vorkommen.

- Das bei Verletzungen aufgenommene Bakterium bildet Tetanustoxin, das im ZNS die Freisetzung inhibitorischer Neurotransmitter hemmt. Dies führt zu einer spastischen Tonuserhöhung der Muskulatur.

- Klinisch : Trias aus Trismus (Kieferklemme), Risus sardonicus (Teufelsgrinsen) und Opisthotonus (Hyperlordose der Wirbelsäule). Durch eine Beteiligung der Atemmuskulatur kann es zum peripheren Atemstillstand kommen.

- Die Therapie umfasst Wunddebridement, die Toxinneutralisierung mit Tetanus-Immunglobulin, die aktive Immunisierung sowie eine supportive intensivmedizinische Therapie.

- Die Letalität unter intensivmedizinischer Therapie liegt bei etwa 25%.

- Die Primärprävention durch Impfungen ist daher entscheidend. Nach erfolgreicher Grundimmunisierung mit mindestens drei Teilimpfungen (Innerhalb des 1. Lebensjahres) sollten bis zum 18. Lebensjahr zwei und danach alle zehn Jahre Auffrischungsimpfungen durchgeführt werden. Bei Verletzungen und nicht ausreichendem Impfschutz erfolgt eine Aktivimpfung und ggf. eine simultane Passivimpfung.

Herpes zoster (Gürtelrose)

- Die Gürtelrose ist durch die Reaktivierung einer Varizelleninfektion verursacht, da das Virus nach einer Primärinfektion im Kindesalter (in Form von Windpocken) lebenslang in den Hirn- und Spinalganglien persistiert.

- Eine Reaktivierung kann durch Stress oder Immunschwäche ausgelöst werden und tritt als schmerzhafte unilaterale und dermatombezogene Hautrötung mit Bläschen in Erscheinung.

- Durch den Einsatz von antiviralen Medikamenten (insb. Aciclovir) kommt es i.d.R. zu einer folgenlosen Ausheilung.

- Mögliche Komplikationen sind eine Enzephalitis oder insb. bei älteren Menschen eine (oft lebenslang anhaltende) schmerzhafte Post-Zoster-Neuralgie. Befällt das Virus die Hirnnerven, kann es beim Zoster ophthalmicus zu Visusverlust und beim Zoster oticus zu Fazialisparese und Schwerhörigkeit kommen. In diesen Fällen ist eine schnelle Einleitung der antiviralen Therapie besonders wichtig.

- Dermatom: Hautbereich, der von einer Spinalnervenzwurzel versorgt wird.

Lyme-Borreliose

- Sie wird durch Bakterie Borrelia-burgdorferi hervorgerufen, die durch Zecken auf den Menschen übertragen werden.

- Die Infektion äußert sich meistens als Erythem, das sich von der Einstichstelle ausgehend vergrößert.

- Wird dieser Lokalbefund nicht antibiotisch behandelt, ist eine disseminierte Erkrankung möglich.

Diese kann sich als Lyme-Neuroborreliose mit radikulären Schmerzen und Paresen, als Lyme-Karditis mit Herzrhythmusstörungen, als Lyme-Arthritis der großen Gelenke oder als Acrodermatitis chronica atrophicans äußern. Daneben sind klinisch inapparente Verläufe und systemische Manifestationen ohne vorheriges Erythema migrans möglich.

- Während das Erythema migrans eine Blickdiagnose ist, werden andere Verlaufsformen bei klinischem Verdacht über den Nachweis borrelienspezifischer Antikörper im Serum und bei Neuroborreliose auch im Liquor cerebrospinalis diagnostiziert.

- Jede Lyme-Borreliose wird antibiotisch behandelt, etwa mit Doxycyclin oder Ceftriaxon. 3 Wochen

- Die Prognose ist in der Regel gut.

- Prävention : Vermeidung von Zeckenstichen sowie schnelle Entfernung von Zecken nach erfolgtem Stich. Eine Impfung existiert nicht.

• Trismus
Kieferklemme

• Risus
Sardonicus
Teufelsgrinsen

• Opisthotonus
Hyperlordose des WS

Handwritten note: "Erythem"

Handwritten note: "200mg/Tag po x 14 Tage"

LYME DISEASE SYMPTOMS

Early Signs (3-30 Days After Bite)



Fever




Headache



Fatigue

Later Signs



Irregular
Heartbeat



Dizziness



Bull's eye



- Lyme Neuroborreliose
- Lyme Keratitis
- Lyme Arthritis
- Acrodermatitis chronica atrophicans

| Tetanusimpfstatus | | Typ Wunde | Aktivimpfung | Passiv Immunisierung |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|
| 3 oder mehr Dosen | <5 Jahre seit letzter Dosis | Alle | Nein | Nein |
| | 5-10 Jahre seit letzter Dosis | Oberflächlich, saubere Wunden | Nein | Nein |
| | | Alle übrigen Wunden | Ja | Nein |
| | >10 Jahre seit letzter Dosis | Alle Wunden | Ja | Nein |
| Weniger als 3 Dosen oder unsicherer Impfstatus und bei* | | Oberflächlich, saubere Wunden | Ja | Nein |
| | | Alle übrigen Wunden | Ja | Ja |

+ unabhängig vom Impfstatus bei *Patienten mit einer humoralen Immundefizienz oder medikamentöser Immunsuppression.

Tetanusprophylaxe gemäss Empfehlung BAG 2020

Malaria

- meldepflichtige Tropenkrankheit, die von Plasmodien ausgelöst und durch die Anopheles-Mücke als Vektor übertragen wird.

- Klinik und Prognose hängen maßgeblich von der Plasmodiumart ab: Plasmodium malariae ist der Erreger der zumeist benignen Malaria quartana (4-Tage-Fieber), bei der es alle 72 Stunden zu Fieberschüben kommt.

Plasmodium vivax und ovale sind die Erreger der zumeist benignen Malaria tertiana (3-Tage-Fieber), bei der es alle 48 Stunden zu Fieberschüben kommt. Plasmodium falciparum löst die potentiell kompliziert verlaufende Malaria tropica aus, die durch unregelmäßige Fieberschübe gekennzeichnet ist.

- Klinisch kann sich eine Malaria aber ganz unterschiedlich präsentieren (Bewusstseinsstörung, Übelkeit, Erbrechen, Ikterus, Anämie etc.) und wird deswegen häufig fehldiagnostiziert. Bei allen Erregern kommt es i.d.R. erst nach frühestens 5-7 Tagen Inkubationszeit zu den Symptomen.

- Wichtigste diagnostische Maßnahme ist der direkte Erregernachweis im „dicken Tropfen“ (Anreicherung im Blutausschlag).

- Zur medikamentösen Therapie stehen zahlreiche Medikamente zur Verfügung (z.B. Chloroquin, Chinin,...), die zum Teil auch zur Chemoprophylaxe bei Reisen in Endemiegebiete genutzt werden.

- Wichtigste präventive Maßnahme ist aber der adäquate Schutz vor der Anopheles-Mücke (Moskitonetze, Bedeckung von freien Körperstellen etc.).

Chagas-Krankheit

- Parasitose, die durch Trypanosoma hervorgerufen wird und ihre größte Verbreitung in Süd- und Mittelamerika hat.

- Übertragungsweg: Insekten


- akute Symptome: lokale Hautreaktion, Fieber, Diarrhö.




- Im Verlauf kann es jedoch zu chronischen Schädigungen verschiedener Organe kommen. Hier stehen insbesondere kardiale Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen (AV-Block), Herzinsuffizienz und eine dilatative Kardiomyopathie (durch Myokarditis) im Vordergrund.

- Aufgrund der begrenzten Therapiemöglichkeiten kommt der Prävention (Insektizide) eine besondere Rolle zu.

Benznidazol

Plasmodium malariae → Malaria quartana
Plasmodium vivax & ovale → Malaria tertiana
Plasmodium falciparum → Malaria tropica





malaria tropica

falciparum



malaria

Trophozoit (Plasmodium malariae)

Der abgebildete Blutausstrich zeigt einen Erythrozyten (rot), der mit Merozoiten des Plasmodium malariae infiziert ist. Haben Merozoiten einen Erythrozyten befallen, wird er als Trophozoit bezeichnet (grün), der charakteristischerweise (siegel-)ringförmig ist. Im Verlauf der Erkrankung entwickeln sich erst Schizonten und schließlich neue Merozoiten und/oder geschlechtsreife Gametozyten. Die neuen Merozoiten befallen weitere Erythrozyten, wohingegen die Gametozyten von einer Mücke aufgenommen werden müssen, um zu überleben und verbreitet zu werden.

Neurologie



Migräne +++

Definition

- rezidivierender meist einseitiger Kopfschmerz, welcher oftmals mit Übelkeit, Erbrechen, Phono- oder Photophobie einhergeht. In 20% der Fälle kommt es dabei zu Auraphänomenen. ^{10-30%}
- Erstmanifestation meist zwischen 15. und 25. Lebensjahr. ♀ > ♂

Ätiologie

- Familiäre Disposition
- Mögliche Triggerfaktoren: Stress, Wetterwechsel, Noxen (Alkohol, Nikotin), Nahrungsmittel (Zitrusfrüchte, Milchprodukte), Veränderungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, Menstruation ^{♀ Hormone}

Symptome/Klinik

Prodromi: In 1/3 der Fälle. Stunden bis 2 Tage vor der Migräneattacke

- Stimmungsveränderung
- Heißhunger oder Appetitlosigkeit
- Schwierigkeiten beim Schreiben und Lesen

polymer
Pavlovsche
vermehrte Gähnen
u.ä.

Kopfschmerzen

- in 2/3 einseitig, insb. frontal, frontotemporal, retroorbital
- Pulsierend, bohrend, Langsam zunehmend.
- Dauer: 4-72 Stunden

Begleitphänomene

- Phonophobie, Photophobie (Überempfindlichkeit gegen Geräuschen oder Licht)
- Übelkeit, Erbrechen
- Verstärkung durch körperliche Tätigkeiten

Phono-

Photophobie

Augenbrennen

Migräne mit Aura

- Anfallsweise auftretende, reversible fokale neurologische Symptome
- Flimmerskotom (Gesichtsfeldausfall, gezackte Linien), Photopsien (Lichtblitze), Sensibilitätsstörungen, Aphasie, Paresen, Schwindel

Plötzliche
Farbveränderungen,
Lichtblitze, dunkle
Flecken sind die
häufigsten
Erscheinungsformen

Verlaufs- und Sonderformen

Aura ohne Kopfschmerz

Erschwerte Diagnosestellung aufgrund der fehlenden Kopfschmerzen

Migräne mit Hirnstammaura

Okzipitaler Kopfschmerz mit Aura (Beidseitige Gesichtsfeldausfälle oder Doppeltsehen)

Ophthalmoplegische Migräne

Migränekopfschmerzen mit Doppelbildern. Meist bei Kindern

Dysarthrie, Ataxie, Hörminderung

Vestibuläre Migräne

Kopfschmerzen mit Dreh- und Schwankschwindel

Diagnostik

Anamnese, körperliche Untersuchung und Zusatzdiagnostik

Zum Ausschluss anderer Ursachen (siehe Diagnostik Kopfschmerzen)

Klinische Diagnose der klassischen Migräne ohne Aura (4 Kriterien)

- mind. 5 Attacken, die nicht auf eine andere Erkrankung zurückzuführen sind
- Dauer (ca. 4-72 Stunden)
- Mind. zwei der folgenden Kriterien bzgl. der Kopfschmerzen: einseitige Lokalisation, Pulsierender Charakter, Mittlere bis starke Intensität, Verstärkung durch körperliche Aktivität
- Mind. ein der folgenden Begleitsymptome: Übelkeit/Erbrechen, Photophobie/Phonophobie

Differentialdiagnosen

Siehe DD Kopfschmerzen

min. 5 Attacken

- 4-72 St.
- Kopfschmerzen
- Begleitsymptome

einseitig
pulsierend
mittl. bis stark
↑ durch Bewegung

Übelkeit & Erbrechen
Phonophobie & Photophobie

Anamnese

Migräne

Die Anamnese (Krankengeschichte) stellt einen wichtigen Baustein in der Diagnostik der Migräne dar.

Aktuelle Anamnese/Systemanamnese (somatische und psychische Beschwerden)

- Treten die Kopfschmerzen bei Ihnen auf einer Seite des Kopfes oder auf beiden Seiten auf?
- Haben Sie dabei halbseitige Sehstörungen (Flimmerskotom)?
- Wie stark sind die Kopfschmerzen?
- Strahlt der Schmerz aus?
- Wie lange dauern die Kopfschmerzen?
- Wechselt der Kopfschmerz in Bezug auf die Seite des Auftretens?
- Werden die Kopfschmerzen bei Bewegung intensiver?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr stark ist?
- Haben Sie neben den Kopfschmerzen begleitende Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärmscheu?
- Treten Augentränen und Augenrötung auf?
- Treten während der Kopfschmerzen Sehstörungen oder neurologische Störungen wie Lähmungen oder Sensibilitätsstörungen auf?*
- Haben Sie dabei Sprachstörungen?
- Wie oft treten die Kopfschmerzen auf?

Geben Sie bitte an, ob es bei Ihnen Auslöser für die Migräne gibt (ggf. führen eines Kopfschmerzkalenders/Kopfschmerztagebuchs)?

- Ernährung
 - Käse, vor allem dessen Bestandteil Tyramin
 - Schokolade, vor allem der Bestandteil Phenylethylamin
 - Hunger
 - Nahrungskarenz
- Genussmittelkonsum
 - Alkohol, vor allem Rotwein (besonders der Bestandteil Tyramin)
 - Kaffee
 - Tabak (Rauchen)

- Psycho-soziale Situation
 - Angst
 - Stress
 - Entlastung nach Stresssituationen
 - plötzliche Entspannung (Sonntagsmigräne)
- Änderung der Schlafgewohnheiten (bzw. Wechsel des Schlaf-Wachrhythmus) sowie Schlafmangel
- Vegetative Anamnese inkl. Ernährungsanamnese
 - Sind Sie übergewichtig? Geben Sie uns bitte Ihr Körpergewicht (in kg) und Ihre Körpergröße (in cm) an.
 - Ernähren Sie sich ausgewogen?
 - Essen Sie viel Käse oder Schokolade?
 - Sind Sie wetterfühlig?
 - Haben Sie sich in großen Höhen aufgehalten oder halten Sie sich regelmäßig in großen Höhen auf?
 - Waren Sie in letzter Zeit einer Zeitonen-Verschiebung ausgesetzt?
 - Schlafen Sie regelmäßig?
 - Trinken Sie gerne Kaffee, schwarzen und grünen Tee? Wenn ja, wie viele Tassen pro Tag?
 - Rauchen Sie? Wenn ja, wie viele Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen pro Tag?
 - Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, welches Getränk bzw. welche Getränke und wie viele Gläser pro Tag?
 - Nehmen Sie Drogen? Wenn ja, welche Drogen und wie häufig pro Tag bzw. pro Woche?
- Eigenanamnese inkl. Medikamentenanamnese
 - Vorerkrankungen (Kopfschmerzen, neurologische Erkrankungen)
 - Operationen
 - Allergien
- Medikamentenanamnese
 - Einnahme von Hormonpräparaten bei Frauen zur Empfängnisverhütung oder in der Menopause

- Fenfluramin (Appetitzügler)
- Reserpin – Antisymphathikotonikum; Medikament, welches die Synthese oder Freisetzung von Noradrenalin hemmt; sie werden in der Behandlung der Hypertonie eingesetzt; haben aber relativ viele Nebenwirkungen, weshalb sie nicht Medikamente der ersten Wahl sind

- Weitere Medikamente: siehe dazu unter "Arzneimittelnebenwirkungen" unter "Kopfschmerzen durch Medikamente"

Umweltanamnese

- Flackerlicht
- Lärm
- Aufenthalt in großer Höhe
- Rauch

Familienanamnese

- Gibt es in Ihrer Familie häufig Kopfschmerzen?


Soziale Anamnese

- Welchen Beruf üben Sie aus?
- Gibt es Hinweise auf psychosoziale Belastungen oder Belastungen auf Grund Ihrer familiären Situation?



Au ra Symptome vorher ?

Allgemeine Untersuchung beim Leitsymptom Kopfschmerz zum Ausschluss anderer Ursachen

- Neurologischer Status und detaillierter Hirnnervenstatus
- Trigeminale Nervenaustrittspunkte
- Bulbusdruck- und Bewegungsschmerz
- Beweglichkeit der HWS, Druckschmerzhaftigkeit der perikraniellen Muskulatur
- Klop- und Druckschmerz der Kalotte
- Schmerzen bei Kieferöffnung
- Beurteilung der Schleimhäute, Zahnstatus
- Ertasten der A. temporalis superficialis
- Messung des Blutdrucks



DD



| | Klassischer Migränekopfschmerz | Spannungskopfschmerz | Clusterkopfschmerz |
|------------------|--|---|--|
| Charakter | Pulsierend, hämmernd | Dumpf, drückend | Bohrend, stechend, brennend |
| Dynamik | Langsam progredienter Schmerz, welcher bis zu 72 Std. anhalten kann | Anfangs häufig episodisches Auftreten, Übergang in chronische Form mit täglichem KS möglich | In 75% typische Häufung der Attacken über Wochen mit beschwerdefreien Episoden |
| Weitere Symptome | Oft Übelkeit/Erbrechen, Photo-/Phonophobie, evtl. Auraphänomene | Photo-/Phonophobie möglich, Übelkeit, <u>keine</u> Erbrechen | Autonome Symptome (Konj. Injektionen, Rhinorrhö, Schwitzen) |
| Besonderheiten | Beginn häufig im jungen Erwachsenenalter (15–25 J.), Verstärkung durch körperliche Aktivität | Körperl. Akt. verstärkt den Schmerz <u>nicht!</u> | Häufig nächtliches Auftreten der Attacken. Meist kurze Dauer der Attacken (30–40 Min.) |
| CAVE | Hohe Gefahr des medikamenten-induzierten Kopfschmerzes! | Erbrechen deutet auf chronische Form hin! | Besser mit Bewegung |

Therapie

Therapie der Migräneattacke

Allgemeine Maßnahmen

- Licht, laute Geräuschen vermeiden
- Bettruhe

Medikamentöse Therapie

- **Leichte bis mittelschwere Migräneattacke: NSAR** (Acetylsalicylsäure oder Ibuprofen p.o.)
 - Bei Misserfolg: ASS i.v. oder Sumatriptan s.c. *sc 6mg / PO 50-100mg max 200mg/Tag*
 - Bei Kontraindikation gegen NSAR: Paracetamol oder Metamizol p.o.
- **Mittelschwere bis schwere Migräneattacke: Triptane** (Sumatriptan s.c.)
 - Wirkung: Vasokonstriktion.
 - Nebenwirkungen: Blutdruckanstieg, Parästhesien, Schwindel
 - Kontraindikationen: KHK, pAVK, ischämische Schlaganfall
- Antiemetikum: Metoclopramid p.o. oder i.v. *10mg*

ASS, NSAR, Paracetamol, Metamizol
Sumatriptan
MCP

Prävention

Allgemeine Maßnahmen

- Lebensstiländerung: Vermeidung von Stress, Sport, Muskelrelaxation

Medikamentöse Therapie

- **Betablocker: Metoprolol, Propranolol** *50-200mg/Tag*
- Indikationen:

- **≥3 Attacken/Monat**
- **Migräneattacke >72 h oder lang anhaltende Aurasymptome** ← *persistierende Aura*
- **Nichtansprechen auf Akuttherapie**

Komplikationen

1. **Chronische Migräne**: Kopfschmerzen **≥15 Tagen/Monat über >3 Monate** ohne dass ein Medikamentenübergebrauch besteht
2. **Status migrainosus**: Migräneattacke, die **länger als 3 Tage** anhält
 - Therapie: Glucocorticoide (Prednison p.o.) *50-100mg Einmalgabe* + *Prophylaxe mit B-Blocker*
3. **Migränöser Infarkt**: Persistierende Migräne mit Aurasymptomen in Kombination mit einem Infarktgeschehen (*fokale neurologische Ausfälle*)
4. **Persistierende Aura ohne Hirninfarkt**: Dauer der Aurasymptome **>1 Woche**, aber kein Korrelat für einen Hirninfarkt in der Bildgebung *Prophylaxe mit B-Blocker*
5. **Zerebraler Krampfanfall**: Getriggert durch eine Migräneattacke
6. **Medikamenten-induzierter Kopfschmerz**:
 - sekundäre Kopfschmerzform, bei der vorbestehende primäre Kopfschmerzen chronifizieren, weil die Patienten zu häufig Schmerzmittel einnehmen. Insb. bei Migräne und Spannungskopfschmerz
 - Betroffene Medikamente: Ergotamin, Triptane, Opioide, NSAR
 - Therapie: Absetzen von Analgetika und Einleitung der prophylaktischen medikamentösen Therapie des primären Kopfschmerzes

Schwangerschaft und Stillzeit[6]

- Therapie [9] [6] [10]
 - In der Schwangerschaft
 - Paracetamol (1. Wahl)
 - Ibuprofen (2. Wahl), **nur bis zur 28. SSW!**
 - Alternativ: Acetylsalicylsäure (ASS), nur bis zur 28. SSW!
 - Antiemetikum: **Dimenhydrinat**
 - In der Stillzeit
 - Ibuprofen oder Paracetamol
 - Antiemetikum: Dimenhydrinat
 - **Sumatriptan** in der Schwangerschaft und Stillzeit: **Es besteht keine Zulassung** für schwangere und stillende Patientinnen, jedoch ein hoher Erfahrungsumfang [6]
 - Anwendung in der Schwangerschaft unter strenger Indikationsstellung möglich
 - Sumatriptan ist in der Schwangerschaft das am besten erprobte Triptan[11]
 - Als Therapieeskalation anwendbar, wenn der Nutzen das Risiko übersteigt: Sumatriptan mit verschiedenen Applikationsformen
 - Stets Aufklärung der Patientin über Off-Label-Use!
- Medikamentöse Prophylaxe
 - Bei 50–80% der Patientinnen Reduktion der Migräneattacken in der Schwangerschaft
 - Mögliche medikamentöse Prophylaxe (laut aktueller Leitlinie): **Metoprolol, Propranolol und Amitriptylin**

Triptane

- Wirkung: Agonist des 5-HT₁-Rezeptors

- Hemmung der perivaskulären, aseptischen Entzündung im Bereich der Duraarterien; zudem Vasokonstriktion
- Wiederkehrkopfschmerz (headache recurrence): Wiederauftreten innerhalb von 2–24 h nach primär wirksamer Therapie (bei ca. 15–40% der Patienten nach oraler Gabe); erneute Gabe ist dann möglich

- Nebenwirkungen

- Passagerer Blutdruckanstieg (häufig), koronare Ischämien (selten)
- Parästhesien und Kältegefühl der Extremitäten
- Schwindel, Müdigkeit, Flush
- Kopfschmerzen bei zu häufiger Anwendung (max. 10x/Monat)

- Kontraindikationen

- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe
- Koronare Herzkrankheit, Myokardinfarkt in der Anamnese, Prinzmetal-Angina, pAVK
- Ischämische Schlaganfälle, TIA in der Anamnese
- Arterielle Hypertonie
- Gleichzeitige Therapie mit
 - MAO-Hemmern
 - Ergotamin
- Schwere Leberinsuffizienz
- Eingeschränkte Nierenfunktion
- Schwangerschaft und Stillzeit (muttermilchgängig → mindestens 12 h Stillpause nach Einnahme) [6]

Nasentrümpfen

Lieder fest zukneifen

Stirn in Falten legen


das Gaumensegel

Gaumbogen heben sich symmetrisch

Zunge ausstrecken

HWS Bewegung schwer einschränkung

Kopfschmerzen ++



Formen

- **Primäre Kopfschmerzen:** ohne strukturelle Erkrankung
- **Sekundäre (symptomatische) Kopfschmerzen:** durch strukturelle Erkrankung verursacht
- **Häufigste Kopfschmerzform:** Spannungskopfschmerz und Migräne

Warnsymptome (Red Flags)

Bei folgenden Warnsymptomen (Red Flags) sollte eine umgehende Diagnostik erfolgen

- **Vernichtungskopfschmerz, Meningismus** (z.B. bei Subarachnoidalblutung) *Nachschüttigkeit*
- **Fieber** (z.B. bei Meningitis)
- **Herdsymptomatik** (z.B. bei Schlaganfall)
- **Hirndruckzeichen:** Bewusstseinsstörungen oder Übelkeit (z.B. bei intrakranieller Raumforderung)

Diagnostik

Anamnese

- **Zeit:** Dauer, Häufigkeit pro Monat, Verlauf (z.B. chronisch, gelegentlich)
- **Schmerz:** Lokalisation (z.B. einseitig, beidseitig), Charakter (z.B. pulsierend, stechend), Intensität (Schmerzskala 0–10)
- **Begleitsymptome,** z.B.: Übelkeit, Aura, *Sehstörung, Doppelsehen, Hörstörung, Tinnitus, Schwindel, Parosmien, Photo- od. Phonophobie*
- **Auslöser oder Verstärker,** z.B.: Schlaf-Wach-Rhythmus, Körperliche Bewegung, *Gewürzmittel*
- **Allgemeinanamnese:** Medikamente, Alkohol,...

Körperliche Untersuchung

- Messung des Blutdrucks *↑?*
- **Neurologische Untersuchung** (mit Hirnnervenstatus) *Nervengeschichte*
- **Beweglichkeit der HWS** *Meningismus? Ds*
- **Klopf- und Druckschmerz der Kalotte**
- **Ertasten der A. temporalis superficialis** *Verhärtung, Ds, ↑ Empfindlichkeit*
- **Schmerzen bei Kieferöffnung, Zahnstatus**

Abnorme A. temporalis (Druckschmerzhaftigkeit, verhärtet, abgeschwächter/fehlender Puls)

Zusatzdiagnostik (zur Abklärung sekundärer Kopfschmerzen)

- **Labor:** Entzündungsparameter (z.B. Arteriitis temporalis),...
- **Bildgebung**
 - **cCT** (z.B. zum Nachweis einer Subarachnoidalblutung)
 - **cMRT** (z.B. zum Nachweis von parenchymatösen Läsionen)
 - **Digitale Subtraktionsangiographie** (z.B. zum Nachweis von kleineren Aneurysmen)
 - **Sonographie** (z.B. zur Darstellung von Dissektionen)
 - **Röntgen der Nasennebenhöhlen** (z.B. zur Darstellung einer Sinusitis)
- **Weitere Diagnostik:** Liquorpunktion (z.B. zum Ausschluss einer Meningitis), EEG

Differentialdiagnosen


Primäre Kopfschmerzen

| | Spannungskopfschmerzen | Migräne | Clusterkopfschmerz |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| Dauer | 30min – 7d | 4 – 72 h (3d) | 15min – 3h |
| Häufigkeit | Gelegentlich bis täglich | Gelegentlich bis mehrmals pro Monat | mehrmals pro Tag |
| Lokalisation | Holozephal (= ganzer Kopf) oder bifrontal | In 2/3 einseitig | Streng einseitig |
| Charakter | Drückend | pulsierend, bohrend | stechend, brennend |
| Intensität | Leicht bis mittel | Mittel bis stark | Stark |


**Klassischer
Migränekopfschmerz**



Spannungskopfschmerz



Clusterkopfschmerz



| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| Charakter | Pulsierend, hämmernd | Dumpf, drückend | Bohrend, stechend, brennend |
| Dynamik | Langsam progredienter Schmerz, welcher bis zu 72 Std. anhalten kann | Anfangs häufig episodisches Auftreten, Übergang in chronische Form mit täglichem KS möglich | In 75% typische Häufung der Attacken über Wochen mit beschwerdefreien Episoden |
| Weitere Symptome | Oft Übelkeit/Erbrechen, Photo-/Phonophobie, evtl. Auraphänomene | Photo-/Phonophobie möglich, keine Übelkeit, kein Erbrechen | Autonome Symptome (Konj. Injektionen, Rhinorrhö, Schwitzen) |
| Besonderheiten | Beginn häufig im jungen Erwachsenenalter (15–25 J.), Verstärkung durch körperliche Aktivität | Körperl. Akt. verstärkt den Schmerz nicht! | Häufig nächtliches Auftreten der Attacken. Meist kurze Dauer der Attacken (30–40 Min.) |
| CAVE | Hohe Gefahr des medikamenten-induzierten Kopfschmerzes! | Erbrechen deutet auf chronische Form hin! | |


| | Spannungskopfschmerzen | Migräne | Clusterkopfschmerz |
|-------------------------|--|---|---|
| Begleit-symptome | - Muskuläre Verspannungen <u>Keine Übelkeit/Erbrechen</u> | - Phonophobie, Photophobie - <u>Übelkeit/Erbrechen</u> | Ipsilaterales Auftreten von: - <u>Konjunktivaler Injektion</u> und/oder <u>Tränenfluss</u> - <u>Rhinorrhö</u> <i>Nasenlaufen, Nasensekret</i> - Horner-Syndrom - <u>Schwitzen</u> |
| Auslöser/ Verstärker | - Auslöser: Stress - <u>Keine Verstärkung durch körperliche Aktivität</u> | - Auslöser: Stress, Alkohol, Nahrungsmittel - <u>Verstärkung durch körperliche Aktivität</u> | - Auslöser: Alkohol <i>↓ Körperliche Aktivität</i> |
| Therapie | - Akut: NSAR - Prophylaktisch: <u>Amitriptylin</u> | - Akut: <u>NSAR oder Triptane</u> - Prophylaktisch: <u>Betablocker</u> | - Akut: <u>Triptane</u> , 100% <u>O₂</u> - Prophylaktisch: <u>Verapamil</u> |

Sekundäre Kopfschmerzen

| Genese | Diagnose | Art der Kopfschmerzen | Begleitsymptomatik/Charakteristika |
|-------------------|--|--|--|
| Infektiöse Genese | Meningitis | Akute, progrediente, diffuse Kopfschmerzen | - <u>Fieber</u> <u>Meningismus</u> <u>Übelkeit/ Erbrechen</u> , Vigilanzminderung, <u>Photo- und Phonosensibilität</u> - Dgk: <u>Lumbalpunktion</u> |
| | Enzephalitis | Akute, progrediente, diffuse Kopfschmerzen | - <u>Fieber</u> , Vigilanzminderung, <u>Herdsymptomatik</u> - Dgk: <u>MRT</u> |
| Vaskuläre Genese | intrakranielle Blutungen - Dgk: CT, MRT | Intrazerebrale Blutung: akute, progrediente Kopfschmerzen | - Übelkeit/ Erbrechen, Vigilanzminderung - Herdsymptomatik |
| | | Subarachnoidalblutung: <u>Hochakuter Vernichtungskopfschmerz</u> | Meningismus, Übelkeit/ Erbrechen, Vigilanzminderung |
| | | Epidural-/Subduralblutung: progrediente, diffuse Kopfschmerzen | - Epi-/Subduralblutung: Vigilanzminderung, kontralaterale Herd- und Hirndrucksymptomatik, <u>Ipsilaterale Mydriasis</u> <i>dilatation</i> - Epiduralblutung: Initiale Bewusstlosigkeit → " <u>Symptomfreies Intervall</u> " → Erneute Eintrübung - Chronische Subduralblutung (v.a. ältere Patienten nach Bagateltrauma): Kopfdruck, psychomotorische Verlangsamung |
| | Zerebrale Venen-thrombose | Akute, progrediente, diffuse Kopfschmerzen | - Vigilanzminderung, Herd- und Hirndrucksymptomatik - Dgk: CT, MRT <i>Angio</i> |
| | Arteriitis temporalis | <u>Pulssynchrone, bohrende Schläfenschmerzen</u> | - Druckschmerzhaft, prominente Temporalarterie - Abgeschlagenheit, Depressivität, B-Symptomatik - Dgk: <u>BSG</u> , <u>Temporalisbiopsie</u> <small>Bildgebung: Duplexsonografie ○ Halozeichen ○ Sanduhrförmiger Verlauf der Temporalarterie</small> |
| | Hypertensive Krise | - <u>Diffuse pulsierende Kopfschmerzen</u> - <u>Verstärkung durch körperliche Aktivität</u> | - <u>Schwindel</u> , <u>Nasenbluten</u> - bei hypertensivem Notfall zusätzlich Zeichen von Organschäden (z.B. akute Herzinsuffizienz,...) - Dgk: <u>Blutdruckmessungen</u> |

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|--|
| | Schlaganfall | manchmal akute Kopfschmerzen | - Herdsymptomatik (z.B. Hemiparese, Aphasien), ggf. Vigilanzminderung - Dgk : CT, MRT |
| Tumoröse Genese | Hirntumor | progrediente, diffuse Kopfschmerzen | - Herd- und Hirndrucksymptomatik - Dgk : CT |
| Traumatische Genese | Schädelhirntrauma | Akute Kopfschmerzen | - Evtl. Herdsymptomatik, Vigilanzminderung - Dgk : CT |
| Sonstige Genese | Sinusitis | Gesichts- und ggf. Kopfschmerzen | - Fieber, Nasensekretion, Nasenverstopfung, Druckgefühl in der betroffenen Nasennebenhöhle - Dgk: Röntgen, CT, HNO-Untersuchung |
| | Glaukom-anfall | Einseitige, starke Augen- und Kopfschmerzen | - Sehstörungen, Übelkeit/Erbrechen, steinharter Bulbus, Bulbusdruckschmerz - Dgk: augenärztliche Untersuchung |

^{sekundäre} Kopfschmerzen



Cluster-Kopfschmerz ++

Definition

- primäre Kopfschmerzform. Dabei treten – häufig nachts – stärkste und streng einseitige Kopfschmerzattacken im Bereich des Auges auf.

- Erstmanifestation meist zwischen 15. und 25. Lebensjahr. ♂ > ♀

Ätiologie

- **Primärer** Clusterkopfschmerz : Ätiologie ungeklärt
 - Mögliche Triggerfaktoren : Alkohol
- **Sekundärer** Clusterkopfschmerz (seltener): Raumforderungen, Gefäßfehlbildungen

Symptome/Klinik

Leitsymptomatik

Stärkste einseitige Kopfschmerzattacken mit ipsilateraler autonomer Symptomatik Kopfschmerzen

- **Lokalisation:** Streng einseitig Augenregion
- **Schmerzcharakter :** Stechend, brennend, starke Schmerzintensität
- **Zeitlicher Charakter**
 - Häufig nachts auftretend
 - Dauer der Attacke: 15min – 3h
 - Gehäuftes Auftreten in „Clusterperioden“ bis zu 8 Attacken/Tag
- **Verlaufsformen**
 - Episodischer Clusterkopfschmerz: ¾ der Fälle
 - Chronischer Clusterkopfschmerz: ¼ der Fälle

Autonome Symptome (immer ipsilateral)

- Konjunktivale Injektion und/oder Tränenfluss
- Inkomplettes Horner-Syndrom (nur Ptosis und/oder Miosis)
- Rhinorrhö
- Schwitzen

Diagnostik

Klinische Diagnosestellung

Hinweisend auf Clusterkopfschmerz :

- Einseitige Symptomatik
- Schmerzen im Bereich des Auges
- Zeitliche Charakteristika (bspw. Erwachen aus dem Schlaf, Wiederholung zur selben Tageszeit)

♂ (Motorische) Unruhe während Attacke

- unauffälliger neurologischer Status zwischen Attacken

Nitroglyzerin-Provokationstest

Nitroglyzerin sublingual provoziert Attacke bei bis zu 80 % der Betroffenen während der Clusterperiode

Schädel-CT oder -MRT

zur Ausschlussdiagnostik sekundärer Clusterkopfschmerzen

Differentialdiagnosen

Siehe DD Kopfschmerzen

Therapie

Allgemeine Maßnahmen

Meiden von Triggerfaktoren (Alkohol), Nikotinabstinenz

Akuttherapie

- **Sumatriptan** s.c., Inhalation von 100 %igem Sauerstoff

◦ Alternativ: **Lidocain** (nasal)

1 mL 4 %ige oder 1 mL 10 %ige Lösung jeweils als Einmaldosis, Instillation in Nasenloch auf symptomatischer Seite

Prophylaxe

- **Verapamil** *KI bei HF NYHA III/IV*

◦ Alternativ: Lithiumcarbonat

„Schmerzmittel wie NSAR oder Opioide sind bei Patienten mit Clusterkopfschmerz **wirkungslos**“

Sumatriptan (etwa Imigran Inject® oder Sumavel DosePro®) **6 mg s.c.** als Einmaldosis, **max. 12 mg/Tag** (keine Mehrfachanwendung bei einer Attacke, zweite Dosis frühestens nach 2 h),

20 mg nasal als Einmaldosis (Sprühstoß), **max. 2 Sprühstöße/Tag** (keine Mehrfachanwendung bei einer Attacke, zweite Dosis frühestens nach **2 h**)

Lidocain entweder **1 mL 4 %ige** oder **1 mL 10 %ige** Lösung jeweils als Einmaldosis, **Instillation in Nasenloch** auf symptomatischer Seite

Verapamil ret. **80 mg p.o. 1-1-1**, Dosissteigerung um 80 mg/Woche möglich, wirksamer Dosisbereich 240–480 mg/Tag in zwei Einzeldosen

Wirkbeginn 2-12 Wochen

Lithiumcarbonat ret. (Quilonum® retard) Tag 1–3: **400 mg p.o. 1-0-0**, danach **400 mg p.o. 1-0-1**,

Kurzzeitprophylaxe:

Prednisolon 1 mg/kgKG p.o. 1-0-0, initial für 2–5 Tage, dann langsame Abdosierung über **2 Wochen**

bis Verapamil wirkt

Circulus arteriosus cerebri

(Willisi)


Der Circulus arteriosus cerebri wird von zwei großen, paarig angelegten Arterien gespeist und bildet um den Hypophysenstiel herum einen geschlossenen Arterienkreis, der das gesamte Gehirn versorgt. Das Blut für die vorderen Abschnitte wird von den beiden Arteriae carotis internae zugeführt, das für die hinteren Abschnitte von den zwei Arteriae vertebrales. Über Verbindungsarterien sind beide zuführenden Arterien miteinander verbunden und bilden einen Kreislauf. Dieser Kreislauf kann im Falle eines Gefäßverschlusses als Kollateralkreislauf dienen.



Die Anlage des Circulus arteriosus cerebri kann individuell sehr unterschiedlich sein, was jedoch funktionell meist keine nachteiligen Auswirkungen auf die arterielle Versorgung des Gehirns hat. Funktionelle Details zum Gehirnstoffwechsel werden in der Leistungsphysiologie dargestellt (siehe: Leistungsphysiologie und Altern).

- Zuführende Arterien
 - A. carotis interna + Äste: Speisen den vorderen Anteil
 - A. vertebralis + Äste: Speisen den hinteren Anteil
- Verbindungen
 - A. communicans anterior: Verbindet die A. cerebri anterior beider Seiten
 - A. communicans posterior: Verbindet die A. carotis interna mit der A. cerebri posterior
- Wichtige Äste
 - A. basilaris aus Aa. vertebrales
 - A. cerebri anterior aus A. carotis interna
 - A. cerebri media aus A. carotis interna
 - A. cerebri posterior aus A. basilaris

C. arteriosus Willisii

A. carotis interna, Speisen den vorderen Anteil
 A. vertebralis, Speisen den hinteren Anteil
 A. communicans Ant., A. cerebri ant. verbindet
 A. communicans Post., A. carotis interna mit A. cerebri posterior
 wichtigste Äste: A. basilaris, A. cerebri Ant., A. cerebri media & A. cerebri post.





Schlaganfall (Apoplex...) ++

Akute zerebrale Durchblutungsstörung im arteriellen Stromgebiet. Die Ursache ist meist ischämischer Natur, seltener liegt eine intrakranielle Blutung zugrunde.

Ätiologie

Ursachen

Ischämischer Schlaganfall (80–85%)

Atherosklerose

⊙ **Makroangiopathie:** Arterioarterielle Embolie (z.B. an der Karotidgabel), seltener poststenotische Minderperfusion

⊙ **Mikroangiopathie:** Lakunäre Ischämien

⊙ **Kardiale Embolien:** Vorhofflimmern, Herzwandaneurysma, Endokarditis, **paradoxe Embolie** bei Phlebothrombose und persistierendem Foramen ovale (PFO) oder Atriumseptumdefekt

⊙ **Sonstige Ursachen:** Karotis- oder Vertebralisdissektion, Vaskulitis

Hämorrhagischer Schlaganfall (intrazerebrale Blutung, Subarachnoidalblutung (15-20%))

- Zerebrale **Mikroangiopathie** bei arterieller Hypertonie
- **Gerinnungsveränderung** (durch orale Antikoagulation)
- **Gefäßfehlbildungen** (Aneurysma, arteriovenöse Malformation)

Risikofaktoren für den ischämischen Schlaganfall

- **Arterielle Hypertonie**
- **Vorhofflimmern**
- Rauchen
- **Diabetes mellitus**
- **Dyslipidämie**
- **Alter**

RFs

Klassifikation

Nach Verlauf

- **Transitorische Ischämische Attacke (TIA):** Vorübergehende Episode neurologischer Dysfunktion infolge einer fokalen Ischämie des ZNS **ohne Anhalt für Infarkt**
 - Störung von Motorik, Sensibilität, Sprache, Koordination, Sehen (Amaurosis fugax)
 - Dauer meist einige **Minuten**
 - **Kein Läsionsnachweis im MRT**
 - Warnsymptom eines zukünftigen Schlaganfalls
- **Ischämischer Schlaganfall:** Episode neurologischer Dysfunktion infolge eines **Infarktes** des ZNS
 - **Minor Stroke:** Schlaganfall mit gering ausgeprägter Symptomatik
 - **Progressive Stroke:** Neurologische Defizite nehmen im Verlauf weiter zu

Nach betroffenem Gefäßkaliber

- **Territorialinfarkt:** **ausgedehnter** Infarkt infolge des Verschlusses einer **größeren Arterie**
- **Lakunärer Infarkt:** **Kleiner subkortikaler** Infarkt infolge einer **Mikroangiopathie** aa. Verschluss einer kleinen peripheren Ast (Arterie)

Symptome/Klinik

- Der Leitsymptom ist ein **akutes fokal-neurologisches Defizit**
- Klassisch ist ein **plötzliches Auftreten** von **Hemiparesen, Hemihypästhesien, Sprach- und Sehstörungen**. Bewusstseinsbeeinträchtigung und Schwindel sind auch möglich

Schlaganfall

ischämisch

Atherosklerose

Mikroangiopathie
lakunar infarkt

Makroangiopathie
A-A Embolie

Kardiale Embolie

VHF
Wandaneurysma
Endokarditis
Paradox Embolie

Andere

Dissektion
Vaskulitis

Hämorrhagisch

Mikroangiopathie
d HT

Gerinnungsstörung

Orale Antikoagulation

Fehlbildung

Aneurysma
A-V
Malformation

Klinik nach betroffenem Gefäß

- **A. cerebri media (Mediainfarkt)** : Kontralaterale brachiofaziale sensomotorische Hemisymptomatik . Dysarthrie. Ggf. Aphasie, Apraxie
- **A. cerebri anterior (Anteriorinfarkt)** : Kontralaterale beinbetonte Hemisymptomatik, Apraxie
- **A. vertebralis**: Ataxie, Schwindel Störung der Bewegungskoordination und Haltungsinervation.
- **A. basilaris**: Vigilanzminderung, schwere motorische Störung
- **A. cerebri posterior (Posteriorinfarkt)** : kontralaterale homonyme Hemianopsie

Verlust der zielgerichteten bzw. zweckmäßigen Handlungsfähigkeit

Hemianopsie ist ein halbseitiger Gesichtsfeldausfall.

Diagnostik

(Fremd-)Anamnese

- **Symptomatik** : Beginn, Verlauf
- **Medikamentenanamnese**, insb. Antikoagulantien und Thrombozytenaggregationshemmer

Fokussierte neurologische Untersuchung

- **FAST**
 - **F** (Face = Gesicht): veränderte Mimik
 - **A** (Arm): Unfähigkeit, einen Arm angehoben zu halten
 - **S** (Sprache): Gestörtes Sprachverständnis oder Sprachproduktion
 - **T** (Time is Brain): Bei Hinweisen auf einen Schlaganfall (= eines der 3 oberen Kriterien trifft zu) → Bildgebung und ggf. Therapie so schnell wie möglich
- **Erheben des NIHSS** : Skala zur klinischen Einschätzung des Ausmaßes eines ischämischen Infarkts anhand neurologischer Defizite des Patienten.

Bildgebung

Bei Verdacht auf einen Schlaganfall muss für die anschließende Therapie herausgefunden werden, ob es sich um ein ischämisches oder um ein hämorrhagisches Ereignis handelt. Diese Unterscheidung ist am besten mit einem CCT möglich.

Nativ-cCT

- wichtigste Untersuchung zum **Ausschluss einer Hirnblutung**. Ggf. zum **Nachweis ischämischer Frühzeichen**
 - **2–6 Stunden** : Verlust der Mark-Rinden-Grenze ← Hyperdensität
 - **12–24 Stunden** : Hypodensität im Infarktgebiet. Ggf. Ödembildung
- **Bei intrazerebraler Blutung** :
 - **Akute Blutung**: **Hyperdense** Raumforderung
 - **Hyperakute Blutung**: **Hypodense** Raumforderung (vor Eintreten der Blutkoagulation)

cMRT

- In Akutsituation bei V.a. Infarkt im vertebrobasilären Stromgebiet, unklarem Zeitfenster oder Symptombeginn >4,5 h. Im Verlauf zur Darstellung des Infarktmusters
- Frühere Darstellung von Infarktareal möglich
- Darstellung von Infarktarealen: Hypointens (T1-Wichtung), Hyperintens (T2-Wichtung)


Weitere Diagnostik

- **Lumbalpunktion**: Bei V.a. SAB ohne Blutungsnachweis im CT
- **EKG**, ggf. **Langzeit-EKG**: zum Nachweis eines Vorhofflimmerns
- **Echokardiographie** (insb. **Transösophageale Echokardiographie**): Zur Suche einer Emboliequelle, insb. kardiale Thromben oder PFO
- **Doppler-Sonographie** der hirnversorgenden Arterien, ggf. **Angiographie** (CT, MRT, DAS): Stenosen, Verschlüsse, Dissektionen

Differenzialdiagnose


- Intrazerebrale Blutung, Subarachnoidalblutung
- Subdurales Hämatom
- intrakranielle Tumoren
- Enzephalitis

| Funktionsbereiche/Items | Abstufung |
|---|--|
| 1A: Vigilanz | Vigilanz testen <ul style="list-style-type: none"> 0: Wach 1: Benommen 2: Soporös 3: Komatös |
| 1B: Orientierung | Frage nach Monat und Alter <ul style="list-style-type: none"> 0: Beide Fragen richtig beantwortet 1: Eine Frage richtig beantwortet 2: Keine Frage richtig beantwortet |
| 1C: Befolgung von Aufforderungen | Aufforderung, die Augen und die Faust zu schließen <ul style="list-style-type: none"> 0: Führt beide Aufforderungen richtig aus 1: Führt nur eine der Aufforderungen richtig aus 2: Führt keine der Aufforderungen richtig aus |
| 2: Blickparese | Aufforderung, dem Finger des Untersuchers zu folgen (Finger wird horizontal durch das Blickfeld geführt) <ul style="list-style-type: none"> 0: Normal 1: Partielle Blickparese 2: Komplette Blickparese oder forcierte Blickdeviation |
| 3: Gesichtsfeld | Grobe Gesichtsfeld-Perimetrie <ul style="list-style-type: none"> 0: Keine Einschränkung 1: Partielle einseitige Hemianopsie 2: Komplette einseitige Hemianopsie 3: Blindheit oder komplette beidseitige Hemianopsie |
| 4: Faziale Parese | Mimik prüfen <ul style="list-style-type: none"> 0: Normal und symmetrische Motorik 1: Geringe Parese 2: Partielle Parese 3: Vollständige Parese |
| 5 A+B: Armparese | Aufforderung, den Arm anzuheben (rechts und links getrennt testen, Punktwerte addieren!) <ul style="list-style-type: none"> 0: Kein Absinken 1: Leichtes Absinken des Arms 2: Absinken auf Bett 3: Kein Anheben gegen Schwerkraft möglich 4: Vollständige Armparese |
| 6 A+B: Beinparese | Aufforderung, das Bein anzuheben (rechts und links getrennt testen, Punktwerte addieren!) <ul style="list-style-type: none"> 0: Kein Absinken 1: Absinken 2: Absinken auf Bett 3: Kein Anheben gegen Schwerkraft möglich 4: Vollständige Beinparese |
| 7: Extremitätenataxie | Aufforderung zum Finger-Nase-Versuch und Knie-Hacke-Versuch <ul style="list-style-type: none"> 0: Keine Ataxie 1: Ataxie einer Extremität 2: Ataxie beider Extremitäten |
| 8: Hemihypästhesie | Testen von Berührungsempfinden und Schmerz an beiden Körperhälften <ul style="list-style-type: none"> 0: Keine Hypästhesie 1: Leichte Hypästhesie 2: Schwere Hypästhesie |
| 9: Aphasie | Sprache beobachten, ggf. Gegenstände benennen lassen <ul style="list-style-type: none"> 0: Keine Aphasie 1: Leichte Aphasie 2: Schwere Aphasie 3: Global/stumm |
| 10: Dysarthrie | Sprache beobachten, ggf. Wortliste lesen lassen <ul style="list-style-type: none"> 0: Keine Dysarthrie 1: Leichte Dysarthrie 2: Schwer Dysarthrie/stumm |
| 11: Neglect | Auslöschungs- und Vernachlässigungsphänomene prüfen <ul style="list-style-type: none"> 0: Kein Neglect 1: Neglect einer Modalität 2: Neglect mehrerer Modalitäten oder schwerer halbseitiger Neglect |



Hyperdenses Mediäzeichen



Kranielle Computertomographie ohne Kontrastmittelgabe bei akuter Hemiparese: Auf dem ersten CT-Bild ist ein sog. „hyperdenses Mediäzeichen“ erkennbar. Es handelt sich dabei um die direkte Visualisierung eines Thrombus in der A. cerebri media, wodurch das Gefäß hyperdens erscheint, obwohl kein Kontrastmittel verabreicht wurde. Es ist ein frühes Zeichen eines ischämischen Apoplexes und etwa innerhalb der ersten 90 Minuten nach Auftreten der Symptomatik erkennbar.



Massiver Hirninfarkt linksseitig

Hypodensität



CCT mit Darstellung eines massiven linksseitigen Hirninfarkts.



Subakuter sekundär hämorrhagischer Mediainfarkt

CT des Schädels in axialer Schnittführung ohne i.v. Kontrastmitteldgabe bei einem 75-jährigen Patienten:

Rechtshemisphärisch zeigt sich ein ausgedehntes, unscharf begrenztes hypodenses Areal (grüne Fläche) mit zentralen hyperdensen Bereichen (rote Fläche). Es handelt sich hierbei um einen subakuten (hypodensen) Infarkt im Stromgebiet der A. cerebri media mit sekundär hämorrhagischen (hyperdensen) Anteilen. Das massive Ödem (typisch für dieses Infarktstadium) verursacht eine Mittellinienverlagerung zur kontralateralen Seite (gestrichelte Linie und Pfeile), eine Kompression des ipsilateralen Seitenventrikels (rote Pfeilspitzen) und eine Dilatation des kontralateralen Seitenventrikels (weiße Pfeilspitzen).



Abgelaufene lakunäre Infarkte

cCT nativ in axialer Schnittführung:

Das linke Bild entspricht einer minimal höher gelegenen Ebene als das rechte Bild. Auf dem linken Bild sind im Bereich der Stammganglien beidseits multiple hypodense, relativ scharf abgrenzbare Läsionen zu sehen (beispielhaft weiß eingekreist). Auf dem zweiten Bild zeigt sich im Thalamus rechts eine weitere scharf abgrenzbare, hypodense Läsion (weiß eingekreist).

Hierbei handelt sich um abgelaufene lakunäre Infarkte, die meist aufgrund mikroangiopathischer Veränderungen infolge einer arteriellen Hypertonie entstehen.

Bei der scharf begrenzten Läsion (rot markiert), die paramedian links im Okzipitallappen zu sehen ist, handelt es sich am ehesten auch um einen alten ischämischen Defekt.

Therapie

- TIA: Schnellstmögliche stationäre Aufnahme. Beginn antithrombotischer Maßnahmen. Schnelle Abklärung (EKG, Echokardio, Doppler-Sono)

Präklinisches Management

- Transport in Krankenhaus mit Stroke Unit
- Stabilisierung der Vitalfunktionen
- Ggf. **Sauerstoffgabe** über eine Nasensonde
- **Arterielle Hypertonie i.d.R. tolerieren, zur Erhaltung der Perfusion** der Penumbra
 - ① Zielwerte: 180/100 mmHg für bekannte Hypertoniker bzw. 160/90 mmHg für Nicht-Hypertoniker
 - ② Senkung bei Werten >220 mmHg systolisch oder >120 mmHg diastolisch
 - Bei Durchführung einer Lysetherapie oder Antikoagulation sollte RR systolisch nicht >185 mmHg sein (Blutungsgefahr)
 - Ausnahmen: kardiales Lungenödem, Aortendissektion

Akuttherapie im Krankenhaus

Rekanalisierende Therapie nach Blutungsausschluss im cCT

Thrombolysetherapie (Alteplase)

Alteplase (rt-PA, Actilyse®) 0,9 mg/kgKG i.v., max. 90 mg (10% der individuellen Dosis als Bolus, der Rest über 60 min über einen Perfusor)

- **Indikation:** Ischämischer Schlaganfall innerhalb von **4,5 h** nach Symptombeginn
 - Schnellstmögliche Durchführung. Keine obere Altersgrenze
- **Wirkprinzip:** Aktivierung von Plasminogen → Bildung von Plasmin → Auflösung von Fibrin im Thrombus → Thrombolyse → Reperfusion verschlossener Gefäße
- **Kontraindikationen für eine Lysetherapie:** intrazerebrale **Blutung**. Thrombozyten <100.000, INR >1,7, Quick <50%. Erkrankungen mit erhöhtem Blutungsrisiko (Malignom). OP oder Trauma innerhalb der letzten **zwei Wochen**. **Schwangerschaft/Entbindung/Wochenbett**. Nicht kontrollierbare aHT >185/110 mmHg
- **Komplikationen:** Blutungen (insb. intrakraniell). Angioödem
- **Kontroll-CT: 24 h** nach Thrombolysetherapie zum Blutungsausschluss

Interventionelle Therapie

- **Indikationen:** Akuter Verschluss der **großen** hirnversorgenden Gefäße
- **Prozedere:** Nicht-invasive Gefäßdarstellung (CT-Angiographie, MR-Angiographie), **mechanische Thrombektomie mittels Stent**

Frühversorgung auf der Stroke Unit

- **Monitoring der Vitalparameter** (EKG, Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung)
- **Neuroprotektive Basismaßnahmen**
 - ① **Blutdruckmanagement** (s.o.)
 - ② **Blutzuckermanagement:** Korrektur ab ≥ 200 mg/dL
 - ③ **Fiebersenkung:** (Ziel <37,5 °C)
 - Ausgleich von **Elektrolytstörungen**
- **Dysphagie-Screening** („Schluckversuch“) vor erster oraler Kost. Ggf. Erwägung einer nasogastralen Sonde zur Ernährung
- **Thromboseprophylaxe** (z.B. Enoxaparin)
- **Frühmobilisation**
- **Frührehabilitative Behandlung** (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie)

präklinisch

- Transport → Stroke Unit
- Sauerstoffgabe/Nasensonde
- Monitoring V/P
- a-HT tolerieren

im Krankenhaus

- Rekanalisierende Therapie
 - CT: Ausschluss Blutung
 - Lysetherapie <4,5 Stunden
 - KF, Komplikationen
 - CT Kontrolle 24 St. nachher
- Interventionelle Therapie
 - CT, MR, Angio
 - mechanische Thrombektomie

Stroke Unit

- Monitoring V/P (EKG, RR, O₂, HF, AF)
- Blutdruck- und Blutzuckermanagement
- Fiebersenkung, Ausgleich Elektrolytstörungen
- Dysphagiescreening, ggf. Magen sonde Ernährung
- Thromboseprophylaxe
- Rehab
- Mobilisation

Prävention

Primärprävention

Beseitigung der veränderbaren Risikofaktoren

- Blutzuckereinstellung
- Blutdruckeinstellung
- Nikotinverzicht
- Risikoadaptierte LDL-Cholesterineinstellung mit Statinen
- Ggf. Gewichtsreduktion
- Regelmäßig Sport treiben
- Bei Vorhofflimmern: Ggf. Antikoagulation

Sekundärprävention



Bei Atherosklerose:

- ASS 100 mg/d (oder Clopidogrel 75 mg/d bei Unverträglichkeit)
- Statine
- Bei Vorhofflimmern : Orale Antikoagulation

Vorgehen bei Karotisstenose

- **Symptomatische Karotisstenose:** Bei einer Stenosierung von >50% (insb. >70%) ist eine Thrombendarteriektomie empfohlen
- **Asymptomatische Karotisstenose:** Bei einer Stenosierung von >60% kann eine Thrombendarteriektomie in Erwägung gezogen werden

Parkinson-Syndrom ++

Definition

Syndrom bestehend aus **Bradykinesie, Rigor, Tremor** infolge vermindelter Dopaminwirkung im extrapyramidal-motorischen System.

Ursachen

- **Morbus Parkinson:** Degeneration dopaminergener Neurone in der Substantia nigra
- **Sekundäres Parkinson-Syndrom:** Medikamente (Neuroleptika, **Metoclopramid**, ..), abgelaufene Enzephalitiden, Morbus Wilson *Stoffwechselstörung, Kupferablagerung*

Klinik

- Frühphase oft unspezifische Symptome: Hyposomnie, Sturzneigung
- **Bradykinesie/Akinesie+++:** Verlangsamung aller Bewegungsabläufe, fehlende Mimik, leise und monotone Sprache, gebückte Haltung
- **Rigor**

| | |
|-------|---|
| Rigor | • Erhöhter Tonus mit „wachsartigem“ Widerstand bei passiver Dehnung der Skelettmuskulatur, nicht geschwindigkeitsabhängig |
|-------|---|
- **Tremor:** Überwiegender Ruhetremor der Hand
- **Weitere Symptome:** posturale Instabilität, Bradyphrenie (verlangsamte psychische Abläufe), Depression, vegetative Störungen (Obstipation, orthostatische Dysregulation), ggf. dementielle Entwicklung.

„Ein einseitiger Beginn der Erkrankung ist charakteristisch für den Morbus Parkinson“

Diagnostik

- **Klinik:** neurologische Untersuchung.
- **Abgrenzung sekundärer Formen:** besonders Medikamente. Bei jüngeren Patienten Ausschluss eines Morbus Wilson.
- **MRT oder cCT:** Standard bei Erstdiagnose. Zum Ausschluss sekundärer Parkinson-Syndrome; der M. Parkinson zeigt sich in der MRT unauffällig.
- **L-Dopa-Test:** Keine routinemäßige Diagnostik. Eine Symptomverbesserung nach Gabe einer einmaligen Dosis von L-Dopa soll eine Differenzierung zwischen idiopathischem (spricht gut an) und atypischem (spricht nicht an) Parkinson ermöglichen.

„Der Morbus Parkinson ist eine klinische Diagnose! Anamnese und klinische Untersuchung sind die zentralen diagnostischen Maßnahmen!“

Differenzialdiagnose des Tremors

- Parkinson-Tremor
- **Essenzieller Tremor**
- Seniler Tremor
- **Psychogener Tremor**
- Flapping tremor: v. a. bei schwerer **Leberinsuffizienz** und Urämie
- Tremor bei **Hyperthyreose**
- Tremor bei chronischem **Alkoholabusus**
- **Medikamentös** verursachter Tremor (z.B. β -Sympathikomimetika)

Therapie

Medikamenteninduziertes Parkinson-Syndrom

- Absetzen bzw. Dosisreduktion des Medikaments

Morbus Parkinson

- **Patienten < 70 Jahre:** **Dopaminagonist** (Ropinirol)
- **Patienten > 70 Jahre:** **L-Dopa (+ Decarboxylasehemmer)** (L-Dopa + Carbidopa)
- **Bei Tremordominanztyp:** Betablocker (insb. Propranolol), Anticholinergikum
- **Akinetische Krise:** Amantadin i. v. (NW: QT-Zeit-Verlängerung) *10 mg 3x langsam und 80 mg/Tag möglich*
- **Stärkere Symptomatik/beginnende Fluktuationen:** Kombinationstherapie (L-Dopa + Dopaminagonisten oder Monoaminoxidase-B-Hemmer) *200 mg / 500 ml Lösung / 3 Stunden*

Versagen der medikamentösen Therapie

- **Tiefe Hirnstimulation**

Bei Therapiebeginn 100 mg L-Dopa + 25 mg Carbidopa p.o. 1-0-1; langsame Steigerung um 50 mg L-Dopa + 12,5 mg Carbidopa/Tag alle 3–7 Tage, bis Wirksamkeit zufriedenstellend; hierbei mit Dosiserhöhung Aufteilung der Gaben von anfänglich 2x auf zunächst 3x und schließlich 4x/Tag; Maximaldosis ca. 700 mg L-Dopa + 175 mg Carbidopa/Tag (bei Verhältnis 4:1) bzw. 2000 mg L-Dopa + 200 mg Carbidopa/Tag (bei Verhältnis 10:1)

Begleitende Therapiemaßnahmen

- Physiotherapie, Ergotherapie und ggf. Logopädie
- ggf. antidepressive Behandlung

Prognose

- Lebenserwartung normal unter Medikation
- Im Verlauf häufig Pflegebedürftigkeit

L-Dopa (+ Decarboxylasehemmer)

- Dopaminvorstufe (Periphere Decarboxylasehemmer hemmen die periphere Umwandlung von L-Dopa in Dopamin. Dies führt zu einer Erhöhung der zentralen Verfügbarkeit von L-Dopa)
- **Wirkung** : Erhöhung der Dopaminkonzentration im ZNS
- **NW** : Hypo- oder hyperkinetische Wirkungsfluktuationen (4–8 Jahre nach Behandlungsbeginn). Orthostatische Hypotonie. Psychische Störungen. Nausea und Emesis

Dopaminagonisten

- Agonistische Wirkung an Dopaminrezeptoren
- **NW** : orthostatische Hypotension, psychische Störungen, Nausea und Emesis

Monoaminoxidase-B-Hemmer

MAO

- Vermindern den Abbau von Dopamin
- **NW** : Dyskinesien, psychische Störungen

Als **Rigor** bezeichnet man eine gesteigerte Grundspannung der **Skelettmuskulatur**, die sich bei der passiven Bewegung einer **Extremität** als konstanter Widerstand bemerkbar macht. Rigor ist ein **Kardinalsymptom** der **Parkinson-Krankheit**.

Unter dem **extrapyramidalmotorischen System**, kurz EPMS, versteht man alle ins **Rückenmark** ziehenden **motorischen** Bahnen, die nicht der **Pyramidenbahn** angehören

Diagnosekriterien des Parkinson-Syndroms und Leitsymptome des Morbus Parkinson

- Bradykinese/Akinese und mind. eines der folgenden Kriterien
 - Ruhetremor (sog. Pillendreher- oder Münzenzähler-Tremor)
 - Ca. 4–8 Hz
 - Bei Bewegung → Amplitude ↓
 - Emotionale Aufregung/Anspannung → Amplitude ↑
 - Rigor
 - Posturale Instabilität

L-Dopa

Pharmakokinetik

- L-Dopa passiert als Dopamin-Vorstufe (Prodrug) im Gegensatz zu Dopamin die Blut-Hirn-Schranke
- Im ZNS Umwandlung von L-Dopa in wirksames Dopamin

Dopamin kann nicht Blut-Hirn-Schranke überwinden

Kontraindikationen

- Kontraindikation bei Patienten <25. Lebensjahr
- Schwere Leber- und Niereninsuffizienz
- Gravidität und Stillzeit

Wirkung

Dopaminagonisten Ropinirol

- Agonistische Wirkung an postsynaptischen Dopaminrezeptoren → Direkte dopaminerge Wirkung, unabhängig vom Funktionszustand der präsynaptischen striatalen Neurone
- Wirkung auf Akinese > Rigor > Tremor

Restless-Legs-Syndrom ++

- Das RLS ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen und geht mit vermehrt in Ruhe auftretenden (also meist nächtlichen) Missempfindungen und Bewegungsdrang einher. Die Beschwerden bessern sich bei Bewegung.
- Es werden primäre Formen mit genetischer Prädisposition und sekundäre Formen (z.B. durch Eisenmangel oder Urämie) unterschieden.
- Der neurologische Untersuchungsbefund ist unauffällig.
- Bei Therapiebedürftigkeit erfolgt eine Behandlung mit L-Dopa und Dopaminagonisten, bei sekundären Formen muss die Grunderkrankung behandelt werden.
- Die Erkrankung weist eine gute Prognose auf: Pharmaka lindern die Beschwerden, müssen allerdings tlw. lebenslang eingenommen werden, sekundäre Formen sind bei kausaler Behandlung meist regredient.
- Prävalenz mit Lebensalter zunehmend. ♀ > ♂

Ätiologie

- **Primär:** Genetische Prädisposition im Zusammenspiel mit Umweltfaktoren
- **Sekundär:**
 - Medikamentös: Neuroleptika, Antidepressiva, Metoclopramid
 - Schwangerschaft
 - Eisenmangel, Niereninsuffizienz
 - Polyneuropathien

Pathophysiologie

nicht eindeutig geklärt.

Symptome/Klinik (Diagnosekriterien)

- **Minimalkriterien (obligat)**
 - Bewegungsdrang der Beine (seltener der Arme) und sensible in den betroffenen Extremitäten
 - Auftreten und Verstärkung der Symptomatik in Ruhe
 - Besserung oder vollständige Rückbildung der Symptome bei Bewegung
 - Periodische Rhythmik mit Verstärkung abends und nachts
- **Supportive Kriterien (nicht obligat)**
 - Ansprechen auf Gabe von L-Dopa
 - Positive Familienanamnese
 - Periodische Beinbewegungen im Schlaf
- **Häufig assoziierte Befunde**
 - Schlafstörungen
 - Initial fluktuierender Verlauf, der später kontinuierlich voranschreitet
 - Unauffälliger neurologischer Untersuchungsbefund

Diagnostik

Die Diagnose wird durch die Anamnese gestellt, eine Besserung nach Gabe von L-Dopa bestätigt sie. Die weitere Diagnostik kann ein sekundäres Syndrom sowie DD abgrenzen.

Klinisch-neurologische Untersuchung

- Unauffälliger Befund
- Bei begleitender Polyneuropathie: Vorliegen entsprechender Symptome wie etwa distale Sensibilitätsstörungen, Areflexie und andere Defizite

Labordiagnostik

- **Ausschluss sekundärer Formen**
 - Eisenmangel: Blutbild und Ferritin
- **Nierenfunktion:** Retentionsparameter (Harnstoff, Kreatinin)
- **Weitere zur Symptomatik beitragende Faktoren**
 - Hyperthyreose (TSH)

- Hypovitaminosen (insb. Vitamin B₁₂ und Folsäure)

L-Dopa-Test

- Probatorisch **einmalige abendliche** Gabe von L Dopa + Decarboxylasehemmer (L-Dopa + Carbidopa) 100 / 25 mg
- Bei Ansprechen auf die Medikation **gehen die Missempfindungen und der Bewegungsdrang zurück**
- Ein Nichtansprechen schließt ein RLS jedoch **nicht** sicher aus

Zusatzdiagnostik

- **Polysomnographie**: Messung bestimmter biologischer Parameter im Schlaf. Zur Abgrenzung gegenüber einem Schlafapnoe-Syndrom und assoziierten Bewegungsstörungen, insb. wenn die RLS-Therapie nicht anspricht sowie bei jungen Patienten.
- **Elektrophysiologie**: Zur Bestätigung bzw. zum Ausschluss einer (begleitenden) Neuropathie.

Differentialdiagnosen

- **Akathisie** (Sitzunruhe)
- **Nächtliche Wadenkrämpfe**
- **Polyneuropathie**
- **Periodic Limb Movement Disorder** (durch Schlafstörungen und Tagesmüdigkeit charakterisiert)

Therapie

Allgemeine Therapieprinzipien

- Absetzen/reduzieren potentiell verstärkender oder auslösender Medikamente
- Koffein-Abstinenz; Schlafhygiene

Behandlung von Auslösern des sekundären RLS

- **Eisenmangel**: Substitution
- **Niereninsuffizienz**: Ggf. Optimierung der Behandlung

Medikamentöse Therapie

- **Therapie der Wahl**: L-Dopa (+ Decarboxylase-Hemmer) oder Dopaminagonisten
- **Therapieindikation**: Individueller Leidensdruck

50/12,5 mg p.o. 0-0-1 zu Therapiebeginn, Steigerung um 50 mg L-Dopa alle 2 Tage möglich, Maximaldosis 200 mg/d

Ropinirol 0,25 mg p.o. 0-0-1 zu Therapiebeginn, Steigerung auf 0,5 mg am 3. Behandlungstag, dann jede Woche um weitere 0,5mg möglich, Maximaldosis 4mg/d

Koma +

Grade der Vigilanzminderung

- **Benommenheit:** Verlangsamte, unpräzise Reaktionen des Patienten
- **Somnolenz:** Schlafähnlicher Zustand, aus dem der Patient durch äußere Reize (z. B. Ansprechen) erweckbar ist
- **Sopor:** Patient ist nur durch starke Reize (z. B. Schmerzreiz) kurzfristig erweckbar
- **Koma:** Patient ist durch äußere Reize nicht mehr erweckbar

Glasgow-Koma-Skala

Standardisierte klinische Einschätzung der Bewusstseinsstörung

| Prüfung | Reaktion | Bewertung |
|--|-------------------------------------|-----------|
| Augenöffnen | spontan | 4 |
| | nach Aufforderung | 3 |
| | nach Schmerzreiz | 2 |
| | kein | 1 |
| verbale Antwort | orientiert | 5 |
| | desorientiert | 4 |
| | einzelne Worte ohne Zusammenhang | 3 |
| | unverständlich | 2 |
| | keine | 1 |
| motorische Antwort | befolgt Aufforderung | 6 |
| | reagiert gezielt auf Schmerzreize | 5 |
| | reagiert ungezielt auf Schmerzreize | 4 |
| | Beugemechanismen | 3 |
| | Streckmechanismen | 2 |
| | keine | 1 |
| Summe der 3 Punktzahlen ergibt den Glasgow-Koma-Skala: minimal 3 Punkte (= schwerstes Koma), maximal 15 Punkte (= kein neurologisches Defizit) | | |

Häufigste Ursachen des primär unklaren Komats

- **Exogene Vergiftungen:** Besonders Alkohol und Psychopharmaka.
- **Metabolische Störungen:** Diabetisches, hepatisches, urämisches Koma.
- **Zerebrales Koma:** Ischämischer Insult, Hirnblutung, Meningoenzephalitis.
- **Kreislaufschock.**

Vorgehen

Jedes Koma stellt primär einen lebensbedrohlichen Zustand dar. Die Erstmaßnahmen beschränken sich daher zunächst auf die Kontrolle und ggf. Therapie akut gefährdeter vitaler Funktionen

Fremdanamnese

- **zeitliche Entwicklung:** Akut, schleichend?
- **Grunderkrankungen:** Diabetes mellitus, Leber-, Nierenerkrankungen?
- **Hinweise für suizidale Intoxikation:** z. B. Medikamentenverpackungen, Abschiedsbrief, bekannte Depression?
- **Alkoholkonsum, Drogenmissbrauch, Medikation?**
- **vorausgegangenes Trauma?**
- **vorausgegangener Krampfanfall?**
- **vorausgegangene Hirndruckzeichen:** z. B. Kopfschmerzen, Erbrechen?

Koma: - KU

• Foetor
• Temp°

• Hautbefund

• Atmung

• Pupillen

• Meningismus

• Halbseitensymptomatik

• Verletzung

Körperliche Untersuchung

- **Foetor:**
 - **alkoholisch:** Alkoholintoxikation
 - **nach Azeton:** Diabetisches Koma
 - **nach Urin:** Urämisches Koma
 - **nach frischer Leber:** Hepatisches Koma
 - **nach Knoblauch:** Alkylphosphatvergiftung
- **Körpertemperatur:**
 - **erhöht:** Sepsis, Meningoenzephalitis, Hyperthyreose, Hitzschlag
 - **erniedrigt:** Alkoholintoxikation, Hypothyreose, Schock
- **Hautbefund:**
 - **Exsikkose:** Diabetisches hyperosmolares Koma
 - **Zyanose:** Respiratorische Insuffizienz
 - **Blässe:** Schock, Blutung, Hypoglykämie
 - **Ikterus:** Leberinsuffizienz
 - **dunkel pigmentiert:** Morbus Addison, Urämie
 - **Injektionsläsionen:** Drogenmissbrauch
 - **Hautblutungen:** Hämorrhagische Diathese, Meningokokkensepsis
- **Atmung:**
 - **Hyperventilation:** Metabolische Azidose, Sepsis, Hirnschädigung
 - **periodisch:** Hirnschädigung
- **Pupillen:**
 - **Miosis** (Pupillenverengung): Opiatintoxikation, Alkylphosphatvergiftung
 - **mittelweit, ohne Reaktion:** Hirnschädigung
 - **Mydriasis** (Pupillenerweiterung), ohne Reaktion: Fortgeschrittene Hirnschädigung (auch nach Kreislaufchock), Intoxikation mit Atropin, Antidepressiva, Antihistaminika
 - **Seitendifferenz:** Unilaterale Hirnläsion
- **Meningismus:** Meningoenzephalitis, Subarachnoidalblutung, Hitzschlag
- **Halbseitensymptomatik** (Reflexdifferenzen, pathologische Reflexe): unilaterale Hirnschädigung (Blutung, Ischämie, Tumor, Abszess)
- **Verletzungszeichen**
- **Leitsymptome häufiger Vergiftungen:**

| Vergiftung | Leitsymptome | Antidot |
|------------------------------|--|---------------------|
| Alkohol (= Ethanol) | Foetor alcoholicus, Hypothermie, Hypoglykämie | |
| Alkylphosphate (Insektizide) | Knoblauchgeruch, Miosis | Atropin |
| Benzodiazepine | Kreislauf- und Atemdepression, Hypothermie | Flumazenil |
| Kohlenmonoxid | rosige Hautfarbe, Muskelkrämpfe | Sauerstoff 10 l/min |
| Opiate | Miosis, Kreislauf- und Atemdepression | Naloxon |
| Paracetamol | Erbrechen, akute Leberinsuffizienz mit Ikterus | N-Acetylcystein |


Labor

BSG/CRP, Blutbild, Blutglukose, Blutgasanalyse, Kreatinin, Na^+ , K^+ , Ca^{++} , γGT , GOT, GPT, CK, LDH, Ammoniak, Laktat, Alkoholspiegel, Quick/INR, PTT, Urinstatus

Weitere primärdiagnostische Maßnahmen

in Abhängigkeit vom Verdacht (s.u.):

- **Lumbalpunktion:** primär bei Meningismus, ansonsten wenn Bewusstseinstörung anderweitig nicht hinreichend geklärt ist
- **Computertomografie, MRT**



Differenzialdiagnose

| Verdachtsdiagnose | wegweisende Untersuchungen |
|--|--|
| Stoffwechselstörungen: | |
| hypoglykämisches Koma ↓ Glu | Blutglukose (< 50 mg/dl) |
| diabetisches ketoazidotisches Koma ↑ Glu | Blutglukose (> 300 mg/dl), BGA, Urinstatus (Ketonurie) |
| diabetisches hyperosmolares Koma ↑ Glu | Blutglukose (> 600 mg/dl), Serum-Osmolalität (> 350 mosmol/kg) |
| hepatisches Koma | Ikterus, γGT, GPT, Quick/INR, NH ₃ |
| urämisches Koma | Kreatinin, BGA |
| Addison-Krise (akute Nebennierenrindeninsuffizienz) | Na ⁺ , K ⁺ , Blutglukose, Kortisol |
| thyreotoxisches Koma | Klinik, fT ₃ , fT ₄ |
| Myxödemkoma | Klinik, fT ₄ |
| Hyperviskositätssyndrom | Gesamteiweiß, Elektrophorese |
| Hyperkalzämie Ca⁺⁺ ↑ | Ca ⁺⁺ |
| Hypernatriämie Na⁺ ↑ | Na ⁺ |
| Hypovolämie | Klinik Blutdruck, Puls, Exikose Blutung, Diarrhö, Erbrechen, Schmerzen |
| laktatazidotisches Koma | Laktat BGA |
| zerebrale Erkrankungen: | |
| ischämischer Insult, Hirnblutung, Tumor, Metastasen, Sinusthrombose, Abszess | neurologischer Befund, Schädel-CT / MRT |
| Epilepsie, postiktales Koma | Fremdanamnese, Verlauf |
| Meningoenzephalitis | Meningismus, Liquorpunktion Fieber |
| Hitzschlag | Fremdanamnese ↑ Hauttemperatur |
| zerebrale Malaria | Tropenaufenthalt? Blutausstrich |
| Trauma | Fremdanamnese, Klinik, Schädel-CT Verletzungen |
| exogene Vergiftungen (s.o.) | Fremdanamnese Depression, Droger nadelstichläsionen Abszesse Medikation, psych. Vorg. |

Tab. 5.1 Gifte, Antidote und Klinik

| Gifte | Antidot/Therapie | Klinik |
|---|--|--|
| Alkylphosphate (Pflanzenschutzmittel, muskarinerge Pilze) | Atropin, Obidoxim | Miosis, gesteigerter Speichelfluss, Bradykardie, Krampfanfälle, Somnolenz, Sopor, Koma, Atemlähmung (peripher!) |
| Neuroleptika | Biperiden | Hypotension, Herzrhythmusstörungen, anticholinerges Syndrom |
| Schaumbildner | Dimethylpolysiloxon | ingestiertes Gift kann über Schäumen zu Aspiration und Erstickten führen |
| Zyanide, Blausäure, Bittermandeln | 4-DMAP, Natriumthiosulfat, Hydroxycobalamin | Hyperpnoe, Erregung, Angst, Zyanose, Krämpfe |
| β-Blocker | Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin, externer Schrittmacher | bradykarde Herzrhythmusstörungen, Müdigkeit bis Koma, Krämpfe, Hypoglykämie, Hyperkaliämie, Dyspnoe |
| Benzodiazepine | Flumazenil | Hypothermie, Hyperventilation, Apnoe, Somnolenz, Sopor, Koma |
| Kalziumkanalblocker | Kalzium | Hypotension bis Schock, Bradykardie bis Asystolie, Somnolenz bis Koma, Krämpfe, Hypoglykämie, Hyperkaliämie, Dyspnoe |
| Reizgas | Glukokortikoide | Schleimhaut gerötet/verrußt, Husten, retrosternale Schmerzen, Bronchospastik, Bewusstseinsstörungen |
| Paracetamol | N-Acetylcystein | Schwindel, Erbrechen, Bauchschmerzen |
| Opiate, Schlafmohn | Naloxon | Miosis, Hypothermie, Hypoxie/Lungenödem, Brady-/Apnoe, Hypotension, Bradykardie, Somnolenz, Sopor, Koma |
| Atropin, Scopolamin, trizyklische Antidepressiva, Tollkirsche, Fliegenpilz, Stechapfel, Antihistaminika | Physostigmin | Mydriasis, trockener Mund, Hyperthermie, Herzrhythmusstörungen, Tachykardie, Halluzinationen, Rausch, Aggressivität |
| Kohlenmonoxid | Sauerstoff (Druckkammer) | Kopfschmerz, Schwindel, Kirsch-/hellrote Hautfarbe (später Zyanose), Krämpfe, Somnolenz, Sopor, Koma |
| Methämoglobinbildner (z. B. 4-DMAP) | Toluidinblau, Methylenblau, Thionin | Zyanose, Müdigkeit, Dyspnoe, Tachykardie, Bewusstseinsstörungen |
| Schwermetalle (z. B. Blei, Quecksilber, Kupfer) | Chelatbildner (z. B. EDTA) | verschiedenartig, oft aber Störungen des Zentral-, Gastrointestinal- sowie Renalsystems |
| Methanol | Ethanol | Rausch, Sehstörungen, schwere Azidose |
| Heparin | Protamin | gesteigerte Blutungsneigung |
| Cumarine | Vitamin K ₁ | gesteigerte Blutungsneigung |
| Digoxin, Digitoxin (auch in Fingerhut) | Digitalisantitoxin | Herzrhythmusstörungen, Bradykardie, forcierte Diurese, Übelkeit + Erbrechen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Delir, Krämpfe |
| Insulin | Glukose | Hypoglykämie (S. 32) |
| Nikotin | Natriumsulfat, Aktivkohle, Atropin | Magen-Darm-Beschwerden, Atemdepression, Herz-Kreislauf-Beschwerden |
| Barbiturate | s. Notärztliche Therapie | Hautblasen, Hypotension, Somnolenz, Sopor, Koma |
| Kokain | Intensivtherapie | Mydriasis, Hypertension, Agitation, Ruhelosigkeit |
| Amphetamine (Ecstasy) | Infusionstherapie bei Dehydratation, ggf. Sedierung | Erregung, Euphorie, Halluzinationen, Hypertonie, Tachykardie, Hyperthermie, Mydriasis, später Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen |

Intrakranielle Volumenzunahme und Schädelhirntrauma +

Ätiologie

Hirnödem

- Vermehrte Flüssigkeitseinlagerung in das Gehirn als Resultat der Schädigung der Blut-Hirn-Schranke oder der Blut-Liquor-Schranke :
 - **Traumatisch** (Schädelhirntrauma : SHT)
 - **Toxisch** (Bleiintoxikation)
 - **Entzündlich** (Meningitis)
 - **Raumfordernder Prozess** (Hirntumoren, Subduralhämatom, intrazerebrales Hämatom)

Weitere Gründe für eine Volumenzunahme

- **Volumenzunahme der Liquormenge** (Hydrozephalus)
- **Volumenzunahme des intrakraniellen Blutvolumens** (Zerebrale **Hyperkapnie** und/oder **Hypoxie**, Sinusvenenthrombose)

Schädelhirntrauma (SHT)

- **Definition:** Traumatische Schädigung des Gehirns und des Schädels .
 - Geschlossenes Schädelhirntrauma: Dura mata ist nicht verletzt.
 - Offenes Schädelhirntrauma.
 - **Einteilung der Schwere:**
 - **Leichtes SHT** = GCS-Score 13–15
 - **Mittelschweres SHT** = GCS-Score 9–12
 - **Schweres SHT** = GCS-Score ≤ 8

„Indikation zur **endotrachealen Intubation**: Bei Werten ≤ 8 zur Sicherung der Atemwege und Gewährleistung einer suffizienten Beatmung“

Symptome/Klinik

Allgemeine Hirndruckzeichen

Der physiologische intrakranielle Druck beträgt **5–15 mmHg** bei Werten von >15 mmHg liegt ein pathologisch gesteigerter intrakranieller Druck („Hirndruck“) vor.

- **Akut** (innerhalb von Stunden bis Tagen entstehend)
 - **Kopfschmerzen** (diffus, morgens verstärkt)
 - **Übelkeit und Erbrechen** (Nüchternerbrechen, zudem im Schwall)
 - **Vigilanzstörung** (Somnolenz, Sopor, Koma)
- **Chronisch:** Die Antriebsstörung steht im Mittelpunkt. Die Patienten sind asponant, **langsam, lustlos und im Verhalten inadäquat**

Kann der intrakranielle Hirndruck nicht ausgeglichen werden, können einerseits Zwischen- und Mittelhirn im Tentoriumschlitz (**obere Einklemmung**) und andererseits die Medulla oblongata im Foramen magnum (**untere Einklemmung**) komprimiert werden.

Diagnostik

1. Anamnese

- Beschreibung des **Unfallherganges**
- Einschätzung des **Verletzungsmechanismus** (stumpf, scharf, etc.)

2. Klinische Untersuchung

- **Inspektion und Palpation** des Gesichtes und der Kalotte
- Abschätzung der Bewusstseinslage mithilfe der Glasgow-Coma-Scale (**GCS**)
- Vollständige **neurologische Untersuchung** mit Fokus auf Pupillenreaktion, weitere Hirnnervenprüfung

3. Bildgebende Diagnostik

- **Native Computertomographie des Schädels (cCT)** : Methode der Wahl zur raschen Abklärung eines SHT
 - Frakturen der Schädelkalotte, Jochbein,...
 - intrakranielle Lufteinschlüsse bei einem Durariss

- **MRT** : bei unklaren Befunden im cCT
- **Orbitaübersichtsaufnahme** : Zum Ausschluss von Frakturen der Orbita

Therapie

Hirndrucksenkung

Es sollte ein intrakranieller Druck von <20 mmHg angestrebt werden.

- **Therapie der Grunderkrankung** (z.B. Tumorentfernung bei Hirndruck aufgrund einer intrakraniellen Raumforderung, Liquordrainage)
- **Oberkörperhochlagerung** (15–30°)
- Ausreichende Sedierung und **Analgesie bei Bedarf**
- Hypothermiebehandlung (auf 34 °C Körpertemperatur) bei globaler zerebraler Ischämie
- **Glucocorticoide** (z.B. Dexamethason) bei **Hirntumor und Metastasen** zur Senkung des intrakraniellen Drucks, bei der bakteriellen Meningitis im Rahmen der Primärtherapie
- Evtl. **Kraniektomie zur Dekompression**
- **Osmotherapie** → Gabe von **Mannitol** oder Gabe hypertonischer Kochsalzlösung
- **Milde Hyperventilation** (geringerer CO₂-Gehalt im Blut führt zu einer intrakraniellen Vasokonstriktion)

„Bei erhöhtem Hirndruck aufgrund eines **Schädel-Hirn-Traumas** oder eines **ischämischen Schlaganfalls** sollte die Gabe von Glucocorticoiden vermieden werden“

Vereinfachtes Vorgehen bei Schädelhirntrauma




- **Leichtes SHT (Comotio cerebri)**
 - **Beobachtung** für 24 h und vorübergehende Schonung und ggf. symptomatische Medikation; keine spezielle Behandlung
- **Mittelschweres und schweres SHT (Contusio und Compressio cerebri)**
 - **Intensivmedizinische Überwachung**, evtl. Monitoring des intrakraniellen Drucks (mit epiduraler Sonde)
 - **Ödemprophylaxe und Hirndrucksenkung** (s.o.)

Glasgow-Coma-Scale [6][7]

| Kriterium | Reaktion | Punkte |
|---|--|--------|
| Augenöffnen Spontan Auf Ansprache / Geräusche Auf Schmerzreiz Keine Reaktion | Spontan | 4 |
| | Auf Ansprache/Geräusch | 3 |
| | Augenöffnen auf Schmerzreiz | 2 |
| | Keine Reaktion | 1 |
| | Nicht beurteilbar durch Störfaktor | – |
| | | |
| Beste verbale Reaktion Orientiert Desorientiert, Konversationsfähig Unzusammenhängende Wörter Unverständliche Laute Keine | Orientiert zu Person, Ort und Zeit | 5 |
| | Desorientiert, aber konversationsfähig | 4 |
| | Unzusammenhängende, aber verständliche Wörter | 3 |
| | Unverständliche Laute (Stöhnen/Ächzen) | 2 |
| | Keine Reaktion | 1 |
| | Intubation oder anderer Störfaktor | – |
| | | |
| Beste motorische Reaktion Auf Aufforderungen Gezielt auf Schmerzreiz normaler Beugung Abnormaler Beugung Streckung Keine | Befolgt Aufforderungen | 6 |
| | Reagiert gezielt auf Schmerzreiz | 5 |
| | Reagiert mit normaler Beugereaktion des Arms auf Schmerzreiz | 4 |
| | Reagiert mit abnormaler Beugereaktion des Arms auf Schmerzreiz | 3 |
| | Reagiert mit Streckung des Arms im Ellenbogen auf Schmerzreiz | 2 |
| | Keine Reaktion | 1 |
| | Lähmung oder andere Störfaktoren vorhanden | – |


Epidurales Hämatom +

- Akute Blutung meist aus der **A. meningea media** zwischen Schädelknochen und Dura mater.
- Die **Symptome** sind Folge der Gehirnkompensation und können sich direkt nach dem Trauma oder mit einer gewissen **Latenz** nach initialer Bewusstlosigkeit (**freies Intervall**) manifestieren. Neben der Vigilanzstörung ist insbesondere eine **Anisokorie** durch eine **ipsilaterale Mydriasis** ein alarmierendes Zeichen.
Pupillengrößendifferenz *Weitstellung der Pupillen*
- Das CT bestätigt die Verdachtsdiagnose (**bikonvexe, hyperdense, scharf begrenzte** Raumforderung)
- Eine notfallmäßige **Trepanation** (neurochirurgische Eröffnung des Schädelknochens) ist indiziert, meist temporal.
- **Prognose** : Bei rechtzeitiger Behandlung: 70%-ige Überlebenschance



Subdurales Hämatom +

- Akute, subakute oder chronische **venöse Blutung** zwischen Dura mater und Arachnoidea nach Riss einer **Brückenvene** (Verbindung der oberflächlichen Hirnvenen zu den Sinus durae matris).
- Der **akute Verlauf** tritt meist als Begleiterscheinung bei einem Schädelhirntrauma auf, während der **chronische Verlauf** i.d.R. durch Bagateltraumata ausgelöst wird.
- **Akuter Verlauf** : Kopfschmerzen, Vigilanzminderung, **Ipsilaterale Mydriasis** und **kontralaterale Hemiparese**
- **Subakuter oder chronischer Verlauf** : Kopfdruck, psychomotorische Verlangsamung und mnestiche Funktionseinschränkungen
- Im Zentrum der **Diagnostik** steht die Schnittbildgebung mittels cCT (Mittel der Wahl) oder MRT.
- **cCT** : **sichelförmige Blutung**. **Akut**: Hyperdens. **Chronisch**: Hypodens
- Neben der **Kontrolle** und ggf. **Anpassung von Gerinnung und Hirndruck** stehen die **operative Therapie** (Drainage durch Bohrlochtrepanation) oder die konservative Therapie (engmaschige Überwachung) im Fokus.
- Die Prognose ist beim chronischen Verlauf deutlich günstiger.



Subduales Hämatom / Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Normalisierung der Gerinnung
 - Insb. bei antikoagulierten Patienten bei Notwendigkeit einer operativen Therapie
 - Stets kritische Abwägung: Gefahr thromboembolischer Ereignisse im Rahmen des Grundleidens
 - Verschiedene Substanzen verfügbar, bspw. Fresh Frozen Plasma, Vitamin K, rekombinanter Faktor VIIa
- Hirndrucksenkung

Operative Therapie

- Indikationen (es muss nur einer der folgenden Punkte zutreffen)
 - Klinische Zeichen einer Herniation oder Erhöhung des intrakraniellen Drucks (bspw. asymmetrische oder starre und erweiterte Pupillen)
 - Verschlechterung des neurologischen Status (beinhaltet u.a. Orientierung zu Raum, Zeit und Person)
 - Mittellinien-Verlagerung von >5 mm
 - Größe der Raumforderung >10 mm
- Therapie
 - Bohrlochtrepanation mit Einlage einer Drainage
 - Kraniotomie

Konservative Therapie

- Indikation: Die Kriterien der operativen Therapie werden nicht erfüllt
- Therapie
 - Engmaschige klinische Kontrollen (insb. neurologischer Status)
 - Intrakranielle Druckmessung
 - Regelmäßiges Überprüfen der Hämatomausdehnung mittels CT

Subarachnoidalblutung +-

Definition

Einblutung in den liquorgefüllten Subarachnoidalraum

Ätiologie

Eine SAB ist häufig die Folge einer Ruptur eines Aneurysmas der Hirnbasisarterien.

Pathophysiologie

- Es kommt zum Anstieg des intrakraniellen Drucks.

- **Cushing-Reflexes** : In den ersten Stunden und Tagen besteht eine Neigung zu arterieller Hypertonie infolge der Erhöhung des zentralen Sympathikotonus

Symptome/Klinik

- **Akute Leitsymptome**
 - Plötzlicher **Vernichtungskopfschmerz**
 - Vigilanzminderung
 - Meningismus (Nackensteifigkeit)
 - Vegetative Symptome: Übelkeit, Erbrechen
- **Spezifische neurologische Symptome** : Okulomotoriusparese, Hemi- oder Tetraparese,...
- **Prodrom: Warnblutung** (Heftiges Kopfschmerzereignis Tage bis Wochen vor einer SAB)

Diagnostik

Nachweis der Subarachnoidalblutung

CT

- **cCT nativ** : Nachweis von subarachnoidalem Blut (hyperdens)
- **CT-Angiographie** : zum sicheren Ausschluss einer SAB. Darstellung von Aneurysmen >3 mm

Lumbalpunktion

wenn die cCT nicht eindeutig ist und keine Zeichen einer Hirndrucksteigerung aufweist (Gefahr der Einklemmung bei Liquorpunktion!). **Drei-Gläser-Probe**

Aneurysmadarstellung

Digitale Subtraktionsangiographie (DSA)

- Innerhalb von **72 Stunden** nach Symptombeginn
- **Darstellung der Blutungsquelle**, Entscheidung über Therapie

Weitere Diagnostik

- **EKG**: Veränderungen sind häufig (CAVE: Mögliches Bild eines Myokardinfarktes!)
- **Transkranielle Dopplersonographie**: Tägliche Verlaufskontrolle bezüglich Vasospasmen

Differentialdiagnosen

- Intrazerebrale Blutung
- Zerebrale Sinus- und Venenthrombose
- Meningitis

Therapie

Intensivmedizinische Überwachung und Stabilisierung

- **Bettruhe**
- Bei schweren SAB i.d.R. **Analosedierung und Intubation** erforderlich
- **Schmerztherapie**
- **Oberkörperhochlagerung um 30°**
- **Vasospasmusprophylaxe**: Calciumantagonist (Nimodipin)
- **Blutdrucksenkung** (Vermeidung systolischer Drücke >160 mmHg)
- **Neuroprotektive Basismaßnahmen**
 - Normoglykämie anstreben
 - Fiebersenkung mit dem Ziel der Normothermie (<37,5 °C)
 - Normovolämie anstreben
 - Ausgleich von Elektrolytstörungen (insb. Hyponatriämie)
- **Antiemetische Therapie**

Aneurysmaversorgung

- Durchführung innerhalb der ersten 72 Stunden nach Symptombeginn
- **Mögliche Verfahren**
 - **Coiling:** Endovaskuläres Einbringen von Coils in das Aneurysma
 - **Clipping:** Chirurgischer Verschluss mit einem Metallclip

Komplikationen

- **Rezidivblutung**
- **Hydrozephalus :** Therapie
 - Externe Ventrikeldrainage (Temporäre Liquordrainage)
 - Ventrikuloperitonealer Shunt (Dauerhafte Liquordrainage)
- **Vasospasmen und sekundäre Ischämien**
- Epileptische Anfälle
- Elektrolytstörungen (Hyponatriämie)

Prognose

- **Hohe Letalität**
- Ein Drittel der Überlebenden mit dauerhafter Behinderung

Prävention

Vermeidung von Risikofaktoren

- Nikotin- und Alkoholkarenz
- Behandlung eines arteriellen Hypertonus

Screening von Angehörigen

Intrazerebrale Blutung - Überwachung und Stabilisierung

- Aufnahme auf Stroke-Unit oder Intensivstation
- **Kontinuierliche** (intensivmedizinische) **Überwachung** und bedarfsgerechte Versorgung
 - **Atemwegsmanagement**: Spätestens bei Vigilanzminderung sollte der Atemweg durch Intubation gesichert und eine maschinelle Beatmung eingeleitet werden
 - **Venöse Zugänge**: Mindestens 2 periphere Venenzugänge, ggf. **ZVK-Anlage**
 - **Kontinuierliches Monitoring**: (Arterielle) Blutdruckmessung, Pulsoxymetrie, EKG, ggf. EEG, ggf. ICP über Parenchymsonde
 - **Stündliches Monitoring**: Pupillomotorik, fokale Defizite, Vigilanz, Körpertemperatur, Urinausscheidung
- **Schmerztherapie**, je nach Schmerzstärke Paracetamol oder Opiode, etwa Piritramid
- **Neuroprotektive Basismaßnahmen**
 - **Normoglykämie** anstreben (siehe auch: Diabetes mellitus – Stationäres Blutzuckermanagement)
 - **Fiebersenkung** mit dem Ziel der Normothermie ($<37,5^{\circ}\text{C}$)
- Ggf. **Stressulkusprophylaxe** (etwa bei Beatmung >48 Stunden, Sepsis, Nierenversagen)

Intrazerebrale Blutung - Blutdrucksenkende Therapie

- Frühzeitige **Blutdrucksenkung**: Zielwert systolischer Druck <140 mmHg
- Kurzwirksame i.v. Medikation (gute Steuerbarkeit)
 - **Urapidil**: Initial fraktionierte Injektion, nach Absenkung kontinuierliche Weiterführung über Perfusor 5-15 mg/h
↓ Dmg iv
 - Clonidin
 - Esmolol: Initialdosis und anschließend Erhaltungsdosis
 - **Keine Gabe von Nitraten** Nitrates haben eine vasodilatatorische Wirkung und können so über eine Steigerung des zerebralen Blutvolumens zu einer Erhöhung des intrakraniellen Drucks beitragen.
 - Nach Stabilisierung (überlappende) Umstellung auf orale Antihypertensiva

Normalisierung der Gerinnung bei Therapie mit Antikoagulantien

- Absetzen der Antikoagulation bzw. der Thrombozytenaggregationshemmer
- Gerinnungsnormalisierung bei bestehender Gerinnungsstörung bzw. vorheriger Therapie mit Antikoagulantien
- Antagonisierung
 - Heparin: **Protamin**
 - Vitamin-K-Antagonisten und erhöhte INR: **Vitamin K in Kombination mit Gerinnungsfaktoren**, um kurzfristige Gerinnungsnormalisierung zu erreichen
 - Dabigatran: Idarucizumab
 - Apixaban und Rivaroxaban: Andexanet alfa
 - Unspezifisch: Gerinnungsfaktorenkonzentrat PPSB oder FFP
 - Nachteile von gefrorenem Frischplasma (FFP) gegenüber Prothrombinkonzentrat (PPSB):
 - Muss **AB0-kompatibel** transfundiert werden bzw. im Notfall Infusion von Plasma der Blutgruppe AB (Universalspender für Plasma)
 - **Große Volumina** notwendig (zeitaufwändig, Gefahr der unerwünschten Volumenbelastung)
- Therapieempfehlungen und Dosierungen: Siehe Antagonisierung der Antikoagulation
- Besonderheit: **Keine prokoagulatorischen Substanzen** (etwa rFVIIa) bei spontaner ICB

Hirndrucktherapie

- Faktoren für Hirndrucksteigerung
 - Hämatom
 - Perifokallödem
 - Ggf. Hydrozephalus
 - Ggf. sekundäre Ischämien
- Indikation: Intrakranieller Druck (ICP) >20 mmHg
- Maßnahmen
 - Oberkörperhochlagerung um 30°
 - Suffiziente Analgosedierung
 - Osmotische Hirndrucktherapie
 - Glycerin
 - Mannitol 20% 100ml iv 6x1/Tag/5 Tage dann 3xTag/Tag dann 2xTag/7 Tag
 - Kontrolle: Serumosmolarität 2x/Tag (Zielwert: 300–320 mOsm)
 - Externe Ventrikeldrainage (EVD) bei Hydrozephalus
 - Zieldruck 15–20mmHg
 - Durchführung: Operative Anlage in Vorderhorn eines Seitenventrikels
 - Funktionen
 - Ableitung von Liquor
 - Messung des intrakraniellen Drucks über integrierten Druckwandler
 - Komplikation: Hohes Risiko für Ventrikulitis und/oder Meningitis von mind. 5%
 - Tägliche Kontrolle der Einstichstelle
 - Strikte Anwendung aseptischer Arbeitstechniken
 - Diagnostische Liquorentnahmen (Entzündungszeichen?) , bei auffälligen Werten Liquorkultur und kalkulierte antibiotische Therapie
 - Hyperventilation
 - Hyperventilation $\rightarrow pCO_2 \downarrow \rightarrow$ Zerebrale Gefäße kontrahieren \rightarrow Cerebral Blood Pressure (CBP) \downarrow und Cerebral Blood Volume (CBV) $\downarrow \rightarrow$ ICP \downarrow
 - Bei intrazerebraler Blutung unzureichend untersucht, nur vorübergehend mit Ziel- pCO_2 30–35 mmHg möglich
 - Hypothermie
 - Hämatomevakuuation (s.u.)
 - Nicht empfohlen: Dexamethason

nicht mehr?

Operative Therapie (Hämatomevakuuation)

- Immer eine Einzelfallentscheidung
- Faktoren für den Entscheidungsprozess: Lokalisation und Ausmaß der Blutung, Ventrikeleinbruch, Vigilanz, Alter, Begleiterkrankungen
 - Bei supratentoriellen Blutungen ist ein genereller Nutzen der operativen Therapie nicht nachgewiesen
 - Kleinhirnblutungen mit Gefahr einer raumfordernden Wirkung (Kompression/Verlagerung IV. Ventrikel, Vigilanzverschlechterung) sollten schnell operiert werden
 - Nicht operiert werden:
 - Thalamus- und Hirnstammlutungen
 - Ausgedehnte Blutungen mit infauster Prognose

Operatives Vorgehen

- Supratentorielle Blutung
 - Kraniotomie mit konventioneller Hämatomausräumung
 - Stereotaktische Hämatomaspiration
 - Endoskopische Hämatomausräumung
 - Entlastungskraniektomie in Ausnahmefällen
- Kleinhirnblutung: Kraniotomie
 - Mit Lobektomie (wenn Großteil einer Kleinhirnhemisphäre betroffen)
 - Mit dekompressiver Trepanation ohne Hämatomausräumung
 - Mit konventioneller Hämatomausräumung, ggf. mit zusätzlicher subokzipitaler Trepanation
- Prinzipien
 - Kurze Zugangswege unter Umgehung funktionell wichtiger Kortexareale („eloquente Areale“) zur Vermeidung eines Zugangstraumas
 - Bei oberflächennahen Blutungen eher konventionelle Hämatomausräumung, bei tiefer gelegenen Blutungen eher andere Verfahren
 - Je nach Blutungsursache: Zusätzlich Biopsie aus Tumorgewebe, Resektion von arteriovenösen Malformationen

Thromboseprophylaxe

- Frühe Mobilisierung
- Medikamentöse Thromboseprophylaxe
 - Niedermolekulare Heparine
 - Unfraktionierte Heparine (PTT-Kontrolle)
 - Heparinoide
- Alternativ: Intermittierende pneumatische Kompression bei immobilen Patienten (in Deutschland kaum verbreitet)

Meningitis (Hirnhautentzündung) +

Definition

- **Meningitis:** Entzündung der Hirnhäute (und Rückenmarkshäute)
- **Enzephalitis:** Entzündung des Gehirns
- **Meningoenzephalitis:** Kombinierte Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten

Ätiologie

• Akute bakterielle Meningitis

- **Infektionsweg**
 - Direkte Übertragung von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion
 - Hämatogene Streuung
 - Kontinuierliche Ausbreitung
- **Erregerspektrum abhängig vom Erkrankungsalter**
 - **Kinder**
 - Alter ≤ 6 Wochen: Streptococcus agalactiae und E. coli
 - Alter > 6 Wochen: Pneumokokken, Meningokokken wie Erwachsene
 - **Erwachsene:** Pneumokokken, Meningokokken

• Akute virale Meningitis

- Entero- (bzw. Coxsackie-) Viren

• Weitere Formen

Bakterien (mit subakutem Verlauf): Tuberkulöse Meningitis, Neuroborreliose, **Pilze**, **Parasiten**

Symptome/Klinik

Allgemein

- **Kopfschmerzen, Meningismus und hohes Fieber**
- Ggf. Übelkeit, Erbrechen, Lichtscheu „Photophobie“, Unruhe, Verwirrtheit, Vigilanzstörung, Hyperästhesie, Paresen, Krampfanfälle
- Bei Meningokokken-Meningitis Hautveränderungen: hämorrhagische petechiale Exantheme bis hin zur Purpura fulminans mit Hautnekrosen





Bei Säuglingen und Kleinkindern

- **Fieber, Erbrechen**
- Bei 40% **gespannte Fontanelle**
- Der sonst typische Meningismus kann fehlen

Diagnostik

Klinische Untersuchung (Prüfen auf Meningismus)

- **Nackensteifigkeit:** Opisthotonus ist ein Krampf vor allem in der Streckmuskulatur des Rückens.
- **Brudzinski-Zeichen:** Bei der Prüfung auf Nackensteifigkeit kommt es zum reflexartigen Anziehen der Beine.
- **Kernig-Zeichen:** Im Rückenlage wird das Bein in Hüft- und Kniegelenk je 90° gebeugt und dann durch den Untersucher im Kniegelenk gestreckt. Bei meningealer Reizung kommt es zu Schmerzen und muskulärem Widerstand.
- **Lasègue-Zeichen:** Im Rückenlage wird das Bein passiv durch den Untersucher in der Hüfte gebeugt. Ab einem bestimmten Beugungswinkel kommt es zu Nervendehnungsschmerz mit reflektorischer Beugung des Kniegelenks



Brudzinski-Zeichen

1 Definition

Das **Brudzinski-Zeichen** ist ein klinisches Zeichen, das im Rahmen einer **neurologischen Untersuchung** überprüft wird. Es weist unter anderem auf das Vorliegen einer **Meningitis** oder einer **Subarachnoidalblutung** hin.

2 Prüfung

Der Patient wird flach auf dem **Rücken** gelagert. Der Untersucher beugt den **Kopf** kräftig im **Nacken** (**Ventralflexion**). Das Brudzinski-Zeichen ist positiv, wenn der Patient die **Knie** anzieht.

Kernig-Zeichen

1 Definition

Das **Kernig-Zeichen** ist ein klinisches Zeichen, das im Rahmen einer neurologischen Untersuchung überprüft wird. Es dient dem Nachweis eines **Nervendehnungsschmerzes**.

2 Prüfung

Der Patient wird flach auf dem Rücken gelagert. Die **Beine** werden bei gestrecktem **Knie** im **Hüftgelenk** gebeugt. Beugt der Patient dabei aufgrund von Schmerzen die **Knie**, ist das Kernig-Zeichen positiv.

Alternativ kann das Kernig-Zeichen durch Beugung des Beines im Hüftgelenk mit gebeugten Knien erfolgen. Die Prüfung erfolgt dann durch ein Strecken der Beine im Kniegelenk. Ist das Ausstrecken im Kniegelenk schmerzhaft, liegt ebenfalls ein positives Kernig-Zeichen vor.

Neben dem **Brudzinski-** und dem **Lasègue-Zeichen** dient die Überprüfung des Kernig-Zeichens vor allem der Diagnose eines **Meningismus**.

Labor/Mikrobiologische Untersuchungen

Liquordiagnostik/Liquorpunktion

Bakterien:-
 ↑ Zellzahl
 ↓ Glucose
 ↑ Protein
 ↑ Laktat

| | Erscheinung | Zellart | Zellzahl/ μ L | Laktat | Eiweiß | Glucose |
|------------------------|----------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------------|--|
| Referenzwerte | Klare Flüssigkeit | | <5 | 1,5–2,1 mmol/L | 150–400 mg/L | 2,7–4,2 mmol/L (Liquor/Serum-Quotient: >0,5) |
| Bakterielle Meningitis | Trübe, eitrige Flüssigkeit | Granulozytose | Erhöht, >1.000 | ↑ erhöht | ↑ Erhöht | ↓ Vermindert |
| Virale Meningitis | Klare Flüssigkeit | Lymphozytose | Erhöht, < 500 | Normal | Normal bis leicht erhöht | Normal |
| Tuberkulöse Meningitis | Klare Flüssigkeit | Lymphozytose Monozytose Granulozytose | Erhöht, < 500 | ↑ Erhöht | ↑ Erhöht | ↓ Vermindert |
| Neuroborreliose | Klare Flüssigkeit | Lymphozytose | Erhöht, < 500 | Normal | ↑ Erhöht | Normal |

Die tuberkulöse Meningitis kann aufgrund des ähnlichen Zellbefundes leicht mit einer Virusmeningitis verwechselt werden. Zusätzliche Diagnostik bei tuberkulöser Meningitis: PCR

Blutuntersuchung

- Differentialblutbild, CRP, (Procalcitonin), Elektrolyte, Glucose, Blutkultur
- „Typischerweise zeigen sich eine Leukozytose mit Neutrophilie und Linksverschiebung (Aufreten von unreifen Granulozyten) und eine CRP-(sowie Procalcitonin-)Erhöhung!“
- „Zum Ausschluss von erhöhtem Hirndruck wird bei entsprechender Klinik vor der Liquorpunktion ein kraniales CT durchgeführt.“

Therapie

Diagnostisch-therapeutische Vorgehensweise bei Meningitis

- Vorgehen nach Aufnahmebefund:** Bei Kontraindikationen gegen eine unmittelbare diagnostische Liquorpunktion sofort kalkulierte Antibiotikatherapie
 - Patienten **OHNE Bewusstseinsstörung bzw. fokal-neurologisches Defizit:** Liquorpunktion und Blutkulturen → Glucocorticoide i.v. vor der 1. Antibiotikagabe → Kalkulierte Antibiotikatherapie („erst Liquor, dann Antibiotika!“)
 - Patienten **MIT Bewusstseinsstörung bzw. fokal-neurologischem Defizit:** Blutkulturen → Glucocorticoide i.v. vor der 1. Antibiotikagabe → Kalkulierte Antibiotikatherapie → **Schädel-CT** → Liquorpunktion, wenn keine Kontraindikation im CT („erst CT, dann Liquor!“)

„Die Antibiotikagabe ist die absolut wichtigste Maßnahme und muss so schnell wie möglich erfolgen, jede Verzögerung ist prognostisch ungünstig!“

Weiteres Vorgehen

- Überwachung und supportive Therapie:** Aufnahme auf die Intensivstation und Behandlung von Komplikationen
- Fokussuche:** Ggf. operative Fokussanierung

Kalkulierte Antibiotikatherapie bei Meningitis

- Ambulant erworbene Meningitis:** Cephalosporin der 3. Generation i.v. (z.B. Ceftriaxon) und Ampicillin i.v. (Zur Abdeckung von Listerien)
 - Nosokomial erworbene Meningitis:** Vancomycin + Meropenem. Ggf. +Metronidazol
- „Nach einer Cephalosporintherapie über 24 Stunden gelten Patienten nicht mehr als kontagiös!“

2gr 1-0-1

206/10

10-1-1

20-1-1

wenn nach OPs (neurochirurgisch)

- Überwachung und supportive Therapie: Aufnahme auf die Intensivstation und Behandlung von Komplikationen (bspw. Ausgleich evtl. auftretender Elektrolytstörungen, Behandlung eines Endotoxinschocks bei Meningokokken-Meningitis)
- Bei erhöhtem Hirndruck: Hirndrucksenkende Maßnahmen (Oberkörperhochlagerung um 30°, Osmotherapie, ggf. Liquordrainage)
- Bei Krampfanfällen/Epilepsie-typischen Potentialen im EEG: Antikonvulsive Therapie
- Bei septischer Sinusvenenthrombose: Antikoagulation
 - Siehe auch: Therapeutische Antikoagulation - klinische Anwendung
- Fokussuche
 - Insb. HNO-ärztliche Konsiliaruntersuchung und Suche nach einem parameningealen Entzündungsherd im CT oder MRT (z.B. Sinusitis)
 - Ggf. operative Fokussanierung noch am Aufnahmetag
- Schutz von Kontaktpersonen: Postexpositionsprophylaxe bei Meningitis bedenken und Kontaktpersonen dokumentieren (Postexpositionsprophylaxe von Kontaktpersonen o.ä. wird nach Meldung durch das Gesundheitsamt organisiert)
- Reevaluation nach 2 Tagen
 - Bei unveränderter oder verschlechterter Klinik: Hinterfragen
 - 1 der Wirksamkeit der begonnenen Antibiotikatherapie
 - 2 eines unter der Therapie persistierenden Infektfokus
 - 3 eines etwaigen Vorliegens intrakranieller Komplikationen
 - Bei stabiler bzw. bessernder Klinik: Ggf. Deeskalation der Antibiotikatherapie nach Erregernachweis bzw. Resistogramm

Akute virale Meningitis

- **Unkomplizierte Virusmeningitis** : Symptomatische Therapie (Analgetika/Antipyretika)
- **Bei Enzephalitis mit Verdacht auf eine Herpesvirus-Ätiologie** : Sofortige Gabe von Aciclovir i.v.! *10 mg/Kg alle 8 St. / Neugeborene 60 mg/Kg/d*

Tuberkulösen Meningitis

- **Tuberkulostatische Kombinationstherapie**: Initial 4er-Kombination über 2 Monate. Anschließend 2er-Kombination über weitere 10 Monate
 - **plus Glucocorticoide** (Prednisolon)
Prednisolon 40 mg pro Tag p.o., Dosisreduktion nach 2–3 Wochen in Schritten von 10 mg/Woche, insg. Dauer über 6–8 Wochen, bei tuberkulostatischer Therapie ohne Rifampicin Halbierung der Dosis
- Initial 4er-Kombination über 2 Monate: Isoniazid + Rifampicin + Pyrazinamid + Streptomycin
◦ Anschließend 2er-Kombination über weitere 10 Monate: Isoniazid + Rifampicin

Komplikationen

Allgemeine Komplikationen der bakteriellen Meningitis

- Neurologisch
 - Hirnödem
 - Vestibulokochleäre Schädigung (Taubheit, Schwindel)
 - Seltener: Hirnabszess, Hydrozephalus, subdurales Empyem
- Internistisch
 - Sepsis, Verbrauchskoagulopathie
 - ARDS (Akute respiratory disease syndrom)

Waterhouse-Friderichsen-Syndrom

- Tritt meist in Zusammenhang mit der Meningokokken-Meningitis auf.
- **Pathophysiologie** : Freisetzung von Endotoxinen → Septischer Schock, disseminierte intravasale Gerinnung (DIC)
- **Klinik** : Klassische Meningitissymptome. Petechiale Haut- und Schleimhaut-einblutungen bis zur Purpura fulminans mit ausgedehnten Nekrosen. Schocksymptomatik mit Multiorganversagen

Prognose

Bakterielle Meningitis

- **Letalität**
 - Unbehandelt fast 100%
 - Unter Therapie abhängig von Allgemeinzustand, Immunkompetenz und Alter des Patienten sowie ursächlichem Erreger
- **Neurologische Residuen**: 10–40% der Meningitisfälle
 - Hörstörungen treten insb. nach Pneumokokken-Meningitis auf

Virale Meningitis: Bei unkompliziertem Verlauf meist spontane Abheilung

Prävention

- **Meningokokkenimpfung**
- **Hib-Impfung** (Haemophilus influenzae Typ b)
- **Pneumokokkenimpfung**
- **FSME-Impfung** **Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)**
- **Prophylaxe bei Kontaktpersonen** : Rifampicin 7 bis 10 Tagen bei Meningokokken, Haemophilus influenzae

Meldepflicht

- **Arztmeldepflicht**: Namentliche Meldepflicht bei Verdachts-, Krankheits- oder Todesfällen einer Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis

Prophylaxe bei Kontaktpersonen

Mittel der Wahl für Kinder ist Rifampicin. Bei Neugeborenen im 1. Lebensmonat beträgt die Dosis $2 \times 5 \text{ mg/kg KG/Tag}$ ebenfalls für 2 Tage. Es wird bei Säuglingen (ab dem 2. Lebensmonat), Kindern und Jugendlichen bis 60 kg über 2 Tage in einer Dosierung von $2 \times 10 \text{ mg/kg KG/Tag}$ gegeben (maximale ED 600 mg). Jugendliche ab 60 kg und Erwachsene erhalten $2 \times 600 \text{ mg/Tag}$ für 2 Tage. Für Erwachsene ist außerdem Ciprofloxacin (einmalige Dosis 500 mg p. o.) für die Chemoprophylaxe zugelassen. Weiterhin ist eine Prophylaxe mit Ceftriaxon (nur i. m. Applikation) mit einer einmaligen Gabe von 125 mg bei Kindern unter 12 Jahren und 250 mg bei Kontaktpersonen über 12 Jahren möglich. Bei Schwangeren ist Ceftriaxon das Mittel der Wahl. Das darin enthaltene Lidocain gilt in dieser einmaligen Dosierung trotz des generellen Hinweises der Roten Liste auf eine Kontraindikation von Lidocain als unbedenklich in der Schwangerschaft (Schaefer C, et al. 2006). Alle drei Präparate führen mit hoher Sicherheit zur Eradikation von Meningokokken im Nasopharynx (Zalmanovici Trestioreanu A, et al. 2011).

Bei stationären Patienten mit einer Meningokokken-Infektion, die eine Therapie mit Penicillin G erhalten haben, wird ebenfalls eine Chemotherapie wie oben beschrieben vor der Entlassung aus dem Krankenhaus empfohlen, da Penicillin G nicht zu einer Eradikation der Erreger im Nasen-Rachen-Raum führt

Multiple Sklerose (MS...) +/-

- Die Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata) ist eine **chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems**. Kennzeichnend sind **herdförmige ZNS-Läsionen**, die durch Demyelinisierung von Nervenfasern und axonale Schäden geprägt sind.
- ♀ > ♂. Häufigkeitsgipfel um 30. Lebensjahr

Ätiologie

Die Ursache der Multiplen Sklerose ist **unbekannt!**

Pathophysiologie

- Noch ungeklärt. Die MS wird als Autoimmunerkrankung angesehen.

Symptome/Klinik

Verlauf

- Symptomatik **beginnt meist schubförmig** und **monosymptomatisch**
 - Vollständige oder unvollständige Symptomrückbildung innerhalb von Tagen bis Wochen
- Auch langsame stetige Behinderungszunahme möglich

Symptome

Je nach Lage der Läsionen sind vielfältige neurologische Symptome möglich

- **Optikusneuritis** : Entzündung des Sehnervens (i.d.R. **Retrobulbärneuritis**) → häufiges Frühsymptom. I.d.R. einseitig.
- **Störung der Okulomotorik** : Doppelbilder durch Augenmuskelparesen.
- **Sensibles Defizit** im Versorgungsbereich des N. trigeminus (V). Fazialisparese
- **Sensibilitätsstörungen** : Parästhesien. Hypästhesien. Dysästhesien
- **Motorische Störungen** : Zentrale Paresen.
- **Ataxie** : Störung der Bewegungskoordination
- **Vegetative Symptome** : Blasenstörungen
- **Schmerzen**. Asthenie

Diagnostik

1. **Anamnese und Untersuchungsbefund** → Verdachtsdiagnose einer entzündlich-demyelinisierenden Erkrankung des ZNS
2. Ausschluss von Differentialdiagnosen (mittels **MRT-Bildgebung** und Labordiagnostik)
3. Nachweis der zeitlichen und örtlichen Dissemination („Streuung“) von Läsionen (Klinik, MRT) → Diagnosestellung gemäß McDonald-Kriterien

Differentialdiagnosen

- Neuromyelitis optica
- Neurosyphilis. Chronische Neuroborreliose
- Vitamin-B₁₂-Mangel

Therapie

Schubtherapie

Glucocorticoid-Hochdosistherapie

Verlaufsmodifizierende Therapie

Interferon β

Symptomatische Therapie

Physiotherapie. Ergotherapie. Logopädie. Psychotherapie

„Eine kurative MS-Therapie existiert bisher nicht“

Prognose

- Behinderung : Nach 15 Jahren 50% der Patienten mit Gehhilfe
- Lebenserwartung: Durchschnittlich 6–7 Jahre reduziert



Epilepsie +-

Definition

- **Epilepsie:** Überbegriff für Erkrankungen, die sich durch eine Übererregbarkeit der Neurone der Hirnrinde (cortex) auszeichnen (caractériser).
- **Epileptischer Anfall:** Transitorische, plötzliche Dysfunktionen des zentralen Nervensystems aufgrund von synchronen und hochfrequenten Entladungen (déchargement) der Nervenzellen der Hirnrinde.

Ätiologie

Ursachen einer erhöhten Epileptogenität

- **Hirnerkrankungen:** Hirntumor, intrazerebrale Blutung, Enzephalitis
- **Metabolisch:** Hypoglykämie, Hyponatriämie
- **Idiopatisch/Genetisch**
- **Kryptogen** (Unbekannte Ursache)

Trigger epileptischer Krampfanfälle

- **Alkoholentzug** (häufigste Ursache im Erwachsenenalter). **Drogenintoxikation** (Kokain).
- **Fieber** (häufigste Ursache im Kindesalter), **Hyponatriämie**, **Hypoglykämie**
- **Schlafentzug**

Klassifikation

Fokale Krampfanfälle

Auf definierte Regionen des Gehirns beschränkt

- **Einfach-fokal:** Fokale Anfälle **ohne** Bewusstseinsstörung
- **Komplex-fokal:** Fokale Anfälle **mit** Bewusstseinsstörung
- **Fokale Anfälle mit sekundärer Generalisierung**

Primär generalisierte Krampfanfälle

Sie betreffen von Anfang an beide Großhirnhemisphären.

- **Tonisch-klonischer Anfall** (Grand-mal-Anfall) : Häufigste Anfallsform
- **Absencen** : Manifestation zumeist im Kindesalter
- **Klonische Anfälle. Tonische Anfälle. Atonische Anfälle**

Symptome/Klinik

Fokale Krampfanfälle

Orale Automatismen (Temporallappenanfälle). Komplexe Bewegungsabläufe (Frontallappenanfälle). Visuelle Halluzinationen (Okzipitallappenanfälle)

Primär generalisierte Krampfanfälle (Tonisch-klonischer Anfall)


- Ggf. **Aura** (Sehstörungen, Sprachstörungen)
- **Bewusstseinsstörungen**
- **Klonische Phasen:** Muskelzuckungen
- **Tonische Phasen:** Muskelspannung
- **Atonische Phasen:** Tonusverlust
- **Postiktale Phase:** Terminalschlaf, Verwirrtheit

Diagnostik

- **Anamnese und Fremdanamnese**
- **Labor:** Blutzucker, Elektrolyte
- **EEG:** Nachweis typischer Potentiale, z.B. Spikes, Sharp-Waves, Hypsarrhythmie. Allerdings interiktal häufig ohne auffälligen Befund
- **cMRT (ggf. cCT)**

Triggerfaktoren epileptischer Krampfanfälle [6][7][8][9]

- **Substanzabhängige Trigger**
 - Einnahme von **Drogen** (bspw. **Alkohol**, Ecstasy, Amphetamine, Kokain)
 - Einnahme von **Medikamenten**, welche die Krampfschwelle senken, bspw.
 - **Antidepressiva** (Amitriptylin, Clomipramin, Maprotilin, Bupropion, Amoxapin) [10]
 - **Antipsychotika** (Clozapin, Olanzapin, Haloperidol)
 - **Antibiotika** (insb. hochdosiertes **Penicillin**, seltener Carbapeneme, Cephalosporine, Norfloxacin, Ciprofloxacin) [11]
 - **Analgetika** (Alfentanil, Indometacin, Tramadol)
 - **Antiemetika** (Metoclopramid, Ondansetron)
 - Theophyllin
 - Methohexital
 - Evtl. Clonidin
 - Entzug: Insb. **Alkoholentzug** (häufigste Ursache bei Erwachsenen), Medikamentenentzug
- **Trigger im Rahmen anderer Erkrankungen**
 - **Fieber** (häufigste Ursache bei Kindern)
 - **Elektrolytentgleisungen** (bspw. Hyper- und Hyponatriämie, Hypokalzämie, Hypomagnesiämie)
 - **Hypoglykämie** (v.a. durch Insulinüberdosierung)
 - **Eklampsie**
 - **Epilepsie nach ischämischem Schlaganfall**
- **Situationsabhängige Trigger**
 - Exzessive körperliche Verausgabung
 - **Extremer psychischer Stress**
 - **Schlafentzug**
 - **Stroboskop-Licht**
 - **Hypoxie**
 - **Hyperventilation**



EEG-Kriterien eines epileptischen Anfalls

- **Klarer Anfang und klares Ende**
- Steigerung der **Amplitude** im Verlauf
- Veränderung der **Frequenz** im Verlauf

Differentialdiagnosen

- Synkopen
- Hypoglykämie
- Psychogene Anfälle
- Narkolepsie (Schlafkrankheit) : imperativer Schlafdrang am Tag

Therapie

Allgemeinmaßnahmen

- Bei symptomatischen Epilepsien: **Beseitigung** (élimination) **der Ursache**
- **Trigger meiden** (Alkohol, Schlafentzug, Flickerlicht)

Medikamentöse Anfallsprophylaxe (Antikonvulsiva)

- **Indikation** : 2 Anfälle / 6 Monate
- **Fokal (auch sekundär generalisiert)** : **Lamotrigin**
- **Primär generalisiert und Absencen** : **Valproat**
- **Therapieende** : grundsätzlich nach 2 Jahren Anfallsfreiheit und bei unauffälligem EEG möglich

Operative Therapie (bei Pharmakoresistenz)

- **Kallosotomie** (Durchtrennung des Corpus callosum)

Status epilepticus

Definition

>5 Minuten anhaltender generalisierter tonisch-klonischer Anfall oder >20–30 Minuten anhaltender fokaler Anfall oder rezidivierende epileptische Anfälle in kurzer Abfolge

Therapie

- **Benzodiazepin (Lorazepam i.v.)**

Komplikationen

- Entwicklung eines Hirnödems
- Elektrolytstörungen (Hyperkaliämie, Hyponatriämie)
- Metabolische Azidose oder/und respiratorische Azidose
- Rhabdomyolyse, akutes Nierenversagen

Prognose

- Letalität: Etwa 10%

Prognose

Rezidivrisiko

- Nach einmaligem tonisch-klonischen Anfall: ca. 40%
- Nach zweimaligem tonisch-klonischen Anfall: ca. 90%

Anfallsfreiheit (unter optimaler Therapie)

- Bei 90% der Patienten mit idiopathischer Epilepsie
- Bei 60% mit kryptogener oder symptomatischer Epilepsie

1. Stufe Benzodiazepine
Midazolam 0,2mg/Kg iv od. im max 10mg
Diazepam 0,15–0,2mg/Kg iv
0,2–0,5mg rektal max 20mg

2. Stufe Antikonvulsiva
Valproat 40mg/Kg iv max 3000mg
Phenytoin 20mg/Kg im max 50

3. Stufe Inhibitionsanaloge
Propofol 2mg/Kg dann 10mg/Kg/24h
Midazolam 0,2mg/Kg 2mg/Kg/24h

Benzodiazepine binden an den GABA A -Rezeptor und erhöhen die Affinität für GABA. Die Gammaaminobuttersäure (GABA) ist ein inhibitorischer Neurotransmitter.

NW Gehirnschwerheit, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Antigravitationsamnesie
Toleranzentwicklung, Abhängigkeit.

Stufentherapie des Status epilepticus (SE) Personen >40 kgKG

- Atemwege freihalten
- Intubationsbereitschaft sicherstellen
- O₂-Insufflation
- i.v. Zugang
- Blutentnahme
- BZ-Schnelltest/BGA

5 min nach
Anfallsbeginn

1. Stufe – Benzodiazepin-Bolusgabe

Nur ein Wirkstoff, Unterdosierung vermeiden!
Bolus ggf. einmal wiederholen

Bei etabliertem i.v. Zugang

- **Lorazepam** 0,1 mg/kgKG, max. 4 mg/Bolus
- Oder: **Clonazepam** 0,015 mg/kgKG, max. 1 mg/Bolus
- Oder: **Midazolam** 0,2 mg/kgKG, max. 10 mg/Bolus
- Oder: **Diazepam** 0,15–0,2 mg/kgKG, max. 10 mg/Bolus

Bei fehlendem i.v. Zugang

- **Midazolam i.m.** 10 mg/Bolus
- Oder: **Diazepam rektal** (einmalig!) 0,2–0,5 mg/kgKG, max. 20 mg
- Oder: **Midazolam bukkal** 5–10 mg/Bolus

max. 30 min n.
Therapiebeginn

Bei Benzodiazepin-refraktärem SE:

2. Stufe – Antikonvulsiva-Aufsättigung i.v.
Mehrere Wirkstoffe nacheinander einsetzbar

1. Wahl:

- **Levetiracetam** 30 mg/kgKG, max. 4.500 mg über >10 min
- **Valproat** 40 mg/kgKG, max. 3.000 mg über >10 min
- **Fosphenytoin** 20 mg/kgKG, max. 1.500 mg über >10 min

2. Wahl:

- **Phenytoin** 20 mg/kgKG, max. 50 mg/min (über separaten Zugang!), Zielspiegel: 20–25 µg/mL
- **Phenobarbital** 15–20 mg/kgKG, max. 100 mg/min, Zielspiegel: 30–50 µg/mL
- **Lacosamid** 5 mg/kgKG über 15–30 min, max. 200 mg/15 min

max. 60 min n.
Therapiebeginn

Bei refraktärem SE:

3. Stufe – Intubationsnarkose auf ITS
Bei SE ohne Bewusstseinsstörung im Einzelfall

Unter kontinuierlichem EEG-Monitoring (Ziel: Burst-Suppression-Muster)

- **Propofol** 2 mg/kgKG Bolus, dann 4–10 mg/kgKG/h für 24 h
- Oder/und: **Midazolam** 0,2 mg/kgKG Bolus, dann max. 2,9 mg/kgKG/h für 24 h
- Oder: **Thiopental** 5 mg/kgKG Bolus, dann 0,5–5 mg/kgKG/h für 24 h

Schnellstmögliche Ursachensuche inkl. cCT, Labordiagnostik, evtl. Liquoruntersuchung
siehe: Koma unklarer Ätiologie und Diagnostik nach epileptischem Anfall

Polyneuropathie (PNP) +/-

Erkrankung, bei der mehrere, meist periphere Nerven durch eine systemische Erkrankung in Mitleidenschaft gezogen werden.

Ätiologie

Die Ursachen sind vielfältig. Häufigste Ursachen: **Diabetes mellitus** und **Alkoholkonsum**

- **Metabolisch**: Diabetes mellitus
- **Exogen**: Alkohol. Schwermetalle (Blei). Medikamente (z.B. Chemotherapeutika)
- **Hereditär**: Amyloidose
- **Entzündlich**: Vaskulitiden, Kollagenosen
- **Infektiös**: Bakteriell (Borreliose). Viral (HIV)
- **Paraneoplastisch**: kleinzelliges Bronchialkarzinom

Symptome/Klinik

- Sensibilitätsstörungen und Missempfindungen: Meist **distal symmetrisch** und **schmerzhaft**
- Parästhesien: Kribbeln, "Ameisenlaufen"
- Störung des Vibrationsempfindens (Pallästhesie) und der Temperaturwahrnehmung
- **Vegetative Störungen**: Orthostatische Dysregulation, Blasenentleerungsstörungen

Diagnostik

Neurologische Untersuchung

- Sensibilitätsprüfung: Pallhypästhesie, Hypästhesie, Hypalgesie
- Prüfung der Motorik: (Atrophische) Paresen
- Reflexstatus: Meist reduzierte Eigenreflexe
- Koordinations- und Gleichgewichtsprüfung: Ataxie

Labordiagnostik

- Blutbild, BSG, Entzündungsparameter, Diabetischer Status, Elektrophorese, Vitamin-B12- und Folsäure-Spiegel, Nachweis von Giftstoffen (Blei, Thallium, Arsen), Delta-Aminolävulinsäure (Porphyrie, Bleibelastung), Borrelien-Antikörper...

Apparative Diagnostik

- **Neurophysiologische Untersuchung**

| Schädigungsart | Elektro-neurographie (ENG) | Elektromyographie(EMG) |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Axonal Bspw. bei alkoholtoxischer oder asymmetrischer diabetischer PNP | Reduzierte Amplitude der Potentiale | Pathologische Spontanaktivität |
| Demyelinisierend Bspw. bei symmetrischer diabetischer PNP | Reduzierte Nervenleitgeschwindigkeit | Meist unauffälliger Befund |

- **Weitere mögliche Diagnostik**: Ggf. Nerven-Muskelbiopsie

Differentialdiagnosen

- Periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Funikuläre Myelose
- Tabes dorsalis *Neurosyphilis*
- Radikuläre Syndrome

Therapie

Kurativ

- Behandlung der Grunderkrankung!

Symptomatisch

- Antidepressiva (Amitriptylin), Antikonvulsiva (Carbamazepin, Pregabalin)
- Analgetika: Opioide

Sonstiges +-

Fazialisparese

periphere Fazialisparese

- **Ätiologie** : meist idiopathisch, kann aber auch andere Ursachen haben (Neuroborreliose, Zoster oticus, Verletzungen im Verlauf des Nervus facialis).
- **Klinik**: Ipsilateraler Ausfall der mimischen Muskulatur (Hängender Mundwinkel, Fehlender Lidschluss, Stirnrunzeln nicht möglich).
- **Therapie**:
 - Die idiopathische Fazialisparese wird für einige Tage mit Prednisolon behandelt. Die Prognose ist relativ gut.
 - Bei erregerbedingten Fazialisparenen wird antibiotisch (bei Neuroborreliose) oder antiviral (bei Zoster oticus) behandelt.

zentrale Fazialisparese

- **Ätiologie** : Ischämischer oder hämorrhagischer Schlaganfall, Multiple Sklerose, Raumforderungen
- **Klinik** : kontralateraler Ausfall der mimischen Muskulatur → Kontralateral hängender Mundwinkel, Lidschluss und Stirnmuskulatur sind nicht betroffen (Der Grund dafür ist, dass die obere Gesichtshälfte von beiden motorischen Großhirnhemisphären versorgt wird)

Guillain-Barré-Syndrom

- **Erkrankung des peripheren Nervensystems**, die **meist nach Infekten** ^{z.B. (Reise?)} auftritt. ^{- nach OP od. Schwangerschaft}
^{- nach Impfungen}
- **Symptome**: aufsteigende und **symmetrische Lähmungen** (Atemmuskulatur kann betroffen)
- **Pathophysio**: akute, entzündliche und **demyelinisierende Polyneuropathie**, **verursacht durch Autoantikörper**
- **Diagnostik**: **starke Eiweißerhöhung ohne Zellvermehrung im Liquor** sowie **Demyelinisierungszeichen in der Elektroneurographie**. ^{ENG}
- **Kpl**: Atemlähmungen, Lungenembolien
- **Therapie** : **Immunglobuline**. Ggf. **Plasmapherese**.
- **Prognose**: meistens ist der Verlauf günstig. Meistens entwickeln sich die Symptome in umgekehrter Reihenfolge unter Therapie wieder zurück.

Hirntumoren

- Sie können histologisch gut- oder bösartig sein. Bösartige Tumoren sind durch Infiltration von hirneigenem Gewebe rasch lebenslimitierend, aber auch gutartige Tumoren gehen nicht selten mit einer schlechten Lebenserwartung einher (durch Einklemmungen aufgrund einer Erhöhung des Hirndrucks).
- Erstsymptome stellen in der Regel **diffuse Kopfschmerzen** oder **epileptische Anfälle** dar. Die Lokalisation des Hirntumors bestimmt die klinischen Symptome; so können beispielsweise Tumoren des Frontalhirns durch psychische Veränderungen symptomatisch werden. Störungen des Bewusstseins und neurologische Ausfälle sind Spätsymptome oder Zeichen eines schnellen Tumorwachstums.
- Die Verdachtsdiagnose wird durch ein MRT bestätigt. Bei unklaren Befunden werden die Raumforderungen zunächst im Verlauf kontrolliert, Heilung verspricht jedoch nur die vollständige Entfernung des Tumors. Postoperativ kann mittels histologischer Differenzierung des Tumors in WHO-Grad I-IV eine grobe Prognose abgeschätzt werden. **Ist der Tumor bösartig, folgt oftmals eine Bestrahlung u./o. Chemotherapie**.
- WHO-Grad I (Mittlere Überlebenszeit >10 Jahre): Pilozytisches Astrozytom, Akustikusneurinom, Meningeom, Kraniopharyngeom
- WHO-Grad IV (Mittlere Überlebenszeit: < 2 Jahre): Glioblastom, Medulloblastom
- **Glioblastom** : **Häufigster maligner hirneigener Tumor**
- **Hirnmetastase**: Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Melanom

Das Delir ist ein komplexes hirnorganisches Syndrom, das durch eine akute Störung des qualitativen Bewusstseins, der Aufmerksamkeit, der kognitiven Funktionen (inkl. Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis), der Psychomotorik, des Schlaf-Wach-Rhythmus und der Emotionalität gekennzeichnet ist.

Akuter Verwirrheitszustand (Delir)

- geriatrische Notfallsituation, da lebensbedrohliche Ursachen (z.B. Hypoglykämie, Herzrhythmusstörung) vorliegen können.
- **Ätiologie:**
 - Störungen des Elektrolyt- und Wasserhaushaltes (Exsikkose, Hyponatriämie)
 - **Medikamente:** Psychopharmaka, Analgetika, Antibiotika, ...
 - Immobilisation, Operationen, Infektionen, Schlaganfall, Herzinsuffizienz
 - Schmerzen, Koprostase, Harnverhalt
 - Seh- und Hörstörungen
- **Klinik:**
 - akuter Beginn mit fluktuierendem Verlauf
 - Störungen des Bewusstseins und des Schlaf-Wach-Rhythmus
 - gestörte Psychomotorik, sowohl hypoaktive (Patient ist v.a. durch Folgen der Immobilität bedroht), wie auch hyperaktive Formen (häufigste Komplikation: Stürze)
 - emotionale Störungen
- **Basisdiagnostik:** Körperliche Untersuchung, Notfalllabor
- **Differenzialdiagnose:** Demenz
- **Therapie:**
 - **allgemeine Maßnahmen:** Überwachung, Rehydrierung bei exsikkierten Patienten, Absetzen aller nicht unbedingt notwendiger Medikamente
 - **Ggf. kausale Therapie**
 - **Psychopharmakotherapie:** vorübergehende Anwendung von niederpotenten Neuroleptika (z.B. Melperon), ggf. hochpotenten Neuroleptika (z.B. Haloperidol)

- **Prognose:** Nach Behandlung der Ursache meist reversibel

Demenz ist ein Syndrom als Folge einer meist chronischen oder fortschreitenden Krankheit des Gehirns mit Störung vieler höherer kortikaler Funktionen, einschließlich Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen.

Demenz

- erworbenes organisches Syndrom, das durch eine Störung höherer Hirnfunktionen zu einer Beeinträchtigung des Gedächtnisses mit Abnahme von Sprache, Urteilsvermögen, Denkvermögen und/oder Orientierung führt.

- Diese Defizite sind chronisch progredient und durch Medikamente nicht wesentlich beeinflussbar. Da dementielle Erkrankungen für Betroffene und Angehörige sehr belastend sein können, stellen psychosoziale Maßnahmen eine wichtige Therapiesäule dar.

- Ätiologie:

- **Primär:** Neurodegenerativ (Morbus Alzheimer ++, Morbus Parkinson,...), vaskulär
- **Sekundär:** Hypoxische Hirnschaden, Normaldruck-Hydrozephalus, Alkoholkrankheit, Morbus Wilson, Traumata, Blutungen oder Tumoren,...

- **Diagnostik:** Eigen- und Fremdanamnese, neuropsychologische Testung zur Objektivierung der Defizite, Blutuntersuchung.

- **Differentialdiagnostik:** Wichtig ist der Ausschluss sekundärer Formen und anderer Erkrankungen, die mit kognitiven Defiziten einhergehen (Depression, Delir)

Morbus Alzheimer -

- häufigste Form der Demenz. Je nach Eintrittsalter unterscheidet man zwischen präseniler (vor 65 Jahren) und seniler (nach 65 Jahren) Demenz.
- Die Alzheimer-Demenz äußert sich durch Gedächtnisstörungen (wobei das Langzeitgedächtnis noch lange erhalten bleibt) sowie Orientierungsstörungen.
- Histopathologisches Korrelat: „Amyloid-Plaques“
- Die genaue Pathogenese ist unklar.
- Neben Anamnese und körperlicher Untersuchung können diagnostische Hinweise durch neuropsychologische Testung, Liquordiagnostik und Bildgebung gewonnen werden. Zur Diagnosestellung ist der Ausschluss anderer Ursachen wichtig.
- Da eine kurative Therapie bisher nicht existiert, kann lediglich eine symptomatische Therapie mit Acetylcholinesterasehemmern oder NMDA-Antagonisten (Memantine) versucht werden.

- Die mittlere Überlebensdauer beträgt 8 Jahre.

Trigeminusneuralgie -

- Gesichtsschmerzen, begrenzt auf das Ausbreitungsgebiet eines oder mehrerer Trigeminusäste
- **Klinik:** Plötzliche einseitige Schmerzen im Bereich des betroffenen Trigeminusastes
- **Auslösung der Schmerzen** z. B. durch Reize wie Kauen, Zähneputzen oder Kälte etc.
- **Diagnostik:** v.a. mit Anamnese
- **Therapie:** Auslöser vermeiden, medikamentöse Therapie bzw. Prophylaxe mit Carbamazepin oder Pregabalin

Rheumatologie - Unfallchirurgie




Rettungsablauf am Unfallort und klinische Primärversorgung ++

Ablauf

- Erstversorgung durch Laienhelfer/Meldung des Unfalls
- Erste ärztliche Maßnahmen
- Transport ins Krankenhaus
- Übergabe durch den Notarzt
- Klinische Erstversorgung
 - Reanimationsphase
 - Operative Phase I
 - Stabilisierungsphase
 - Operative Phase II
 - Weiterführende Maßnahmen

Erstversorgung durch Laienhelfer

- **Meldung des Unfalls: 112 ("5-W-Regel")**
 - **Wo** (ist der Notfall)?
 - **Was** (ist passiert)?
 - **Wie viele** (Verletzte)?
 - **Welche** (Verletzungen bzw. Krankheitszeichen)?
 - **Warten** (auf Rückfragen)!
 - Ggf. Weitere (Gefährdungen)? Wann (ist es passiert)? Wer (meldet den Unfall)?
- **Basic-Life-Support:** Lebensrettende Sofortmaßnahmen durch Laien
- **Lagerung:** Bewusstlose, aber spontan atmende Patienten sollten in die **stabile Seitenlage** gebracht werden
 - **Ziel**
 - Offenhalten der oberen Atemwege durch Kopfüberstreckung
 - Verhinderung einer Aspiration
 - **Durchführung**
 - Ausgangslage: Der Bewusstlose liegt flach auf dem Rücken, die Helferin kniet auf seiner linken Seite
 - Die Helferin greift den linken Arm des Bewusstlosen und winkelt ihn an (90° in Schulter- und Ellenbogengelenk).
 - Dann platziert sie seine rechte Hand auf der linken Schulter, sodass der rechte Arm über der Brust gekreuzt liegt, und stellt das rechte Bein an.
 - Danach dreht sie den Bewusstlosen auf die linke Seite.
 - Der Kopf wird anschließend vorsichtig überstreckt und mit der rechten Hand des Bewusstlosen fixiert, sodass der leicht geöffnete Mund der tiefste Punkt des Kopfes ist.
 - Ist der Patient in die stabile Seitenlage gebracht, sollten Atmung und Kreislauf weiterhin regelmäßig kontrolliert werden!
- Rettung ggf. mittels **Rautek-Griff** (dient als Schleppgriff zur Bergung von Patienten. Der Helfer umfasst den Patienten von hinten, indem er unter den Achseln durchgreift, einen Arm des Patienten vor dem Brustkorb verschränkt und mit beiden Händen den Unterarm umfasst. Der Helfer kann den Patienten nun rückwärts gehend aus der Gefahrenzone bergen)



Erste ärztliche Maßnahmen am Unfallort

Es gibt keine starren Vorgaben zum Behandlungsablauf am Unfallort; es muss eine individuelle Abschätzung der Gesamtsituation und der Prioritäten erfolgen. Vitale Verletzungen sollten immer zuerst behandelt werden: **Treat first what kills first!** Hierbei hat sich ein Vorgehen nach dem ABCDE-Schema etabliert.

Sicherung des Unfallortes

- **Beachtung des Selbstschutzes in potentiell gefährlichen Situationen**
 - Verkehrsunfall: Betreten einer Straße nur nach Absicherung
 - Verdacht auf Gasvergiftung: Vorsicht vor Betreten von Räumlichkeiten
 - Verdacht auf Elektrounfall: Trennen des elektrischen Gerätes von der Stromversorgung vor Patientenkontakt

Beurteilung des Bewusstseinszustandes

- **Erhebung der GCS**
- **Weiteres Vorgehen** : abhängig vom Bewusstseinszustand
 - **Wacher Patient**: Trauma-Check bzw. Vorgehen nach ABCDE-Schema bei Polytrauma
 - **Bewusstloser bzw. bewusstseinsgestörter Patient mit Atmung**: Grobe Orientierung (Blutungen, Fehlstellungen, Kopfverletzungen), ggf. stabile Seitenlage, ggf. Vorgehen nach ABCDE-Schema, ggf. Intubation
 - **Bewusstloser Patient ohne Atmung** (siehe: Reanimation)

Körperliche Untersuchung

Trauma-Check


- Orientierende Untersuchung, insb. bei wachen Patienten
 - **Kurze Anamnese**
 - **Kopf**: Untersuchung des Kopfes (z.B. Pupillenreaktion, offensichtliche Verletzungen, Monokel- oder Brillenhämatom, Blutung aus Ohren, Nase oder Mund)
 - **Hals**: Schmerzen? (Trauma der Halswirbelsäule)
 - **Thorax**: Palpation, Auskultation und Perkussion (z.B. zum Ausschluss eines Pneumothorax oder von Frakturen)
 - **Abdomen**: Inspektion und Palpation (z.B. zum Ausschluss penetrierender, stumpfer oder innerer Verletzungen)
 - **Becken**: Prüfung der Beckenstabilität
 - **Wirbelsäule**: Schmerzen der Wirbelsäule, neurologische Ausfälle
 - **Extremitäten**: Fehlstellungen, Verletzungen, Durchblutung, Motorik, Sensibilität (kurz „DMS“)
 - **Kreislaufmonitoring**: Blutdruckmessung, Herzfrequenz und -rhythmus, Kontrolle der Atmung, Pulsoxymetrie, EKG-Ableitung, Blutzuckerbestimmung

ABCDE-Schema: Polytrauma

- Bei polytraumatisierten Patienten Vorgehen nach dem **ABCDE-Schema** :
 - **A** ("Airways"): Sicherung der Atemwege und Stabilisierung der Halswirbelsäule
 - **B** ("Breathing"): Untersuchung und Aufrechterhaltung der Atmung; sofern nötig: Beatmung
 - **C** ("Circulation"): Untersuchung und Aufrechterhaltung des Kreislaufs (Blutungskontrolle und Flüssigkeitszufuhr)
 - **D** ("Disability"): Erhebung des neurologischen Zustandes
 - **E** ("Exposure"/"Environmental control"): Entkleiden zur Untersuchung, Vermeidung einer Unterkühlung (Durchführung i.d.R. nicht am Unfallort, sondern erst in der klinischen Versorgung)

Therapie

- **Sicherung der Atmung**
 - Sauerstoffgabe per Nasensonde
 - Intubation, wenn notwendig
 - Koniotomie: Ultima Ratio bei abfallender Sättigung oder frustrierten Intubationsversuchen
 - **Definition**: Durchtrennung des Lig. conicum (= Lig. cricothyroideum medianum) zwischen Cartilago thyroidea und Cartilago cricoidea
 - Ggf. Thoraxdrainage
- **Sicherer Gefäßzugang**: Legen von ein bis zwei großlumigen venösen Zugängen (z.B. am Handrücken) zur raschen Medikamentenapplikation und ggf. Volumensubstitution
- **Medikamente**
 - Analgesie: z.B. i.v. Fentanyl-Gabe bei starken Schmerzen 0,6–2,5 µg/kgKG i.v. bzw. i.o. als langsame Bolusgabe oder 1–2 µg/kgKG intranasal
 - Weitere Medikation (z.B. Volumensubstitution)
- **Wundversorgung**
 - Blutstillung (z.B. Druckverband)
 - Sterile Abdeckung von Wunden
 - Initiale Frakturversorgung: Reposition (insb. bei starker Dislokation bzw. Luxation) und Ruhigstellung in Schiene o.ä.
- **Lagerung**
 - Stabile Lagerung (Vakuummatratze)
 - Immobilisierung (Extremitäten, Wirbelsäule, bei V.a. ein HWS-Trauma Anlage eines Immobilisationskragens bspw. Stifneck®) collier
 - Schutz vor Auskühlung
- **Transport**: Nach Möglichkeit Transport des Patienten in ein Krankenhaus mit den benötigten Fachdisziplinen und Kompetenzen




Transport

- Bodengebundene Rettungsmittel
 - Krankentransportwagen (KTW): Nur Transport von Patienten ohne Störung der Vitalfunktionen
 - Rettungswagen (RTW)
 - Notarztwagen (NAW, Fahrzeug mit Notarztbesetzung und Transportmöglichkeit für Patienten) / Notarzteinsetzfahrzeug (NEF, Notarztfahrzeug ohne Transportmöglichkeit für Patienten)
- Luftrettung: Rettungshubschrauber
- Seerettung

Klinische Primärversorgung beim Polytrauma

Grundlegende Ziele und Vorgehen

- **Definition Polytrauma**: Verletzungen mehrerer Körperregionen, bei denen mindestens eine oder die Kombination mehrerer Verletzungen lebensbedrohlich ist
- **Übergabe** des Patienten durch den Notarzt an Teamleiter der Notaufnahme/Schockraum



- **Primäre Ziele**
 - Aufrechterhaltung/Wiederherstellung der Vitalfunktionen (Reanimationsphase)
 - Diagnostik, Einschätzung und Akutbehandlung von Verletzungen lebenswichtiger Organe
- **Voraussetzungen**
 - Interdisziplinäres Team
 - Ausreichende Größe und adäquate materielle Ausstattung des Schockraums zur Schwerverletztenversorgung
 - Möglichkeiten zur Bildgebung (Röntgen, Sonographie, CT)
- **Ggf. Reanimation** (Advanced-Life-Support)
- **Stabilisierung der Vitalparameter** (Vorgehen nach ABCDE-Schema)

Diagnostik

- **Komplette körperliche Untersuchung** (Bodycheck)
 - Zeitbedarf so gering wie möglich halten (insb. bei instabilen Patienten)
 - Gefahr der Auskühlung durch Entkleiden beachten
 - Begutachtung der Körperrückseite: Vorsichtige Drehung insb. bei Verletzung des Achsenskeletts
- **Ultraschalldiagnostik** (eFAST)
 - Routinemäßiger Einsatz empfohlen
 - Untersuchte Regionen: Abdomen, Perikard und Pleura
 - Standardisiertes Vorgehen wichtig
 - **Reihenfolge** : Sollte an den Unfallhergang angepasst werden. Häufig Beginn im subxiphoidalen Schnitt
 - **Positionen** :
 - Oberer rechter Quadrant: Morison-Pouch und Recessus costodiaphragmaticus rechts untersuchen
 - Oberer linker Quadrant: Koller-Pouch und Recessus costodiaphragmaticus links untersuchen
 - Herz: Perikardbeutel
 - Becken: Douglas-Raum und Proust-Raum
 - Lunge: Pleura (Detektion Pneumothorax)

Radiologische Diagnostik

- **Ganzkörper-Computertomographie** (Polytrauma-CT)
 - **Goldstandard** zur detaillierten Diagnostik des Verletzungsmusters bei Polytrauma
 - **Durchführung auch bei unauffälligem eFAST-Befund empfohlen** sowie bei
 - Störung der Vitalparameter (Atmung, Kreislauf, Bewusstsein)
 - Hochenergetischem Trauma (bspw. Sturz aus großer Höhe, Verkehrsunfall mit hoher Geschwindigkeit)
 - Relevanter Verletzung ≥ 2 Körperregionen
 - Zeitnahe Durchführung empfohlen
 - **Untersuchungsumfang**
 - Native CT des Schädels
 - CT von Kopf bis einschließlich Becken **mit Kontrastmittelgabe**
 - Alternativ: CT-Schädel, CT-Thorax oder CT-Abdomen als Einzeluntersuchung bei isoliertem Trauma
- **Röntgen-Thorax-Untersuchung**
 - **Indikation**: **Einzelfallentscheidung**, falls keine CT durchgeführt wird
 - Wenig Evidenz bei der Versorgung polytraumatisierter Patienten
 - Wesentliche Pathologien (bspw. Hämato- und Pneumothorax) prinzipiell auch sonographisch darstellbar
- **Weitere radiologische Untersuchungen** : leitsymptom- bzw. **bedarfsadaptiert** (v.a. konventionelle Aufnahmen des Beckens sowie der Extremitäten)

Labordiagnostik

- **Blutgasanalyse** (bevorzugt arteriell)
 - Beurteilung insb. von **Gasaustausch**, **Elektrolyt**- bzw. **Säure-Base-Haushalt** und möglicher **Transfusionsindikation**
 - Überprüfung und ggf. Anpassung der therapeutischen Maßnahmen (bspw. Beatmung, Volumentherapie)
- **Gerinnungsparameter** : Quick-Wert, aPTT, Fibrinogen und Thrombozytenzahl
- **Blutgruppenbestimmung und Antikörpersuchtest**
 - Möglichst vor Transfusion von Fremdblut
 - Gleichzeitige Durchführung eines Bedside-Tests erwägen
- **Weitere Parameter** : nach Klinikstandard (Blutbild, Harnstoff, Kreatinin, LDH, CK, γ GT, GOT, GPT)

Therapie

- **Schockraumphase**
 - **Stabilisierung der Vitalparameter** (Vorgehen nach ABCDE-Schema)
 - **Intubationskriterien bei Polytrauma**
 - **Apnoe, Hypopnoe** (Atemfrequenz $<6/\text{min}$) oder **Schnappatmung**
 - **Hypoxie** (Sauerstoffsättigung $<90\%$) **trotz Sauerstoffgabe** und nach Ausschluss eines Spannungspneumothorax
 - **Respiratorische Insuffizienz** (Atemfrequenz $>29/\text{min}$) bei schwerem Thoraxtrauma
 - **Vigilanzminderung** (GCS <9) bei schwerem Schädel-Hirn-Trauma
 - **Persistierende hämodynamische Instabilität** (systolischer Blutdruck <90 mmHg) aufgrund eines Traumas
 - **Durchführung einer Intubation als Rapid Sequence Induction** (anästhesiologisches Verfahren zur schnellen Intubation und Narkose, bei dringlicher Intubationsindikation eines nicht-nüchternen Patienten, um das Aspirationsrisiko zu verringern)
 - **Vermeiden einer Trauma-induzierten Koagulopathie**: Rahmenbedingungen der Gerinnung aufrechterhalten
 - **Normothermie**: Einsatz von erwärmten Infusionslösungen, Wärmematten (*matelas*) und Heißluftgebläse (*ventilateur*) mit dem Ziel der Normothermie
 - **Normalisierung des pH-Wertes**: Ggf. Azidoseausgleich
 - **Normokalzämie**: Calciumsubstitution bei Hypokalzämie
 - **Gerinnung aufrechterhalten**: Substitution gerinnungsaktiver Präparate, ggf. Transfusion von Thrombozyten, Erythrozyten und/oder Plasma
 - **Neuroprotektion** (insb. bei SHT): Normoxie, Normokapnie, Normotonie
 - **Permissive Hypotension**: Bei Patienten mit unkontrollierbaren Blutungen können niedrige systolische Blutdruckwerte bis 90 mmHg akzeptiert werden
 - Kontraindikation: SHT
 - Maximale Dauer: 60 min
- **Operative Phase I**
 - (Temporäre) **Versorgung der akut lebensbedrohlichen Verletzungen**, ggf. simultan (z.B. Notfalllaparotomie, Notfallthorakotomie, Notfallkraniotomie, Beckenzwinge)
 - Ggf. noch im Schockraum
- **Stabilisierungsphase**: Stabilisierung der Vitalfunktionen auf Intensivstation, vor definitiver operativer Versorgung
- **Operative Phase II**
 - Operationen weiterführender Verletzungen wie offene Frakturen, Kompartmentsyndrom, Rückenmarkskompression, Verletzungen des Urogenitaltraktes etc.
- **Weitere operative Phasen**: Nach fortlaufender Stabilisierung können weitere chirurgische Eingriffe vorgenommen werden

„Das Grundprinzip in der Polytraumaversorgung: Vital bedrohliche Verletzungen sollten immer zuerst behandelt werden ("Treat first what kills first!")!“

Was ist ein Polytrauma?



Verletzungen, die entweder allein oder in Kombination lebensbedrohlich sind

Wann Schockraum?

1. Atemstörung/Intubationspflicht nach Trauma
2. Systolischer Blutdruck < 90 mmHg
3. GCS < 9 nach Trauma
4. Penetrierende Verletzungen Rumpf/Hals
5. Frakturen > 2 proximalen Knochen
6. Instabilität Thorax, Becken
7. Amputationsverletzungen proximal der Hände / Füße
8. Neurologische Querschnittssymptomatik
9. Offene Schädelverletzung
10. Verbrennung $> 20\%$ Grad $> 2b$

1/3 innerhalb der ersten Sekunden bis Minuten

1. Dekapitierungsverletzungen
2. Penetrierende Verletzungen von großen Gefäßen oder Herz
3. Atlanto-okzipitale Dislokationen
4. Aortenruptur oder Hirnstammverletzungen

Medizinisch nicht verhinderbar – nur durch primäre Prävention

Duale Reihe Orthopädie und Unfallchirurgie
Niehård, Pfeil, Biberthaler

2. Sterblichkeitsgipfel: $< 24h$

1. Sauerstoffmangel *Pneumothorax*
2. Häorrhagischer Schock *am häufigsten*
3. Intrakranielle Blutungen

Domäne der Schockraumversorgung

Duale Reihe Orthopädie und Unfallchirurgie
Niehård, Pfeil, Biberthaler

3. Sterblichkeitsgipfel: $> 72h$

1. Verletzungsfolgen *Sepsis*
2. Multiorganversagen

Medizinisch verhinderbar:

Phase nach der Schockraumversorgung (ICU)

Duale Reihe Orthopädie und Unfallchirurgie
Niehård, Pfeil, Biberthaler

Damage Control

„Damage Control ist dabei eine **Strategie zur Versorgung von Schwerverletzten** mit dem Ziel, Sekundärschäden zu minimieren und das **Outcome der Patienten zu maximieren**. Im Bereich der Frakturversorgung wird hierbei z. B. **auf die primär definitive Osteosynthese verzichtet und stattdessen eine temporäre Stabilisierung mittels Fixateur externe durchgeführt**. Durch den kleineren Eingriff und die kürzere Operationszeit soll die zusätzliche Traumabelastung im Sinne des Sekundärschadens möglichst gering gehalten werden.“

Hämorrhagischer Schock - Klassifikation

Tabelle 2. Geschätzter Flüssigkeits- und Blutverlust, beruhend auf der ersten Untersuchung des Patienten.

| | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Blutverlust ml | 750 (-15%) | <1500 (15–30%) | <2000 (30–40%) | >2000 (>40%) |
| Blutdruck (systolisch) | normal | normal | erniedrigt | sehr niedrig |
| Blutdruck (diastolisch) | normal | erhöht | erniedrigt | nicht messbar |
| Puls/min. | <100 | >100 | >120 | >140 (schwach) |
| Kapillarfüllung | normal | >2 Sekunden | >2 Sekunden | nicht feststellbar |
| Atemfrequenz | 14–20 | 20–30 | 30–40 | >35 |
| Urinfluss (ml/h) | >30 | 20–30 | 10–20 | 0–10 |
| Extremitäten | normale Farbe | blass | blass | blass und kalt |
| Vigilanz | wach | ängstlich oder aggressiv | ängstlich oder aggressiv | verwirrt, bewusstlos |

Allgemeine Frakturlehre ++

- **Fraktur** : komplette oder inkomplette Kontinuitätsunterbrechung eines Knochens

Ätiologie

- **Traumatische Fraktur**
- **Ermüdungsfraktur**: Aufgrund einer Überbelastung
- **Pathologische Fraktur** : Spontane Frakturen ohne adäquates Trauma (bei Tumor, Metastasen oder Osteoporose)


Klassifikation

Frakturarten

- **Nach Verlauf der Fraktur** : Spiralfaktur. Schrägfraktur. Querfraktur
- **Nach Anzahl der Fragmente** : Einfragmentfraktur. Mehrfragmentfraktur bei 3–6 Fragmenten. Trümmerfraktur bei >6 Fragmenten
- Inkomplette Fraktur = Haarriss/Fissur

Dislokationsformen

- **Dislocatio ad peripheriam** = Verdrehung um die Längsachse
- **Dislocatio ad axim** = Achsabknickung
- **Dislocatio ad latus** = Seitverschiebung der Knochenfragmente
- **Dislocatio ad longitudinem** = Verschiebung in Längsrichtung
 - Cum contractione = mit Verkürzung
 - Cum distractive = mit Verlängerung



Klassifikation nach Gustilo/Anderson zur Einteilung offener Frakturen

Insbesondere der Weichteilschaden und der Grad der Verschmutzung haben Einfluss auf die Wahl der Therapie.

| | Typ I (Grad I) | Typ II (Grad II) | Typ III (Grad III) |
|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Gewalteinwirkung | Gering | Mittelgradig | Hochgradig |
| Hautdefekt | Hautwunde <1 cm | Hautwunde >1 cm | Hautwunde >10 cm |
| Weichteilverletzung | Minimal | Mittelgradig | Hochgradig |
| Kontamination der Wunde | Keine | Moderat | Hoch |

AO-Klassifikation

Die Einteilung der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese berücksichtigt Körperregion und Position der Fraktur sowie den Frakturtyp (Komplexität).

Frakturzeichen

- **Klinisch** :
 - **Sicher** : Achsabweichung. Offene Fraktur. Stufenbildung. Krepitation
 - **Unsicher** : Schmerzen. Schwellung. Hämatom. Bewegungsseinschränkung
- **Radiologisch** : Unterbrechung der Kortikalis. Aufhellungslinien. Stufenbildung. Zerstörung der Trabekelstruktur

Diagnostik

- **Körperliche Untersuchung** : Überprüfung der peripheren Durchblutung, Motorik und Sensibilität („DMS“). Frakturzeichen (s.o.). Begleitverletzungen
- **Bildgebung**:
 - **Röntgen in zwei oder mehr Ebenen** : Frakturzeichen (s.o.)
 - **Ggf. CT/MRT**

Therapie

Prinzipien

1. Anatomische Reposition
2. Fixation
3. Ruhigstellung

Therapieverfahren

- **Konservative Versorgung**
 - Bei einfachen, nicht-dislozierten, geschlossenen Frakturen
 - Bspw. mittels (Gips-)Verband
- **Operative Versorgung**
 - Bei dislozierten Frakturen, offenen Frakturen oder schwerer Weichteilverletzung
 - Bspw. mittels Plattenosteosynthese, Schraubenosteosynthese, Fixateur externe oder Fixateur interne
- **Allgemeine Maßnahmen**
 - Schmerzadaptierte Analgesie (z.B. mit Ibuprofen)
 - Thromboseprophylaxe bei Ruhigstellung einer unteren Extremität
 - Klinische und radiologische Kontrollen
 - Physiotherapie

Therapie offener Frakturen

- **Antibiotikagabe**: Bei verschmutzten Wunden abhängig von der Klassifikation nach Gustilo/Anderson
 - **Gustilo Typ I und II**: Cefuroxim
 - **Gustilo Typ III**: Ampicillin/Sulbactam
- Ggf. Tetanusprophylaxe
- Operative Versorgung: Wunddébridement. Ggf. Fixateur externe

Komplikationen

- Blutung
- Weichteilverletzungen (Nerven, Gefäße, Sehnen). Ggf. Organverletzungen
- Fehlstellung
- Pseudarthrose
- Arthrose (bei artikulären Frakturen)
- Thrombose, Embolie (durch Immobilisation).
- Kompartmentsyndrom
- Wundinfektion, Osteomyelitis (insb. bei offenen Frakturen)

Osteosynthese

- Plattenosteosynthese
- Schraubenosteosynthese
- Marknagelung : diaphysäre Frakturen (Tibia, Femur, Humerus)
- Dynamische Hüftschraube (DHS) : Pertrochantäre Femurfraktur
- Zuggurtungsosteosynthese : Patella-Querfraktur
- Kirschner-Draht-Osteosynthese : Mittelhandknochen
- Fixateur externe : offene Frakturen
- Fixateur interne : Frakturen der Wirbelsäule

Sonderformen

Stressfraktur (Überlastungs- oder Marschfraktur)

- **Ursache:** Tanzen, Laufsport (insb. Marathon), lange Märsche
- **Mechanismus:** Subtraumatische, jedoch intensive und wiederholte gleichförmige mechanische Belastung
- **Klinik:** Belastungsabhängiger Schmerz
- **Betroffene Regionen:** Meist untere Extremität, insb. im Mittelfußbereich (dort meist Os metatarsale II)

Frakturen im Kindesalter

Sonderformen

- **Grünholzfraktur**
 - Biegungsbruch mit geringer Dislokation und erhaltenem Periostmantel
 - Einseitiger Bruch der Kortikalis
 - Betrifft hauptsächlich lange Röhrenknochen
- **Bowing-Fraktur**
 - Plastische Verformung des Knochens mit fixierter Biegung bei intakter Kortikalis und intaktem Periost

Therapie


- **Therapieregime**
 - Häufig konservative Therapie möglich
- **Generelles zu Osteosynthesematerialien**
 - Häufig: K-Draht, ESIN (Elastisch Stabile Intramedulläre Nagelung), Schraubenosteosynthese
 - Seltener Alternative: Plattenosteosynthese
- **Besonderheit bei Grünholzfrakturen**
 - Bei starker Achsenabweichung zunächst „Komplettierung“ des Bruches (= Gegenseite wird auch gebrochen), anschließend Versorgung

Komplikationen

- **Allgemein:** Analog zum Erwachsenen (z.B. Kompartmentsyndrom oder sekundäre Dislokation)
- **Spezifisch:** Wachstumsstörungen

Epiphysenfugenverletzung

Klassifikation



Therapie

- **Aitken 0 und I :** Konservative Therapie mittels Ruhigstellung im Gips
- **Aitken II und III :** Operative Therapie (Spickdrahtosteosynthese oder Zugschrauben mit anschließender Ruhigstellung im Gips)

- **Aitken IV** : Konservative Therapie mit Ruhigstellung im Gips (schlechte Prognose mit häufiger Wachstumshemmung)

Komplikationen

- Wachstumsstörungen (vor allem bei Aitken II und III)
- Wachstumshemmung (häufig bei Aitken IV)

Frakturheilung:

Die Frakturen können auf zwei Wegen verheilen.

- Die **primäre Frakturheilung** findet statt, wenn die gebrochenen Knochenenden chirurgisch optimal adaptiert werden (Abstand <1 mm). Hierbei kann direkt Lamellenknochen im Frakturspalt gebildet werden (Spaltheilung).
- Die **sekundäre Frakturheilung** findet hingegen statt, wenn der Abstand der Frakturenenden größer ist. Dabei wird der Bruchspalt initial mit Binde- und Knorpelgewebe (fibrokartilaginärer Kallus) überbrückt, welches im Laufe der Zeit durch enchondrale Ossifikation zu Geflechtknochen (knöcherner Kallus) umgebaut wird. Im Verlauf von Monaten wird der Geflechtknochen langsam wieder in belastbareren Lamellenknochen umgebaut.
- Wird dieser Heilungsprozess durch Bewegen der Frakturenenden nachhaltig gestört (bspw. unzureichende Immobilisation), kann es zur Ausbildung eines sog. Scheingelenks (Pseudarthrose) kommen.

Anamnese in der Akutsituation

SAMPLE-Schema bzw. SAMPLE(R)-Schema

- **S wie „Symptoms“**: Symptome
 - Genaue Beschwerden, mögliche (vegetative) Begleitsymptome und Verlauf
- **A wie „Allergies“**: Allergien
- **M wie „Medication“**: Medikamentenanamnese
 - Dauer- und Bedarfsmedikation (insb. NSAR, Steroide, Antibiotika, Antikoagulantien und Thrombozytenaggregationshemmer)
- **P wie „Past Medical History“**: Medizinische Vorgeschichte des Patienten
 - Voroperationen, medizinische Prozeduren oder Vorerkrankungen
- **L wie „Last Oral Intake“**: Letzte Nahrungsaufnahme
- **E wie „Events Prior To Incident“**: Vorausgegangene Ereignisse
- **R wie „Risk Factors“**: Risikofaktoren
 - Alkoholkonsum, Nikotinabusus, Diabetes mellitus, Auslandsaufenthalte, Kontakt zu erkrankten Personen
 - Für Frauen: Letzte Periode und mögliche Schwangerschaft

Distale Radiusfraktur ++


- Häufigste Fraktur des Menschen

Ätiologie (Unfallmechanismus)

- Häufig, Sturz auf die dorsoextendierte Hand → Extensionsfraktur („Colles-Fraktur“)
- Selten, Sturz auf die palmarflektierte Hand → Flexionsfraktur („Smith-Fraktur“)

Klassifikation (Einteilung nach Unfallhergang)

- **Extensionsfrakturen:**
 - **Colles-Fraktur**
 - Extraartikuläre Extensionsfraktur
 - Dislokation des distalen Fragments nach dorsal und radial
 - **Barton-Fraktur** : Partiell-artikulär
- **Flexionsfrakturen:**
 - **Smith-Fraktur**
 - Extraartikuläre Flexionsfraktur
 - Dislokation des distalen Fragments nach palmar und radial
 - **Reversed-Barton-Fraktur** : Partiell-artikulär



Pathophysiologie

- Zwei Gelenke können betroffen sein : **Radiokarpalgelenk und distales Radioulnargelenk (DRUG)**
- **Begleitverletzungen** : Kahnbeinfraktur (Skaphoidfraktur). Abrissfraktur des Processus styloideus ulnae. Weichteilverletzungen (Nerven, Gefäße, Sehnen). Kompartmentsyndrom

Symptome/Klinik

- Frakturzeichen (siehe)
- Abknickung nach dorso-radial (Extensionsfraktur)
- Abknickung nach palmar (Flexionsfraktur)


Diagnostik

Klinische Untersuchung

- Überprüfung der peripheren Durchblutung, Motorik und Sensibilität (pDMS)
- Frakturzeichen (siehe)

Apparative Diagnostik

- **Röntgenaufnahme des Handgelenks in zwei Ebenen:** a.p. und seitlich.
 - Frakturzeichen (siehe)
 - Veränderter Böhler-Winkel des distalen Radius
 - ✓ Radioulnare Inklination/Gelenkflächenneigung : Normwert ca. 20–25°
 - ✓ Palmare Inklination/Gelenkflächenneigung: Normwert ca. 10–15°
- Ggf. CT/MRT



Differentialdiagnosen

- Prellung oder Distorsion
- Schaftfrakturen des Unterarms
- Skaphoidfraktur

Therapie

Konservative Therapie

- **Indikation**
 - Bei einfachen, nicht-dislozierten, geschlossenen Frakturen : Ruhigstellung ohne vorherige geschlossene Reposition
 - Bei dislozierten Frakturen mit Kontraindikationen der operativen Therapie: Ruhigstellung nach geschlossener Reposition
 - Mehrfache Repositionsversuche oder Nachrepositionen sollten unbedingt vermieden werden, da hierdurch das Risiko für ein CRPS (s.u.) ansteigt!
- **Durchführung** : Ruhigstellung im Unterarmverband für 4–6 Wochen

Operative Therapie

- **Indikation** : Bei dislozierten Frakturen, offenen Frakturen, schwerer Weichteilverletzung, Begleitverletzungen (Gefäße oder Nerven), Kompartmentsyndrom, oder Versagen der Konservativen Therapie.
- **Durchführung** : Spickdrahtosteosynthese (z.B. bei Kindern), Schraubenosteosynthese, Plattenosteosynthese. Fixateur externe (Offene Fraktur)

Allgemeine Maßnahmen

- Schmerzadaptierte Analgesie (z.B. mit Ibuprofen).
- Klinische und radiologische Kontrollen (nach 1, 3 und 6 Wochen).
- Physiotherapie

Komplikationen

- **Allgemeine Komplikationen**: Blutung. Weichteilverletzungen (Nerven, Gefäße, Sehnen). Fehlstellung. Pseudarthrose. Arthrose (bei artikulären Frakturen). Kompartmentsyndrom. Wundinfektion/Osteomyelitis (insb. bei offenen Frakturen)
- **Komplikationen nach Osteosynthese** : Blutung. Weichteilverletzungen (Nerven, Gefäße, Sehnen). Fehlstellung. Pseudarthrose. Arthrose (bei artikulären Frakturen). Thrombose/ Embolie. Materialbruch
- **Spezielle Komplikationen** : Posttraumatisches Karpaltunnelsyndrom. CRPS (komplexes regionales Schmerzsyndrom). Sekundäre Dislokation. Sehnenruptur (v.a. Sehne des M. extensor pollicis longus)

Kindliche distale Radiusfrakturen

- **Korrekturpotential von Fehlstellungen** : <10 Jahre: Sehr hoch. >10 Jahre: Wenig
- **Frakturformen/-arten**: Wulstfraktur (Metaphysäre Stauchungsfraktur, bei der meist nur auf einer Seite die Kortikalis gebrochen ist und das Periost intakt bleibt), Grünholzfraktur, Fraktur mit Beteiligung der Epiphyse
 - Klassifikation in stabil und instabil
- **Therapie**
 - **Konservativ**
 - Indikation: Undislozierte, extraartikuläre Frakturen innerhalb der altersabhängigen Toleranzgrenzen
 - Durchführung : Unterarmgips für 3–4 Wochen
 - **Operativ**
 - Indikation: Frakturen außerhalb der Toleranzgrenzen und bei Notfallindikationen
 - Durchführung
 - **K-Draht-Osteosynthese** mit anschließender Ruhigstellung für 4–6 Wochen (Mittel der Wahl). Plattenosteosynthese in Ausnahmesituationen
 - Fixateur externe bei offener Fraktur
- **Spezifische Komplikation**: Wachstumsstörungen

Proximale Femurfrakturen ++


- Häufige Fraktur des alten Menschen. ♀ > ♂ (2:1)

Anatomische Strukturen des proximalen Femurs und Hüftgelenks

- **Proximales Femur:** Caput ossis femoris, Collum ossis femoris und Trochanterregion
- **Hüftgelenk:** Caput ossis femoris und Azetabulum
 - Größtes Gelenk des Menschen
 - Enarthrosis (Nussgelenk)
- **Arterielle Blutversorgung des Caput ossis femoris :** A. circumflexa femoris (aus A. profunda femoris), A. capitis femoris (aus Arteria obturatoria)

Einteilung der proximalen Femurfrakturen

- **Femurkopffrakturen**
 - Abscherfrakturen (= Flake Fracture : Ausriss eines Knorpelfragments oder Abbruch eines Knochen-Knorpel-Fragments aus einer Gelenkfläche)
 - Impressionsfrakturen (Bone Bruise : Mikrofrakturen der Spongiosa mit kleinen Einblutungen und Knochenödemen)
- **Oberschenkelhalsfrakturen**
 - Medial (über 80%): Intrakapsuläre Frakturlinie zwischen subkapitalem Oberschenkelhals und Schenkelhalsmitte
 - Adduktionsfrakturen
 - Abduktionsfrakturen
 - Lateral: Meist extrakapsuläre Frakturlinie zwischen Oberschenkelhalsmitte und distalem Oberschenkelhalsende
- **Pertrochantäre Femurfrakturen:** Extrakapsuläre, in der Trochanterregion liegende Frakturen
- **Subtrochantäre Femurfrakturen**



Ätiologie

Frakturmechanismus

- **Niedrigrasanz-Trauma:** Häufigster Unfallmechanismus bei alten Menschen
 - Stolpersturz aus dem Stand
 - Sturz aus niedriger Höhe (Sitzen, Bett) auf die Hüfte
- **Hochrasanz-Trauma:** Häufigster Unfallmechanismus bei jungen Menschen
- **Spontanfrakturen**
 - **Insuffizienzfraktur:** Bei normaler Belastung eines geschwächten Knochens
 - Osteoporoseassoziiert: Hormonell bedingte Minderung der Knochendichte
 - Pathologische Frakturen
 - **Ermüdungsfraktur (Stressfraktur):** Wiederholte ungewohnte Belastung eines gesunden Knochens

Risikofaktoren

- Osteoporose: Prädisposition insb. bei Frauen nach der Menopause
- Gangunsicherheit und Koordinationsstörungen
- Hohes Lebensalter

Klassifikation


AO-Klassifikation der proximalen Femurfraktur

Weitere Klassifikationen der einzelnen Frakturformen

Garden-Klassifikation der Oberschenkelhalsfraktur

Sie teilt die Oberschenkelhalsfraktur nach dem Risiko einer Perfusionsstörung des Femurkopfes ein. Je kleiner die Kontaktfläche der Frakturfragmente und je gröber die Dislokation einer Fraktur ist, desto größer ist das Risiko einer Perfusionsstörung und einer daraus resultierenden Femurkopfnekrose.

| Typ | Frakturform |
|-------------------|---|
| Garden I | Inkomplette Abduktionsfraktur: Eingestaucht (<i>écrasé</i>), Valgusstellung, ohne Dislokation, Perfusion intakt |
| Garden II | Vollständige Fraktur ohne Dislokation: Keine Impaktierung, hintere Kapsel erhalten, Perfusion intakt |
| Garden III | Vollständige Fraktur mit teilweiser Dislokation: Mediale Kontaktfläche erhalten, Varusstellung, hintere Kapsel und Kortikalis potentiell verletzt, Perfusionsstörung |
| Garden IV | Vollständige Fraktur mit kompletter Dislokation: Kein Kontakt der Frakturfragmente, ungünstige Perfusionsprognose |








Pauwels-Klassifikation der medialen Oberschenkelhalsfraktur

Bei der Pauwels-Klassifikation erfolgt die Einteilung nach einem Winkel der Hauptfrakturlinie zur Horizontalen. Je größer der Winkel ist, desto höher ist das Risiko einer Dislokation und desto schlechter ist die Heilungstendenz einer Fraktur.

| Typ | Frakturform |
|--------------------|---|
| Pauwels I | Winkel $<30^\circ$: Abduktionsfraktur in Valgusfehlstellung, günstige Heilungstendenz |
| Pauwels II | Winkel $30-50^\circ$: Adduktionsfraktur in Varusfehlstellung, abnehmende Heilungstendenz |
| Pauwels III | Winkel $>50^\circ$: Abscherfraktur, schlechte Heilungstendenz |

Pipkin-Klassifikation der Femurkopffraktur

| Klassifikation der Luxationsfrakturen des Femurkopfes nach Pipkin | | | |
|---|--|---|--|
| Pipkin I | Frakturverlauf unterhalb der Fovea capitis femoris | Pipkin II | Frakturverlauf oberhalb der Fovea capitis femoris |
|  | |  | |
| Pipkin III | Kopffraktur (Typ I oder II) mit zusätzlicher Schenkelhalsfraktur | Pipkin IV | Kopffraktur (Typ I oder II) mit zusätzlicher Acetabulumfraktur |
|  | |  | |



Symptome/Klinik

Femurkopffraktur

- **Fehlstellung:** Adduziertes, innenrotiertes Bein mit Beugung
- **Schmerzen:** In der Hüftgegend
- **Bewegungseinschränkung**
- Oft kombiniert mit einer Hüftgelenkluxation oder Acetabulumfraktur → Symptomatik dieser Verletzung führend

Oberschenkelhalsfraktur und pertrochantäre Femurfraktur

- **Fehlstellung**
 - Adduktionsfraktur: Außenrotation und Beinlängenverkürzung
 - Abduktionsfraktur: Einstauchung, oft keine bzw. geringe Beinfehlstellung
- **Schmerzen:** Druck- und Klopfschmerz über dem Trochanter major, Ruheschmerz in Hüft- und Leistengegend
- **Bewegungseinschränkung**

Subtrochantäre Fraktur

- **Fehlstellung:** Adduzierter Femurschaft und abduziertes, außenrotiertes und flektiertes proximales Fragment
- **Schmerzen:** Am proximalen Oberschenkel
- **Bewegungseinschränkung**

Diagnostik

Anamnese

- Unfallmechanismus und -zeitpunkt, adäquates Trauma
- Lokalisation und Art der Schmerzen
- Begleiterkrankungen: Osteoporose, kardiale Vorerkrankungen, Malignom, renale Vorerkrankungen und Alkoholabusus

Körperliche Untersuchung

- **Inspektion**
 - Blickdiagnose: Sichtbare Fehlstellung und Beinlängendifferenz
- **Palpation**
 - pDMS
 - Druckschmerz über dem Trochanter major, in der Leiste und/oder dem proximalen Oberschenkel
- **Funktionsuntersuchung :**
 - Bewegungs- und axialer Stauchungsschmerz
 - Rotationsschmerz

- Keine aktive Hebung oder Streckung des Beines möglich, Gang- und Standunfähigkeit
„Bei Spontan- und nicht-dislozierten proximalen Femurfrakturen sind manche Patienten noch gehfähig! Gang- und Standfähigkeit sind somit keine Ausschlusskriterien für eine Fraktur!“

Bildgebung

• Nativ-Röntgen

- **Durchführung:** Tief eingestellte Beckenübersicht, Lauenstein-Aufnahme (in Rückenlage bei 45° Flexion und 45° Abduktion im Hüftgelenk)
- **Befund**
 - Radiologische Frakturzeichen
 - Beurteilung des Frakturverlaufs, einer Dislokation und der Frakturform

• CT

- **Indikation:** Standarduntersuchung bei verdächtigen, pathologischen oder nicht beurteilbaren Befunden im konventionellen Röntgen sowie nach Hüftgelenksluxation

Differentialdiagnosen

- Femurschaftfraktur
- Hüftgelenksluxation
- Aktivierte Coxarthrose

Therapie

Konservative Therapie

• Indikation

- Hochrisikopatient: Multimorbider, inoperabler Patient
- Pipkin I- und II-Femurkopffraktur

- **Verfahren :** Mobilisation nach Frakturform. Schmerztherapie. Thrombose- und Dekubitusprophylaxe.
Ggf. Hüftgelenkpunktion bei intrakapsulären Hämatom

Operative Therapie (Therapeutische Option der Wahl)



Zeitpunkt

- Dringlicher Eingriff (<24 h): Möglichst frühzeitiger Operationszeitpunkt
- Bei Erhalt des Femurkopfes: Signifikanter Anstieg des Femurkopfnekrose-Risikos bei späterem Operationszeitpunkt


Operative Verfahren

| Hüftkopferhaltende Osteosynthese | | Indikation und Anwendung |
|----------------------------------|--|---|
| Allgemein | | <ul style="list-style-type: none"> • Junges biologisches Alter • Eingestauchte, nicht-dislozierte Fraktur • Multimorbider, immobil Patient |
| Extramedulläre Verfahren | <ul style="list-style-type: none"> • Dynamische Kondylenschraube (DCS) | <ul style="list-style-type: none"> • Subtrochantäre Frakturen |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Schraubenosteosynthese | <ul style="list-style-type: none"> • Subtrochantäre Fraktur • Schenkelhalsfraktur |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Dynamische Hüftschraube (DHS) : Frakturfixierung über Schenkelhalsschraube, Platte am Femurschaft und ggf. Antirotationsschraube | <ul style="list-style-type: none"> • Schenkelhalsfraktur • Pertrochantäre Fraktur |
| Intramedulläre Verfahren | <ul style="list-style-type: none"> • Proximaler Femurmarknagel (PFN) • Gammanagel (γ-Nagel) | <ul style="list-style-type: none"> • Pertrochantäre Fraktur • Laterale Schenkelhalsfraktur |


| Gelenkersatz | | Indikation und Anwendung |
|--------------------------|--|--|
| Allgemein | | <ul style="list-style-type: none"> • Hohes biologisches Alter • Grobe Dislokation • Schenkelhalsfraktur • Trochantäre Trümmerfrakturen |
| Hemiprothese | <ul style="list-style-type: none"> • Duokopfprothese | <ul style="list-style-type: none"> • Lebenserwartung <5 Jahre • Geringer funktioneller Anspruch |
| Totalendoprothese | <ul style="list-style-type: none"> • Zementiert • Zementfrei | <ul style="list-style-type: none"> • Lebenserwartung >5 Jahre • Koxarthrose |



Bauelemente einer Hüftendoprothese :
Totalendoprothese (A).
Hemiprothese (B, z.B. Duokopfprothese)



Dynamische Hüftschraube



Schraubenosteosynthese

Nachsorge

- **Frühzeitige Mobilisation** unter physiotherapeutischer Anleitung (möglichst innerhalb von 24 h)
 - Vollbelastung bei Gelenkersatz, intramedullärer Osteosynthese und i.d.R. auch bei DHS möglich
 - Kontakt- oder Teilbelastung bei extramedullärer Osteosynthese
- **Osteoporosediagnostik** und Therapieeinleitung bei Bedarf

Komplikationen

Allgemeine Komplikationen

- **Akutkomplikationen**
 - Tiefe Beinvenenthrombose
 - Pneumonie
- **Langzeitkomplikationen**
 - Sekundäre Frakturdislokation
 - Pseudarthrose (15%)
 - Posttraumatische Arthrose
 - Avaskuläre Femurkopfnekrose: Risiko für eine Perfusionsstörung steigt mit zunehmendem Patientenalter und Ausmaß der Frakturdislokation

Peri- und postoperative Komplikationen

- **Wundinfekt** nach Frakturversorgung
 - Bei klinisch hohem Verdacht: Zeitnahe operative Revision und Spülung sowie Erregernachweis aus operativ gewonnenem Material
 - Antibiotikatherapie über mehrere Wochen
- **Implantatversagen** oder -lockerung

Prognose

- Hohe Letalität der proximalen Femurfrakturen (20%)
- Verminderte posttraumatische Funktionalität und Mobilität

Prävention

Evaluation des Sturzrisikos

- **Tinetti-Test:** Beurteilung des Sturzrisikos anhand eines Gleichgewichts- und Gehtests
- **„Timed Up and Go“-Test:** Beurteilung der Gehfähigkeit → Es wird die Zeit gemessen, die der Patient benötigt, um aus einem Stuhl mit Armlehne (*accoudoir*) aufzustehen, drei Meter weit zu laufen, sich umzudrehen, zurückzulaufen und sich wieder hinzusetzen

Maßnahmen

- **Allgemeine Präventionsmaßnahmen**
 - Sturztraining
 - Anpassung des häuslichen Umfeldes (u.a. Entfernen von Stolperfallen, ebenerdige Wohnlage)
 - Geeignetes Schuhwerk (*chaussure*), Anpassen von Sehhilfen
- **Medikamentöse Prophylaxe**
 - Sekundärprophylaxe und Therapie einer bestehenden Osteoporose
 - Abklärung und Behandlung von kardialen und zerebralen Sturzrisiken

Kompartmentsyndrom ++

Zustand, in dem bei geschlossenem Weichteilmantel und Faszien ein erhöhter Gewebedruck zu einer verminderten Gewebepерfusion führt. Mit fortschreitender Zeit resultieren daraus zunehmende Gewebe-, Muskel- oder Organschäden sowie neuromuskuläre Schäden. Am häufigsten sind der Unterarm und der Unterschenkel (Insb. Tibialis-anterior-Loge) vom Kompartmentsyndrom betroffen. Ferner ist ein abdominelles Kompartmentsyndrom bekannt. Therapeutisch von großer Bedeutung ist eine frühe Faszien-spaltung (Fasziotomie) innerhalb der ersten sechs Stunden nach Manifestation, um schwerwiegende Nekrosen abzuwenden.

Ätiologie

- **Kompression des Kompartments**
 - Einengende (Gips-)Verbände
 - Tourniquet-Syndrom mit ischämischen Reperfusionssödem
 - Druckbedingt bei Lagerung
- **Inhaltszuwachs**
 - Blutungen bei Gefäßverletzung oder Antikoagulation
 - Funktionelles Kompartmentsyndrom bei Überbeanspruchung (*surmenage*)
 - Erhöhte Kapillarpermeabilität, z.B. im Schock
- **Posttraumatisch**
 - Frakturhämatom, posttraumatisches Muskelödem
 - Enger, ungespaltener Gips oder zirkuläre Verbände
 - Verbrennungsödem

„Bei polytraumatisierten Patienten im Schock ist die periphere Durchblutung vermindert, sodass bei steigendem Druck in einem Kompartiment frühzeitig ein erhöhtes Ischämie-Risiko besteht!“

Klassifikation

- **Drohendes Kompartmentsyndrom**
 - Spannungsschmerz
 - Periphere Durchblutung erhalten
 - Eventuell leichte neurologische Symptome
- **Manifestes Kompartmentsyndrom**
 - Schmerz und Schwellung
 - Periphere Durchblutung beeinträchtigt
 - Ausgeprägte neurologische Symptomatik

Pathophysiologie

- Reduktion der Gewebepерfusion bei Anstieg des Gewebedrucks, der normalerweise <10 mmHg beträgt
- Irreversible Gewebeschädigung an Muskeln und Nerven nach vierstündiger Ischämie

Symptome/Klinik

Allgemeine Symptome

- **Leitsymptome:** Stark progredienter, nicht auf Analgetika ansprechender (Druck-)Schmerz und bretthart gespannte Muskulatur
- Neurologische Defizite: Störung von Motorik und Sensibilität
- Weichteilschwellung
- Glänzende, überwärmte Haut mit Spannungsblasen

„Der arterielle Puls ist i.d.R. noch erhalten und fehlt erst bei einem sehr schweren Kompartmentsyndrom!“

Tibialis-anterior-Syndrom

Folge einer Läsion des N. peroneus (fibularis) profundus

- Motorisch: Zehenheberschwäche
- Sensibel: Sensibilitätsverlust/Parästhesien im Autonomiegebiet des Nerven → 1. Interdigitalraum der Zehen

Sonderform : Abdominelles Kompartmentsyndrom

Das abdominale Kompartmentsyndrom entsteht durch Druckerhöhungen in der Bauchhöhle bspw. nach Bauchverletzungen oder ausgedehnten Operationen. Die resultierende Kompression mit Beeinträchtigung der Perfusion kann nicht nur die Bauchorgane schädigen, sondern auch zu Multiorganversagen und hämodynamischer Instabilität führen. Daher handelt es sich um ein lebensbedrohliches Krankheitsbild, das schnell erkannt und therapiert werden muss.

- **Ätiologie**

- Trauma des Beckens oder Abdomens
- Intraabdominelle Blutungen
- Ausgedehnte Bauchoperationen
- Massive Volumengabe
- Barrierestörungen wie bei Sepsis

- **Klinik**

- Prall gespanntes Abdomen
- Ansteigende Beatmungsdrücke
- Oligurie
- Hämodynamische Instabilität

- **Diagnostik:** Messung des intraabdominellen Druckes

- **Goldstandard:** Druckabnehmer in Harnblasenkatheter
 - Vorteil: Wenig invasiv, ein Harnblasenkatheter ist ohnehin in der Regel erforderlich

- **Komplikationen**

- Nierenversagen
- Respiratorische Insuffizienz
- Darmatonie, Barrierestörung, Peritonitis
- Multiorganversagen bis Tod

- **Therapie:** Laparotomie zur Dekompression

- **Prävention:** Nach ausgedehnten Operationen oder Unfällen ggf. kein sofortiger vollständiger Wundverschluss

Diagnostik

- **Messung des Gewebedrucks mit Messfühler**

- Normaldruck: <10 mmHg
- Kompartimentdruck: 30–40 mmHg

- **Erfassung der Durchblutung:** Bei nicht palpablen peripheren Pulsen mit Pulsoxymeter und Dopplersonographie

Therapie

Konservative Therapie bei drohendem Kompartment-Syndrom

- Kühlen und leichtes Anheben der Extremität zur Druckentlastung
- Antiphlogistische Therapie
- Entfernen komprimierender (Gips-)Verbände
- Regelmäßige Kontrolle → Im Zweifelsfall sehr frühes operatives Vorgehen!
„Hochlagerung kann durch Senkung der Durchblutung die Ischämie verschlimmern!“

Operative Therapie bei manifestem Kompartment-Syndrom

- Wiederherstellung der Perfusion durch Entlastung mittels einer früheren Faszien-spaltung (**Dermatofasziotomie**) innerhalb der ersten 6 h mit anschließender offener Wundbehandlung

Komplikationen

- Muskel- und Weichteilnekrosen mit erhöhter Infektionsgefahr
- Nervenläsion (v.a. N. tibialis und N. peroneus)
- Rhabdomyolyse, Crush-Niere
- Muskelkontrakturen
- **Rebound-Kompartmentsyndrom:** Tritt 6–12 h nach operativer Reperfusion aufgrund von erhöhter Kapillarpermeabilität auf

Osteoporose ++

Bei der Osteoporose kommt es durch einen **Mangel an Knochenmasse** zu einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber Knochenbrüchen, was wiederum zu einer wesentlich erhöhten Morbidität und Mortalität im Alter beiträgt.

Definition

- **Osteoporose:**
 - Unzureichende Knochenfestigkeit
 - Materialschwund (*perte*) an organischem (Kollagen, Proteoglykane) und anorganischem Anteil (Mineralien, vor allem Calcium) des Knochens gleichermaßen
- **Osteopenie:** Vorstufe der Osteoporose
- **T-Score:** Durch Densitometrie (Knochendinsität)
 - **Osteopenie:** T-Score -1 bis $>-2,5$ Standardabweichungen
 - **Osteoporose:** T-Score $\leq -2,5$ Standardabweichungen
 - **Manifeste Osteoporose:** T-Score $\leq -2,5$ Standardabweichungen **+ Fraktur**

Von der Osteoporose ist die Osteomalazie abzugrenzen, die durch eine verminderte Mineralisation der Knochen gekennzeichnet ist.

Epidemiologie

- Geschlecht: ♀ > ♂
- Frauen sind häufiger von primärer, Männer häufiger von sekundärer Osteoporose betroffen.

Ätiologie

- **Primäre Osteoporose (ca. 90%)**
 - Typ I: Postmenopausale Osteoporose
 - Typ II: Senile Osteoporose
 - Idiopathische Osteoporose
- **Sekundäre Ursachen (ca. 10%)**
 - Medikamentös/iatrogen: systemische Langzeittherapie mit **Glucocorticoiden**. Langzeittherapie mit **Protonenpumpenhemmern**, Antiepileptika, Heparin
 - Immobilisation
 - Endokrin/Metabolisch: **Hypercortisolismus** (**Cushing Syndrom**),
- **Risikofaktoren**
 - **Alkoholabusus**
 - **Starker Nikotinabusus**
 - **Frühe Menopause**

Die Cushing-Schwelle (Tagesbedarf) bei einer Dauertherapie mit Glucocorticoiden beträgt 7,5 mg Prednisolonäquivalent/Tag! (Überschreitet man den Tagesbedarf, droht logischerweise ein Hypercortisolismus/Cushing-Syndrom)

Pathophysiologie

- **High-turnover-Osteoporose:** Gesteigerter Knochenabbau führt zum Verlust von Knochensubstanz
- **Low-turnover-Osteoporose:** Verringerter Knochenstoffwechsel führt zum Verlust von Knochensubstanz

Symptome/Klinik

- **Frühsymptom:** Diffuse **Rückenschmerzen**
- **Später:** **Kyphosierung** der BWS mit **Rundrückenbildung** (Gibbus) und **Minderung der Körpergröße**
- **Pathologische Frakturen:**
 - **Senile Osteoporose** → Frakturen von Oberschenkelhals, subkapitalem Humerus und distalem Radius (trabekuläre und kortikale Schädigung)

- **Postmenopausale Osteoporose** → Wirbelkörpereinbrüche (vor allem trabekuläre Schädigung)

Diagnostik

Anamnese und körperliche Untersuchung

- Zeitpunkt der **Menopause**, Bewegung, **Medikamentenanamnese** (z.B. Glucocorticoide)
- Verlust der Körperhöhe → Regelmäßiges Messen
- **Tannenbaumphänomen**(*Weihnachtsbaum*): Charakteristische Hautfalten des Rückens, die durch die Abnahme der Körperhöhe entstehen (sapin).

Laboruntersuchungen

- Blutbild und Entzündungsparameter (BSG, CRP) (Ausschluss einer entzündlicher rheumatischer oder auch maligner Erkrankungen)
- Alkalische Phosphatase: Normwertig bis leicht erhöht (Da bei pathologischen Frakturen die Osteoblastenaktivität erhöht ist (Frakturheilung), erhöht sich auch die AP).
- γ -GT (hepatische Ursache für eine Erhöhung der AP?)
- Serumcalcium und Serumphosphat (Hyperparathyreoidismus als Ursache einer Osteopenie?)
- Kreatinin (renale Osteopathie?)
- Ggf. Vitamin D (Ein Vitamin-D-Mangel gilt als Risikofaktor für eine Osteoporose. Außerdem ist die Osteomalazie in Folge eines Vitamin-D-Mangels eine wichtige Differentialdiagnose)
- TSH (Eine Hyperthyreose kann Ursache einer Osteopathie sein)
- **Urin:** „Crosslinks“ \uparrow (Querverbindungen zwischen Kollagenmolekülen, die durch erhöhten Knochenumsatz vermehrt über den Urin ausgeschieden werden. Eine Früherkennung der peri- oder postmenopausalen Osteoporose bei normalen Knochendichtewerten ist durch die Bestimmung der Crosslinks möglich)

Apparative Diagnostik

- **Osteodensitometrie**
 - Dual X-ray-Absorptiometry (**DXA**): Messung der Knochenflächendichte
 - Quantitative Computertomographie (QCT): Messung der echten physikalischen Dichte
- **Konventionelles Röntgen in 2 Ebenen**
 - Vermehrte **Strahlentransparenz** erst ab Verlust von **30%** der Knochenmasse sichtbar
 - **Verschmälerung** (*schmäler werden*) **der Kortikalis**
 - **Rarefizierung der Trabekel** des Wirbelkörpers
 - Vertikal „gestreifte“ Wirbelkörper
 - Rahmenstruktur
 - Fischwirbel, Keilwirbel und Plattwirbel

Differentialdiagnosen

- Ossäre Metastasen
- Plasmozytom
- Intraossäres Hämangiom (Wirbelkörperhämangiom)

Therapie

Osteoporose- und Frakturprophylaxe

- **Körperliche Aktivität:** Mobilisation, Krankengymnastik, Muskelstärkung
- **Ernährung**
 - Verzicht auf Alkohol und Nikotin
 - Ausreichende Zufuhr von Calcium und Vitamin D3
 - Ggf. medikamentöse Nahrungsergänzung
- **Sturzgefahr reduzieren**
 - Absetzen sedierender Medikamente
 - Einsatz apparativer Hilfen (Gehhilfe, Rollator, etc.)

- **Supportive Maßnahmen**

- Wärmetherapie
- Heliotherapie (Behandlung durch Sonnenlicht)

Ohne körperliche Bewegung ist die Einnahme von Calcium und Vitamin D3 nutzlos!

- **Medikamentöse Therapie**

- **Indikation**

- Osteoporotische Wirbelkörperfraktur bei $T\text{-Wert} \leq -2,0$
- Niedrige Knochendichte und hohes Lebensalter
- Vorliegen von weiteren Risikofaktoren (Langzeittherapie mit Glucocorticoiden, multiple Stürze, Epilepsie, Immobilität, Nikotinkonsum)

- **Therapie der postmenopausalen Osteoporose**

- **Klasse-A-Medikamente**

- **Bisphosphonate:** Minderung des Knochenabbaus durch Hemmung der Osteoklasten. (z.B. Alendronat)
- **Strontiumranelat:** Steigert den Knochenaufbau, hemmt den Abbau
- **Parathormon-Analoga** (Teriparatid): Führt zur Steigerung der Resorption von Calcium sowie zur Ausscheidung von Phosphat in der Niere und stimuliert die Synthese von Vitamin D3. Anwendungsdauer auf max. 24 Monate begrenzt

„Bisphosphonate sollten morgens und mindestens 30 Minuten vor dem Essen (Verhindern der Komplexbildung mit Calcium) mit reichlich Leitungswasser in aufrechter Körperhaltung (Verhindern von Ösophagitis) eingenommen werden!“

- **Weitere Medikamente**

- **Calcitonin:** Osteoklastenhemmung, antiresorptiv

- **Osteoporose des Mannes:** Bisphosphonate, Teriparatid

- **Glucocorticoid-induzierte Osteoporose:** Bisphosphonate, Teriparatid

„Nach osteoporosetypischen Frakturen soll bei älteren Patienten i.d.R. eine spezifische Osteoporosetherapie eingeleitet werden.“

Klavikulafraktur +

Ätiologie

- Indirektes Trauma
 - Meist: Gewalteinwirkung auf das Schultergelenk mit Biegebelastung (*charge de flexion*) auf die Klavikula
 - Selten: Sturz auf den (ausgestreckten) Arm oder die Schulter (*étendu*)
- Direktes Trauma: Direkte Gewalteinwirkung auf die Klavikula



Klassifikation

Klassifikation nach Allman (nach Lokalisation)

| Gruppe | Lokalisation der Fraktur | Häufigkeit |
|--------|-----------------------------|------------|
| 1 | Mittleres Drittel | 80% |
| 2 | Laterales/distales Drittel | 15% |
| 3 | Mediales/proximales Drittel | <5% |

Klassifikation nach Jäger

| Gruppe | Lokalisation der Fraktur | Stabilität |
|--------|---|--|
| I | Fraktur lateral des Ligamentum coracoclaviculare | Stabil |
| II | Fraktur innerhalb des Lig. coracoclaviculare (am häufigsten) | a : Ruptur des Lig. conoideum : Instabil |
| | | b : Ruptur des Lig. trapezoideum : Ggf. instabil |
| III | Fraktur medial des Lig. coracoclaviculare (selten) | Instabil |
| IV | Luxation der lateralen Klavikula aus ihrem Periostschlauch (bei Kindern und Jugendlichen) | Instabil |



Symptome/Klinik

- **Frakturzeichen** (siehe)
- **Spezifische Zeichen** : Stufenbildung, Schonhaltung in Adduktion. Verkürzter Schultergürtel.

Diagnostik

Klinische Untersuchung

- Überprüfung der peripheren Durchblutung, Motorik und Sensibilität (pDMS)
- Frakturzeichen (siehe)
- **Klaviertastenphänomen** (v.a. bei Fraktur mit Zerreißen des korakoklavikulären Lig.)
- **Begleitverletzungen** : Weichteilverletzungen (Nerven : Plexus brachialis). Organverletzungen (Pneumothorax). Rippenfraktur.

Apparative Diagnostik

- **Röntgenaufnahme der Klavikula in zwei Ebenen**: a.p. und tangential.
 - Frakturzeichen (siehe)
- Ggf. CT/MRT

Differentialdiagnosen

- Schulterprellung oder –distorsion
- Luxation des Acromioclaviculargelenks

Therapie

Konservative Therapie

- **Indikation**: Bei einfachen, nicht-dislozierten, geschlossenen Frakturen (v.a. Proximal und distal) mit intakter pDMS
- **Durchführung**
 - Keine Reposition i.d.R.!
 - Ruhigstellung mittels **Rucksackverband**, über 3–4 Wochen

Operative Therapie

- **Indikation** : Bei dislozierten Frakturen, offenen Frakturen, schwerer Weichteilverletzung, Begleitverletzungen (Rippenfraktur, Pneumothorax) oder Versagen der Konservativen Therapie.
- **Durchführung**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Laterale/distale Fraktur | Plattenosteosynthese |
| Schaftfraktur (diaphysäre) | Elastische intramedulläre Nagelung (ESIN) oder Plattenosteosynthese |
| Mediale/proximale Fraktur | Kein Standardverfahren, ggf. Plattenosteosynthese |

Allgemeine Maßnahmen

Schmerzadaptierte Analgesie (z.B. mit Ibuprofen). Klinische und radiologische Kontrollen (nach 1, 3, 6 Wochen). Physiotherapie

Komplikationen

- **Allgemein** : Fehlstellung, Pseudarthrose, neurovaskuläre Kompression durch hypertrophe Kallusbildung
- **Komplikationen nach Osteosynthese** : (siehe)
 - **Spezifische Komplikationen**: Verletzung von Plexus brachialis oder Lunge/Pleura

Schultergelenkluxation +

- **Häufigste Luxation** des Menschen. ♂ > ♀ (3:1)

Ätiologie (und Klassifikation)

- **Traumatisch** (indirekten Krafteinwirkung)
 - **Anteriore Luxation** +++ (95%): bei Sturz auf den ausgestreckten und abduzierten Arm, v.a. Sportunfall
 - **Posteriore Luxation** (3%) : bei Krampfanfall oder Elektrounfall
 - **Inferiore Luxation** (0,5%) : bei Sturz auf den gestreckten, hyperabduzierten Arm
 - Seltene Varianten: Luxatio superior, Luxatio intrathoracica
- **Habituell** bei angeborener Dysplasie oder Schwäche der Bandführung, ohne adäquates Trauma bei physiologischer Bewegung
- **Posttraumatische, rezidivierende Luxation** nach Ersttrauma, Prädisposition durch
 - Verletzung des Pfannenrandes (= Bankart-Läsion)
 - Impressionsläsion am Humeruskopf (= Hill-Sachs-Läsion)
 - Dilatierte Gelenkkapsel
 - Schädigung von Kapsel- und Bandstrukturen

Symptome/Klinik

- Schmerzhafte, federnde (*élastique*) Fixierung des Arms in luxierter Stellung
 - Lux. ant.: Außenrotations- und Abduktionsstellung
 - Lux. post.: innenrotations- und Abduktionsstellung
 - Lux. inf.: Abduktionsstellung
- „Delle“ (tastbare leere Gelenkpfanne) *creux*
- Humeruskopf disloziert tastbar
- Hervorstehendes (*protubérant*) Akromion

Diagnostik

Klinische Untersuchung

- Frakturzeichen (siehe)
- pDMS


Röntgen bei Schulterluxation

- **Indikation:** Nach Sicherung der Diagnose durch das Röntgen sollte zügig reponiert werden, bevor weitere Diagnostik angeschlossen wird!
- **Durchführung:** Schultergürtel (in mind. zwei Ebenen)
- **Mögliche Nebentbefunde bei Schulterluxation**
 - Fraktur
 - **Hill-Sachs-Läsion** (Hill-Sachs-Delle)
 - Dorso-laterale Impression des Humeruskopfes bei vorderer Luxation
 - Erhöhtes Rezidivrisiko
 - Reverse-Hill-Sachs-Läsion
 - Ventro-kraniale Impression des Humeruskopfes bei hinterer Luxation
 - Erhöhtes Rezidivrisiko

„Bei Primärvorstellung werden ca. 60% aller posterioren Schulterluxationen übersehen.“

MRT (Alternative: Arthro-MRT)

- **Indikation**
 - Zum Ausschluss einer Verletzung von Knorpel- oder Kapselgewebe
 - Unter anderem indiziert bei Nachweis einer Hill-Sachs-Delle
- **Befunde**
 - **Bankart-Läsion**
 - Läsion des anterior-inferioren Labrum glenoidale
 - Erhöhtes Rezidivrisiko
 - Weichteilverletzungen
 - Knöcherne Begleitverletzungen



Therapie

Konservativ: Schulterreposition



Grundprinzipien zur Durchführung

- **Schnellstmögliche Reposition anstreben**
- **Vor der Reposition**
 - Kontrolle von Durchblutung, Motorik, Sensibilität (N. axillaris!) und radiologischem Status
 - Ggf. Analgesie. Ggf. Sedierung
- **Während der Reposition**
 - Dem Patienten alle Arbeitsschritte erklären und Repositionsbewegungen langsam und kontrolliert ohne ruckartige (*saccadé*) Bewegungen durchführen
 - Bei Auftreten von Schmerzen: Gelenkmanipulation unterbrechen
 - um Komplikationen (wie z.B. Frakturen oder Gefäß- und Nervenläsionen) zu vermeiden
- **Zeichen einer erfolgreichen Reposition**
 - Für den Patienten: Kurz auftretender Schmerz, dann Schmerzbefreiung
 - Für den Arzt: Spür- bzw. hörbares Reiben
- **Nach der Reposition**
 - Kontrolle von Durchblutung, Motorik, Sensibilität (N. axillaris!) und radiologischem Status
 - Anschließend Ruhigstellung im **Desault- oder Gilchrist-Verband** mit funktioneller Behandlung

Varianten zur Reposition einer vorderen Schulterluxation


In der Regel kommen zur Schulterreposition schonende Verfahren zum Einsatz (z.B. die Repositionstechniken nach Stimson oder Milch). Diese machen sich eine Kombination aus Traktions- und Hebelbewegungen (*levier*) sowie ggf. eine direkte Manipulation an der Scapula oder am Humerus zunutze.

- **Reposition nach Stimson**
 - Patient in Bauchlage
 - Die luxierte Schulter des Patienten wird etwas hochgelagert und am Arm des Patienten wird ein Gewicht befestigt, dessen stetiger Zug nach einer Weile zur Entspannung der Schultermuskulatur und zum Zurückgleiten des Humerus in die Gelenkpfanne führt.
 - Als Alternative zum Gewicht kann der Untersucher auch selbst an dem herabhängenden (und im Ellenbogengelenk gebeugten) Arm des Patienten einen leichten Zug ausüben.
 - Ggf. kann zusätzlich der Angulus inferior der Skapula mit dem Daumen nach kraniomedial geschoben werden.
- **Reposition nach Milch**
 - Patient in Rückenlage
 - Arm des Patienten wird im Ellenbogen rechtwinklig gebeugt
 - Vorsichtige passive Abduktion, Außenrotation und Elevation des Armes, der in Überkopf-Lage auf der Liege abgelegt wird;
 - Ggf. vorsichtiger axialer Zug am Arm (nach kranial) sowie evtl. direkte Manipulation am Humeruskopf in der Axilla



- **Reposition nach Arlt**

- Der Patient sitzt auf einem Repositionsstuhl, seine Achselhöhle liegt auf einem Achselpolster auf.
- Der Unterarm des Patienten ruht auf dem Oberschenkel des Untersuchers, der den Oberarm des Patienten etwa 45° abduziert und einen leichten axialen Zug ausübt (Es kann einige Minuten dauern)
- Ggf. kann der Untersucher eine leichte axiale Rotationsbewegung durchführen.



- **Schulterreposition nach Hippokrates** (selten angewendet, Gefahr einer Nervenschädigung)

Operativ

- **Primäre bzw. notfallmäßige Indikationen:** Begleitverletzungen (Gefäß- oder Nervenverletzungen). Erfolgreiche Reposition
- **Sekundäre Operation** (bei rezidivierenden Luxationen) nach weiterer Diagnostik zur Reduzierung des Risikos einer Reluxation.
 - Bei jungen und sportlich aktiven Patienten wird eine frühe OP-Indikation gestellt
 - Ziel ist die offene oder arthroskopische Wiederherstellung und Stabilisierung des Gelenks

Komplikationen

- **Akute Komplikationen**

- Läsion des N. axillaris : Sensibilitätsstörung über der lateralen, proximalen Schulter. Lähmung des M. deltoideus
- Läsion des Plexus brachialis oder der A. und V. axillaris
- Abrissfraktur des Tuberculum majus/minus
- Verletzungen der Rotatorenmanschette (Rotatorenmanschettenruptur)

- **Spätfolgen**

- Hyperlaxizität des Glenohumeralgelenks
 - Positives Sulcus-Zeichen: Sichtbare Dellenbildung am lateralen Akromionrand nach leichtem axialen Zug am Humerus nach kaudal
- Bewegungseinschränkung/Adduktionskontraktur bei langer Ruhigstellung
- Omarthrose
- Posttraumatische Arthrofibrose

Prognose

- Hohe Rezidivneigung
 - Mehrzahl der Patienten ≤ 30 Jahren erleidet ein Rezidiv nach Erstluxation
 - Nach operativer Versorgung ist die Rezidivrate deutlich niedriger

Prävention

- Prophylaxe eines vorderen Schulterluxationsrezidivs
 - Gezieltes Training des M. subscapularis


Sprunggelenksfraktur +

Ätiologie

- **Trauma durch Adduktion:** Eher Außenknöchelfrakturen vom Typ Weber A oder Innenknöchelfrakturen
- **Trauma durch Abduktion:** Eher Außenknöchelfrakturen vom Typ Weber B oder C

Klassifikation (Einteilung nach Weber)

- **Weber A:** Fraktur des Außenknöchels (Malleolus lateralis) unterhalb der Syndesmose (intakte Syndesmose) (*unechtes Gelenk*)
- **Weber B:** Fraktur des Außenknöchels in Höhe der Syndesmose (mit möglicher Läsion der Syndesmose)
- **Weber C:** Fraktur des Außenknöchels oberhalb der Syndesmose (rupturierte Syndesmose und Membrana interossea)
 - **Maisonneuve-Fraktur:** Ruptur der Syndesmose. Zerreißung der Membrana interossea. Hohe/subkapitale Weber-C-Fraktur.
- **Mögliche Begleitverletzungen:** Innenknöchelfraktur (Malleolus medialis) oder Riss des Lig. deltoideum (Verbindung zwischen Malleolus medialis und Calcaneus). Fraktur der hinteren Tibiakante (bord) (**Volkman-Dreieck**) (bei Weber-B- und -C-Frakturen)



Symptome/Klinik

- Frakturzeichen (siehe)
- Bei Sprengung der Sprunggelenksgabel → Fehlstellung

Sonderformen

- **Pilon-tibiale Fraktur:** Fraktur der distalen Tibiagelenkfläche
- **Trimalleoläre Fraktur:** Fraktur von Innen- und Außenknöchel sowie Fraktur der hinteren Tibiakante (Volkmann-Dreieck)
- **Sprunggelenkluxationsfraktur:** Bimalleoläre Fraktur mit Sprengung (explosion) der Sprunggelenksgabel

Diagnostik

Körperliche Untersuchung

- Überprüfung der peripheren Durchblutung, Motorik und Sensibilität (pDMS)
- Frakturzeichen (siehe)
- Druck auf die Fibula im gesamten Verlauf zum Ausschluss einer hohen Weber-C-Fraktur

Apparative Diagnostik

- **Röntgenaufnahme des Sprunggelenkes in zwei Ebenen:** a.p. und seitlich.
 - Frakturzeichen (siehe)
- **Röntgen Unterschenkel in zwei Ebenen:** Bei V.a. hohe Fibulafraktur
- Ggf. CT/MRT

Differentialdiagnosen

- Isolierte ligamentäre Verletzungen
- Isolierte Fibulafraktur
- Frakturen der Fußwurzel- oder Mittelfußknochen

Therapie

Konservative Therapie

- **Indikation:** Weber-A-Frakturen und undislozierte Weber-B-Frakturen
- **Durchführung:** Ruhigstellung mittels Unterschenkelgips, für etwa 6 Wochen

Operative Therapie

- **Indikationen:** Weber-C-Frakturen sowie dislozierte Weber-B-Frakturen.
- **Durchführung :**
 - Naht der Syndesmose und anderer Bandstrukturen
 - Stabilisierung der Fragmente mittels Schrauben
 - Postoperative Ruhigstellung im Unterschenkelgips für etwa 6 Wochen.

Allgemeine Maßnahmen :

- Schmerzadaptierte Analgesie (z.B. mit Ibuprofen).
- Thromboseprophylaxe.
- Klinische und radiologische Kontrollen (nach 1, 3 und 6 Wochen).
- Physiotherapie

Komplikationen

- **Allgemeine Komplikationen:** Blutung. Weichteilverletzungen (Nerven, Gefäße, Sehnen). Fehlstellung. Pseudarthrose. Arthrose (bei artikulären Frakturen). Kompartmentsyndrom. Wundinfektion/Osteomyelitis (insb. bei offenen Frakturen)
- **Komplikationen nach Osteosynthese :** Blutung. Weichteilverletzungen (Nerven, Gefäße, Sehnen). Fehlstellung. Pseudarthrose. Arthrose (bei artikulären Frakturen). Thrombose/ Embolie.
Materialbruch
- **Spezielle Komplikationen :** Nervus-peroneus-communis-Läsion oder Nervus-saphenus-Läsion. Knorpelabscherungen des Talus („Flake Fracture“). Abrissfraktur des Volkmann-Dreiecks. Kompartiment-Syndrom. Posttraumatische Arthrose (Die Arthrose des oberen Sprunggelenks ist – im Gegensatz zur Arthrose in Hüft- und Kniegelenk – in den meisten Fällen posttraumatischer Genese)

Rheumatoide Arthritis +

chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung unklarer Genese.

Beginn 35 - 50 Lebensjahr. ♀ > ♂

Klassifikation (ACR/EULAR)

- **Kriterien** : Geschwollene oder schmerzhafte Gelenke, Serologie (RF, Anti-CCP-AK), Entzündungsparameter (CRP, BSG), Symptombdauer
- **Rheumatoide Arthritis** = ≥ 6 Punkte + gesicherte Synovitis

Symptome/Klinik

- **Allgemeinsymptome** : Nächtliches Schwitzen. Subfebrile Temperaturen
- **Spezifische Symptome**: Polyarthritis vor allem der kleinen Fingergrundgelenke. Tendovaginitis und Bursitis. Karpaltunnelsyndrom
- **Klinische Verdachtskriterien**: Symmetrische Schwellung der Fingergrund- und – mittelgelenke. Schmerzhaftigkeit auch in Ruhe. Morgensteifigkeit. Rheumaknoten (Indolenter, subkutaner Knoten)
- **Organmanifestationen** : Lunge (Pleuritis, Lungenfibrose). Herz (Peri- und Myokarditis). Augen (Keratoconjunctivitis sicca: sekundäres Sjögren-Syndrom). Vaskulitis (Raynaud-Syndrom) „Fingerendgelenke sind i.d.R. nicht betroffen und die Erkrankung verläuft schubweise“

Diagnostik

ACR/EULAR-Klassifikationskriterien ++

Körperliche Untersuchung

- **Gaenslen-Zeichen**: Kompressionsschmerz der Hand auf Höhe der Fingergrundgelenke

Labor

- **Unspezifische Laborwerte** : CRP, BSG, Ferritin ↑. Entzündungsanämie
- **Spezifische Laborwerte** : **Anti-CCP-Antikörper** ↑ (hohe Spezifität). Rheumafaktoren ↑. Ggf. Antinukleäre Antikörper ↑

Apparative Diagnostik

- **Röntgen**: Röntgen-Aufnahme beider Hände und beider Füße (Periartikuläre Weichteilschwellung, Gelenkspaltverschmälerung, Erosionen)
- **Sonographie** : Gelenkerguss, Tendosynovitis, Bursitis (sensitiver als Röntgen)
- **MRT**: Sensitiver als Röntgen
- **Evtl. Gelenkpunktion mit Synovialanalyse**

Differentialdiagnosen

Psoriasis-Arthritis. Bakterielle Arthritis. Reaktive Arthritis. Rheumatisches Fieber,...

Therapie

Physikalisch

- Im akuten Schub: Kälteanwendungen
- Bewegungstherapie

Medikamentös

- **Akut** : **Glucocorticoide** (Systemisch. Ggf. intraartikulär)
- **Langfristig** : **Methotrexat (MTX)**. Ggf. Biologicals (Infliximab)

Interventionell

- **Radiosynoviorthese** (Behandlung mittels radioaktiver Substanzen)

Chirurgisch

- **Synovektomie**

Komplikationen

- Unbehandelt und/oder bei schwerem Verlauf kommt es zur irreversiblen Destruktion der betroffenen Gelenke mit Versteifung und Fehlstellung ("Rheumahand")
- Weitere Komplikationen : Erhöhtes Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt


Sonderform : **Felty-Syndrom** : schwere seropositive rheumatoide Arthritis, die mit Splenomegalie und Granulozytopenie einhergeht

Orthopädische Untersuchungszeichen + Beweglichkeitsprüfung (Neutral-Null-Methode)

- Bestimmung des Bewegungsmaßes jedes Gelenks in Winkelgraden: z.B. Extension mit Gradzahl - Neutralstellung mit Gradzahl - Flexion mit Gradzahl
- Die Null wird normalerweise in die Mitte der drei angegebenen Zahlen gesetzt
- **Beispiele für physiologisches Bewegungsmaß einiger Gelenke**
 - Kniegelenk → Extension/Flexion: 0/0/150
 - Hüftgelenk → Außenrotation/Innenrotation: 50/0/40; Extension/Flexion 20/0/140; Abduktion/Adduktion 50/0/30
 - Ellbogengelenk → Extension/Flexion 10/0/150; Pronation/Supination des Unterarms: 90/0/90
 - Schultergelenk → Abduktion/Adduktion: 180/0/40; Außenrotation/Innenrotation: 60/0/90; Anteversion/Retroversion: 160/0/40

Untersuchung des Kniegelenks

- **Beurteilung der Beinachsen**
 - Von ventral (Genu valgum/Genu varum?)
 - Von lateral (Genu recurvatum/Genu flexum?)
- **Beweglichkeitsprüfung**
- **Untersuchung der Kreuzbänder**
 - **Schubladen-Tests** : unspezifischer Test zur Untersuchung **beider Kreuzbänder**. Der Untersucher testet die Verschieblichkeit der Tibia gegenüber dem Femur am flektierten Knie. Bei erhöhter ventraler oder dorsaler Verschieblichkeit ist eine Läsion des vorderen Kreuzbandes (ventral) oder des hinteren Kreuzbandes (dorsal) zu vermuten.
 - **Lachman-Test** : Test zur Untersuchung des **vorderen Kreuzbandes**. Der Untersucher testet am leicht flektierten Knie den Anschlag des vorderen Kreuzbandes.
 - Physiologisch: sofortiger harter Anschlag.
 - Verlängerung: verspäteter Anschlag.
 - Schädigung: fehlender oder weicher Anschlag
- **Untersuchung der Menisken**
 - **Steinmann-I-Zeichen** : Der Untersuchende beugt das Knie bei gleichzeitig forcierter Rotation im Kniegelenk. Schmerzen bei der Innenrotation sprechen für eine Läsion des Außenmeniskus, Schmerzen bei der Außenrotation für eine Läsion des Innenmeniskus.
 - **Steinmann-II-Zeichen** : Der Untersuchende palpiert das Kniegelenk am medialen bzw. lateralen Gelenkspalt. Das Knie wird passiv gebeugt und gestreckt. Schmerzen beim Beugen sowie beim Strecken des Kniegelenks = Meniskusläsion.



Koxarthrose und Gonarthrose +/-

- **Arthrose:** Chronisch-progrediente Destruktion des hyalinen Gelenkknorpels
- **Gonarthrosis deformans:** Arthrose des Kniegelenks
- **Coxarthrosis deformans:** Arthrose des Hüftgelenks
- **Häufige Erkrankungen** des Erwachsenen :I.d.R. des älteren Menschen (≥ 50 Jahre) oder posttraumatisch ♀ > ♂

Ätiologie

Primärarthrose: Idiopathisch

- **Idiopathische Genese**
- **Prädispositionsfaktoren :** Weibliches Geschlecht. BMI >25. Höheres Lebensalter

Sekundärarthrose

- **Allgemein**
 - Posttraumatische
 - Stoffwechsel- und metabolische Erkrankungen: Hypercholesterinämie, Hyperurikämie, Hämochromatose, Diabetes mellitus
- **Spezifisch**
 - **Gonarthrose :** Genu valgum/varum/recurvatum. Kniebinnenschäden
 - **Koxarthrose :** Hüftgelenkdysplasie und Hüftgelenkluxation

Symptome/Klinik

- **Koxarthrose**
 - Schmerz in der Leistenregion und über dem Trochanter major
 - Initial eingeschränkte Innenrotation, später Innen- und Außenrotation schmerzhaft
- **Gonarthrose**
 - Schmerz des Kniegelenks
 - Belastungsinduzierte Kniegelenksschwellung, ggf. mit intraartikulärer Ergussbildung
 - Instabilitätsgefühl
- **Aktivierte Arthrose:** Kardinalzeichen der Entzündung

Diagnostik

Anamnese

- **Schmerz :** Akute Schmerzepisode vs. chronischer Schmerz. Bewegungsschmerz. Morgensteifigkeit. Ruhe- und Nachtschmerz
- **Bewegungs- und Funktionseinschränkung**

Körperliche Untersuchung

- **Inspektion :** Achsverhältnisse im Stehen. Gangbild
- **Palpation :** Druckschmerz. Periartikuläre Schwellungen
- **Funktionsuntersuchung**

Röntgen

- Arthrosezeichen. Verkalkung von Weichteilstrukturen

Therapie

Konservative Therapie

- **Nicht-medikamentöse Therapie**
 - Patientenaufklärung und -edukation: Bewegung im Rahmen gelenkschonender Sportarten (bspw. Schwimmen, Radfahren), Vermeidung von High Impact-Sportarten
 - Physiotherapie und physikalische Therapie

- Orthopädische Hilfsmittel: Einlagen, Pufferabsätze , Unterarmgehstützen („Gehstock“ auf der gesunden Seite zur Entlastung des betroffenen Beines)
- **Medikamentöse Therapie nach WHO-Stufenschema**
 - Topische NSAR
 - Orale NSAR (bei erhöhtem GI-Risiko: Plus PPI)
 - Orale Opioide: Kurzzeitig in der niedrigsten wirksamen Dosis

Operative Therapie

Gelenkerhalt

- **Arthroskopien:** Bspw. arthroskopische (Teil-)Meniskektomie oder Entfernung freier Gelenkkörper
- **Knorpelersatzverfahren:** Insb. bei fokalen Defekten der Gonarthrose
- **Umstellungsosteotomien**

Gelenkersatz

- **Indikationen :** Schmerz für mind. 3–6 Monate und Nachweis eines Strukturschadens. Versagen konservativer Therapiemaßnahmen
- **Hemiprothesen**
 - **Koxarthrose:** Duokopfprothese
 - **Gonarthrose:** Unikondyläre Schlittenprothese
- **Totalendoprothesen (TEP)**
 - **Koxarthrose:** Hüft-TEP
 - **Gonarthrose:** Knie-TEP
- **Arthrodesen :** Operative Gelenkversteifung

Komplikationen

- **Aseptische Prothesenlockerung:** Häufigste Spätkomplikation
- **Beschwerdepersistenz** und -progression
- **Protrusionskoxarthrose**
- **Periartikuläre Verknöcherungen** (Ossifikationen)

Karpaltunnelsyndrom +/-

- chronische Kompression des Nervus medianus im Karpaltunnel.

Ätiologie

- Idiopathisch
- Überlastung
- rheumatoider Arthritis
- Trauma
- Risikofaktoren : Familiäre Prädisposition. Schwangerschaft. Diabetes mellitus, Hypothyreose

Symptome/Klinik

- Frühsymptom: **Nächtliche Schmerzen** und Parästhesien im Nervenversorgungsgebiet (palmare Hand und Finger I–III). Besserung der Symptomatik durch Schütteln oder Massieren der Hände
- Hypästhesie im Nervenversorgungsgebiet
- Spätsymptom: Thenarmuskelatrophie
- Beidseitiger Befall in 1/3 der Fälle

Diagnostik

- **Klinische Untersuchung**
 - **Hoffmann-Tinel-Zeichen:** Das Beklopfen des Karpaltunnels führt zu Schmerzen distal im Versorgungsgebiet des N. medianus.
 - **Karpalkompressionstest :** Druck auf den Karpaltunnel löst Schmerzen distal im Versorgungsgebiet des N. medianus aus
- **Apparative Diagnostik**
 - **Elektro-neurographie:** Nachweis einer verringerten Nervenleitgeschwindigkeit des N. medianus. Sie bestätigt die Diagnose.

Therapie

- **Konservativ**
 - Nächtliche Ruhigstellung
 - Kurzzeitig analgetische Therapie (NSAR)
- **Operativ**
 - Indikation: dauerhafte Dysästhesie, Thenarmuskelatrophie, Versagen der konservativen Therapie
 - Operative Spaltung des Ligamentum carpi transversum

Bei pathologischer apparativer Diagnostik ohne klinische Symptome ist keine Therapie indiziert!

Komplikationen

- Rezidive nach Operation: 1-2% der Fälle

Prognose

- Symptomverbesserung nach OP bei >80%

Kreuzschmerzen +/-

Definition

Schmerzen, die ein- oder beidseitig in der Region zwischen der 12. Rippe und der Gesäßfalte lokalisiert sind.

Häufigste Ursachen

- Akute oder chronische statische Fehlbelastungen der Wirbelsäule.
- Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule

Vorgehen

Anamnese

Körperliche Untersuchung

- Beurteilung statischer Veränderungen wie Beinlängenverkürzung, Wirbelsäulenfehlstellungen.
- Überprüfung auf Druck- und Klopfschmerzhaftigkeit der Wirbelsäule und des Iliosakralgelenks
- Überprüfung der Wirbelsäulenbeweglichkeit
- Überprüfung auf Nervendehnungsschmerzen und neurologische Untersuchung

Apparative Diagnostik

- **Labor:** BSG/CRP, BB, Kreatinin, Ca^{++} , AP, Elektrophorese, Urinstatus
- **Ggf. Röntgendiagnostik**
- **Erweiterte Diagnostik:** nach Verdacht und Fragestellung (Tab.1 und Tab.2).

Differenzialdiagnosen

Vertebrale Ursachen

| Verdachtsdiagnose | wegweisende Untersuchungen |
|--|--|
| Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen - Skoliosen, Kyphosen - Diskusprolaps - Spinalkanalstenose | <i>Röntgen</i> - CT, MRT - CT |
| Osteopathien/Stoffwechselerkrankungen: - Osteoporose - Osteomalazie; Morbus Paget | <i>Röntgen</i> - Knochendichtemessung - AP |
| Wirbelsäulentrauma (z. B. Wirbelkörperfrakturen) | <i>Röntgen</i> |
| Infektionen: Spondylitis, Spondylodiszitis (v. a. durch Staphylokokken, Brucellen, Tuberkelbakterien) | <i>Klinik (Infektionszeichen), CT, MRT</i> |
| Spondyloarthritiden: Spondylitis ankylosans, ... | <i>Klinik, Röntgen (auch Iliosakralgelenke), HLA-B27</i> |
| neoplastische Erkrankungen: Metastasen (Schilddrüsen-, Mamma-, Prostata-, Bronchialkarzinom), Lymphome (multiples Myelom),... | <i>Röntgen, Skelettszintigrafie, CT, Tumorsuche</i> |
| neurologische Erkrankungen: Radikulitis: z. B. bei Herpes zoster,... | <i>Klinik</i> |

Extravertebrale Ursachen

| Verdachtsdiagnose | wegweisende Untersuchungen |
|---|---|
| - Aortenaneurysma - Ulcus duodeni - akute Pankreatitis - Pyelonephritis; Nephrolithiasis - Prostatitis; Prostatatumoren - Uterus- oder Ovarialerkrankungen - Rektumkarzinom | - Sonografie, CT - Gastroskopie - Lipase, Amylase, Sonografie - Urinstatus, Sonografie - Klinik (rektale Untersuchung), PSA - gynäkologische Untersuchung - rektale Untersuchung, Rektoskopie |

Lumbaler Bandscheibenvorfall (Diskusprolaps) +/-

Definition

Verlagerung des Gallertkerns (Nucleus pulposus) der Bandscheibe durch Risse im Faserring. ^{النواة اللينة}

Stadien

- **Protrusion:** Vorwölbung des Faserrings (reversibel)
- **Prolaps:** Vorfall des Gallertkerns durch den zerrissenen Faserring in die Foramina intervertebralia bzw. den Spinalkanal (bedingt reversibel)

Ursachen

- Chronische oder akute Fehl- oder Überbelastung der Wirbelsäule. Begünstigung durch Adipositas, Schwangerschaft, untrainierte Rückenmuskulatur
- Degenerativ-fehlstatistische Erkrankungen: z. B. Spondylolisthesis, Spondylosis deformans, Skoliose.

Klinik - Einteilung

Leitsymptome (meist L 4/L 5 oder L 5/S 1 betroffen)

- **Lumbago:** Blitzartig einsetzende Kreuzschmerzen („Hexenschuss“) nach abrupter Bewegung oder schwerem Heben, verstärkt beim Husten oder Niesen
- **Wurzelkompressionssyndrom:** Schmerzausstrahlung meist nur in ein Bein, im Verlauf des N. ischiadicus (Ischialgie) oder des N. femoralis (Femoralgie). Sensible und motorische Ausfälle in Abhängigkeit von der Lokalisation des Bandscheibenvorfalles
- **Cauda-Syndrom** (selten): bilaterale Lähmung und Areflexie mit Sensibilitätsstörungen der Beine (neurochirurgischer Notfall!)
- **Conus-Syndrom** (selten): Sensibilitätsstörungen im Anogenitalbereich (neurochirurgischer Notfall!)

Formen

- **Protrusion:** Lumbago + Schmerzausstrahlung ohne neurologische Ausfälle
- **mediolateraler Prolaps** (90 %): Lumbago + Wurzelkompressionssyndrom
- **medialer Prolaps:** Lumbago + bilaterales Wurzelkompressionssyndrom + Kaudasyndrom
- **lateral Prolaps:** Wurzelkompressionssyndrom (ohne Lumbago).

Diagnostik

- **Überprüfung auf Nervendehnungsschmerzen:**
 - **Lasègue-Zeichen:** Passives Anheben des gestreckten Beines in Rückenlage führt nach wenigen Grad zu Schmerzen im Rücken
 - **umgekehrtes Lasègue-Zeichen:** Wie Lasègue, jedoch in Bauchlage
- **Neurologische Untersuchung:** Reflexe, Motorik, Sensibilität, Hinweise für Wurzelkompressionssyndrom?

| Nervenwurzel | sensible Störung | motorische Störung | Reflexminderung | Nervendehnungszeichen |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| L 3 | Oberschenkelvorderseite | Hüftbeugung | (Patellarsehnenreflex) | umgekehrter Lasègue |
| L 4 | Oberschenkelaußenseite, Tibiakante | Knie-Streckung | Patellarsehnenreflex | umgekehrter Lasègue |
| L 5 | Beinaußenseite, Fußrücken, Großzehe | Fuß- und Großzehenhebung | | Lasègue |
| S 1 | Beinrückseite, Fußaußenrand | Fußsenkung | Achillessehnenreflex | Lasègue |

- **Röntgen-LWS:** evtl. degenerative Veränderungen oder Fehlstellungen der Wirbelsäule
- **CT (MRT)** des betroffenen Wirbelsäulensegments: Durchführung bei neurologischen Ausfällen, beim Kaudasyndrom als Notfalluntersuchung.

Therapie

- Bettruhe auf harter Unterlage, lokale Wärmebehandlung.
- Analgetika, z. B. 3 × 50 mg Diclofenac (+ PPI), evtl. für begrenzte Zeit Diazepam als Muskelrelaxans (z. B. 5–10 mg zur Nacht), bei Therapieresistenz Opioide.
- Nach Abklingen der akuten Schmerzen Physiotherapie/physikalische Therapie
- Operationsindikationen: neurologische Ausfälle, Kaudasyndrom (Notfallindikation!), therapieresistente Schmerzen > 4 – 6 Wochen.

Sonstiges +-

Polymyalgia rheumatica (PMR) und Riesenzellarteriitis (RZA, Morbus Horton, Arteriitis temporalis)

- Sowohl die PMR als auch die RZA führen durch autoimmune Prozesse zu einer jeweils unterschiedlich lokalisierten Gefäßentzündung der mittelgroßen und großen Arterien.
- Durch die ähnliche Pathophysiologie werden sie zu einer Krankheitsentität zusammengefasst.
- Ätiologie : nicht vollständig geklärt
- Leitsymptom der PMR sind heftigste symmetrische Schulterschmerzen (insb. nachts), während die RZA durch Entzündungen der kraniellen Gefäße unter anderem zu Sehstörungen mit vorübergehender Erblindung eines Auges (Amaurosis fugax) sowie zu pochenden Schläfenschmerzen führen kann.
- Ein gemeinsames Auftreten beider Erkrankungen ist möglich, wobei diagnostisch in beiden Fällen eine Sturzsenkung (Extrem beschleunigte Senkungsgeschwindigkeit) im Labor charakteristisch ist. Bei RZA auch : Duplex-Sonographie (Halozeichen), Biopsie der A. temporalis. Die Diagnose der beiden Erkrankungen wird anhand diagnostischer Kriterien gestellt.
- Die schnell einzuleitende Therapie besteht jeweils in einer hochdosierten Glucocorticoidgabe, wodurch bei der RZA eine mögliche Erblindung verhindert werden kann.

Lupus erythematoses

- Der LE ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung aus der Gruppe der Kollagenosen. Er beruht auf der Bildung von Autoantikörpern gegen Zellkernbestandteile, die zu einer entzündlichen Schädigung des Gefäßbindegewebes führen. Die Ursache der Erkrankung ist unbekannt.
- Unterschieden wird zwischen kutanem und systemischem LE. Während beim kutanen LE nur die Haut befallen ist, handelt es sich beim systemischen LE um eine schwere systemische Erkrankung. Dabei kann theoretisch jedes Organ von der entzündlichen Schädigung betroffen sein, woraus beispielsweise Arthritiden, Glomerulonephritiden sowie Vaskulitiden resultieren. Ein Befall von Niere und Nervensystem ist in diesem Zusammenhang prognostisch besonders ungünstig. Herz: Perikarditis mit Perikarderguss, Myokarditis, Beteiligung der Koronarien.
- Charakteristisch für beide Verlaufsformen ist das sog. Schmetterlingserythem, das sich im Gesicht der Betroffenen zeigen kann.
- Der Verlauf der Erkrankung ist variabel und kann akut oder subakut sein. In den meisten Fällen ist er jedoch chronisch rezidivierend mit oft jahrelangen Remissionen zwischen den einzelnen Schüben.
- Die Diagnose des Lupus wird anhand diagnostischer Kriterien gestellt, die sich aus klinischen Veränderungen und Labortests zusammensetzen. Bei den Labortests ist der Nachweis von Autoantikörpern diagnostisch wegweisend (insb. Anti-DNA-AK).
- Eine kausale Therapie des LE besteht nicht. Zum Einsatz kommen Glucocorticoide, NSARs und das Antimalariamittel Hydroxychloroquin, in schweren Fällen werden Immunsuppressiva eingesetzt.


Beckenringfrakturen

- Frakturen innerhalb des Beckenrings (gebildet aus dem Os sacrum und den Ossa coxae). Bei Beckenringverletzungen ist ein massiver, lebensbedrohlicher Blutverlust möglich!
- Bei jüngeren Patienten treten sie meist im Rahmen eines Polytraumas bei Verkehrsunfällen oder Stürzen aus großer Höhe auf, bei älteren Patienten hingegen aufgrund der Osteoporose häufiger nach Niedrigrasanztraumen (wie Sturz aus dem Stand).
- **Einteilung nach Lokalisation:**
 - **Vordere Beckenringfraktur** = Fraktur im anterioren Bereich des Beckenrings (Sonderform Schmetterlingsfraktur: Beidseitige vordere Beckenringfraktur)
 - **Hintere Beckenringfraktur** = Fraktur im hinteren Bereich des Beckenrings
- **Einteilung nach der AO-Klassifikation:** je nach Zustand des hinteren Beckenrings (aus dem sich die Stabilität ergibt):
 - **Typ-A:** intakt
 - **Typ-B:** partielle Unterbrechung
 - **Typ-C:** komplette Unterbrechung
- **Diagnostik :** Anamnese und klinische Untersuchung (siehe allgemeine Frakturlehre). Röntgen (Beckenübersicht a.p.), CT++, E-FAST-Sonographie (Zum Ausschluss innerer Blutungen)
- **Therapie:**

- Stabile Beckenringfrakturen (Typ A) können meist konservativ mit kurzzeitiger Bettruhe und anschließender schmerzadaptierter Mobilisation behandelt werden.
 - Instabile Beckenringfrakturen erfordern hingegen eine operative Versorgung.
 - In der Notfallsituation (insb. bei starken Blutungen und hämodynamischer Instabilität) kann die Anlage einer Beckenzwinge oder eines Fixateur externe nötig sein. Eine definitive osteosynthetische Versorgung (z.B. durch eine Plattenosteosynthese oder Verschraubung) erfolgt dann nach Stabilisierung der hämodynamischen Situation.
 - Thromboseprophylaxe ++
- **Komplikationen:** Intra- und retroperitoneale Blutungen bis hin zum hämorrhagischen Schock. Kompartmentsyndrom des Beckens. Thrombose. Begleitverletzungen (Blase, Urethra, Darm, Gefäße)

Wirbelkörperfraktur

- Sie können als pathologische Frakturen bei geminderter Knochensubstanz (Osteoporose, ossäre Tumoren und Metastasen) oder im Rahmen eines Traumas auftreten.
- Sie äußern sich meist primär durch lokale Schmerzen, können aber auch durch eine radikuläre Symptomatik (Sensibilitätsstörungen, Paresen) oder medulläre Symptomatik (Querschnitt durch Kompression des Rückenmarks bis hin zum spinalen Schock) auffallen.
- Neben einer ausführlichen Anamnese und körperlichen Untersuchung ist die Bildgebung, d.h. Röntgen, CT oder MRT, für den weiteren Therapieverlauf entscheidend.
- Einteilung nach AO-Wirbelsäulen-Klassifikation
- Stabile Frakturen ohne Beteiligung der Wirbelkörperhinterkante werden konservativ behandelt (Schmerztherapie, Physiotherapie und ggf. Ruhigstellung). Instabile Frakturen erfordern eine operative Therapie, z.B. mit einer Ballonkyphoplastie oder einer Versteifung des Wirbelsäulenabschnitts (Spondylodese).
- Aufgrund der Nähe zu essentiellen Strukturen (Rückenmark, Gefäße) sind gravierende Komplikationen sowohl der Fraktur selbst als auch im Rahmen der operativen Therapie möglich. Ziel einer jeden Therapie ist die Wiederherstellung der protektiven, statischen und dynamischen Funktion der Wirbelsäule.
- Komplikationen: radikuläre Kompression oder Verletzung, medulläre Kompression oder Verletzung bis zum (in-)kompletten Querschnittssyndrom, Spinaler Schock, Gefäßläsionen (Dissektion der A. vertebralis)
- **Sinterungsfraktur** : Fraktur eines Wirbelkörpers. Chronische Schmerzen und erhebliche Bewegungseinschränkungen sind die Folge. Die Ursache ist meist eine Strukturverminderung des Wirbelknochens durch Osteoporose. Betroffen sind vor allem ältere Menschen.



Humerusfraktur

- Sie werden aufgrund ihrer Lokalisation in proximal, diaphysär und distal eingeteilt.
- Während distale Frakturen eher bei jungen Patienten und Kindern vorkommen, sind proximale Humerusfrakturen klassische Frakturen des Alters und gelten als Indikatorfraktur für Osteoporose.
- Begleitverletzungen ergeben sich aus der anatomischen Nähe des Oberarmknochens zu neurovaskulären Strukturen (insb. N. axillaris und N. radialis).
- Proximale und Schaftfrakturen werden häufig konservativ behandelt, während bei distalen Frakturen die operative Therapie Mittel der Wahl ist. Neben klassischen osteosynthetischen Verfahren mit Platten, Schrauben, Spickdrähten oder Marknägeln stehen bei Gelenkfrakturen auch endoprothetische/gelenkersetzende Verfahren als alternative Versorgung zur Verfügung.

Femurschaft- und distale Femurfrakturen

- Sie sind eine relativ seltene, aber schwerwiegende Verletzung der unteren Extremität.
- Betroffen sind v.a. junge Männer nach einem Hochrasanztrauma und ältere Frauen mit Osteoporose.
- Die operative Versorgung ist Therapie der Wahl. Je nach Frakturform und Gelenkbeteiligung erfolgt eine intramedulläre Marknagelung oder eine Plattenosteosynthese. Die temporäre Frakturversorgung mittels Fixateur externe wird bei polytraumatisierten oder mehrfach verletzten Patienten angewandt. Bei ausgeprägter Osteoporose oder intraartikulärer Trümmerfraktur kann auch ein Gelenkersatz notwendig werden.
- Neben postoperativen Frühkomplikationen wie einem Infekt, Weichteilschäden oder einer pulmonalen Fettembolie stehen besonders Langzeitfolgen wie eine Pseudarthrose, Fehlstellung oder eine posttraumatische Arthrose des Kniegelenks im Vordergrund.

Frakturen des Unterschenkels

- Unterschenkelfraktur = Kombinierte Fraktur von Tibia und Fibula. Da der Unterschenkel distal die geringste Stabilität hat, ist dort die Unterschenkelfraktur am häufigsten lokalisiert.
- Schienbeinfraktur = Isolierte Tibiafraktur: Tibiakopffraktur (mit Beteiligung des Kniegelenks), Tibiaschaftfraktur, Pilon-tibiale-Fraktur (mit Beteiligung des oberen Sprunggelenks)
- Wadenbeinfraktur = Isolierte Fibulafraktur (ohne Beteiligung des oberen Sprunggelenks, selten)
- Da die Hauptlast des Körpers durch das Schienbein getragen wird, orientiert sich die Therapie der Unterschenkelfraktur stark an der Therapie der Schienbeinfraktur. Während stabile Frakturen konservativ behandelt werden können (Ruhigstellung mit Gipschiene, unter Thromboseprophylaxe), kommen bei instabilen verschiedene Osteosyntheseverfahren (z.B. Marknagelung, Plattenosteosynthese) zum Einsatz. Fixateur externe bei offenen Frakturen
- Zu beachten ist insb. der schmale Weichteilmantel, der im Bereich des Unterschenkels das Risiko für offene Frakturen erhöht.
- Komplikationen: (siehe allgemeine Frakturlehre) Nervus-peroneus-communis-Läsion (Steppergang), TVT, Kompartmentsyndrom, Arthrose des Kniegelenks oder Sprunggelenks, Infektionen und Pseudarthrose

Rippenfraktur / Rippenserienfraktur

- Von einer Rippenserienfraktur wird gesprochen, wenn auf einer Seite des Thoraxskeletts mindestens drei Rippen frakturiert sind
 - **Klinik:** Vorwölbungen des Thorax, schmerzbedingte Hypoventilation
 - **Diagnostik:** Aufnahme des knöchernen Hemithorax in Weichstrahltechnik
 - **Komplikationen:** Pneumothorax, Hämatothorax, eingeschränkte Spontanatmung
 - **Therapie:** Wenn keine Komplikationen vorliegen, lediglich adäquate Schmerztherapie (keine "Ruhigstellung" oder operative Versorgung), sonst ggf. Thoraxdrainage und thoraxchirurgischer Eingriff (bspw. bei Thorax-penetrierender Rippe)
- „Bei Verdacht auf eine Rippenfraktur sollte eine knöcherne Hemithoraxaufnahme angefordert werden und nicht eine Röntgenthoraxaufnahme!“

Bakterielle Arthritis

- **Ätiologie:** Sie entsteht entweder durch direkte Kontamination++ (= iatrogen: Injektion, Arthroskopie → Staphylokokken) oder auf hämatogenem Weg (z.B. Gonorrhö).
- **Diagnostik:** klinische Untersuchung, Labor, Röntgen, ggf. Sonographie/MRT, Gelenkpunktion++
- **Therapie:** Ruhigstellung des Gelenks, Antibiotikatherapie, operative Sanierung.
- **Nachbehandlung :** Physiotherapie
- **Kpl :** Gelenkdestruktion, Sepsis

Degenerative Spinalkanalstenose

- Leitsymptom sind belastungsabhängige Kreuzschmerzen mit Ausstrahlungen in die Beine (Claudicatio intermittens spinalis).
- Die Diagnose wird mittels MRT gestellt.
- Therapie: zunächst konservative Maßnahmen wie schmerzlindernde Medikamente und Physiotherapie. Operation bei stark progredienten Schmerzen und neurologischen Ausfällen.

Achillessehnenruptur

- Begünstigt durch altersabhängige Degeneration sowie systemische und medikamentöse Vorschädigung ist die Achillessehnenruptur die häufigste Sehnenruptur des Menschen.
- In den meisten Fällen kommt es zu einer kompletten Zerreißung der Sehne durch eine akute, indirekte Krafteinwirkung (z.B. beim Sport). Bei einer kompletten Ruptur ist ein Ein-Bein-Zehenstand nicht mehr möglich.
- Neben einer ausführlichen Anamnese und klinischen Untersuchung sind die Sonographie und das Röntgen diagnostisch wegweisend.
- Es erfolgt entweder eine konservativ-funktionelle oder eine operative Versorgung.

Morbus Sudeck (Komplexes regionales Schmerzsyndrom)

- posttraumatisches Schmerzsyndrom einer Extremität, das mit inadäquaten chronischen Schmerzen und motorischen, autonomen oder sensorischen Störungen einhergeht.
- Therapie : Physio- und Ergotherapie, Schmerzbehandlung nach WHO-Stufenplan
- Prophylaxe : Adäquate Analgesie bei Operationen/Repositionen. Operationszeit so gering wie möglich

Urologie

Urolithiasis +++

RF
Familiäre Disposition
Oxalatreiche Ernährung
HWS, Hyperparathyreoidismus
Hyperurikämie, FTA
Medikamente (Furosemid, Aminopenicilline, Sulfonamide)

- Harnsteine (Urolithiasis) können im gesamten Urogenitaltrakt lokalisiert sein (Niere = Nephrolithiasis, Harnleiter = Ureterolithiasis, Harnblase = Zystolithiasis, Harnröhre = Urethralithiasis)
- Häufigkeitsgipfel 30.–60. Lebensjahr. ♂ > ♀

Klassifikation

Calciumoxalatsteine

- 75% aller Steine
- Röntgenpositivität : ✓✓
- Ätiologie
 - Hyperkalzämie, oxalatreiche Ernährung (Kaffee, Kakao, Nüsse)
 - Erkrankungen mit Gallensäureverlust (z.B. Morbus Crohn, Kurzdarm)
- Prophylaxe
 - Behandlung der Hyperkalzämie
 - Anpassung der Ernährung
 - Alkalisierung des Harns (Natriumbikarbonat)
 - ggf. Thiazide

Struvitsteine

- 10% aller Steine
- Röntgenpositivität : ✓
- Ätiologie: Harnwegsinfekte
- Prophylaxe
 - Therapie des Harnwegsinfekts
 - Ansäuern des Harns (Methionin)

Harnsäuresteine (Urat)

- 5–10% aller Steine
- Röntgenpositivität : –
- Ätiologie: Hyperurikämie
- Therapie bzw. Prophylaxe
 - Alkalisierung des Harns (Natriumbikarbonat)
 - Behandlung der Hyperurikämie (Allopurinol)

Weitere seltenere Steine

- Medikamentös induzierte Steine (Furosemid, Sulfonamide, Aminopenicilline)
- Calciumphosphatsteine, Zystinsteine, Xanthinsteine

Symptome/Klinik

Beginn der Symptome häufig nach Übertritt des Steines in den Ureter

- Kolikartige Flankenschmerzen : Mögliche Schmerzausstrahlung in Unterbauch, Leiste, Genitalien
- Unruhe
- Mikrohämaturie. Ggf. Makrohämaturie
- Übelkeit und Erbrechen. Ggf. paralytischer Subileus (reflektorisch)

„Je nach Lage des Steins kann sich eine Urolithiasis wie eine Hodentorsion, aber auch wie eine Appendizitis präsentieren!“

Diagnostik

Diagnose der Urolithiasis

Anamnese

Ernährung, familiäre Disposition, Symptome

Körperliche Untersuchung

Ggf. klopfschmerzhaftes Nierenlager

Struvit-
phosphatminerale
die meist mineral
sind in urin

| | Ätiologie | Prozentualer Anteil | Spezielle Maßnahmen / Prophylaxe | | Röntgenpositivität |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Alkalisierung des Harns | Ansäuerung des Harns | |
| <u>Calciumoxalatsteine</u> | <ul style="list-style-type: none">HyperkalzämieOxalatreiche Ernährung | ca. 75% | ✓ | - | ✓✓ |
| <u>Struvitsteine</u> | <ul style="list-style-type: none">Harnwegsinfekte | ca. 10% | - | ✓ | ✓ |
| <u>Harnsäuresteine</u> | <ul style="list-style-type: none">Hyperurikämie | ca. 5-10% | ✓ | - | - |
| <u>Calciumphosphatsteine</u> | <ul style="list-style-type: none">HyperparathyreoidismusRenal-tubuläre Azidose | zusammen <5% | - | ✓💬 | ✓✓ |
| <u>Zystinsteine</u> | <ul style="list-style-type: none">Rückresorptionsstörung von Aminosäuren | | ✓ | - | ✓ |
| <u>Xanthinsteine</u> | <ul style="list-style-type: none">Genetischer Defekt der XanthinoxidaseAllopurinoltherapie | | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |

Urinstatus

- **Mikrohämaturie.** Ggf. Hinweise auf **Harnwegsinfekt** (Leukozyturie, positives Nitrit)
- Bei Steinverdacht **Urin sieben!** *to filter*

Sonografie (Methode der 1. Wahl)

- **Darstellung von Konkrementen** (Nierensteine : echoreich mit echofreiem Schallschatten) und sekundärer Stauung. Harnleitersteine meist **nicht** direkt darstellbar
- **Ausschluss von Differentialdiagnosen**

Nativ-CT

Bessere Darstellung von Konkrementen. Indiziert insb. bei V.a. **Harnleitersteine**

Ggf. Röntgen-Abdomen

- Röntgenpositiv : Calciumoxalatsteine
- Schwach röntgenpositiv: Struvitsteine
- Röntgennegativ: Harnsäuresteine

Ggf. Kontrastmitteldarstellung des Hohlraumsystems

- Mit **i.v. Urogramm** oder **CT mit Kontrastmittel**
- Insb. bei Indikation zur interventionellen bzw. operativen Therapie
- Darstellung von Steinen (Kontrastmittelaussparungen), Harnstau

Ergänzende Diagnostik bei nachgewiesener Urolithiasis

- **Serum:** Kreatinin, **Ca⁺⁺**, Phosphat, **Harnsäure**, Gesamteiweiß, alkalische Phosphatase, **Parathormon**
- **Urin:** **pH**, Bakterien, Leukozyten, Kristalle
- **Steinanalyse:** zur Bestimmung von Harnsteinart

*PTH
Kalzium
Harnsäure*

Differentialdiagnosen (Siehe akutes Abdomen)

- Appendizitis, Divertikulitis, Cholezystitis,...
- Adnexitis, Extrauterin gravidität (bei Frauen), Hodentorsion (bei Männer),...

Komplikationen

- **Harnwegsinfektion** mit Fieber und der Gefahr der Pyelonephritis und Urosepsis
- **Harnstauung** mit möglicher Infektion des gestauten Urins (infizierte Harnstauungsniere)
- **chronische Pyelonephritis**

Therapie

Schmerztherapie der Nierenkolik

- **Metamizol** i.v. (1. Wahl bei starken Schmerzen)
- Diclofenac (bei moderaten Schmerzen)
- Ggf. **Morphin** i. v.
- Ggf. **Spasmolytikum** (Butylscopolamin)

Konservative Therapie

- **Indikation:** Bei Uretersteinen **≤ 5 mm** und komplikationslosem Verlauf (ein spontaner Abgang kann unter konservativen Maßnahmen abgewartet werden)

Maßnahmen

- **Schmerztherapie** (s.o.) *75mg 1-0-0*
 - **Alpha-Blocker** (z.B. Tamsulosin) : supportive Therapie für Spontanabgang *0.4mg 1-0-0*
 - **Erhöhung der Trinkmenge**
 - **Körperliche Bewegung**
- Senkung des adrenergen Einflusses auf die glatte Muskulatur des Harnleiters kann einen spontanen Steinabgang fördern und auch Schmerzen reduzieren (Off-Label-Therapie).*


Interventionelle Therapie

Harnableitung

Indikation


- Versagen der konservativen Therapie
- Hochgradige Obstruktion mit Harnstauungsniere oder postrenalem Nierenversagen
- Infizierte Harnstauungsniere (mit antibiotischer Therapie)

*Harnableitung
Stententfernung*



- Verfahren

- **Harnleiterschienung**: Retrograde Harnleiterspiegelung (Ureterorenoskopie) und Einlage eines Doppel-J-Katheters (Der Katheter ermöglicht den Abfluss des Harns, bis die Schwellung der Ureterschleimhaut zurückgegangen ist)
- **Perkutane Nephrostomie** (Einführung eines Nephrostomiekatheters in ein Nierenbeckenkelch unter sonographischer Kontrolle)



Steinentfernung

• Indikation

- Niedrige Wahrscheinlichkeit eines Spontanabgangs
- *استنزاف* Ausgeschöpfte Analgesie
- Anhaltende Obstruktion

• Bei Harnleitersteinen


- Ureterorenoskopie: durch retrograde Harnleiterspiegelung
- Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (Schallwellen werden außerhalb des Körpers über eine Energiequelle generiert und unter sonographischer Kontrolle auf den Stein ausgerichtet)
- Offene und laparoskopische Ureterolithotomie

• Bei Nierensteinen

- Ureterorenoskopie
- Perkutane Nephrolithotomie (Einführung eines Endoskops in ein Nierenbeckenkelch unter sonographischer Kontrolle, dann werden die Steine zerkleinert und die Fragmente geborgen)
- Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie

Prophylaxe

- Reichlich Flüssigkeitszufuhr: Mindestens 2,5 Liter pro Tag
- Ernährung: kochsalzarm, ausgewogen und ballaststoffreich
- Spezifische Prophylaxe: siehe oben



Risikostratifizierung der Urolithiasis

- Risikostratifizierung: Patienten mit einer Urolithiasis müssen in Niedrig- und Hochrisikogruppe eingeteilt werden
 - Niedrigrisikogruppe: Allgemeine Harnsteinmetaphylaxe
 - Hochrisikogruppe: Spezielle Harnsteinmetaphylaxe
- Kriterien für die Einordnung in die **Hochrisikogruppe**
 - Häufig rezidivierende Urolithiasis (≥ 3 Steine innerhalb von 3 Jahren)
 - Urolithiasis bei Kindern und Jugendlichen
 - Positive Familienanamnese
 - Bestimmte Steinarten bzw. Ursachen der Steinbildung
 - 🔍 Genetische Stoffwechselstörung
 - 🔍 Hyperparathyreoidismus und Sarkoidose als Ursache einer Hyperkalzämie
 - 🔍 Chronische gastrointestinale Erkrankungen
 - Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
 - Zustände der Malabsorption (z.B. Zöliakie, ggf. auch nach bariatrischer Chirurgie)
 - 🔍 Harnsäuresteine und insb. Infekt-assoziierte Monoammoniumuratsteine
 - 🔍 Calciumphosphatsteine
 - Urologische Problemkonstellationen
 - Residualsteine 3 Monate nach erfolgter Intervention
 - Nephrokalzinose
 - Bilaterale große Konkrementmasse
 - Harnabflussstörungen anderer Ursache

Pyelonephritis +++

Definition

- bakterielle Entzündung der Nierenbeckenstrukturen

Ätiologie

- Meist gehen bakterielle Infekte der Harnblase (Urozystitis) voraus
- **Erreger**
 - **Enterobacteriaceae** (Gram-negative Stäbchen)
 - Escherichia coli (ca. 70% der Fälle)
 - Proteus mirabilis
 - Klebsiellen

meist infolge eines aufsteigenden bakteriellen Infekts der Harnblase.

Symptome/Klinik

- Fieber, Schüttelfrost
- Flankenschmerzen, meist einseitig
- Dysurie

Diagnostik

- **Anamnese** : Symptome, prädisponierende Faktoren
- **Körperliche Untersuchung**: Nierenklopfschmerz
- **Labor**
 - Urin-Stix: Meist Leukozyturie und Mikrohämaturie
 - Urinkultur zum Keimnachweis mit Resistogramm
 - Blutuntersuchung: Entzündungsparameter, Retentionsparameter, **Blutkultur**
- **Sonographie der Nieren und der Harnblase**
 - Vergrößerte, im Parenchym aufgelockerte, gut atemverschiebliche Niere
 - Mark-Rinden-Trennung evtl. unscharf

RF
 Ot weiblich
 Harnwegsinfekt
 Anomalien
 Dm
 Strahlung
 OP URT
 Katheter - Schleimen
 Restharnmenge > 100ml
 myelom
 erkrankung
 post op
 Tumor
 inf.
 Stoma
 Reflux?
 Strahlung

✓
 Anam. & KU
 Labor serum
 urin
 VIS
 bei rezidivierend →
 • Kontrast CT
 • Miktionurethrogramm
 • Urodynamik
 • Funktionszintigraphie

Ausschluss einer komplizierten Harnwegsinfektion

- **Indikation**: Insb. bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen
- **Definition**: Infektion der Harnwege bei jeglicher struktureller oder funktioneller Abnormalität des Urogenitaltraktes :
 - Vesikoureteraler Reflux
 - Neurogene Harnblasenentleerungsstörung
 - Jegliche Form der Obstruktion: Urolithiasis bzw. Prostatitis

Ergänzende Diagnostik bei unklarer Genese

- **Kontrastmittel-CT** des Abdomens/Urogramm zur Darstellung der Abflussverhältnisse
- **Miktionsurethrogramm** zur Verifizierung eines vesikoureteralen Reflux
- **Urodynamik** zum Ausschluss einer neurogenen Harnblasenentleerungsstörung oder subvesikalen Obstruktion
- **Nierenfunktionsszintigraphie** zur Bestimmung der Nierenrestleistung im Seitenvergleich

Pathologie

- Destruktive interstitielle Nephritis


Differentialdiagnosen

- Akute Cholezystitis
- Sigmadivertikulitis
- Adnexitis
- Pathologien des Bewegungsapparates
- Pankreatitis
- Basale Pneumonie
- Pleuritis
- Akute Appendizitis

Pollakisurie - häufige Wasserlassen in kleinen Mengen

Miktionszystourethrografie

- Indikation: Darstellung der ableitenden Harnwege bei V.a. bspw. Harnabflussstörungen oder vesikoureteralen Reflux
- Durchführung
 - Retrograde Befüllung der Harnblase mit Kontrastmittel über Harnblasenkatheter oder Zystoskopiegerät (intraoperativ)
 - Röntgenologische Untersuchung während des Miktionsvorgangs mit Darstellung der Harnleiter und Harnröhre
- Mögliche pathologische Befunde
 - Harnröhre: Stenosen, Urethralklappen oder Fisteln
 - Harnblase: Blasendivertikel, Undichtigkeit bei Anastomoseninsuffizienz und Messung der Kapazität
 - Harnleiter : Kinking und Grad des vesikoureteralen Refluxes



Therapie

Allgemeine Maßnahmen

- Antipyretika, Analgetika
- Flüssigkeitssubstitution
- Bei Harnverhalt, Restharn oder Pyurie: Einlage eines transurethralen Dauerkatheters zur Harnableitung

Empirische Therapie der unkomplizierten Pyelonephritis (milder)

Verlauf)

- **1. Wahl:** Fluorchinolone (oral) : Ciprofloxacin (500 mg p.o. 1-0-1 für 7–10 Tage)
- **Alternativ:** Cephalosporine (z.B. Cefpodoxim) *orale 3. Generation* *200mg 1-0-1/10 T*
- Alternativen bei nachgewiesener Sensibilität des Erregers : Amoxicillin/Clavulansäure oder Cotrimoxazol (Trimethoprim/Sulfamethoxazol)

Empirische Therapie der unkomplizierten Pyelonephritis (schwerer)

Verlauf)

Der schwere Verlauf wird über das Vorhandensein systemischer Symptome wie hohem Fieber, Verschlechterung des Allgemeinzustandes, Übelkeit und Erbrechen definiert.

- **intravenöse Therapie**, nach klinischer Besserung Umstieg auf orale Therapie
- Dauer der Therapie i. d. R. 7–14 Tage
- Nach Identifizierung des Erregers sollte die empirische Therapie überdacht und ggf. angepasst werden
- **1. Wahl**
 - **Cephalosporine der 3. Generation** : Ceftriaxon (2 g i.v. 1-0-0)
 - **Fluorchinolone** : Ciprofloxacin (400 mg i.v. 1-0-1)
 - **(Acy)Aminopenicilline mit Betalaktamaseinhibitoren** : Ampicillin/ Sulbactam (2 g/1 g i.v. 1-1-1) *Univert* oder Piperacillin/Tazobactam (4,5 g i.v. 1-1-1)

Empirische Therapie komplizierter Infektionen der Harnwege

- Eine unkomplizierte Urozystitis des Mannes kann analog behandelt werden (wie eine Prostatitis)
- Bei hospitalisierten Patienten intravenöse Therapie, nach klinischer Besserung Umstieg auf orale Therapie
- Nach Identifizierung des Erregers sollte die empirische Therapie überdacht und ggf. angepasst werden
- Dauer der Therapie i. d. R. 7–14 Tage (14 Tage bei Prostatitis)
- Berücksichtigung folgender Punkte bei der Wahl des Antibiotikums : Ort der Erwerbung der Infektion (ambulant vs. nosokomial)? Antibiotische Vorbehandlung? Katheterisierung?
- **Empirische Initialtherapie**
 - **Fluorchinolone** : Ciprofloxacin (400mg iv 1-0-1)
 - **oder Cephalosporine der 3. Generation** (z.B. Ceftriaxon; 2g iv 1-0-1)
 - **oder Aminopenicilline plus Betalaktamaseinhibitoren** (Ampicillin/Sulbactam)

Komplikationen

Chronifizierung

1. Rezidivierende bakterielle Pyelonephritiden
2. Schrumpfnieren
3. Terminale Niereninsuffizienz bei beidseitigem Befall, Einzelniere oder anderer Pathologie der kontralateralen Niere

Urosepsis

- Lebensbedrohliche Organdysfunktion infolge einer dysregulierten Immunantwort auf eine Harnwegsinfektion

Besondere Patientengruppen

Pyelonephritis gravidarum (Schwangerschaftspyelonephritis)

- Therapie

- Bei unkomplizierten Fällen ohne schweren Verlauf: Orale antibiotische Therapie, z.B. mit
 - Amoxicillin/Clavulansäure
 - oder Cephalosporinen der 3. Generation (Cefpodoxim) 200mg 1-0-1, 10 Tage
- Bei komplizierten bzw. schweren Verläufen: Vorgehen wie bei schwerer Pyelonephritis, Bevorzugung der in der Schwangerschaft unter strengem Nutzen-Risiko anwendbaren Beta-Laktam-Antibiotika

„Fluorchinolone und Cotrimoxazol sind in der Schwangerschaft kontraindiziert!“



Tabelle 19 Empfohlene empirische Antibiotikatherapie der **unkomplizierten Pyelonephritis** bei Frauen in der Prämenopause
(Starker Konsens Abstimmung: 9/9)

| Substanz | Tagesdosierung | Dauer | Eradikationsrate bei sensiblen Erregern | Empfindlichkeit | Kollateralschäden | Sicherheit/Geringe Nebenwirkungen (UAW) |
|--|--------------------|------------------------|--|-----------------|--|---|
| Orale Therapie bei leichten bis moderaten Verlaufsformen | | | | | | |
| Ciprofloxacin ¹ [525] | 500-750mg 2 × tgl. | 7-10 Tage | +++ | ++ | + | ++ |
| Levofloxacin [290,460] | 750mg 1 × tgl. | 5 Tage | +++ | ++ | + | ++ |
| Cefpodoxim Proxetil [383] | 200mg 2 × tgl. | 10 Tage | +++ | ++ | + | +++ |
| Ceftibuten ² [82] | 400mg 1 × tgl. | 10 Tage | +++ | ++ | + | +++ |
| ¹ Niedrige Dosierung untersucht, hohe Dosierung von Experten empfohlen. | | | | | | |
| Initiale parenterale Therapie bei schweren Verlaufsformen | | | | | | |
| Nach Besserung kann bei Erregerempfindlichkeit eine orale Sequenztherapie mit einem der oben genannten oralen Therapieregime eingeleitet werden. Die Gesamtherapiedauer beträgt 1-2 Wochen, daher wird für die parenteralen Antibiotika keine Therapiedauer angegeben. | | | | | | |
| Mittel der 1. Wahl | | | | | | |
| Ciprofloxacin [145,525] | 400mg (2)-3 × tgl. | | +++ | ++ | + | ++ |
| Levofloxacin [145,290] | 750mg 1 × tgl. | | +++ | ++ | + | ++ |
| Ceftriaxon ^{1,4} [566] | (1)-2g 1 × tgl. | | +++ | ++ | + | +++ |
| Cefotaxim ² [339] | 2g 3 × tgl. | | +++ | ++ | + | +++ |
| Mittel der 2. Wahl | | | | | | |
| Amoxicillin/Clavulansäure ^{2,3} | 2,2g 3 × tgl. | | ++ | + | +++ | +++ |
| Amikacin | 15mg/kg 1 × tgl. | | ++ | ++ | ++ | +(+) |
| Gentamicin | 5mg/kg 1 × tgl. | | ++ | ++ | ++ | +(+) |
| Cefepim ^{1,4} [182] | (1)-2g 2 × tgl. | | +++ | ++ | + | +++ |
| Ceftazidim ² | (1)-2g 3 × tgl. | | +++ | ++ | + | +++ |
| Ceftazidim/Avibactam [557] | 2,5g 3 × tgl. | | +++ | +++ | ++ | +++ |
| Ceftolozan/Tazobactam [558] | 1,5g 3 × tgl. | | +++ | +++ | ++ | +++ |
| Piperacillin/Tazobactam ¹ [388] | 4,5g 3 × tgl. | | +++ | +++ | ++ | +++ |
| Ertapenem ^{4,5} [566] | 1g 1 × tgl. | | +++ | +++ | ++ | +++ |
| Imipenem/Cilastatin ^{4,5,1} [388] | 1g/1g 3 × tgl. | | +++ | +++ | ++ | +++ |
| Meropenem ^{4,5,6} [377] | 1g 3 × tgl. | | +++ | +++ | ++ | +++ |
| ¹ Niedrige Dosierung untersucht, hohe Dosierung von Experten empfohlen. | | | | | | |
| ² Nicht bei akuter unkomplizierter Pyelonephritis als Monosubstanz untersucht. | | | | | | |
| ³ Hauptsächlich für Gram-positive Erreger. | | | | | | |
| ⁴ Gleiches Protokoll für akute unkomplizierte Pyelonephritis und komplizierter Harnwegsinfektionen (Stratifikation nicht immer möglich) | | | | | | |
| ⁵ Nur bei ESBL-Resistenzen > 10 %. | | | | | | |
| ⁶ Nur hohe Dosierung untersucht. | | | | | | |
| ⁷ In Deutschland nicht mehr im Handel | | | | | | |
| Zeichenerklärung | Eradikation | Empfindlichkeit | Kollateralschaden | | Sicherheit/Geringe Nebenwirkungen (UAW) | |
| +++ | >90% | >90% | wenig Selektion multiresistenter Erreger, wenig Resistenzentwicklung gegenüber der eigenen Antibiotikaklasse | | Hohe Sicherheit, geringe UAW | |
| ++ | 80-90% | 80-90% | wenig Selektion multiresistenter Erreger, Resistenzentwicklung gegenüber der eigenen Antibiotikaklasse | | Schwere UAW möglich | |
| + | <80% | <80% | Selektion multiresistenter Erreger, Resistenzentwicklung gegenüber der eigenen Antibiotikaklasse | | n.a. | |

Urozystitis +

Definition

- **Harnwegsinfektion**
 - **Obere Harnwegsinfektion:** Pyelonephritis
 - **Untere Harnwegsinfektion:** Urozystitis (Harnblasenentzündung), Urethritis
 - **Unkomplizierte Harnwegsinfektion:** Infektion der Harnwege **ohne relevante funktionelle oder anatomische Anomalien, Nierenfunktionsstörungen oder Begleiterkrankungen**, die eine Harnwegsinfektion bzw. Komplikationen begünstigen
 - **Komplizierte Harnwegsinfektion:** Alle Harnwegsinfektionen, die die Kriterien einer unkomplizierten Harnwegsinfektion nicht erfüllen
 - **Rezidivierende Harnwegsinfektion:** **≥2 Infektionen/Halbjahr** oder **≥3 Infektionen/Jahr**
- **Asymptomatische Bakteriurie:** Vorliegen einer **signifikanten** Bakteriurie ohne Symptome

Ätiologie

Erreger

- **Meist Infektion durch Bakterien der Darmflora**
 - **Enterobacteriaceae** (gram-negative Stäbchen) : **Escherichia coli** (80%). Proteus mirabilis. Klebsiellen
- **abakterielle, interstitielle Zystitis** (Selten)

Prädisponierende Faktoren

- **Weibliches Geschlecht**
 - Zystitiden bei Männern sind immer suspekt und abklärungsbedürftig
- **Honeymoon-Zystitis** (Beim Geschlechtsverkehr)
- **Transurethraler Dauerkatheter** : Häufigste Ursache für einen nosokomialen Harnwegsinfekt; hier sind Männer gleichermaßen betroffen
- **Anomalien des Harntrakts** (z.B. Harnblasendivertikel)
- **Diabetes mellitus**

Symptome

- **Dysurie** (erschwertes Wasserlassen), **Algurie** (Schmerzhaftes Wasserlassen), **Strangurie** (Permanentes, schmerzhaftes Bedürfnis zu miktionieren ohne adäquate Miktion)
- **Pollakisurie** (Häufiger Harndrang mit Entleerung geringer Harnmengen)
- **Hämaturie**
- **Suprapubische Schmerzen**

Diagnostik

Labor

- **Urin-Stix** (=Urinteststreifen): Leukozyturie, Hämaturie, Nitrit positiv
- **Urin-Mikroskopie** (Erlaubt im Gegensatz zum Urin-Stix bei unauffälligem Befund den **Ausschluss** einer Harnwegsinfektion)
- **Urinkultur:** Keimnachweis, **signifikante Bakteriurie ab 10^5 KBE/mL** (Koloniebildende Einheit). **Bei suprapubisch gewonnenem Katheterurin ist bei jeder Bakteriurie auffällig!**
 - Indikation: Jeder Verdacht einer Harnwegsinfektion (außer Frauen mit unkomplizierter Zystitis)

Apparative Diagnostik

- Indikation: komplizierte Zystitis
 - Sonographie (Ausschluss Harnstau, ggf. Hinweise auf Pyelonephritis)
 - Zystoskopie (Abklärung **Malignom**, **Reflux**, u.a.)
- „Jeder Verdacht auf eine komplizierte Zystitis bedarf einer ambulant-urologischen Abklärung des gesamten Urogenitaltraktes!“

Differentialdiagnosen

- Prostatitis
- Urolithiasis
- Interstitielle Zystitis: seltene chronische abakterielle Zystitis mit Fibrosierung der Harnblasenwand
- Tuberkulöse Zystitis
- Medikamentös induzierte Zystitis (NSAR, Cyclophosphamid)
- Harnblasenkarzinom
- Adnexitis

Therapie

- Erhöhte Trinkmenge

Antibiotische Therapie der unkomplizierten Urozystitis

- Indikationen : **Symptomatische Urozystitis** (Eine asymptomatische Bakteriurie ist keine Behandlungsindikation, außer bei Schwangerschaft)
- **Fosfomycin**-Granulat (einmalig) (3 g p.o. als Einmalgabe)
- Bei Versagen : **Fluorchinolone** (Ciprofloxacin : 500mg p.o. 1-0-1)

Antibiotische Therapie der komplizierten Urozystitis

- = Pyelonephritis (siehe)
- Urozystitis des Mannes soll als Prostatitis behandelt werden

Antibiotische Therapie in der Schwangerschaft

- Fosfomycin-Granulat (einmalig)
- Oder **Cephalosporine** (Cefuroxim p.o.)

Komplikationen

- Pyelonephritis
- Prostatitis
- Epididymitis

Prävention

- Erhöhte Trinkmenge
- Miktion direkt nach dem Koitus

Tabelle 18 Empfohlene empirische Antibiotika-Kurzzeittherapie der unkomplizierten Zystitis bei Frauen in der Prämenopause (Starker Konsens Abstimmung: 11/11)

| Substanz | Tagesdosierung | Dauer | Eradikationsrate bei sensiblen Erregern | Empfindlichkeit | Kollateralschäden | Sicherheit/Geringe Nebenwirkungen (UAW) |
|---|--------------------|-----------------|--|-----------------|---|---|
| Folgende Antibiotika sollen bei der Therapie der unkomplizierter Zystitis vorzugsweise eingesetzt werden: | | | | | | |
| Fosfomycin-Trometamol [144,256] | 3000mg 1 × | 1 Tag | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Nitrofurantoin [185,545] | 50mg 4 × tgl. | 7 Tage | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Nitrofurantoin RT [505] Retardform (= Makrokristalline Form) | 100mg 2 × tgl. | 5 Tage | +++ | +++ | +++ | ++ |
| Nitroxolin [386] | 250mg 3 × tgl. | 5 Tage | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Pivmecillinam [398,441] | 400mg 2-3 × tgl. | 3 Tage | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Trimethoprim soll nicht als Mittel der ersten Wahl eingesetzt werden, wenn die lokale Resistenzsituation von Escherichia coli >20% liegt. | | | | | | |
| Trimethoprim [285] | 200mg 2 × tgl. | 3 Tage | +++ | +(+) | ++ | ++(+) |
| Folgende Antibiotika sollen bei der Therapie der unkomplizierter Zystitis NICHT als Mittel der ersten Wahl eingesetzt werden: | | | | | | |
| Cefpodoxim-Proxetil [230] | 100mg 2 × tgl. | 3 Tage | ++ | ++ | + | +++ |
| Ciprofloxacin [145,230,231] | 250mg 2 × tgl. | 3 Tage | +++ | ++ | + | ++ |
| Cotrimoxazol [227] | 160/800mg 2 × tgl. | 3 Tage | +++ | +(+) | ++ | ++ |
| Levofloxacin [145,448] | 250mg 1 × tgl. | 3 Tage | +++ | ++ | + | ++ |
| Norfloxacin [145,396,398] | 400mg 2 × tgl. | 3 Tage | +++ | ++ | + | ++ |
| Ofloxacin [145,227] | 200mg 2 × tgl. | 3 Tage | +++ | ++ | + | ++ |
| Zeichenerklärung | Eradikation | Empfindlichkeit | Kollateralschaden | | Sicherheit/Geringe Nebenwirkungen (UAW) | |
| +++ | >90% | >90% | wenig Selektion multiresistenter Erreger, wenig Resistenzentwicklung gegenüber der eigenen Antibiotikaklasse | | Hohe Sicherheit, geringe UAW | |
| ++ | 80-90% | 80-90% | wenig Selektion multiresistenter Erreger, Resistenzentwicklung gegenüber der eigenen Antibiotikaklasse | | Schwere UAW möglich | |
| + | <80% | <80% | Selektion multiresistenter Erreger, Resistenzentwicklung gegenüber der eigenen Antibiotikaklasse | | n.a. | |

Sonstiges +/-

Hämaturie

- Pathologische Ausscheidung von Erythrozyten im Urin.
 - Makrohämaturie: Mit bloßem Auge erkennbare Rotfärbung des Urins
 - Mikrohämaturie: nur mit der mikroskopischen Untersuchung des Urins erkennbar
- **Differentialdiagnosen:** Teststreifen positiv, im Sediment keine Erythrozyten (Hämoglobinurie, Myoglobinurie). Teststreifen negativ (rote Beete) *حصه ابر*
- **Ursachen:** Harnwegsinfektionen. Nephrolithiasis. Tumoren (Nierenzellkarzinom, Nierenbecken-, Harnleiter- und Blasenkarzinome, Prostatakarzinom). Glomerulonephritis. diabetische oder Hypertensive Nephropathie. Trauma
- **Vorgehen:** Anamnese. Körperliche Untersuchung. Teststreifen, Urinsediment. Labor. **Sonografie** (Harnstau? Konkrement? größerer Niereninfarkt? Nieren-, Prostata-, Blasentumoren?). Weiterführende Diagnostik je nach Ursache

Prostatitis

- Die Entzündung der Prostata kann entweder akut mit Fieber, Schüttelfrost und Defäkationsschmerzen einhergehen oder auch chronisch verlaufen.
- Die Diagnose wird sowohl klinisch als auch laborchemisch gestellt (PSA-Erhöhung, Keimnachweis).
- Therapie: antibiotische Therapie. Bei chronischem Verlauf zusätzlich desobstruierende Medikamente (Anticholinergika).

Vesikoureteraler Reflux

- Retrograder Fluss von Urin aus der Harnblase in die Harnleiter.
- Ursachen: neurogene Faktoren, subvesikale Harnabflussstörungen
- Symptome: Flankenschmerzen oder rezidivierenden Pyelonephritiden
- Diagnostik: Miktionsurethrogramm
- Therapie: meist konservativ mit regelmäßigen Verlaufskontrollen. Operative Therapie bei schweren Verläufen mit massiver Nierenstauung oder medikamentös nicht zu beherrschenden Infekten.

Urethritis

- Sie zählt zu den sexuell übertragbaren Erkrankungen und wird meist durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragen.
- Erreger: Chlamydia trachomatis, Mykoplasmen, Neisseria gonorrhoeae (Gonorrhö)
- Symptome: Männer (Brennen, Bonjour-Tropfen: morgens vor der Miktion eitrigem Ausfluss aus dem Penis). Frauen (Vaginaler Ausfluss, Unterbauchschmerzen, Symptome einer Adnexitis). Sie kann auch asymptomatisch verlaufen.
- Therapie: initial kalkulierte Antibiose (Doxycyclin); nach Keimidentifikation erfolgt die erregergerechte antibiotische Therapie.

Prostatakarzinom

- Häufigste Tumorerkrankung des Mannes. Zumeist Adenokarzinom
- Entstehungsort: periphere Zone. Metastasen: lokal. Knochen *Osteoblastic*
- Risikofaktoren: Alter++
- Symptome: Initial asymptomatisch. Später Harnverhalt. Stauungsnieren. Hämaturie. Knochenschmerzen. Gewichtsverlust
- Diagnostik: Digital-rektale Untersuchung (Derbe *غده* schmerzlose Prostata). PSA (suspekt >4 ng/mL). Transrektale Sonographie. Transrektale, sonographiegesteuerte Prostatastanzbiopsie. Staging (Abdomensonographie, Ganzkörperknochenszintigraphie)
- Differentialdiagnosen: Benigne Prostatahyperplasie, Prostatitis

- **Therapie:** Radikale Prostatektomie oder Strahlentherapie. Bei Metastasen Hormontherapie und palliative Therapie
- **Prognose :** gut wenn nicht metastasiert

Urothelkarzinom

- maligner Tumor, der von der Schleimhaut der ableitenden Harnwege ausgeht
- **Histo :** Urothelkarzinom
- **Risikofaktoren :** Nikotinabusus
- **Symptome:** Schmerzlose Makrohämaturie++. Rezidivierende Infekte (Bei einem Mann ist eine Zystitis immer suspekt und sollte auch an ein Harnblasenkarzinom denken lassen)
- **Diagnostik :** Urin-Stix (Zur Erkennung einer Mikrohämaturie). Urinzytologie. Sonographie der Harnblase und der Nieren (Nachweis des Tumors, Harnstauungsniere). Urethrozystoskopie und/oder Ureterorenoskopie. CT-Abdomen und –Thorax
- **Therapie:**
 - Urothelkarzinom der Harnblase : Transurethrale Tumorresektion (Lokal begrenzter Tumor). Radikale Zystektomie (Lokal fortgeschrittener Tumor)
 - Urothelkarzinom des Harnleiters und des Nierenbeckens : Radikale Nephroureterektomie

Hodentorsion

- **Akute** Verdrehung von Hoden und Samenstrang innerhalb des Skrotums mit konsekutiver Minderdurchblutung. Betroffen sind i.d.R. Kinder und junge Männer.
- **Symptome:** plötzlich einsetzende Schmerzen im Bereich des Hodens und/oder des Unterbauchs.
- **Diagnostik :** Prehn-Zeichen negativ (Anheben des Hodens führt zur Schmerzverstärkung oder zu keiner Veränderung) (positiv bei Epididymitis : Schmerzbesserung). Duplexsonographie (Hodenhomogenität? Hodendurchblutung?)
- **Differentialdiagnosen :** Epididymitis (Nebenhodenentzündung)
- **Therapie:** urologischer Notfall : operative Hodenfreilegung, Detorquierung und beidseitige Orchidopexie (Da innerhalb von etwa 6 Stunden Nekrose und Organverlust drohen)

Maligne Hodentumoren

- Sie treten vornehmlich bei jungen Männern zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr auf und können verschiedene histologische Tumorentitäten aufweisen.
- **Risikofaktoren :** Kryptorchismus
- **Symptome:** isolierte schmerzlose Vergrößerung des Skrotums
- **Diagnostik :** Palpation. Hodensonographie. Bestimmung der Tumormarker (AFP, β -HCG). Intraoperativer Schnellschnitt zur Diagnosesicherung bei unklaren klinischen Befunden
- **Therapie:** operative Hodenfreilegung mit radikaler Orchiektomie der betroffenen Seite (Vor OP: Asservation von Ejakulat++). Ggf. adjuvante Therapie (Radiatio und Chemotherapie)

Hodenhochstand

- Lageanomalie des Hodens, entweder im Bereich der physiologischen Abstiegsstrecke des Hodens (Retentio testis) oder außerhalb davon (Hodenektomie).
- Da in den ersten 6 Lebensmonaten die Spontandeszensus-Rate hoch ist, kann zunächst abgewartet werden. Liegt der Hoden nach 6 Monaten noch immer nicht im Skrotalfach, ist eine hormonelle und/oder operative Therapie indiziert. Aufgrund des mit der Zeit zunehmenden Risikos für Fertilitätsstörungen und Hodenmalignomen sollte die Therapie bis zum 1. Geburtstag abgeschlossen sein.
- Einen Sonderfall stellt der sog. Pendelhoden dar, der infolge eines verstärkten Kremasterreflexes nur intermittierend außerhalb des Skrotalfachs zu liegen kommt. Hier ist i.d.R. keine Therapie notwendig. Es sollten jedoch bis zur Pubertät regelmäßige Kontrollen erfolgen, um eine sekundäre Aszension rechtzeitig zu erkennen.

مرور

(-) Benigne Prostatahyperplasie (BPH)

- **Ätiologie:** unklar (**Risikofaktoren** : Adipositas, Steigendes Alter)
- **Entstehungsort:** Übergangszone
- **Symptome** : Pollakisurie. Nykturie. Abgeschwächter und unterbrochener Harnstrahl. Nachträufeln
- **Komplikationen** : Rezidivierende Infekte. Harnverhalt. Harnblasensteine
- **Diagnostik** : digital rektale Untersuchung. PSA. Abdomensonographie (Restharn? Nierenstauung?). Transrektale Sonographie (Prostatagröße). Uroflowmetrie
- **Differentialdiagnosen** : Prostatakarzinom. Prostatitis
- **Therapie:** medikamentös (Alpha-Blocker: Tamsulosin. 5-alpha-Reduktasehemmer: Finasterid). Ggf. operativ (Transurethrale Resektion der Prostata, Offene OP : Adenomenukleation)

Prehn-Zeichen:-

- Die Schmerzen nehmen bei Anhebung des Hodens ab: Das Prehn-Zeichen ist positiv, was auf eine Orchitis oder Epididymitis hinweist.
- Die Schmerzen nehmen bei Anhebung des Hodens zu oder bleiben unverändert: Das Prehn-Zeichen ist negativ. Dies ist z.B. bei einer Hodentorsion der Fall.

Beim **Kryptorchismus**, oder Hodenhochstand, befinden sich ein oder beide Hoden bei der Geburt nicht im Hodensack. Symptome sind ein leerer Hodensack, in dem keine Hoden ertastet werden können, oder Hoden, die an anderer Stelle gesehen oder ertastet werden können.

Cockcroft-Gault-Formel

$$\text{GFR} = ((140 - \text{Alter [Jahre]}) / \text{Serumkreatinin [mg/dl]}) * (\text{Körpergewicht [kg]} / 72)$$

Bei Frauen wird dieser Wert zusätzlich mit 0,85 multipliziert.

CKD-EPI-Formel

$$\text{GFR} = 141 \times \min(\text{SKr}/\kappa, 1)^\alpha \times \max(\text{SKr}/\kappa, 1)^{-1.209} \times 0.993^{\text{Alter}}$$

Bei Frauen wird der Wert zusätzlich mit 1,018 multipliziert, bei schwarzer Hautfarbe mit 1,159.

Legende:

SKr = Serumkreatinin [mg/dL]
Geschlechtsabhängiger Faktor κ = 0,7 (Frau) bzw. 0,9 (Mann)
Geschlechtsabhängiger Faktor α = -0,329 (Frau) bzw. -0,411 (Mann)
min = Minimum von SKr/ κ und 1
max = Maximum von SKr/ κ und 1
Alter = Lebensalter [Jahre]

Sonstiges

Schmerztherapie ++

Schmerzformen

- **Akuter vs. chronischer Schmerz** (> 3 Monate)
- **Zentraler** (Ursprung im ZNS, z.B. Schlaganfall, Therapie mit Opioide ++. Periphere Analgetika sind wirkungslos) **vs. peripherer Schmerz** (Ursprung in peripherer Nervenfasern, Therapie mit peripherer Analgetika und ggf. Opioide)
- **Nozizeptiver vs. neuropathischer Schmerz**
 - **Nozizeptiver Schmerz:** durch Reizung von Nozizeptoren
 - Somatischer Schmerz
 - Viszeraler Schmerz
 - **Neuropathischer Schmerz:** durch eine Läsion des Nervensystems (meist brennend)

Schmerzbeurteilung

- **Schmerzskala:** Objektivierung der Schmerzintensität anhand einer subjektiven Einstufung des Schmerzes, z.B. mit Hilfe einer **numerischen Rangskala** oder einer **visuellen Analogskala** (bei Kindern: **Smiley-Skala** ++)
- **Schmerztagbuch:** Dokumentation des zeitlichen Verlaufs der Schmerzintensität, um Schmerzspitzen und Schmerzauslöser zu erkennen und ggf. Therapieanpassungen vorzunehmen

WHO-Stufenschema

Die Therapie chronischer Schmerzen sollte sich am WHO-Stufenschema orientieren. Die Medikation besteht aus einer **Basistherapie** (retardierte Präparate, die nach festem Schema und Dosierung eingenommen werden) und einer adäquaten **Bedarfsmedikation** (unretardierte Analgetika, die Schmerzspitzen therapieren). Weiterhin kann eine **Begleitmedikation** mit Koanalgetika und Adjuvantien erfolgen, um spezielle Schmerzformen wirkungsvoller zu behandeln bzw. um Nebenwirkungen der Therapie entgegenzuwirken. Ist der Patient nicht schmerzfrei, muss in die nächst höhere Stufe übergegangen werden.

| | |
|------------------|--|
| Stufe I | Nicht-Opioide-Analgetikum (± Koanalgetikum ± Adjuvans) |
| Stufe II | Nicht-Opioide-Analgetikum + niedrig-potente Opioide (± Koanalgetikum ± Adjuvans) |
| Stufe III | Nicht-Opioide-Analgetikum + hoch-potente Opioide (± Koanalgetikum ± Adjuvans) |

Nicht-Opioide-Analgetika

Nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR)

Unselektive COX-Hemmer

- **Beispiele :** Diclofenac (50mg x2-3/d), Ibuprofen (600mg x2-3/d), Acetylsalicylsäure (=ASS : 500-1000mg x4/d), Naproxen, Indometacin
- **Applikation:** p.o., rektal, i.m., topisch
- **Wirkmechanismus :** Reversible Hemmung des Enzyms Cyclooxygenase 1 und 2 (COX) → Verminderte Prostaglandinsynthese
- **Wirkung :** Analgetisch, antipyretisch und antiphlogistisch (antirheumatisch). Thrombozytenaggregationshemmung (Acetylsalicylsäure, COX-1-vermittelt)
- **Nebenwirkungen :** Magen- und Darmulzera, Renale Nebenwirkungen (Akutes Nierenversagen. Verschlechterung eines chronischen Nierenversagens. Chronische Analgetikaniere). Erhöhung des kardiovaskulären Risikos (außer ASS und Naproxen)

Selektive COX-2-Hemmer (Coxibe)

- **Beispiel :** Celecoxib (100-200mg p.o. x 2/d)
- **Wirkmechanismus :** Reversible Hemmung des Enzyms Cyclooxygenase 1 und 2 (COX) → Verminderte Prostaglandinsynthese
- **Wirkung :** Analgetisch, antiphlogistisch

- **Nebenwirkungen** : Erhöhung des kardiovaskulären Risikos. Renale Nebenwirkungen (Verschlechterung eines chronischen Nierenversagens. Blutdrucksteigerung).
Kaum gastrointestinale Nebenwirkungen

Weitere Nicht-Opioide-Analgetika

- **Beispiele** : Paracetamol, Metamizol (= Novaminsulfon, Novalgin®)
- **Applikation**: p.o., rektal, i.v. **Dosis** : 500-1000mg x4/d
- **Wirkmechanismus** : Reversible Hemmung der Cyclooxygenase + zentrale Effekt
- **Wirkung** : Analgetisch, antipyretisch. Spasmolytisch (Metamizol). Metamizol hat die höchste antipyretische und analgetische Potenz unter den Nicht-Opioide-Analgetika
- **Nebenwirkungen** :
 - **Paracetamol** : Hepatotoxizität (Akutes Leberversagen bei Intoxikation). Begrenzte Nephrotoxizität
 - **Metamizol** : Allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Agranulozytose. Blutdruckabfall

Opioide

- **Wirkstoffe**:
 - **Niedrig-potente Opioide** : Tramadol (50-200mg p.o. x2/d), Tilidin, Dihydrocodein
 - **Hoch-potente Opioide** : Morphin (2-10mg i.v., 5-10mg s.c. x4-6/d, 10-20mg p.o. x2/d), Oxycodon, Levomethadon, Fentanyl, Pethidin, Buprenorphin, Piritramid
- **Applikation**: p.o., transdermal (Pflaster), s.c., i.v.
- **Wirkung**: Agonistische Wirkung an μ -, κ - oder δ -Rezeptoren des zentralnervösen antinozizeptiven Systems. Wirkungen (und Nebenwirkungen) unterscheiden sich je nach Rezeptorbindung
- **Nebenwirkungen** : Atemdepression (\rightarrow CO₂↑ Hirndruckanstieg). Sedierung. Opioid-Toleranz-Entwicklung und Opioidabhängigkeit. Orthostatische Dysregulation (RR↓). Miosis. Übelkeit und Erbrechen. Vermehrtes Schwitzen. Kontraktion der glatten Muskulatur (Obstipation, Harnverhalt). Juckreiz *Obstipation*
- **Analgetische Potenz** : Sufentanil (1000) > Fentanyl (125) > Levomethadon (3) > Oxycodon (2) > Morphin (1) > Codein (0,2) > Tramadol (0,1)
- **Antidot** : Naloxon (0,4–2 mg langsam i.v.)

„- In der Therapie des chronischen Schmerzsyndroms ist nicht mit einer klinisch-relevanten Atemdepression zu rechnen!

- Während sich im Verlauf der Opioidtherapie die Nebenwirkungen Sedierung, orthostatische Dysregulation, Übelkeit und Erbrechen bessern, ist dies bei der Obstipation nicht der Fall!

- Naloxon kann Buprenorphin nicht antagonisieren, da es die höchste Rezeptoraffinität hat“

Koanalgetika

Koanalgetika können in jeder Stufe des WHO-Stufenschemas als Begleitmedikation gegeben werden.

- **Neuropathische Schmerzen** (Bspw. diabetische Neuropathie, Post-Zoster-Neuralgie)
 - Trizyklische Antidepressiva: Amitriptylin, Doxepin
 - Antikonvulsiva: Carbamazepin, Pregabalin

- **Hirndruck und Nervenkompression** : Glucocorticoide
- **Knochenmetastasen und -schmerzen** : Bisphosphonate

Adjuvantien (um die Nebenwirkungen entgegenzuwirken)

- **Laxantien** (immer mit Opioide)
- **Antiemetika** (bei Bedarf mit Opioide)
- **Protonenpumpeninhibitoren** (mit NSAR)

Weitere Verfahren der Schmerztherapie

- **Regionalanästhesie-Verfahren**: Lokalanästhetika
- **Physikalische Maßnahmen**: Massagen, Thermotherapie, Physiotherapie,...
- **Psychotherapie** : Entspannungsverfahren, Kognitive Verhaltenstherapie, Patientenedukation
- Akupunktur

Verbrennung ++

Je nach Tiefe der Schädigung werden Verbrennungen in vier Grade eingeteilt. Das Ausmaß der Verbrennung kann über die Neunerregel oder die Handflächenbestimmung abgeschätzt werden. Durch die Entwicklung eines Kapillarlecks und die fehlende Barrierefunktion der Haut kann es zu großen Flüssigkeits- und Eiweißverlusten sowie zu Volumenmangelschock und SIRS/Sepsis kommen. Neben der lokalen Therapie ist daher eine intensive Flüssigkeitssubstitution sehr wichtig. Je nach Ausmaß der Verbrennung kann ein chirurgisches Vorgehen mit Nekrosenabtragung (=Ablatio), Hautspaltung und sogar Hauttransplantation notwendig sein.

Definition

- Gewebeschädigung durch Hitze

Ätiologie

- Übermäßige Hitzeeinwirkung, z.B. bei Brandverletzungen
- Im weiteren Sinne auch Strahlenschäden, Verbrühungen (Verbrennung, das durch heiße Flüssigkeiten oder Dämpfe ausgelöst wird), Verätzungen (Schädigung der Haut oder Schleimhaut durch starke Säuren, Laugen, oder Detergenzien) oder Starkstromschäden

Pathophysiologie

Hitzeeinwirkung → Nekrose der Haut → Schädigung von Kapillaren → Erhöhte Permeabilität (**Kapillarleck**) → Flüssigkeits- und Eiweißverlust mit Ödembildung → Mikrozirkulationstörung, Herzminutenvolumen↓, metabolische Azidose → **Volumenmangelschock** → Flüssigkeits- und Eiweißsubstitution!

Symptome/Klinik

Lokal

Die Symptome und Schädigungen hängen von der Tiefe der Verbrennung ab. Die Einteilung erfolgt über die Sensibilitätsprüfung und den klinischen Aspekt und ist in vier Grade eingeteilt.

| Verbrennungsgrad | Symptome | Schädigung |
|------------------|---|--|
| 1. Grades | <ul style="list-style-type: none"> Schmerz Rötung Schwellung <i>Ödem</i> | <ul style="list-style-type: none"> Oberste Epidermis Restitutio ad integrum <i>← Heilung</i> Bsp.: Sonnenbrand |
| 2. Grades (2a) | <ul style="list-style-type: none"> Schmerz Rötung Blasen | <ul style="list-style-type: none"> Epidermis und oberer Anteil der Dermis Hautanhangsgebilde intakt Keine Narbenbildung |
| 2. Grades (2b) | <ul style="list-style-type: none"> Kaum Schmerzen Rötung Blasen | <ul style="list-style-type: none"> Tiefe Schichten der Dermis mitbetroffen Abheilung mit Narben |
| 3. Grades | <ul style="list-style-type: none"> Keine Schmerzen (Verlust der Oberflächensensibilität) Nekrose Schwarze, weiße oder graue lederartige Haut | <ul style="list-style-type: none"> Epidermis + Dermis (= Cutis) und Subcutis verbrannt Spontanheilung nicht möglich |
| 4. Grades | <ul style="list-style-type: none"> Verkohlung (carbonisation) | <ul style="list-style-type: none"> Tiefer liegende Schichten mitbetroffen (z.B. Muskeln, Fett, Faszien, Knochen) |


„Das Schmerzempfinden nimmt bei tiefen Verletzungen bis hin zur Analgesie ab, da die Oberflächensensibilität verloren geht!“

Ausmaß der Verbrennung (Oberflächenbestimmung)

- **Neunerregel nach Wallace** : Zur Einschätzung des Ausmaßes der Verbrennung beim Erwachsenen (abweichende Zahlen für Kopf und untere Extremität bei Kindern)

| Körperteil | Körperoberfläche | | |
|---------------------|------------------|-----------|----------|
| | Erwachsene | Kleinkind | Säugling |
| Kopf | 9% | 16% | 18% |
| Rumpf | 36% (4×9%) | | |
| Arme | 18% (2×9%) | | |
| Oberschenkel | 18% (2×9%) | 14,5% | 13,5% |
| Unterschenkel & Fuß | 18% (2×9%) | 14,5% | 13,5% |
| Genitalregion | 1% | | |

Die Berechnung der Körperoberfläche kann nach verschiedenen Formeln mithilfe der Größe und des Körpergewichts erfolgen. Bei einem Erwachsenen beträgt sie ca. 1,5–2 m².



- **Handflächenregel**
 - Die Handfläche des Patienten beträgt 1% seiner Körperoberfläche
 - Genauere Oberflächenbestimmung des Verbrennungsareals als mithilfe der Neunerregel

„Die letale Grenze bei Verbrennungen liegt bei Erwachsenen ab ca. 50–70%, bei Kindern ab ca. 60–80% der Körperoberfläche. Zur Ausbildung einer Verbrennungskrankheit und eines Schocks reichen bei Erwachsenen jedoch bereits >15%, beim Kind >10% der Körperoberfläche!“

Systemisch

Schocksymptomatik durch Flüssigkeits- und Proteinverlust

Verlaufs- und Sonderformen

Verätzungen durch Säuren und Laugen

- Säuren erzeugen **Koagulationsnekrosen**: Trockene und brüchige Nekrose
- Laugen erzeugen **Kolliquationsnekrosen**: Sekundäre Verflüssigung des Gewebes

Strahlenbedingte Wunden (Strahlendermatitis)

- **Schweregrad abhängig von der Strahlendosis**
- **Spätschaden**: Strahlenulkus

Diagnostik

- **Anamnese:** Unfallhergang
- **Körperliche Untersuchung:** Patienten komplett entkleiden, **Nadelstichprobe:** Ab Verbrennung Grad 2b verminderte Schmerzempfindung
- **Labor:** Hb, Hkt, Gesamteiweiß
- **Weiterführende Diagnostik**
 - **Mikrobiologie:** Wundabstriche, **Blutkulturen** bei Superinfektion oder Sepsis
 - Probeentnahme (Histopathologie) im verbrannten Areal
 - Konventionelles Röntgen bei Verdacht auf Frakturen
 - Laryngo-Bronchoskopie (und Entnahme von Trachealsekret) bei Verdacht auf Inhalationstrauma

Therapie

Akut

- **Lokal**
 - **Entfernung** von verbrannter Kleidung
 - **Kühlung** mit kaltem Wasser (15–20 °C) → **Nicht bei großflächigen Verbrennungen >30%, aufgrund der Gefahr des Auskühlens**
 - **Steriles Abdecken** der Verbrennungen mit metallbeschichtetem Verbandtuch
- „Eine Hypothermie verschlechtert die Prognose bei Verbrennungsoptern!“
- **Systemisch**
 - **Sicherung** der Vitalfunktionen, **evtl. Intubation** (frühe Indikation) und Sauerstoffzufuhr (auch über Atemmaske) insb. bei Inhalationstrauma
 - Legen mehrerer großlumiger venöser Zugänge
 - **Volumensubstitution** *Parkland 4 ml x % x Kg, 50%/8h, 25%/8h, 25%/8h = 100%/24h*
 - **Analgesie** *Opioido, Medazolam ssf antinemetika*
- „Ab einer Verbrennung von 30–40% der Körperoberfläche ist eine Intubation indiziert!“

Transport

- **Transport in ein Verbrennungszentrum** indiziert bei:
 - **Verbrennung 2. Grades** ~~>20%~~, Verbrennung 3. Grades ~~>10%~~ (Kleinkinder und Menschen >50 Jahre auch bei geringeren Verbrennungen)
 - **Inhalationstrauma**
 - Verbrennungen spezieller Körperteile (**Hände, Füße, Gesicht, Genital**)
- Falls Transport in Verbrennungszentrum nicht möglich → Transport in das nächstgelegene Akutkrankenhaus

Im Krankenhaus

- **Allgemeinmaßnahmen**
 - **ZVK-Anlage**
 - **Evtl. Intubation**
 - **Flüssigkeitssubstitution** (kristalloide Lösungen) nach der **Parkland-Formel** nach Baxter (je 24 Std.):
 - 4 mL Ringer-Laktat-Lösung pro Prozent verbrannter Körperoberfläche × kg Körpergewicht
 - Beispiel: 10% verbrannte Körperoberfläche bei einem 80 kg schweren Patienten = 4 mL × 10% × 80 kg = 3.200 mL *50% davon (1600ml) über 8st, 25% (800ml)/8 Stunden, und noch 25% (800ml)/8st = 3200ml/24h*
 - **Tetanusprophylaxe**
- **Lokal**
 - **Débridement**: Abtragen nekrotischer Anteile und Eröffnung von Brandblasen
 - **Oberflächliche Wunden**
 - Heilung durch Epithelialisierung, daher **konservative** Therapie mit antibakteriellen Lösungen oder Salben
 - Kühlen

- **Tiefe Wunden**
 - Indikation zur Operation, da keine Möglichkeit der Spontanheilung
 - **Nekrektomie mit anschließender Defektdeckung**
 - **Escharotomie** (= Entlastungsschnitte in der Haut) bei **zirkulären Verbrennungen** (um **Kompartmentsyndrome** oder **Atembehinderungen** am Thorax vorzubeugen)
 - Bei Verdacht auf Kompartmentsyndrom **zusätzlich Fasziotomie**
- **Ruhigstellung** von Extremitäten

„Kleine Verbrennungsareale bis einschließlich Grad IIa können ambulant und konservativ mit Fettgaze, antiseptischer Salbe und Analgetikagabe behandelt werden!“

Komplikationen

- **Wundinfektion** und **Sepsis**
- Verbrennungskrankheit: **Schock, Multiorganversagen**
- Verbrennungen Grad 1 und 2a: Keine Narbenbildung, jedoch Hyper- und Hypopigmentierung möglich
- **Keloidbildung, Kontrakturen**
- **Inhalationstrauma** und -intoxikation
 - Gefahr der Ausbildung eines toxischen Ödems der Lunge und der oberen Atemwege
 - Diagnostischer Nachweis mittels Fiberbronchoskopie: Rußspuren, Rötung, graue/weißliche Verfärbung der Atemwege
 - Therapie
 - Frühzeitige **Intubation** und lungenschonende, **kontrollierte Beatmung** (24–48 h mit FiO₂ von 1,0)
 - **Kontrollbronchoskopie**

Management von Verbrennungen

In der präklinischen Phase stehen Maßnahmen zum Schutz vor Hypothermie und Hypovolämie sowie die adäquate Schmerztherapie und der zügige Transport in ein Verbrennungszentrum oder Akutkrankenhaus im Vordergrund. In der klinischen Phase werden diese Maßnahmen weiter angepasst und ggf. operative Verfahren angewandt, um den Patienten adäquat zu versorgen.

Präklinisches Management

- **Lokaltherapie**
 - **Entkleiden:** Entfernung von verbrannter Kleidung
 - **Kühlung** mit Wasser (Zimmertemperatur ausreichend)
 - Nur bei kleinen umschriebenen Verbrennungen für ca. 10 Minuten
 - Aufgrund der Gefahr des Auskühlens keine Kühlung bei größeren Verbrennungen [2]
 - **Steriles Abdecken:** Verbrennungen mit metallbeschichtetem Verbandtuch abdecken [1]
- **Systemtherapie**
 - **Sicherung der Vitalfunktionen**, evtl. **Intubation** (frühe Indikation) und Sauerstoffzufuhr (auch über Atemmaske) insb. bei Inhalationstrauma
 - Vorgehen nach ABCDE-Schema
 - Bei Inhalationstrauma oder Verbrennungen im kraniozervikalen Bereich: Unverzügliche Intubation [2]
 - **Durchführung** siehe: Rapid Sequence Induction - AMBOSS-SOP
 - **Beachte:** Gestörte Thermoregulation und Auskühlungsgefahr der Patienten nach Intubation
 - Andernfalls Sauerstoffgabe über Maske, bspw. 6 L/min
 - **Durchführung** siehe auch: Hinweise zur Sauerstoffgabe im Notfall
 - **Prävention einer Hypothermie** [1]
 - Gebrauch von Wärmefolien
 - Temperaturmonitoring
 - **Legen mehrerer großlumiger venöser Zugänge**
 - Siehe auch: Anlage eines peripheren Venenverweilkatheters
 - Nicht in verbrannte Hautareale
 - **Intraossären Zugang erwägen:** Schneller, zuverlässiger und alternativer Zugangsweg insb. bei großflächigen Verbrennungen!
 - **Volumensubstitution:** Primär balancierte kristalloide Infusionslösungen [1]
 - Bei Erwachsenen 1000 mL in den ersten 2 h nach Trauma [1]
 - **Analgesie** [1]
 - Bei verbrannter Körperoberfläche <15%: Monotherapie mit Opioiden und Antiemetikum
 - Bei verbrannter Körperoberfläche >15% und hämodynamisch instabilen Patienten: Ketamin mit Midazolam
- **Transport in ein Verbrennungszentrum indiziert bei**
 - Verbrennungen spezieller Körperteile (Hände, Füße, Gesicht, Genital)
 - Inhalationstrauma
 - Verbrennungen 2. Grades >10%, Verbrennungen 3. Grades (Kleinkinder und Menschen >50 Jahre auch bei geringeren Verbrennungen) [1]
 - Verbrennungen durch Elektrizität und **Blitzschlag** (siehe auch: Stromunfall)
 - **Chemikalienverätzungen** (siehe auch: Verätzungen mit Säure, Verätzungen durch Lauge, Erstmaßnahmen nach Art der chemischen Läsion)
 - **Schwerwiegende Begleiterkrankungen oder -verletzungen**
- Falls Transport in Verbrennungszentrum nicht möglich: Transport in das nächstgelegene Akutkrankenhaus [2]

! Eine Hypothermie verschlechtert die Prognose bei Verbrennungsoptionen!

! Ab einer Verbrennung von 30–40% der Körperoberfläche ist eine Intubation indiziert!

Klinisches Management

• Allgemeinmaßnahmen

- ZVK-Anlage
- Evtl. Intubation [1]
 - Siehe auch: Rapid Sequence Induction - AMBOSS-SOP
- Tetanusprophylaxe

• Systemtherapie

- Notfallversorgung und ggf. Schockraumaktivierung (siehe auch: Hypovolämischer Schock - Klinisches Management, ABCDE-Schema)
- Flüssigkeitstherapie bei Verbrennungen [3]
 - Kristalloide Infusionslösungen bevorzugen, bspw. Ringer-Acetat- oder Ringer-Malat-Lösung
 - Parkland-Formel nach Baxter zur Berechnung des Volumens pro 24 h: 4 mL Infusionslösung pro Prozent verbrannter Körperoberfläche × kg Körpergewicht
 - Beispielrechnung bei 10% verbrannter Körperoberfläche bei 80 kg Körpergewicht: $(4 \times 10 \times 80) \text{ mL} = 3.200 \text{ mL}$
 - Beachte: 50% des errechneten Volumens sollten in den ersten 8 h gegeben werden, je 25% in den darauffolgenden 8 h
- Analgesie [1]
 - Anlehnung an das WHO-Stufenschema
 - Bei Interventionen wie Verbandswechsel zusätzliche Analgesie verabreichen! [1]
 - Koanalgetika: Antidepressiva, α -2-Agonisten oder Ketamin im Rahmen eines multimodalen Konzeptes [1]
- Antibiotikatherapie: Bei Infektion (nach mikrobiologischer Diagnostik) bzw. als perioperative Antibiotikaphrophylaxe

• Wundmanagement [1]

- Verbrennung 1. Grades: Konservativ mit pflegenden Salben ohne Verband
- Verbrennung 2. Grades (2a)
 - Wundreinigung (aseptisch)
 - Debridement: Eröffnung der Brandblasen, Entfernung von Fremdkörpern und Verunreinigungen
 - Optionen des Wundverbandes, z.B.
 - Anwendung topischer Salben/Gele, ggf. mit zusätzlicher Abdeckung wie bspw. Fettgaze (siehe auch: Wundgaze)
 - Wundheilungsfördernde Salben, bspw. Panthenolcreme oder
 - Wundgel, bspw. Polihexanidgel (wie Lavanid® Wundgel) oder
 - Antiseptisches Gel, bspw. Octenidin-Wundgel [4]
 - Okklusivverband
 - Anwendung von silberhaltigen Materialien, biologischen oder synthetischen Hautersatzmaterialien erwägen, bspw. Mepitel®, siehe auch: Wundauflagen
 - Wundkontrollen bis zur Heilung
- Verbrennung 2. Grades (2b) bis Verbrennungen 3. Grades [4]
 - Nekrektomie mit anschließender Defektdeckung
 - Tangentiale Nekrektomie bei Verbrennungen Grad 2: Tangential zur Körperoberfläche werden die Nekroseschichten abgetragen, CAVE: Blutverlust!
 - Epifasziale Nekrektomie bei Verbrennungen Grad 3: Haut und Fettgewebe werden bis auf die Faszie entfernt
 - Defektdeckung mit Spalthaut oder temporär mit synthetischer Folie [1]
 - Escharotomie (= Entlastungsschnitte in der Haut)
 - Bei zirkulären Verbrennungen
 - Bei V.a. Kompartmentsyndrom zusätzlich Fasziotomie
- Verbrennungen 4. Grades: Defektdeckung (muskulokutane Lappenplastik), bei Lokalisation an den Extremitäten meist Amputation nötig

Wundbehandlung ++

Wundheilung

Mechanismen der Wundheilung

Regeneration (= Epitheliale Wundheilung)

- Nach Verletzung der Epidermis oder von Schleimhäuten
- Vollständige Abheilung der Wunde durch Regeneration der Epithelien
- keine Narbenbildung („Restitutio ad integrum“)

Reparation

- **Primäre Wundheilung:** Die chirurgisch verschlossenen Wunden werden durch neu gebildetes Bindegewebe verschlossen
- **Sekundäre Wundheilung:**
 - Die offen behandelten Wunden werden zunächst mit Granulationsgewebe ausgefüllt, danach beginnt die Reepithelialisierung
 - längere Heildauer
 - Gefahr der Bildung einer chronischen Wunde

Phasen der Wundheilung und Narbenbildung

- **Exsudative Phase** (Entzündung): Tag 1–3
- **Proliferative Phase** (Granulation): Tag 2–14
- **Reparative Phase** (Epithelialisierung): Tag 5–25

Wundversorgung

Erstversorgung

Zu prüfen, bevor eine primäre Wundversorgung durchgeführt werden kann:

- **Alter der Wunde :**
 - < 6-8 h: Naht möglich, primäre chirurgische Wundversorgung
 - > 6-8 h: Offene Wundversorgung
- **Ausmaß der Wunde**
- **pDMS prüfen:** (Periphere) Durchblutung, Motorik, Sensibilität
- **Art der Wunde :** z.B. sollten Tier- und Menschenbisse aufgrund des hohen Infektionsrisikos stets offen versorgt werden
- **Lokalisation:** Durchblutung und Heilung besser am Kopf als an den Extremitäten

Chirurgische Wundversorgung

Primäre chirurgische Wundversorgung (Bei sauberen, glatt begrenzten Wunden)

- Reinigung und Desinfektion (z.B. Octenisept)
- Lokalanästhesie
- Ggf. Exzision der Wundränder und Spülung
- Naht
- Steriler Verband und ggf. Ruhigstellung (bei Extremitätenverletzung)
- Tetanusschutz : gemäß STIKO-Empfehlungen
- Antibiotische Therapie bei erhöhtem Infektionsrisiko

Offene Wundversorgung (Bei schmutzigen, infizierten, zerfetzten oder fremdkörperhaltigen Wunden sowie bei Bisswunden oder kontaminierten Stichverletzungen)

- Wundreinigung, evtl. Débridement in Lokalanästhesie
- Abfluss gewährleisten
- Feuchter Verband und Ruhigstellung
- Nach 3–8 Tagen evtl. Sekundärnaht
- Tetanusschutz: gemäß STIKO-Empfehlungen
- Antibiotische Therapie bei erhöhtem Infektionsrisiko

„Bei jedem Hundebiss muss auch an Tollwut gedacht werden; bei Verdacht sollte aktiv und ggf. passiv nach Impfschema geimpft werden“

Vakuumtherapie (V.A.C.®-Therapie)

- Sonderform des feuchten Wundverbandes mit luftdichter Abdeckung der Wundfläche und Anlage eines Unterdrucks
- **Indikation:** Schlecht heilende Wunden
- Entfernung entzündlicher Wundsekrete und Abdichtung der Wunde mittels Folie (Entstehen eines keimarmen und feuchten Milieus). Vakuum als Wachstumsreiz (Bildung von Granulationsgewebe → Adaption der Wundränder und Reduktion der Wundtiefe)

Plastische Hautdeckung

Ist ein primärer Wundverschluss nicht möglich und eine Sekundärheilung der Wunde keine Option, sollte eine plastische Sanierung des Hautdefekts angestrebt werden (Hauttransplantation).

Messerstichverletzung / Verletzung durch spitzen Fremdkörper

- Erstversorgung: Fremdkörper in der Wunde belassen
- Entfernung des Fremdkörpers im OP
- Abdominelle Verletzungen: Diagnostische Laparoskopie/Laparotomie

Nadelstichverletzung

- Bei offener Wunde : Wunde für mind. 1 min bluten lassen, intensive Desinfektion
- Impfstatus des Verletzten (Hepatitis B und Tetanus), ggf. Tetanus-Auffrischimpfung
- Blutentnahme
 - Bei der Indexperson : Anti-HCV. Anti-HIV 1+2. HBsAg
 - Beim Verletzten : zusätzlich Anti-HBc
- Postexpositionsprophylaxe bei begründetem Verdachtsfall
- Bei Arbeitsunfall zusätzlich Vorstellung beim Durchgangsarzt
- Weitere Betreuung durch Betriebsarzt und Blutentnahmen i.d.R. nach 6 Wochen, 3 und 6 Monaten

„Übertragungsrisiko nach Nadelstichverletzung bei bekannter positiver Indexperson gilt die Dreier-Regel: 30% für Hepatitis B, 3% für Hepatitis C und 0,3% für HIV.“

Chronische Wunden (> 4 Wochen)

- **Risikofaktoren** : pAVK, Diabetes mellitus, Medikamente (z.B. Immunsuppressiva)
- **Beispiele** : Dekubitus, Ulcus cruris

Dekubitus

Definition

Entstehung einer Wunde an Druckstellen

Pathophysiologie

Entstehung ischämischer Nekrosen durch lokale Minderperfusion durch bestehenden Druck

Risikofaktoren

- Bettlägerigkeit bzw. Bewegungseinschränkung
- Alter. Diabetes mellitus. pAVK. Adipositas oder Kachexie

Prädilektionsstellen

Regionen über knöchernen Vorsprüngen : Kreuz- und Steißbein, Sitzbein, Trochanter major, Ferse, Lateraler Malleolus

Diagnostik

- **Anamnese und klinische Untersuchung**
- **Röntgen** in 2 Ebenen (zur Abklärung einer knöchernen Beteiligung)
- **Sonographie** (zur Einschätzung von Weichteilprozessen)

Stadien

- **Grad I:** Nicht-wegdrückbare Rötung bei intakter Haut
- **Grad II:** Teilverlust der Haut bis in die Dermis
- **Grad III:** Zerstörung aller Hautschichten
- **Grad IV:** Vollständiger Gewebeverlust mit freiliegenden Knochen, Sehnen oder Muskeln

Therapie

- **Dekubitusprophylaxe :**
 - Regelmäßiger Lagewechsel im 2-stündigen Intervall (Rückenlage → 30 ° rechte Seitenlage → Rückenlage → 30 ° linke Seitenlage)
 - Wechseldruckmatratze
 - Hautpflege
 - Optimierung der Ernährung
- **Stadiengerechte Therapie**
 - **Grad I:** Druckentlastung, Hautpflege
 - **Grad II:** Primär konservatives Wundmanagement mittels Wundauflagen
 - **Grad III und IV:** Primär operative Therapie, ggf. mit plastischer Deckung

Thanatologie (Wissenschaft vom Tod) ++

Leichenschau und Obduktion

Äußere Leichenschau

- Ärztliche Untersuchung der Leiche, durchgeführt von einem approbierten Arzt
- Ziel : Feststellung des Todes. Bestimmung der Todesursachen, der Todeszeit und der Todesart (natürlich, nicht natürlich oder ungeklärt). Ansteckende Erkrankungen?
- Zeitpunkt: Unverzüglich (Ggf. zweite Leichenschau nach 2h)
- **Ausfüllen des Totenscheins** nach Durchführung der äußeren Leichenschau
 - Angaben : Name, Vorname, Adresse, Geburtstag und –ort, Sterbezeitpunkt und –ort, Todesursache (z.B. Myokardinfarkt - Koronarthrombose – KHK - arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus), Todesart (natürlich, nicht-natürlich, ungeklärt), Infektionsgefahr?, Name und Unterschrift vom untersuchenden Arzt.
 - Weiteres Verfahren
 - Vor der Bestattung
 - Natürliche Todesart: Ggf. klinische Obduktion
 - Nicht-natürliche bzw. ungeklärte Todesart: Polizei informieren → Gerichtsmedizinische Obduktion
 - Nach der Bestattung: Sammlung aller Totenscheine im Gesundheitsamt

„Eine Todesbescheinigung darf nie ohne das Vorhandensein sicherer Todeszeichen ausgestellt werden“

Obduktion (= Sektion = Innere Leichenschau)

Eröffnung einer menschlichen Leiche zur Feststellung der Todesursache (Öffnung aller drei Körperhöhlen : Schädel-, Brust- und Bauchhöhle)


- **Klinische Obduktion**
 - Medizinische Klärung der natürlichen Todesursache
 - durchgeführt von einem Pathologen
 - Voraussetzung : Zustimmung des Verstorbenen zu Lebzeiten oder des Sorgeberechtigten
- **Gerichtsmedizinische Obduktion**
 - Rechtliche und medizinische Klärung eines nicht-natürlichen oder ungeklärten Todes
 - durchgeführt von zwei Ärzten, mind. einer muss Rechtsmediziner sein
 - Voraussetzungen : Totenschein mit nicht-natürlicher und ungeklärter Todesart. Anordnung des Gerichts

Begriffsdefinitionen

Allgemein

- **Klinischer Tod** : Kreislauf- und Atemstillstand. Reversibel durch kardiopulmonale Reanimation
- **Hirntod** : Erlöschen der Hirnfunktion
- **Individualtod** : irreversibles Sistieren der Atmung, Herz-Kreislauf + Hirntod
- **Biologischer Tod**: Zeitraum nach Absterben der letzten Körperzelle
- **Intermediäres Leben**: Zeitraum zwischen Individualtod und Absterben der letzten Körperzelle
- **Menschliche Leiche** : Körper eines Verstorbenen (Totgeburt ab Körpergewicht 500 g)

Todesart und Todesursache

- **Todesursache**: Unmittelbar zum Tode führende Ursache
- **Todesart**: Art und Weise, die zum Tod eines Menschen geführt hat
 - Unterscheidung zwischen natürlicher, nicht-natürlicher und ungeklärter Todesart
- **Natürlicher Tod** : Tod durch eine krankhafte Ursache
- **Nicht-natürlicher Tod** : Tod durch äußere Einflüsse verursacht (z.B. Unfälle, Suizide und Gewaltdelikte) 
 - Beispiel: Tod einer 70-jährigen Frau durch eine Lungenembolie nach Verkehrsunfall mit Oberschenkelfraktur vor 4 Wochen
- **Ungeklärter Tod** : bei uneindeutiger Todesursache
 - Beispiel: Tod eines scheinbar gesunden Säuglings (Möglichkeit 1: plötzlicher Kindstod als natürliche Todesursache. Möglichkeit 2: Tod durch Fremdeinwirken)

Todeszeichen

Todeszeichen dienen der Feststellung des Todes und der Bestimmung des Todeszeitpunkts.

Sichere Todeszeichen

Frühe Leichenveränderungen

- **Totenflecken (Livores)**
 - Erstes sicheres Todeszeichen, durch schwerkraftbedingtes Absinken des Blutes
 - Auftreten nach 20-30 min
 - Wegdrückbarkeit: bis 4h (mit leichtem Druck). Bis 30h (mit starkem Druck). >30h (nicht mehr wegdrückbar)
 - Umlagerbarkeit: Bis 6h (vollständig). Bis 12h (partiell). >12h (nicht mehr umlagerbar)
 - Farbe: Livide = Blau-Violett (normal). Hellrot (CO-Intoxikation, Cyanid, Kälte). Blassrosa (Blutverlust, Anämie). Braunrot (Methämoglobin-Bildner-Intoxikation: Nitrit, Anilin). Grünrot (Fäulnis)
- **Totenstarre (Rigor mortis)**
 - Ursache: Erschlaffung aller Muskeln nach Eintritt des Todes → ATP-Mangel → Totenstarre (temperaturabhängig: Ausbildung bei Wärme schneller als bei Kälte)
 - Nach 2-4h Beginn der Starre (Nysten-Regel: Kiefer → Nacken → Obere Extremität → Untere Extremität)
 - Nach 6-12h: Vollständige Starre
 - Bis 8h: Wiederauftreten der Totenstarre nach dem Brechen durch kraftvolles Bewegen
 - Nach 48-72h: Lösung der Totenstarre durch Autolyse der Muskulatur
 - Mögliche Phänomene: Totenlaut bei Umlagerung
- **Weitere frühe Leichenveränderungen**: Nicht mit dem Leben zu vereinbarende Verletzungen


Späte Leichenveränderungen

- **Fäulnis (putréfaction)**
 - Fäulniszeichen: Durchschlagen des Venennetzes, Grünfärbung, Anstieg der Leichentemperatur durch Bakterienbesiedlung
 - Caspar-Regel: Fäulniszustand 1 Wo an Luft = 2 Wo im Wasser = 8 Wo im Erdgrab
- **Autolyse**: Zersetzung der Leiche von innen durch körpereigene Enzyme (aus Pankreas, Magen,...)
- **Verwesung**: Zersetzung der Leiche durch aerobe Prozesse
- **Leichenfraß**: Fraßspuren von Tieren
- **Mumifikation**: bei trockener Wärme


Unsichere Todeszeichen

Erscheinungen, die post mortem auftreten, den Individualtod aber nicht beweisen.

- Bewusstlosigkeit, Pulslosigkeit, Atemstillstand
- Hautblässe oder Hautvertrocknung. Hypothermie
- Lichtstarre, weite Pupillen. Areflexie
- Hypothermie



Totenflecken (Livores)



Nr + livide (blau-violett)

CO-intox, Kälte, Cyanid → Hellrot

Blutverlust, Anämie → Blassrosa

Mitthamoglobin - braune - intox. → Braunrot

Fäulnis → Grünrot

Begin 20-30 min

Wegdrückbar:-

mit leichtem Druck < 4st

mit starkem Druck < 30st

nicht mehr verdrückbar > 30st

Umlagerbar:-

vollständig < 6st

Partiell < 12st

nicht mehr > 12st

Todesstarre (Rigor mortis)

Begin 2-4 st

6-12 st vollständig

18-72st → Lösung der Starre



Kiefer
Nacken
↓
DE
UE

Fäulnis


Durchschlagen des Venenretzes

Grünverfärbung

Anstieg der

Leichtentemperatur

(Bakterienbesiedelung)



Luft → 1 W

Wasser → 2 W

Erdboden → 8 W

Eine Pupillenstarre bedeutet das Fehlen einer Reaktion der Pupille auf einen Lichtreiz

Ärztliche Rechtskunde ++

Allgemeines

- **Approbation:** Genehmigung zur Berufsausübung.
 - **Voraussetzungen für die Erteilung der Approbation:** ein erfolgreich abgeschlossenes Medizinstudium und eine bestandene ärztliche Prüfung. Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Eine gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes. Ausreichende deutsche Sprachkenntnisse
- Jeder medizinische Eingriff erfüllt den **Tatbestand der Körperverletzung**. Für die Rechtfertigung des Eingriffs müssen zwei Aspekte erfüllt werden:
 - Aufklärung: Der Patient muss (sofern er einwilligungsfähig ist) in die Durchführung der Maßnahme einwilligen.
 - Die Maßnahme muss gemäß den Regeln der medizinischen Wissenschaft durchgeführt werden.
- **Berufsverbot:** kann nur vom **Strafgericht** angeordnet werden.
- Voraussetzungen : Grober Missbrauch des Berufes. Verletzung der mit dem Beruf verbundenen Pflichten.
- **Ärztelkammer** : Berufsvertretungen der Ärzte. Alle Ärzte sind Pflichtmitglieder in ihren jeweiligen Kammern.
 - **Aufgaben** : Berufsordnung. Weiterbildungsordnung. Überwachung der Berufsausübung der Ärzte. Förderung der beruflichen Fortbildung...

Aufklärungspflicht

- **Umfang der Aufklärung**
 - Der Umfang richtet sich vor allem nach der Dringlichkeit und Invasivität des Eingriffs. Je dringlicher der Eingriff, desto knapper kann die Aufklärung erfolgen.
 - Der Arzt ist verpflichtet, die Maßnahmen, die für die Sicherung des Therapieerfolges notwendig sind, aufzuklären (z.B. körperliche Schonung nach einem operativen Eingriff).
 - Aufklärung im Notfall: Der Arzt kann eine **zweifelsfrei** gebotene Maßnahme in einer akuten Notfallsituation selbst verantworten. Bei bewusstlosem Patienten ist der **mutmaßliche Patientenwille** zu eruieren, wobei einer Patientenverfügung besondere Gewichtung zukommt. **Soweit möglich, sollten Familienangehörige am Entschluss beteiligt werden**, um den mutmaßlichen Willen des Patienten zu bezeugen.
 - Jeder Patient hat das Recht auf Nichtwissen und somit z.B. eine Aufklärung abzulehnen. Wenn der Fall ist, sollte dies vom zuständigen Arzt dokumentiert werden.
- **Zeitpunkt der Aufklärung** : Der Patient muss vor einer medizinischen Handlung so rechtzeitig (mit ausreichendem Abstand) aufgeklärt werden, dass er in der Lage ist, eine eigenständige Entscheidung ohne Handlungsdruck zu treffen. Kann die Aufklärung nicht vor der medizinischen Handlung erfolgen (bspw. bewusstloser, akut vital gefährdeter Patient), muss sie danach baldmöglichst nachgeholt werden
- **Dokumentation:** Eine schriftliche Einwilligung mittels Aufklärungsformular ist zu empfehlen, jedoch **nicht zwingend** notwendig, da eine **dokumentierte mündliche Aufklärung ausreichend** ist. Ein Aufklärungsformular ist nur ein Hinweis darüber, dass eine Aufklärung in einem gewissen Umfang stattgefunden hat. Nach Durchsicht des Aufklärungsbogens durch den Patienten erfolgt ein ärztliches Aufklärungsgespräch über den Ablauf des geplanten Eingriffs und alle relevanten Risiken und Komplikationen.
- **Trotz Aufklärung ist ein Eingriff strafbar, wenn keine medizinische Indikation gegeben ist.**
- **Sprache:** Der Patient kann von seinem Selbstbestimmungsrecht keinen Gebrauch machen, wenn er aufgrund einer sprachlichen Barriere der Aufklärung über den Ablauf und die Risiken einer Behandlung nicht folgen kann.

مهم جداً

لنفس

- Folgende Maßnahmen dürfen i.d.R. ohne Einwilligung des Patienten erfolgen :
 - Erkennung von Geschlechtskrankheiten
 - Untersuchung und Behandlung zur Verhinderung von Seuchen ar, 30
 - Nach Anordnung vom Richter oder Polizei (z.B. Blutalkoholbestimmung bei alkoholisierten Verkehrsteilnehmern, V.a. Strafbestand unter Alkoholeinfluss)
- **Einwilligung und Aufklärung bei Minderjährigen**
 - Alter < 14 Jahren (nicht einwilligungsfähig): Sofern kein Notfall vorliegt, ist bei Kindern die Einwilligung beider Elternteile erforderlich. Wird eine Einwilligung seitens der Eltern verweigert, kann der Arzt das Familiengericht einschalten → Das Familiengericht kann den Eltern das medizinische Sorgerecht entziehen.
 - Alter zwischen 14. und 18. Lebensjahr: Eine Einwilligung ist möglich, wenn Art und Schwere des konkreten Eingriffs ein zeitnahes Handeln notwendig machen **oder** wenn es von einer Urteilsfähigkeit des minderjährigen Patienten zur sachgemäßen Bewertung ausgegangen werden kann. Wird keiner dieser beiden Punkte erfüllt, ist die Einwilligung beider Elternteile erforderlich
- **Aufklärung bei „Entlassung gegen ärztlichen Rat“ :**
 - Grundlage : Einwilligungsfähiger Patient (Dabei darf die Entlassung nicht verweigert werden). Detaillierte Information über weiteres Vorgehen. Genaue Dokumentation

Behandlungsfehler

Ein ärztlicher Behandlungsfehler kann abhängig von den Konsequenzen gleichzeitig sowohl standes-, zivil-, strafrechtlich als auch nach öffentlichem Recht verfolgt werden.

| | Verfolgung | Konsequenzen |
|---------------------------|-------------------------------|---|
| Standesrecht | Standesrechtliches Verfahren | Disziplinarmaßnahmen |
| Zivilrecht | Zivilrechtliches Verfahren | Entschädigung . Schadensersatz |
| Strafrecht | Strafrechtliches Verfahren | Freiheitsstrafen. Geldstrafen. Berufsverbot |
| Öffentliches Recht | Zuständige Verwaltungsbehörde | Approbationsentzug |

- **Definition einer abweichenden Behandlung:** Eine nicht angemessene, nicht fachgerechte oder nicht zeitgerechte Behandlung des Patienten
- Der Arzt ist nicht zur Selbstanzeige verpflichtet! Der Arzt ist aber verpflichtet, den Patienten über Behandlungsfehler zu informieren, insb. wenn durch den Behandlungsfehler Folgeschäden entstehen oder entstanden sein können.

Schweigepflicht (= Verschwiegenheitspflicht)

- Der Arzt hat darüber zu schweigen, was der Patient ihm anvertraut hat. Hierzu gehören neben mündlichen und schriftlichen Mitteilungen des Patienten auch Aufzeichnungen des Arztes über ihn einschließlich apparativer und Laborbefunde. Auch die Tatsache, dass sich der Patient überhaupt in Behandlung befindet, gehört zur Schweigepflicht.
- Nur der Patient selbst kann von der Schweigepflicht entbinden.
- Die Schweigepflicht kann nicht durch die Arbeitgeber oder Vorgesetzten aufgehoben werden. Die Schweigepflicht gilt auch nach Versterben des Patienten. Bei der Verletzung der Schweigepflicht handelt es sich um ein Antragsdelikt (Verletzungen der Schweigepflicht werden erst nach Antragstellung strafrechtlich verfolgt).
- Gegenüber gesetzlichen Krankenversicherungen besteht eine Auskunftspflichtung des Arztes bei Fragen zur Überprüfung der Leistungspflicht (z. B. Diagnose, Verlauf). Bei privaten Krankenversicherungen ist jeweils eine Entbindung von der Schweigepflicht durch den Patienten erforderlich.

- **Geltungsbereich** : Die Schweigepflicht gilt gegenüber **jeder dritten Person (auch Familienangehörigen)**. Die Schweigepflicht gilt für alle (auch außerhalb der beruflichen Tätigkeit) anvertrauten Geheimnisse. Dies trifft allerdings nur zu, wenn einem die entsprechenden Geheimnisse in der Funktion als Arzt anvertraut wurden. Werden einem Geheimnisse in der Rolle als Privatperson anvertraut, gilt die Schweigepflicht nicht.

Entbindung von der Schweigepflicht

- **Voraussetzungen:** **Ausdrückliches Einverständnis des Betroffenen**
- **Offenbarungspflicht:** Obligate Durchbrechung der Schweigepflicht
 - Unmittelbare **Gefährdung der Allgemeinheit**: die Nichtanzeige geplanter Straftaten (z.B. Mord, Totschlag, Völkermord) ist strafbar.
 - **Gesetzliche Auskunftspflicht**: **Meldepflicht, Geburt, Todesfall, Berufskrankheiten**
 - V.a. **nichtnatürliche Todesursache**
- **Offenbarungsbefugnis:** Fakultative Durchbrechung der Schweigepflicht
 - wenn die Offenbarung dem Schutz von rechtlich geschützten Interessen dient
 - Dies gilt insb. dann, wenn es sich um schwere Taten gegen Leib (*corps*), Leben und Freiheit handelt und Wiederholungsgefahr besteht.
 - Es ist jedoch erforderlich, dass der Arzt zuvor in ausreichendem Maße versucht hat, den Patienten von der Tat abzuhalten
 - **Beispiel:** Ein Patient, der aufgrund einer Erkrankung nicht mehr fahrtüchtig ist und auch nach Androhung, ihn bei der Führerscheinsbehörde zu melden, weiter Auto fährt, darf unter Durchbrechung der Schweigepflicht bei der Behörde gemeldet werden.

„Bei rechtfertigendem Notstand ist ein Bruch der Schweigepflicht erlaubt, soweit der Schutz eines höherwertigen Rechtsgutes erforderlich ist (z. B. Kindesmisshandlung, Autofahren trotz Verkehrsuntüchtigkeit)“

Patientenverfügung

- In einer Patientenverfügung werden für den Fall, dass z.B. aufgrund einer **Demenz** oder einer **Bewusstseinsstörung** eine Willensäußerung nicht mehr möglich ist, Wünsche geäußert, die sich auf die Durchführung (z. B. adäquate Schmerztherapie) oder Begrenzung (z. B. Reanimation, Beatmung, PEG) medizinischer Maßnahmen beziehen.
- Patientenverfügungen sind für das ärztliche Handeln verbindlich, soweit es keine Hinweise dafür gibt, dass sie der Patient nicht mehr gelten lassen würde. Sie bedürfen keiner speziellen Form, sind aber schriftlich abzufassen.
- Liegt keine schriftliche Verfügung vor, so ist der **mutmaßliche Patientenwille zu ermitteln**. Hierfür ist das Gespräch mit den Angehörigen besonders wichtig. Die Angehörigen können aber nur informieren (Ausnahme: Bevollmächtigter, gesetzlicher Betreuer, Erziehungsberechtigter). Die Entscheidung über medizinische Maßnahmen liegt dann beim Arzt oder beim **Betreuungsgericht**.

Vorsorgevollmacht

In der Vorsorgevollmacht **setzt man eine bestimmte Person als Entscheidungsbefugten für alle oder bestimmte Bereiche ein**. Dies sollte natürlich eine Person sein, der man vertraut und mit der man ausgiebig über dieses Thema gesprochen hat. Im Fall der Fälle entscheidet der Bevollmächtigte.

Behandlungsvertrag

Das ist ein zivilrechtlicher Vertrag zwischen dem Behandelnden und dem Patienten über die entgeltliche Durchführung einer medizinischen Behandlung. Er kommt bei Terminvergabe, Behandlungsbeginn oder telefonischer Beratung zustande. Der Behandlungsvertrag verpflichtet den Arzt zu einer Aufklärung des Patienten und zur Behandlung nach aktuellen medizinischen Standards (Der Arzt schuldet dem Patienten „nur“ eine Behandlung nach den Regeln der ärztlichen Kunst, aber gerade nicht den Erfolg der Behandlung). Der Behandlungsvertrag endet, wenn Sie wieder gesund sind oder die Behandlung abgeschlossen ist.

Behandlungsbericht

Nach einer stationären Behandlung im Krankenhaus oder nach der Untersuchung beim Facharzt bekommen Patienten einen Arztbrief (= Befund- und Behandlungsbericht).

ويعود كل الحقنة

هذا هو القول به الحقنة (الافتد)

Strahlenschutz ++

Definition

- **Strahlenschutz:** Schutz von Patienten und Personal vor der biologischen Auswirkung von ionisierenden und nicht-ionisierenden Strahlen.
- **Nuklearmedizin:** Oberbegriff zur Bezeichnung von diagnostischen und therapeutischen Verfahren, die auf radioaktiven Strahlen beruhen.

Anwendung der ionisierenden Strahlung in der Medizin

- **Diagnostik** (meist Gamma-Strahlung)
 - Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
 - Szintigraphie (z.B. Knochenszintigraphie, Schilddrüsenszintigraphie)
- **Therapie** (insb. Beta- und teilweise Alphastrahlungen)
 - Strahlentherapie
 - Radioiodtherapie

Ionisierende Strahlungsarten

Als **ionisierende Strahlen** werden alle Strahlungen bezeichnet, deren Energie hoch genug ist um Elektronen aus einem Atom herauszuschleudern.

- **Elektromagnetische Wellen:** Röntgenstrahlung und Gammastrahlung
- **Teilchenstrahlungen:** Alpha- und Betastrahlung

| | Alphastrahlung | Betastrahlung | Gammastrahlung | Röntgenstrahlung |
|------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Charakteristika | nicht durchgehende Strahlung | | durchgehende Strahlung | |
| Medizinische Anwendung | Therapeutisch (Nuklid-Therapie bei Knochen-Metastasen) <i>Strahlentherapie</i> | Therapeutisch (Radioiodtherapie) | Diagnostisch (Szintigraphie) | Diagnostisch |
| Schutzmaßnahmen | Blatt Papier | Aluminium | Blei | |

Strahlenbelastung

Ursachen der Strahlenbelastung

- **Exposition der Bevölkerung:** Mittlere Belastung (effektive Dosis) für den Bundesbürger ca. 4mSv/Jahr
 - **Natürliche Strahlung:** 2mSv/Jahr (*kosmische Strahlung*, *terrestrische Strahlung*, Inhalation von Radon,...)
 - **Medizinische Exposition:** 2mSv/Jahr (Röntgendiagnostik, Nuklearmedizin, Strahlentherapie)
 - Röntgen-Schädel: Exposition von 0,1mSv
 - Röntgen-Thorax: Exposition von 0,2mSv
 - CT-Thorax: Exposition: Exposition von 10mSv.
 - CT-Thorax/Abdomen: Exposition von 20mSv.
 - Herzkatheter: diagnostisch 7 mSV, mit Intervention (PTCA) 15 mSv
- **Berufliche Exposition**
 - Gilt ein Mitarbeiter als beruflich strahlenexponiert ab einer Exposition von 1 mSv/Jahr
 - **Jahresgrenzwert** für beruflich strahlenexponierte Personen: 20 mSv (1 mSv bei Personen unter 18 Jahren)
 - Grenzwert der **Berufslebensdosis**: 400 mSv
 - Risikogruppen:
 - **Medizinisches Personal**, das mit Röntgen- oder radioaktiven Strahlen in Kontakt kommt
 - Personen, die im **Flugverkehr tätig** sind

„Nicht notwendige Strahlenbelastung durch medizinische Exposition sollte unbedingt vermieden werden!“

Strahlenschutzmaßnahmen

- **Anwendung** von Strahlung gemäß rechtfertigender Indikation
- **ALARA-Prinzip**: "As Low As Reasonably Achievable" = "So niedrig wie vernünftigerweise erreichbar" = möglichst hohe Dosisreduktion unter Berücksichtigung des durchführbaren Strahlenschutzes
- **5-A-Grundregel** (Strahlenschutz des Personals)
 - **Anwendung** von Strahlung gemäß rechtfertigender Indikation
 - **Abstand** (Entfernung zur radioaktiven Quelle) : größtmöglich
 - **Abschirmung**: Wände, Bleischürze, Hodenkapseln und Ovarprotektoren
 - **Aufenthaltsdauer** kurz halten (und nur für Befugte)
 - **Aktivität** gering halten (Ausschalten einer elektrisch betriebenen Strahlenquelle)
 - **Aufnahme** in den Körper vermeiden : durch die Aufnahme radioaktiv verseuchter Nahrung und Luft (Inkorporation) kann es zu hohe Strahlendosis und erheblichen Strahlenschäden kommen.

→ „**Rechtfertigung und Optimierung der Strahlenanwendung**“ sind die wichtigsten Maßnahmen zum Strahlenschutz „

Strahlenwirkungen auf den Organismus

Bei den Strahlenschäden unterscheidet man grundsätzlich zwischen deterministischen und stochastischen Schäden.

| | Deterministische Strahlenschäden | Stochastische Strahlenschäden |
|-----------------------------|--|--|
| Beschreibung | Meist unmittelbar auftretende Schäden an Geweben und Organen | Später auftretende Schäden aufgrund von Zellen, deren DNA geschädigt wurde |
| Ursache des Schadens | Abtötung oder Fehlfunktionen zahlreicher Zellen | Mutationen und nachfolgende Vermehrung von einzelnen mutierten Zellen (Körperzellen oder Keimzellen) |
| Dosis-Abhängigkeit | Je höher die Strahlendosis, desto schwerer der Strahlenschaden | Je höher die Strahlendosis, desto höher die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Strahlenschadens |
| Dosis-Schwellenwert | 500 mSv | Nicht vorhanden |
| Beispiele | Rötungen der Haut, Haarausfall, Unfruchtbarkeit, akute Strahlenkrankheit | Krebs, Leukämie, vererbare Effekte |

Soziale Sicherung +

Gesetzliche/private Versicherung

- **Gesetzliche Sozialversicherung** (Solidaritätsprinzip : Der Beitragshöhe für die gesetzlichen Krankenkassen wird einkommensabhängig berechnet und beträgt derzeit 14,6% des Bruttoeinkommens)
 1. Krankenversicherung
 2. Rentenversicherung
 3. Unfallversicherung
 4. Pflegeversicherung
 5. Arbeitslosenversicherung
- **Private Krankenversicherung** (Äquivalenzprinzip : Beitragshöhe wird äquivalent zum individuellen Risiko und dem gewünschten Leistungsspektrum bemessen)

Gesetzliche Krankenversicherung

- Zweig (*branche*) der gesetzlichen Sozialversicherung.
- **Aufgaben** : übernimmt bei Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit die Kosten aller notwendigen Maßnahmen
- **Wichtige Organe** der gesetzlichen Krankenversicherung :
 - der medizinische Dienst der Krankenkassen
 - die kassenärztliche Vereinigung
 - der gemeinsame Bundesausschuss

Kassenärztliche Vereinigung

- **Aufgaben** : Vertretung der Rechte der Vertragsärzte gegenüber den Krankenkassen. Sicherstellung der ambulanten kassenärztlichen Versorgung (z.B. Organisation der Krankheits- und Urlaubsvertretung, sowie Notdienst in sprechstundenfreien Zeiten)

Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK)

- **Aufgaben** : Beratungs- und Begutachtungsdienst für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung.

Gemeinsamer Bundesausschuss

- **Aufgaben** : Erstellung und Aktualisierung von Richtlinien. Entscheidung über Zulassung von neuen Medikamenten

Gesetzliche Unfallversicherung (GUV)

- Zweig (*branche*) der gesetzlichen Sozialversicherung.
- **Aufgaben** : Verhütung (*prévention*) bei Arbeits-/Schulunfällen (auch Wegeunfälle) und Berufskrankheiten. Entschädigungszahlungen
- **Versicherte** : Pflichtversicherte (Arbeitnehmer, Schüler, ...). freiwillig Versicherte (Unternehmer, Freiberufler, ...)

Berufsgenossenschaften (BG)

Die BG sind die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung

Durchgangsarzt (D-Arzt)

Facharzt (i.d.R. für Unfallchirurgie oder Orthopädie) zur Beratung und Untersuchung von Unfallverletzten.

Arbeits- und Wegeunfälle

- **Wegeunfälle** werden behandelt wie Arbeitsunfälle
 - Versichert : Weg zum oder vom Arbeitsplatz. Umwege (um bspw. die Kinder von der Schule abzuholen)
 - Nicht versichert : Jeder Unfall > 2 h nach Arbeitsende. Umwege und Tätigkeiten privater Natur
- **Durchgangsarzt** ("D-Arzt")
 - Bei Arbeitsunfällen übernimmt ein "Durchgangsarzt" nach der Primärversorgung die Beurteilung und Behandlung.
 - Für die Anerkennung durch die GUV muss der Verunfallte von einem Durchgangsarzt (D-Arzt) untersucht werden
- **Meldepflicht durch den Arbeitgeber**: Fällt der Verunfallte für mehr als drei Tage aus, ist dies der Berufsgenossenschaft durch den Arbeitgeber innerhalb von drei Tagen zu melden

Ärztliche Anzeigepflicht

Es besteht eine Anzeigepflicht gegenüber der GUV (nicht gegenüber dem Arbeitgeber) bei jedem Verdacht auf eine Berufserkrankung oder einen Arbeitsunfall **auch gegen den Willen des Patienten!** Dabei ist der Arzt auch dazu verpflichtet, den Versicherten über diese Anzeige zu informieren.

Rentenzahlung bei Berufserkrankung/nach Arbeitsunfall

Liegt nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufserkrankung eine bestehende Minderung der Erwerbsfähigkeit vor, so muss der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung dem Betroffenen eine Rente zahlen.

Gesetzliche Rentenversicherung

Zweig der Sozialversicherung und dient so als Altersvorsorge.

Gesundheitsamt

- staatliche Behörde in einem Stadt- oder Landkreis für das Gesundheitswesen
- Aufgaben : Ärztlicher Dienst. Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung

Gesetzliche Pflegeversicherung

- dient zur Absicherung des Risikos, pflegebedürftig zu werden
- Versicherungsschutz: Jeder, der in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist

Alkoholkrankheit (Alkoholismus) +

Definition

Genuss größerer Mengen Alkohol länger als ein Jahr oder Kontrollverlust über den Alkoholkonsum und dadurch bedingte körperliche, psychische und soziale Schäden.

Ursachen

- genetische Prädisposition, Persönlichkeitsstruktur.
- Psychosoziale Faktoren: z. B. soziale Schicht, soziales Umfeld, Konfliktsituationen.

Klinik

Alkoholintoxikation (= Alkoholrausch)

Schwindel, Koordinationsstörungen, Sehstörungen, Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen bis zur Bewusstlosigkeit, Atemdepression und Tod.

Alkoholentzugssyndrom (Stadien)

- **Vegetativer Entzug:** Feinschlägiger Tremor und innere Unruhe, Appetitlosigkeit, Schwitzen, vermehrte Reizbarkeit, Schlafstörung
- **Prädelir:** Grobschlägiger Tremor, Angst, Übelkeit, Brechreiz, Tachykardie, evtl. Halluzinationen (z. B. Ungeziefer), epileptische Anfälle
- **Delirium tremens:** Zusätzlich Desorientierung, schwere psychomotorische Unruhe, Tachypnoe, Halluzinationen, Bewusstseinsstörungen.

Neurologische Folgeerkrankungen

- **Erkrankungen durch zusätzlichen Vitamin-B₁-Mangel:**
 - **Wernicke-Enzephalopathie:** Augenmuskellähmungen, Ataxie, Bewusstseinsstörungen
 - **Korsakow-Syndrom:** Gedächtnisstörungen (insbesondere Kurzzeitgedächtnis), Desorientierung, Konfabulationen
- **Epilepsie:** meist Entzugskrämpfe
- **Hirnatrophie**
- **Polyneuropathie**

Internistische Folgeerkrankungen

- **Ösophagus:** Refluxösophagitis, Ösophagus-Karzinom, Ösophagusvarizen bei Leberzirrhose, Mallory-Weiss-Läsionen
- **Magen, Duodenum:** Akute Gastritis bzw. Duodenitis, Ulzera
- **Dünndarm:** Resorptionsstörungen
- **Leber:** Fettleber, Hepatitis, Leberzirrhose, Zieve-Syndrom (Tab. 34.4)
- **Pankreas:** Akute und chronisch-rezidivierende Pankreatitiden
- **Stoffwechsel:** Hyperlipidämie, Hyperurikämie, chronische hepatische Porphyrrie
- **endokrines System:** Hypogonadismus, Hyperkortisolismus (Pseudo-Cushing-Syndrom), sekundärer Diabetes mellitus
- **Herz:** Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen (z. B. absolute Arrhythmie bei Vorhofflimmern).

Diagnostik

- Ärztliche Konsultation meist wegen Alkoholrausch, Entzugsdelir oder alkoholinduzierter Folgeerkrankungen. Eine Alkoholkrankheit muss bei entsprechender Symptomatik differenzialdiagnostisch in Erwägung gezogen werden.
- Eigen- (cave: Verleugnungstendenzen) und Fremdanamnese.
- **Laborchemische Hinweise für einen chronischen Alkoholkonsum:**
 - Erhöhung der Leberwerte, insbesondere der γ GT
 - Makrozytose im Blutbild (MCV-Erhöhung)
 - Blutalkoholspiegel

Allgemeine Therapie

Behandlung unter dem Ziel absoluter und dauerhafter Alkoholabstinenz in 4 Phasen:

- Kontakt- und Motivationsphase
- Entgiftungsphase
- Entwöhnungsphase
- Nachsorgephase

Therapie der Alkoholintoxikation

- Bei schwerer Alkoholintoxikation mit Bewusstseinsverlust intensivmedizinische Behandlung. Engmaschige **Überwachung** von Puls, RR, Atemfrequenz, Pupillenreaktion, neurologischem Status, Bilanz (Harnblasenkatheter wegen häufig begleitender Harnentleerungsstörung). Kontrolle von **Blutglukose**, **Blutgasen**, Blutalkohol, **Elektrolyten**, EKG, Röntgen-Thorax (Aspiration?).
- I.v. Zugang, Infusion von **5 %iger Glukoselösung** bzw. elektrolythaltiger Glukoselösungen entsprechend Serumelektrolytspiegeln.
- Evtl. **Magenspülung**
- **Bei schwerer Agitation 5 – 10 mg Haloperidol** i. v., keine Benzodiazepine
- Schutz vor Unterkühlung.
- Bei respiratorischer Insuffizienz **Intubation und Beatmung**.
- Bei Alkoholspiegeln $> 5 \text{ ‰}$ und tiefem Koma **Hämodialysetherapie**.

Therapie des Alkoholentzugssyndroms

Vegetativer Entzug und Prädelir

- **Clomethiazol** : z. B. Distraneurin
- **Vitamin B₁** zur Prophylaxe der Wernicke-Enzephalopathie.

Delirium tremens

- **intensivmedizinische Behandlung** und Monitor-Überwachung von Puls, RR, Atmung und Bilanz (Harnblasenkatheter). Kontrolle von Blutglukose, Blutgasen, Elektrolyten, EKG, Röntgen-Thorax (Pneumonie?)
- **medikamentöse Therapie:** **Clomethiazol** (oder **Diazepam**) + **Haloperidol**
- **O₂**-Substitution nach BGA, ggf. Intubation und Beatmung
- parenterale Ernährung, **Vitamin B₁**
- **Thromboseprophylaxe**
- evtl. Stressulkusprophylaxe mit **PPI**

Körperliche Aufnahmeuntersuchung +

Vorbemerkungen

Untersuchungssituation

- Wie bei der Anamnese sollten außer Arzt und Patient alle mobilen Personen das Patientenzimmer verlassen.
- Der Patient sollte bis auf die Unterhose entkleidet sein
- **Hände desinfizieren** vor der Untersuchung
- Sich selber mit Funktion vorstellen und dem Patienten den Ablauf erklären
- Während der Untersuchung sollten dem Patienten jeweils die weiteren Schritte angekündigt werden
- Material : Kugelschreiber. Ggf. Anamnese-/Untersuchungsbogen. Stethoskop. Untersuchungsleuchte. Spatel. Reflexhammer. Ggf. Otoskop

Allgemeines Vorgehen

- **Inspektion:** Betrachten
- **Palpation:** Abtasten
- **Perkussion:** Abklopfen
- **Auskultation:** Abhören (mit dem Stethoskop)
- **Ggf. Funktionsprüfung**
 - Bei der Abdomenuntersuchung sollte die Auskultation zuerst erfolgen, um eine Verfälschung der Darmgeräusche durch eine vorherige palpatorische Anregung zu verhindern.
 - Untersuchung des Herzens : Palpation und Perkussion haben nur einen geringen Stellenwert.

Allgemeiner Eindruck und Vitalparameter

- **Allgemeinzustand** : grobe Einschätzung über den **Zustand** des Patienten
- **Ernährungszustand** : Untergewicht, Übergewicht
- **Pflegezustand** : Hat der Patient ein gepflegtes oder ungepflegtes Äußeres?
- **Bewusstsein und Orientierung** : Die Orientierung wird mit dem **ZOPS-Schema** (zeitlich, örtlich, zur Person, zur Situation) eingeschätzt. Eine Vigilanzminderung kann mit Hilfe der Glasgow-Coma-Scale (GCS) beurteilt werden.
- **Kooperativität** : ermöglicht oft einen Eindruck über den psychischen Zustand des Patienten.
- **Vitalparameter** : Blutdruck, Herzfrequenz, Temperatur, Atemfrequenz, (Sauerstoffsättigung)

Kopf/Hals

Schädel

- Beklopfen der Kalotte
- Austrittspunkte des N. trigeminus druckschmerzhaft? : oberhalb der Orbitae (Ramus ophthalmicus), unterhalb der Orbitae (Ramus maxillaris) und im Bereich des Kinns (Ramus mandibularis)
- Nasennebenhöhlen klopfschmerzhaft?

Augen

- Inspektion der **Skleren** (Sklerenikterus?) und der **Konjunktiven** (Blasse Konjunktiven bei Anämie)
- **Lichtreaktion der Pupillen** (Normale Reaktion : Myosis. Störungen der Pupillomotorik bei Läsionen des N. opticus sowie des N. oculomotorius)
- Untersuchung der **Augenmotilität**
- Überprüfung des **Gesichtsfeldes**

Mund und Rachen

- Beurteilung der Mundschleimhaut (Trocken bei Dehydratation, blass bei Anämie)
- Beurteilung der Tonsillen (Rötung? Beläge?) und der Gaumensegel (Asymmetrisch bei Läsion des N. glossopharyngeus)
- Den Patienten bitten, die Zunge herauszustrecken : Zungenmotilität (Prüfung des N. hypoglossus), Farbe, Beläge, Feuchtigkeit
- Foetor?

Gesicht

- Prüfung der Sensibilität (Prüfung des N. trigeminus)
- Prüfung der Motorik : Stirn runzeln (*riden*), **Augen festschließen**, Zähne zeigen und **Wangen aufzublasen** (Prüfung des N. facialis)
- Ggf. Otoskopie

Hals

- Beurteilung der Füllung der **Halsvenen** (Einschätzung des zentralvenösen Drucks)
- Palpation der zervikalen, nuchalen und submandibulären **Lymphknoten** (Bei tastbaren Lymphknoten : Größe, Verschieblichkeit und Druckschmerzhaftigkeit prüfen)
- Untersuchung der **Schilddrüse**
 - Inspektion (physiologischerweise nicht sichtbar. Sichtbare Struma?)
 - Palpation (Größe, Beschaffenheit, Verschieblichkeit beim Schlucken, mögliches Schwirren prüfen)
- Beurteilung der **Nackenzugbarkeit** (Nackensteifigkeit = Meningismus, bei meningealer Reizung)
- Prüfung der Kraft des Halses (Prüfung des N. accessorius)

Thorax

Herz

Inspektion

- Den Patienten bitten, den Oberkörper frei zu machen.
- **Narbe** einer Herzoperation (Thorakotomienarbe)? **Herzschrittmacher**?

Palpation

- Die flache Hand auf die **Herzspitze** legen.
- Bei schlanken Menschen ist der Herzspitzenstoß im 5. ICR auf der Medioklavikularlinie palpabel; Verbreiterung bei Linksherzhypertrophie.

Auskultation

- **Allgemeine Hinweise**
 - Die Taschenklappen sind am besten **im Sitzen** mit leicht vorgebeugtem Oberkörper, die Mitralklappe am besten in mäßiger Linksseitenlage hörbar.
 - Sind die Herztöne sehr schwach zu hören, kann man den Patienten bitten, die Luft nach Expiration für einen Moment lang anzuhalten (Atemruhelage).
 - Oftmals ist es hilfreich, dem Patienten anzukündigen, dass man nun auf das Herz hört und er dabei nicht sprechen sollte.
 - Zur besseren Unterscheidung der Herztöne und zur Erkennung eines möglichen Pulsdefizits **sollte während der Auskultation parallel der Puls getastet werden** (meist an der A. radialis)
- **Ablauf: Auskultationspunkte**
 - **3. ICR links** parasternal = **Erb-Punkt** (Hierhin projizieren sich alle Herzklappen)
 - **2. ICR rechts** parasternal: Auskultation der Aortenklappe
 - **2. ICR links** parasternal: Auskultation der Pulmonalklappe
 - **4. ICR rechts** parasternal: Auskultation der Trikuspidalklappe
 - **5. ICR links** medioklavikulär: Auskultation der Mitralklappe
- **Worauf sollte geachtet werden?**
 - **Herzrhythmus und Herzfrequenz**
 - Liegt ein **Pulsdefizit** vor? (z.B. bei Vorhofflimmern)
 - Sind **pathologische Herzgeräusche** zu hören? Wenn ja:
 - Wo sind sie am deutlichsten zu hören? → **punctum maximum** (p.m.)
 - **Systolisch** (Zwischen 1. und 2. Herzton) vs. **diastolisch** (Zwischen 2. und 1. Herzton)
 - **Klangcharakter** (hochfrequent, niederfrequent)
 - **Zeitlicher Verlauf** (bandförmig, spindelförmig etc.)
 - **Fortleitung?** (in die Karotiden bei Aortenklappenstenose, in die Axilla bei Mitralklappeninsuffizienz)

Lunge

Inspektion

- **Thoraxform** (Fassthorax? Kyphoskoliose?)
- **Atemfrequenz** (Normal : 12-20/min)
- **Symmetrie der Atembewegungen** (Asymmetrische Atembewegungen bei z.B. Pneumothorax oder Zwerchfellverletzungen)
- **Zeichen der Dyspnoe** (Interkostale Einziehungen sowie Einsatz der Atemhilfsmuskulatur bei schwerer Dyspnoe)

Palpation

- Prüfung der **Atemexkursion** (Atembewegungen)
- Prüfung des **Stimmfremitus** (Prüfung der Vibrationsleitung über das Lungengewebe auf den Brustkorb; dafür lässt man den Patienten "99" sagen und tastet den hinteren Thorax)

Perkussion

- Perkussion der Lungenabschnitte
- Bestimmung der Atemverschieblichkeit (Normal : 5-6cm. vermindert bei z.B. Pleuraerguss)

Auskultation

- **Ablauf:** den Patienten bitten, **durch den geöffneten Mund** tief ein- und auszuatmen. Die Lungenabschnitte sollten immer im direkten Seitenvergleich auskultiert werden!
 - Von dorsal: Im oberen Thoraxbereich → Oberlappen; mittlere und untere Thoraxabschnitte → Unterlappen
 - Von lateral: Links → Ober- und Unterlappen; rechts → Mittellappen
 - Von ventral: Im oberen Thoraxbereich beidseits → Auskultation des Oberlappens; im unteren Thoraxbereich → rechts Auskultation des Mittellappens und Unterlappens, links des Unterlappens
- **Normalbefund:** Vesikuläres Atemgeräusch über allen Lungenabschnitten
- **Weiterhin:** Prüfung der **Bronchophonie** **66**

Abdomen

Vorbereitung

- Den Patient bitten, sich hinzulegen und den **Bauch frei zu machen.**
- Um eine größtmögliche Entspannung der Bauchdecken des Patienten zu erreichen, kann dem Patienten ein **Kissen unter den Kopf** gelegt und er gebeten werden, **die Arme locker neben dem Körper** abzulegen und die **Beine leicht anzuwinkeln.**

Inspektion

- **Narben?**
- **Gefäßveränderungen** (z.B. Caput medusae)?
- **Vorwölbungen** (Hernie)?

Auskultation

- Über allen 4 Quadranten mit **leichtem Druck** auskultieren
- Normalbefund: Ca. **alle 5-10 Sekunden** gurgelnde Darmgeräusche. (Abgeschwächte/fehlende Darmgeräusche bei paralytischem Ileus. Verstärkte, hochgestellt und metallisch klingende Darmgeräusche bei mechanischem Ileus.)

Perkussion

- Über allen vier Quadranten perkutieren
- Bestimmung der Dichte der intraabdominellen Organe
- **Physiologischer Befund:** Tympanitischer Klopfeschall über luftgefüllten Magen-/Darmabschnitten; gedämpfter Klopfeschall über flüssigkeitsgefüllten oder soliden Organen (Leber, Milz)

Palpation

- Der Patient sollte zunächst gefragt werden, ob Schmerzen im Bereich des Abdomens bestehen. Wird dies bejaht, sollte die Palpation in den nicht-schmerzhaften Bereichen begonnen werden.
- **Vorgehen**
 - **Oberflächliche Palpation:** Bauchdeckenkonsistenz
 - **Tiefe Palpation:** Resistenzen, Druckschmerz, Abwehrspannung
 - **Appendizitiszeichen**
 - **Palpation der Leber** (Beim Gesunden ist die Leber oft nur schwer tastbar)
 - **Palpation der Milz** (Beim Gesunden ist die Milz nicht palpabel. Wenn tastbar, Splenomegalie? Zwerchfelltiefstand?)
 - Palpation der **inguinalen Lymphknoten**
 - **Überprüfung der Nierenlager** (Klopfschmerzhaftigkeit der Nierenlager bei Pyelonephritis)

Bestimmung der Lebergröße

- Kratzauskultation (Das Stethoskop wird unterhalb des Xiphoids aufgelegt und mit dem Fingernagel entlang der Medioklavikularlinie gekratzt. Kratzgeräusch wird über der Leber stärker)

- Perkussion (Als alternative Methode)
- Normalbefund: Die normale kraniokaudale Lebergröße in der Medioklavikularlinie beträgt 7-11,5cm bei der Frau und 8-12,5cm beim Mann

Digital-rektale Untersuchung

- Den Patienten darüber aufklären, dass die Untersuchung unangenehm, aber unerlässlich ist und schnell vorbei sein wird.
- **Vorgehen**
 - Patient befindet sich entweder in Rückenlage mit gering gespreizten und aufgestellten Beinen oder in Links-/Rechtsseitenlage
 - Der Untersucher bittet den Patienten zu pressen und führt dann den (mit einem Handschuh geschützten und mit Vaseline bestrichenen) Zeigefinger peranal ein
 - Betasten des Analkanals und des Rektums
- **Beurteilung:** Sphinktertonus? Druckschmerzhaftigkeit? Resistenz? Prostata?
Untersuchung des Fingerlings nach der Untersuchung (Blut?)

Ggf. Untersuchung der Genitale

Inspektion der äußeren Genitale und Hodenpalpation

Extremitäten

• Inspektion + Palpation

- Hautfarbe der Extremitäten (Blässe? Zyanose?)
- Hautveränderungen (Varikosis? trophische Störungen oder Ulzera?)
- Temperatur der Extremitäten (Kalte Extremitäten bei z.B. pAVK)
- Verformungen der Hände und Finger (z.B. Trommelschlägelfinger bei chronischer Hypoxie)
- Nagelveränderungen (z.B. Uhrglasnägel bei chronischer Hypoxie)

• Pulsstatus

- Palpation im Seitenvergleich von A. carotis communis, A. radialis, Aorta abdominalis, A. femoralis, A. poplitea, A. tibialis posterior, A. dorsalis pedis
- Auskultation von A. carotis, Aorta abdominalis, A. renalis, A. femoralis

• Ödeme

(Orientierende) Neurologische Untersuchung

- **Grobe Prüfung der Sensibilität** (Berührungsempfinden, Schmerzempfinden, Temperaturempfinden, Vibrationsempfinden)

• Grobe Prüfung der Kraft

- Kraftgradskala:
 - 5: normal
 - 4: Bewegung auch gegen leichten Widerstand möglich
 - 3: Bewegung gegen die Schwerkraft möglich
 - 2: Bewegung nur unter Ausschaltung der Schwerkraft möglich
 - 1: sichtbare Kontraktionen ohne Bewegungseffekt
 - 0: keine Muskelaktivität.

- **Prüfung der Koordination:** Finger-Nase-Versuch (Den Patienten bitten, mit geschlossenen Augen die Nasenspitze mit dem Zeigefinger zu berühren), Finger-Folge-Versuch (Den Patienten bitten, den Finger des Untersuchers, der mehrfach die Position wechselt, mit seinem Zeigefinger zu berühren) und/oder Knie-Hacke-Versuch (Den Patienten bitten, bei geschlossenen Augen mit der Hacke -Talon- am Schienbein des anderen Beines herunter zu streichen)

- **Romberg-Stehversuch** : klinischer Test zur Untersuchung einer Ataxie (Störung der Koordination) und kann helfen, zwischen spinaler, vestibulärer und zerebellärer Ataxie zu unterscheiden. Der Patient wird gebeten, mit geschlossenen Füßen und vorgestreckten Armen zu stehen und dabei anfangs die Augen offen zu halten und sie danach für mind. 20 s zu schließen.

- **Romberg positiv:** Verschlechterung der Koordination durch den Augenschluss (das Schwanken verstärkt sich) = *spinale Ataxie*
- **Romberg negativ:** unveränderte Koordination durch den Augenschluss (das Schwanken verstärkt sich nicht) = *zerebelläre Ataxie*
- Fallneigung in eine Richtung nach Augenschluss = *vestibuläre Ursache*


• **Prüfung im Seitenvergleich des Reflexstatus:**

- **Muskeleigenreflexe:** Bizepssehnenreflex, Trizepssehnenreflex, Radius-periost-Reflex, Patellarsehnenreflex, Achillessehnenreflex
 - pathologisch **gesteigert**: Hinweis auf **Pyramidenbahnläsion**
 - abgeschwächt, **fehlend**: Hinweis auf **periphere Nervenläsion**
- **Fremdreflexe:** Ausfall bei **Pyramidenbahnläsion** oder **Sensibilitätsstörungen**, z. B. Bauchhautreflexe (T 8 – T 12), Kornealreflex (V bzw. VII)
- **Pathologische Reflexe** = **Pyramidenbahnzeichen**: Babinski-Reflex (Dorsalextension der Großzehe mit Plantarflexion und Spreizen der Kleinzehen beim Bestreichen des lateralen Fußsohlenrandes)

| Sehnenreflex | Patellar-(PSR) | Achilles-(ASR) | Bizeps-(BSR) | Radiusperiost-(RPR) | Trizeps-(TSR) |
|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|
| Segment | L 3, L 4 | L 5, S 1 | C 5, C 6 | C 5, C 6 | C 6, C 7 |

- **Beurteilung der Körperhaltung** (Abweichungen?) und des **Gangbildes** (Hinken? Schongang?)
- **Hirnnervenprüfung:**

| Hirnnerv | Funktion | Orientierende Prüfung |
|--|---|---|
| I: N. olfactorius | Riechen | mit aromatischen Stoffen (z. B. Zimt, Tee, Kaffee) <i>Anamnese</i> |
| II: N. opticus | Sehen | jedes Auge getrennt mit Visustafel oder <u>Text lesen lassen</u> (bei Brillenträgern mit Brille) |
| | Gesichtsfeld | <u>Fingerperimetrie</u> : Patient fixiert in 1 m Entfernung die Nase des Untersuchers, welcher von beiden Seiten sowie von oben und unten seinen Zeigefinger ins Gesichtsfeld bewegt (für jedes Auge getrennt) |
| | Augenhintergrund | <u>Funduskopie</u> |
| III: N. oculomotorius IV: N. trochlearis VI: N. abducens | Augenmotilität | Patient verfolgt ohne <u>Kopfbewegung</u> den Zeigefinger des Untersuchers in allen 4 Richtungen. Doppelbilder? |
| V: N. trigeminus | Sensibilität | Dermatome der 3 Äste <u>seitengetrennt</u> mit Finger berühren |
| | Motorik | Palpation des M. masseter, während der Patient die Zähne <u>zusammenbeißt</u> |
| | Kornealreflex | vorsichtiges Berühren der Kornea mit Wattebausch (→ Augenschluss) |
| VII: N. facialis | mimische Muskulatur | Gesichtsasymmetrie beim <u>Stirnrunzeln</u> , <u>Augen zukneifen</u> , <u>Backen aufblasen</u> , <u>Zähne zeigen</u> , <u>pfeifen</u> - <u>Periphere Lähmung</u> : <u>Lagophthalmus</u> , Bell'sches Phänomen (beim Versuch des Lidschlusses sichtbare Rotation des Bulbus nach oben) <small>Als Lagophthalmus bezeichnet man das Symptombild eines unzureichenden aktiven Lidschlusses, in dessen Folge es zu einer Verbreiterung der Lidspalte kommen kann.</small> - <u>Zentrale Lähmung</u> : Lidschluss möglich, kein Bell'sches Phänomen |
| VIII: N. vestibulocochlearis | Hören | z. B. Zahlen flüstern (jeweils anderes Ohr zuhalten) <i>od. Fingerreiben</i> |
| | Gleichgewicht | Vestibularisfunktionsprüfung |
| IX: N. glossopharyngeus | u. a. Schluck- und Würgereflex | <u>Schluckversuch</u> mit Wasser. Berührung der Rachenhinterwand mit dem Spatel führt zur Anhebung des Gaumensegels und zum <u>Würgereflex</u> . |
| X: N. vagus (N. laryngeus recurrens) | | <u>Heiserkeit</u> bei fehlender Innervation |
| XI: N. accessorius | M. sternocleidomastoideus, M. trapezius | <u>Kopfdrehung gegen Widerstand</u> , <u>Arme gegen Widerstand über die Horizontale heben lassen</u> |
| XII: N. hypoglossus | Zungenmuskulatur | <u>Zunge</u> herausstrecken lassen. Einseitiges Abweichen? |



Cranial Nerves

Popular Mnemonics to Memorize

by TrulyMedic.com

| | | |
|-------------------|------------------|------------|
| Olfactory | Oh | Only |
| Optic | Oh | Overgrown |
| Oculomotor | Oh | Orangutans |
| Trochlear | To | Try |
| Trigeminal | Touch | To |
| Abducens | And | Aggravate |
| Facial | Feel | Fat |
| Vestibulocochlear | <i>AKustic</i> A | Vagrants |
| Glossopharynx | Girls | Getting |
| Vagus | Vagina | Vodka |
| Accessory | Ah | And |
| Hypoglossal | Heaven | Hamburgers |

Bewegungsapparat

- Prüfung der Beweglichkeit der Gelenke
- Untersuchung der Wirbelsäule (vor/nach der Untersuchung der Nierenlager)
 - Inspektion (Skoliose? Kyphose?)
 - Grobe Prüfung der Beweglichkeit
 - Klopfschmerz

| Syndrom | Kennmuskel/Parese | Dermatom (Sensibilitätsstörung/Schmerzausstrahlung) | Reflex(-minderung) |
|--------------|---|---|---|
| C3/4-Syndrom | <ul style="list-style-type: none"> • Kennmuskel: Diaphragma | <ul style="list-style-type: none"> • Hals und Schulter | – |
| C5-Syndrom | <ul style="list-style-type: none"> • Kennmuskel: M. deltoideus | <ul style="list-style-type: none"> • Lateral, proximaler Oberarm | – |
| C6-Syndrom | <ul style="list-style-type: none"> • Kennmuskel: M. biceps brachii • M. brachioradialis • Bei Parese: Armbeugung geschwächt | <ul style="list-style-type: none"> • Dorsaler Oberarm, radiale Unterarm bis zum Daumen und zur radialen Seite des Zeigefingers | <ul style="list-style-type: none"> • Bizepssehnenreflex (BSR) • Brachioradialisreflex (BRR) = Radiusperiostreflex (RPR) |
| C7-Syndrom | <ul style="list-style-type: none"> • Kennmuskel: M. triceps brachii • M. pectoralis major • Thenarmuskel | <ul style="list-style-type: none"> • Palmar: Medialer Unterarm ab Ellenbogen bis Finger II–IV (II ulnare Hälfte, IV radiale Hälfte) • Dorsal: Distaler, medialer Finger II–IV (II ulnare Hälfte, IV radiale Hälfte) | <ul style="list-style-type: none"> • Trizepssehnenreflex (TSR) |
| C8-Syndrom | <ul style="list-style-type: none"> • Kennmuskel: Hypothenarmuskulatur | <ul style="list-style-type: none"> • Ulnare Seite des Unterarms • Finger IV–V (IV ulnare Seite) | <ul style="list-style-type: none"> • Trömner-Reflex • Trizepssehnenreflex (TSR) |
| L3-Syndrom | <ul style="list-style-type: none"> • Kennmuskel: M. quadriceps femoris • M. iliopsoas • Adduktoren | <ul style="list-style-type: none"> • Vorderseite des Oberschenkels und Knies (schräg von kraniallateral nach kaudomedial) • Nie unterhalb des Knies! | <ul style="list-style-type: none"> • Patellarsehnenreflex (PSR) |
| L4-Syndrom | <ul style="list-style-type: none"> • Kennmuskel: M. quadriceps femoris (insb. M. vastus medialis) • M. iliopsoas | <ul style="list-style-type: none"> • Oberschenkelaußenseite über Patella zur Unterschenkel-Innenseite und Tibiavorderkante | <ul style="list-style-type: none"> • Patellarsehnenreflex (PSR) |
| L5-Syndrom | <ul style="list-style-type: none"> • Kennmuskel^[6] <ul style="list-style-type: none"> ◦ M. extensor hallucis longus • Bei Parese: Großzehenheberschwäche • M. tibialis anterior • Bei Parese: Fußheberschwäche, geschwächter Hackengang • M. gluteus medius | <ul style="list-style-type: none"> • Dorsolateraler Oberschenkel • Knieaußenseite und vorderer, lateraler Unterschenkel • Fußrücken bis zur Großzehe | <ul style="list-style-type: none"> • Tibialis-posterior-Reflex (TPR) |
| S1-Syndrom | <ul style="list-style-type: none"> • Kennmuskel <ul style="list-style-type: none"> ◦ M. triceps surae • Bei Parese: Fußsenkerschwäche, geschwächter Zehengang <ul style="list-style-type: none"> ◦ M. gluteus maximus • M. biceps femoris | <ul style="list-style-type: none"> • Außen- und Rückseite des Ober- und Unterschenkels • Äußerer Malleolus und laterale Fußkante (3.–5. Zehe) | <ul style="list-style-type: none"> • Achillessehnenreflex (ASR) |

Hirnnerven

I Änderungen oder Störungen beim Riechen

II } Lesen Argidiken
III } Gesichtsfeld
IV } Aufmerksamkeit visuellen neglect
VI } Pupillen motorik

Miosis mydriasis Anisokorie > 1mm

Pupillen reaktion

Oculomotorik Pulusstellung? Doppelbilder?

↙ ↘
LH VI RH VI

Konvergenz

II Kaumuskelstar Kieferschließen
Zubeißen muskelpalpation

Sensation
Anzahlpunkte

VII Mohnack Mundwinkel , falten
 Mimisch grinsen , pfeifen
 aufblasen Stirnrunzeln

VIII Fingerreihen (Unterschied)

IX, X

Uvula
Spata

Gurgelreflex

XII

Zunge


IX, X

Schluck

Schmackänderung

XII

Halb schult Bewegung



Motorik


Inspektion

Atrophien
Asymmetrien

Motorik

Klonen
Paraten
Hypotonie
Atonus

Spastik
Rigor



Muskelkraft

Armhalterversuch

Beinhalterversuch

Kraftprüfung

MRC Skala

Prävention +-

Primordialprävention

- **Ziel:** „Veränderungen von Risikofaktoren, die zu einem erhöhten Krankheitsrisiko beitragen“
- **Beispiele**
 - Jodzusatz zum Speisesalz zur Vorbeugung des Jodmangels
 - Fluoridzusatz zu Zahnpasta, Trinkwasser und Salz zur Verringerung des Kariesrisikos

Primäre Prävention

- **Ziel:** Neuauftreten einer Krankheit verhindern
- **Beispiele**
 - Impfung (auch postexpositionelle Impfung)
 - Maßnahmen zur Änderung der Lebensgewohnheiten (z.B. Rauchen, Essgewohnheiten)

Sekundäre Prävention („Früherkennung“)

- **Ziel:** Krankheiten in Frühstadien erkennen, um einer Chronifizierung vorzubeugen
- **Beispiele** (für Maßnahmen, deren kostenlose Durchführungen jedem Versicherten zusteht)
 - **Allgemeiner Gesundheitscheck** (Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten, ugs. "Check-up-Untersuchung")
 - Inanspruchnahme: Einmalig zwischen 18 und 34 Jahren, anschließend ab 35 Jahren, alle 3 Jahre
 - Inhalt: Anamnese, körperliche Untersuchung, Labor (Lipidstatus, Glucose, Urin-Stix), Überprüfung des Impfstatus
 - **Früherkennung von Krebserkrankungen**
 - **Beide Geschlechter**
 - Ab 35 Jahren: Alle 2 Jahre Untersuchung der gesamten Körperoberfläche (Hautkrebsfrüherkennung)
 - Ab 50 Jahren: 1×/Jahr Stuhltest auf okkultes Blut und digital-rektale Untersuchung
 - Ab 55 Jahren: Koloskopie zur Darmkrebsfrüherkennung (Wiederholung nach 10 Jahren oder alle 2 Jahre bei okkultem Blut)
 - **Frauen**
 - Ab 20 Jahren: Genitaluntersuchung, Abstrich Gebärmutterhals
 - Ab 30 Jahren: Untersuchung von Mamma
 - Zwischen 50 und 70 Jahren: Alle 2 Jahre Mammographie
 - **Männer**
 - Ab 45 Jahren: Genitaluntersuchung, Prostata (digital-rektal)

Tertiäre Prävention

- **Ziel:** Rezidivrisiko einer Erkrankung senken (z.B. Maßnahmen zur Verhinderung einer Restenosierung nach Herzinfarkt) und typischen Komplikationen einer Erkrankung vorbeugen
- **Beispiele**
 - **Rehabilitationsmaßnahmen**
 - **Selbsthilfegruppen**
 - **Weitere Beispiele**
 - Tumornachsorge
 - Maßnahmen zur Vermeidung von Komplikationen einer Erkrankung (z.B. Blutdruckeinstellung und Sport bei bestehendem Diabetes mellitus)

„Paradox an den Vorsorgeuntersuchungen ist, dass die für die Gesamtbevölkerung effektivsten Maßnahmen dem Einzelnen keinen oder nur einen geringen persönlichen Vorteil bringen (Präventionsparadoxon)“

Röntgenuntersuchungen +-

Thoraxübersicht

Methoden

- **Thorax in 2 Ebenen**, p. a. und seitlich in Inspiration: Standarduntersuchung
- **Thorax im Liegen**, a. p. in Inspiration: bei immobilisierten Patienten
- **Thorax in Expiration**: Ausschluss oder V. a. Pneumothorax
- **Thoraxdurchleuchtung**: Lagebeurteilung unklarer Herde, Beurteilung der Zwerchfellbeweglichkeit (z. B. bei V. a. Zwerchfellparese).

Beurteilung


- **Zwerchfelle**: Begrenzung (glatt?), Höhe, Wölbung, Adhäsionen
- **Sinus phrenicocostales**: einsehbar? (Ergüsse, Verschattungen?)
- **Herzsilhouette**:
 - Herzgröße (orientierend): Durchmesser Herz/Thorax: normal < 50 %
 - linker Herzrand (linker Ventrikel), rechter Herzrand (rechter Vorhof)
 - Herztaille: Verstrichen bei vergrößertem linkem Vorhof
 - Pulmonalisbogen, Aortensilhouette (Sklerose, Ektasie?)
 - Retrokardialraum (linker Vorhof) und Retrosternalraum (rechter Ventrikel) in der seitlichen Aufnahme
- **Lungenhili**: Pulmonalarterien, Pulmonalvenen, Lymphknoten, Bronchien
 - Breite, Konfiguration
- **Lungenperipherie**:
 - Verschattungen? (flächenhaft, retikulär, fleckförmig, Rundherde?)
 - Aufhellungen?
 - Pneumothorax?
- **Mediastinum**: Breite, Verlagerung?, Tracheaverlauf, retrosternale Struma?, Hiatushernie?
- **Skelettsystem**: Deformitäten, degenerative Veränderungen (WS), Osteoporose, Osteolysen, Frakturen?

Häufige pathologische Befunde


- **einseitige flächige Verschattung**:
 - Pneumonie
 - Pleuraerguss
 - Atelektase : Homogene nicht mit Luft gefüllte Lungenabschnitte, bei entsprechender Ausdehnung gleichseitiger Zwerchfelloberhebung und Verlagerung des Mediastinums zur kranken Seite. Vorkommen bei Verlegung der Bronchien durch Tumor, Schleimpfropf oder Fremdkörper.
- **beidseitige flächige Verschattungen**:
 - kardiales Lungenödem : Kleinfleckig konfluierend, Herzvergrößerung
 - beidseitige Pneumonie
 - ARDS
 - interstitielle Lungenerkrankungen, Lymphangiosis carcinomatosa, Sarkoidose, Strahlenpneumonitis, toxisches Lungenödem u. a.
- **isolierter Lungenrundherd**: Mamillenschatten (symmetrisch auf der kontralateralen Seite auftretend), Bronchialkarzinom, Metastase, Tuberkulom,...
 - **Weitere Diagnostik**, Tumorsuche bei Hinweisen für Malignom: Alter > 40 Jahre, Raucheranamnese, Durchmesser > 2 cm, Größenzunahme im Verlauf
- **multiple Lungenrundherde**: Meist Metastasen
- **pulmonaler Ringschatten**: Emphyseblase, Bronchiektasen, tuberkulöse Kaverne, Lungenzysten, Lungenabszess, zerfallender Tumor, Echinokokkuszyste
- **Hilusverbreiterung**: Zentrales Bronchialkarzinom, Lymphknotenvergrößerung (z. B. Tbc, malignes Lymphom, Bronchialkarzinom, Sarkoidose), zentrale Stauung

- **Zwerchfellhochstand:**

- rechts: Hepatomegalie
- links: Splenomegalie
- beidseits, rechts und/oder links: Adipositas, Aszites, Gravidität, subphrenischer Abszess, Phrenikusparese



Röntgen-Thorax p.-a.



Röntgen-Thorax seitlich

Abdomenübersicht

Durchführung:

- im Stehen: Standarduntersuchung
- in Linksseitenlage: besserer Nachweis kleiner Mengen freier Luft.

Hauptfragestellungen:

- freie Luft: Luftsicheln subdiaphragmal bzw. unter der seitlichen Bauchwand bei freier Perforation oder postoperativ
- Flüssigkeitsspiegel im Darmlumen: Hinweis für Ileus.

Weitere häufige pathologische Befunde:

- Verkalkungen: Gallen- oder Nierensteine, Pankreasverkalkungen (nach chronischer Pankreatitis), Lymphknotenverkalkungen (z. B. nach Tbc), Gefäßverkalkungen (Arteriosklerose)
- Psoasrandkontur unscharf: retroperitoneale Hämatome, Abszessbildungen
- verschluckte Fremdkörper
- pathologische Veränderungen in den abgebildeten Skelettanteilen.

Röntgenuntersuchung des Skeletts

Durchführung:

- Aufnahmen in 2 Ebenen, je nach Untersuchungsregion zusätzlich Spezialaufnahmen.

Allgemeine pathologische Knochenveränderungen (Beispiele):

- **vermehrte Transparenz der Knochenstrukturen:**
 - **diffus:** Osteoporose, Osteomalazie, diffuse Veränderungen maligner Genese (z. B. Multiples Myelom, diffuse Knochenmetastasen)
 - **umschrieben:** Zysten (scharf abgegrenzt), akute Osteomyelitis, osteolytische Metastasen und Multiples Myelom, primäre Knochentumoren

- **verminderte Transparenz der Knochenstrukturen:**
 - osteoplastische Metastasen (unscharf begrenzt z. B. bei Prostatakarzinom)
- **Frakturen:**
 - Extremitäten: Frakturspalt, Dislokation der Knochenfragmente
 - Wirbelsäule: Kompression des Wirbelkörpers mit Einbruch der Deck- und Bodenplatten.

Veränderungen an den peripheren Gelenken und Bandscheiben (Beispiele):

- **degenerative Veränderungen**
- **entzündliche Veränderungen:**
 - Rheumatoide Arthritis
 - Spondylitis ankylosans
- **Arthropathie bei Gicht**

Computertomografie

- Computergesteuerte Anfertigung transversaler Querschnittsbilder verschiedenster Körperabschnitte (z. B. CCT = kraniale Computertomografie) unter Verwendung von Röntgenstrahlen (hohe Strahlenbelastung).
- Bei den meisten Fragestellungen werden jodhaltige Kontrastmittel eingesetzt.
- Einschränkungen können sein: Unruhige unkooperative Patienten, Klaustrophobie, Kontrastmittelallergie.
- **Vorbereitung :** Falls eine intravenöse Gabe von jodhaltigem Kontrastmittel geplant ist, muss Folgendes beachtet werden:
 - **Gefahr der Kontrastmittel-Nephropathie** (dosisabhängige Nebenwirkung)
 - Bestimmung von Kreatinin, GFR
 - Prophylaxe: Ausreichende Hydrierung, ggf. Gabe von Acetylcystein
 - **Gefahr der thyreotoxischen Krise**
 - Bestimmung der Schilddrüsenfunktion
 - Prophylaxe
 - Bei latenter Hyperthyreose: Perchlorat
 - Bei manifester Hyperthyreose: Gabe von jodhaltigem Kontrastmittel nur im vital bedrohlichen Notfall, dann zusätzlich Thiamazol
 - **Gefahr einer allergischen Reaktion**
 - Anamnese nach vorherigen Kontrastmittel- bzw. Jod-Expositionen
- **Interpretation :**
 - **Hypodens:** Die Röntgenstrahlen werden vom Gewebe nur wenig abgeschwächt, so dass ein Großteil der Strahlung auf die gegenüberliegenden Detektoren trifft → Die Strukturen erscheinen dunkel (z.B. Lungengewebe)
 - **Hyperdens:** Die Röntgenstrahlen werden vom Gewebe stark abgeschwächt, so dass nur wenige auf die gegenüberliegenden Detektoren treffen → Die Strukturen erscheinen hell (z.B. Knochen)

Magnetresonanztomografie (MRT)

- **Prinzip:** keine Verwendung von Röntgenstrahlen, sondern Messung der Energie, die unter dem Einfluss eines starken Magnetfeldes. Synonym: Kernspintomografie.
- In Abhängigkeit der Fragestellung höhere Sensitivität und Spezifität in der Diagnosestellung als konventionelles CT. Keine Belastung durch Röntgenstrahlen.
- **Kontrastmittel :** Gadolinium
 - **Kontraindikation:** Bei schwerer (GFR <30 mL/min)
 - **Komplikationsmöglichkeit:** Nephrogene systemische Fibrose
- Durch computergestützte Verarbeitung können Bilder aus beliebigen Schnittebenen (z. B. transversal, frontal, sagittal) verschiedenster Körperabschnitte erzeugt werden.
- Aufgrund der längeren Untersuchungszeit ist eine ausreichende Patientenkooperation erforderlich.
- **Kontraindikationen:** Herzschrittmacher, intrakorporales magnetisches Metall (in Abhängigkeit von der Lage).

- **Signalintensität:**

- Hyperintens = Signalstark → Erscheint hell
- Hypointens = Signalarm → Erscheint dunkel
- Isointens = Gleiche Signalstärke wie ein Vergleichsgewebe

| | Hyperintens | Hypointens |
|--------------------|--|--|
| T1-Wichtung | <ul style="list-style-type: none"> • Fett • Kontrastmittel | <ul style="list-style-type: none"> • Wasser (Liquor, Ödem → Entzündung) • Knochen • Bänder, Sehnen • Luft (kein Signal) |
| T2-Wichtung | <ul style="list-style-type: none"> • Wasser (Liquor, Ödem → Entzündung) • Fett (geringer hyperintens als in T1) | <ul style="list-style-type: none"> • Knochen • Bänder, Sehnen • Luft (kein Signal) |

- **Spezielle Anwendungen, z. B.:**

- **MR-Angiografie** : Alternative Untersuchungstechnik zur konventionellen Angiografie oder DSA, insbesondere bei Patienten mit Kontraindikationen zur Untersuchung mit jodhaltigen Kontrastmitteln
- **MR-Cholangiopankreatografie (MRCP)**: Ermöglicht nicht-invasive Darstellung der Gallengänge und des Pankreasgangs, vergleichbar der ERCP. Im Gegensatz zur ERCP aber keine therapeutische Intervention möglich
- **MR-Enteroklysma** : Methode der Wahl zum Nachweis pathologischer Veränderungen im Dünndarm.

- **Beachte:** Einsatz der MRT insbesondere zur Beurteilung von Weichteil- und Nervengewebe, Einsatz der CT insbesondere in der Notfallmedizin und zur Beurteilung von Knochen!

Sonografie

- Die Sonographie ist ein radiologisches Verfahren, das mithilfe von Ultraschallwellen die Morphologie innerer Organe und Strukturen sichtbar macht.
- Ultraschallwellen sind hochfrequente Schallwellen, die durch den piezoelektrischen Effekt im Ultraschallkopf erzeugt und wieder empfangen werden.
- Je nach gewählter Darstellungsart kann ein zweidimensionales räumliches Bild mittels Graustufen (B-Bild), ein Bildausschnitt in zeitlicher Auflösung (M-Bild) oder auch die Strömungsrichtung und -geschwindigkeit von Flüssigkeiten (Doppler und Duplex) wiedergegeben werden.
- Aufgrund der Unschädlichkeit von Ultraschallwellen und der hohen Verfügbarkeit von Sonographiegeräten wird dieses Verfahren zur Diagnosefindung häufig als Ergänzung zur klinischen Untersuchung insb. auch bei Kindern oder Schwangeren eingesetzt.
- Die Möglichkeit der schnellen Befunderhebung in ausgewählten akuten Fragestellungen (z.B. Verdacht auf Cholezystitis oder akute Rechtsherzbelastung) ist ein weiterer Vorzug dieser Untersuchungstechnik.
- Probleme in der Sonographie ergeben sich jedoch durch eine hohe Untersucherabhängigkeit und häufig auftretende Artefakte.
- Eine weitere Einsatzmöglichkeit des Ultraschalls stellt die Endosonographie dar, die bspw. transrektal, transvaginal, transösophageal oder transgastral erfolgen kann. Sie ist hilfreich bei der Beurteilung von außen nur schwer erreichbaren bzw. beurteilbaren Organen und Strukturen (Prostata, Ovar, Herzklappen, Pankreas).
- Durch den Einsatz von nebenwirkungsarmen Kontrastmitteln konnte das Einsatzgebiet der Sonographie zusätzlich erweitert werden (z.B. TEE, Abklärungen von hepatischen Raumforderungen).
- Eine höhere Frequenz verbessert die Auflösung, verringert aber die Eindringtiefe.
- Da bei der Abdomensonografie Darmgasüberlagerung die Untersuchungsbedingungen einschränkt und eine gefüllte Gallenblase erwünscht ist, Untersuchung möglichst morgens im nüchternen Zustand.

Perioperatives Management +

ASA-Klassifikation

- ASA 1: Gesunder Patient
- ASA 2: Allgemeinerkrankung ohne wesentliche Leistungseinschränkung
- ASA 3: Allgemeinerkrankung mit Leistungseinschränkung
- ASA 4: Schwere Allgemeinerkrankung
- ASA 5: Moribunder Patient
- ASA 6: Hirntoter Patient

Perioperativer Umgang mit Vormedikation

DOAK

- Präoperativ
 - Bei Eingriffen ohne Blutungsrisiko **nicht absetzen**
 - Bei Eingriffen mit Blutungsrisiko **absetzen** : 48 h (Eingriffe mit hohem Blutungsrisiko), 24 h (Eingriffe mit niedrigem Blutungsrisiko)

Rivaroxaban **RX** Xarelto
Apixaban **AE** Eliquis
Edoxaban **EL** Lixiana

- **Kein Bridging**
- Antagonisieren, falls notwendig
 - Im Notfall: PPSB (= Prothrombinkonzentrat)
 - Dabigatran: Antagonisierung mit Idarucizumab, zudem dialysierbar
 - Rivaroxaban, Apixaban: Antagonisierung mit Andexanet alfa
- Postoperativ so früh wie möglich wieder beginnen

Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)

- Präoperativ INR bestimmen
 - Bei Eingriffen ohne Blutungsrisiko **nicht absetzen**
 - Bei Eingriffen mit Blutungsrisiko 4–7 d vorher **absetzen** (Ziel-INR <1,5)
- **Bridging** bei Patienten mit hohem Thromboembolierisiko
- Antagonisieren, falls notwendig
 - Elektiv : Vitamin K 1–5 mg
 - Im Notfall: PPSB, alternativ FFP (Fresh Frozen Plasma)

Heparine

- NMH
 - Präoperativ 2 d vor dem Eingriff absetzen, falls notwendig
 - Antagonisierung mittels Protamin teilweise möglich
 - Postoperativ am Folgetag nach der OP wieder ansetzen
- UFH
 - Präoperativ aPTT bestimmen
 - Antagonisieren, falls notwendig: Protamin

Thrombozytenaggregationshemmer

- Monotherapie mit ASS
 - Präoperativ i.d.R. **nicht absetzen**
 - Wenn nötig, 5 d vorher **absetzen**
- Duale Thrombozytenaggregationshemmung
 - Präoperativ: P2Y12-Antagonisten nur vor **großen** Operationen mit **hohem** Blutungsrisiko **absetzen**
 - Clopidogrel 5 d vorher
 - Ticagrelor 5 d vorher
 - Prasugrel 7 d vorher
 - Perioperativ Therapie mit ASS **möglichst fortführen**
 - Postoperativ duale Plättchenhemmung **schnellstmöglich wieder ansetzen**
 - Elektive Operationen bestenfalls solange verschieben, bis duale Thrombozytenaggregationshemmung beendet ist
 - Im Notfall: Medikation fortführen, Thrombozytenkonzentraten bei Blutung

Metformin

48 h präoperativ bis 48 h postoperativ pausieren (Risiko für Lactatazidose)

Sonstiges +-

Glucocorticoide

- **Prednisolon oder Prednison:** Tagesbedarf bzw. Cushing-Schwellen-Dosis* : 7,5 mg.
- **Dexamethason oder Betamethason :** Tagesbedarf bzw. Cushing-Schwellen-Dosis* : 1 mg
(* Überschreitet man den Tagesbedarf, droht logischerweise ein Hypercortisolismus)
- **Wirkung :** antiinflammatorisch und immunsuppressiv
- **Nebenwirkungen** (insb. Langzeittherapie) :
 - Atrophie der Haut
 - Hypertonie, Ödeme, Hypokaliämie (Mineralocorticoide Wirkung)
 - Hypokalzämie, Knochenatrophie, Muskelatrophie
 - Stammfettsucht, "Stiernacken", "Vollmondgesicht"
 - Erhöhung des Blutzuckerspiegels
 - Immunsuppression (Lymphozytopenie, Eosinopenie und Monozytopenie). Erythrozyten↑, Thrombozyten↑
 - erhöhtes Risiko für einen Ulkus in Magen oder Duodenum mit der Gefahr für gastrointestinale Blutungen
 - ♀: Menstruationsstörungen, Hirsutismus ♂: Impotenz
 - Euphorie. Depressive Episoden
 - Bei Kindern Wachstumshemmung

Arzneimittelrezept

- **Krankenkassenrezept**
 - **Form:** Rotes Rezept
 - **Ausstellung :** durch niedergelassene Fachärzte mit Kassenzulassung
 - **Gültigkeit:** 4 Wochen
 - **Umfang:** Max. 3 Arzneimittel pro Rezept
 - **Besonderheit:** Patienten über 18 Jahre zahlen i.d.R. 5–10 Euro Zuzahlung je Arzneimittel
- **Privatrezept**
 - **Form:** Blaues oder weißes Rezept
 - **Ausstellung :** durch alle approbierten Ärzte
 - **Gültigkeit:** 3 Monate
 - **Umfang:** Max. 3 Arzneimittel pro Rezept
- **Betäubungsmittelrezept (BtM-Rezept)**
 - **Form:** Gelbes Rezept
 - **Gültigkeit:** 7 Tage
 - **Umfang:** Max. 3 Arzneimittel pro Rezept

Zentralvenöse Katheter (ZVK)

- **Indikationen:** Notwendigkeit der ZVD-Messung unter intensivmedizinischer Überwachung. Zufuhr venenwandreizender Substanzen (z. B. Kalium, Kathekolamine). Fehlender peripherer Venenzugang
- **Komplikationen:**
 - **Akut**
 - Blutungen bzw. Hämatome insbesondere bei arterieller Fehlpunktion und Gerinnungsstörungen (INR > 1,5, PTT > 50 Sek., Thrombozyten < 50 000/μl): Sofortige manuelle Kompression für mindestens 5 Min.
 - Pneumothorax (bei Punktion der V. subclavia, seltener V. jugularis interna): Keine beidseitigen Punktionsversuche
 - Luftembolie (Immer in Kopftieflage punktieren)
 - Rhythmusstörungen (Katheterlage korrigieren)
 - **Beim liegenden Katheter :** Thrombophlebitis, Thrombose, Sepsis (bei unklarem Fieber ZVK entfernen und Katheterspitze zur mikrobiologischen Untersuchung einschicken)
- **Zugangswege:**
 - **peripher:** V. basilica
 - **zentral:** V. subclavia, V. jugularis interna

- **Vorbereitung:** Einmalpunktionsset, sterile Tücher, Tupfer, Handschuhe und Mundschutz, 10 ml Spritze mit NaCl 0,9 %, 5–10 ml Lokalanästhetikum (z. B. Lidocain 1 %)
- **Durchführung :**
 - bei der Punktion zentraler Venen **Oberkörpertieflagerung** (Bett um ca. 20° kippen), Ausnahme: dekomensierte Herzinsuffizienz
 - Hautdesinfektion, sterile Handschuhe anziehen, steriles Abdecken
 - Lokalanästhesie
 - Punktion nach Seldinger-Technik, sonographisch gesteuert: Gefäßpunktion mit **Punktionskanüle. Führungsdraht einführen. Entfernen der Punktionskanüle,** Belassen des Führungsdrahtes. **Erweiterung der Einstichstelle** mit dem Skalpell und dann mit Dilatator. **Gefäßkatheter einführen** (V. jugularis interna : 18 – 20 cm, V. subclavia re. : 12-15cm, V. subclavia li. 15-18 cm). **Führungsdraht entfernen. Gefäßkatheter fixieren mit Naht. Pflaster legen**
 - Nach Katheteranlage **Röntgen-Thorax** : korrekte Position überprüfen (Katheterspitze sollte unmittelbar vor der Einmündung der oberen Hohlvene in den rechten Vorhof liegen) und zum Ausschluss eines Pneumothorax (in Expiration).

Endotracheale Intubation

- Patient in Rückenlage
- Den Mund so weit wie möglich öffnen, und der Kopf überstreckt halten
- Laryngoskop mit der linken Hand unter Sicht an der Zunge entlang einführen, bis die Epiglottis sichtbar ist
- Tubus (Größe: 7,0 - 8,5 bei Erwachsenen) mit der rechten Hand unter Sicht einführen, bis die Blockungsmanschette vollständig in die Trachea eingeführt ist
- Blocken des Tubus mit 5 – 10 ml Luft
- Beutel aufsetzen und durch Auskultation Tubuslage kontrollieren: wenn links kein Atemgeräusch, Tubus entblocken und etwas zurückziehen, wenn Blubbern im Epigastrium hörbar ist, Tubus entfernen und erneuter Intubationsversuch. Jeder Intubationsversuch sollte nicht länger als 30 Sek. dauern

Notfallkoniotomie

- wenn die Atemwege z. B. durch ein Glottisödem oder einen Fremdkörper verlegt sind
- Skalpell-Querinzision (ca. 2 cm) der Haut und des Lig. conicum zwischen Schild- und Ringknorpel, Wunde spreizen und Endotrachealtubus (wenn möglich mindestens Größe 6) ca. 5 cm tief einführen und blocken.

Allgemeine Onkologie

- Eine histologische Untersuchung erlaubt die Bestimmung der Tumorentität und des Malignitätsgrads (Grading).
- Die Tumorausbreitung wird mit Hilfe der international standardisierten TNM-Klassifikation eingeschätzt. Die Standardisierung hat den Vorteil, dass sich onkologische Studien weltweit inhaltlich annähern und eine Vereinheitlichung der Prognosen/Therapien ermöglicht wird.
- Nach Klassifizierung des Tumors kann eine Therapie in kurativer (meist frühe Stadien) oder palliativer (meist späte Stadien) Intention geplant werden.
- Bei operativer Entfernung eines Tumors kann eine supportive Radiatio und/oder Chemotherapie adjuvant (nach der OP) und/oder neoadjuvant (vor der OP) durchgeführt werden. Die Erfolgsraten sind dabei (abhängig von Tumor und Stadium) sehr unterschiedlich.
- **Einteilung nach Dignität :** Benigne Tumoren (Gut differenziert, niedrige Zellteilungsrate, keine Metastasierung, selten Rezidive). Maligne Tumoren (Schlecht differenziert, hohe Zellteilungsrate, Metastasierung und Rezidive häufig)
- **TNM-Klassifikation:** TNM ist ein Akronym aus "Tumor", "Nodus" und "Metastasen".
 - T: Ausdehnung des Primärtumors. Tc1s: Carcinoma in situ (Basalmembran intakt - Submukosa nicht infiltriert). T1-4 je nach Ausmaß des Tumors (T4 : Infiltration der Nachbarorgane)

- N: Befallstatus regionärer Lymphknoten. N0: Kein Lymphknotenbefall. N1-3 je nach Ausmaß des Lymphknotenbefalls
- M: Vorhandensein von Metastasen. M0: Keine Fernmetastasen. M1: Vorhandensein von Fernmetastasen. Mx: Status der Fernmetastasierung unklar
- cTNM: klinisches Staging
- pTNM: pathologisches Staging
- rTNM: Bei Rezidiv
- **Grading** : Einteilung des histologischen Differenzierungsgrades eines Gewebes. G1: Gute Differenzierung (hoher Übereinstimmung mit dem Ursprungsgewebe). G4 : Undifferenziertes Gewebe. G2-G3
- **Metastasierung**:
 - Lymphogene Metastasierung: Infiltration regionaler Lymphknotenstationen über den lymphatischen Abfluss
 - Hämatogene Metastasierung: Pfortader-Typ (Primärtumor im Verdauungstrakt : Ösophagus, Magen, Pankreas, Dünn- und Dickdarm bis oberes Rektum. Streuung über die V. portae → Lebermetastasen). Cava-Typ (Primärtumor in Knochen, Nieren, Leber, Kopf und Hals. Streuung über die V. cava → Lungenmetastasen)
- **Tumorresektionsgrad** :
 - R0-Resektion : Resektionsränder sind frei von makro- und mikroskopischem Tumorgewebe
 - R1-Resektion : Mikroskopische Tumoranteile sind verblieben
 - R2-Resektion : Makroskopische Tumoranteile sind verblieben
- **Palliative Therapie** : medizinische Behandlung, die nicht auf die Heilung einer Erkrankung abzielt, sondern darauf, die Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern.

Rote-Hand-Brief

Risikoinformation für Arzneimittel, die direkt vom pharmazeutischen Unternehmen verbreitet wird.

Leitlinie/ Richtlinie

Grundsätzlich gilt, dass eine Leitlinie empfiehlt, hingegen eine Richtlinie normativ fordert.

Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung)

- entzündliche Veränderung der Nasennebenhöhenschleimhaut, die meist von einer Entzündung der Nasenhöhle begleitet wird (Rhinosinusitis).
- In der Regel heilt sie spontan aus; hält die Erkrankung hingegen länger als 12 Wochen an, ist sie definitionsgemäß als chronisch zu bezeichnen.
- **Leitsymptome** sind eitriges Nasenlaufen und bewegungsabhängige Gesichtsschmerzen (v.a. beim Beugen des Körpers nach vorne).
- **Diagnostik** : Akute Rhinosinusitis: klinisch (Anamnese, körperliche Untersuchung). Chronische Rhinosinusitis (Zusätzlich nasale Endoskopie und CT der Nasennebenhöhlen)
- **Ursachen und Therapie** : Viren (Rhino-, Influenzaviren) sind die häufigsten Auslöser, weshalb nur bei heftigem Krankheitsverlauf mit Verdacht auf bakterielle Sekundärinfektion (Pneumokokken, Haemophilus influenzae) eine Antibiotikatherapie sinnvoll ist. Nur in Ausnahmefällen kann bei chronischen Verläufen eine chirurgische endoskopische Intervention notwendig sein.
- **Komplikationen** : Orbitaphlegmone, Meningitis, Intrazerebrale Abszesse, Sinusvenenthrombose

Anästhesie

- Lokalanästhesie

- Substanzen : Lidocain
- Wirkung : Blockade von regionalen Na⁺-Kanälen an Nerven → Hemmung der Erregungsausbreitung → Schmerzempfinden↓
- Komplikationen : Blutung, Infektionen, allergische Reaktionen
- Nebenwirkung (bei intravasaler Injektion / Überdosierung): ZNS (Krampfanfall, Koma mit Atemstillstand), Herz (negativ ino-, dromo-, chronotrop. AV-Block III). Kreislauf (Vasodilatation : Hypotonie, Schock mit Kreislaufstillstand) = „Es muss vor Injektion immer aspiriert werden“

- Regionalanästhesie :

- Arten : Periphere Regionalanästhesie (Leitungsblockade, Plexusblockade). Rückenmarksnahe Regionalanästhesie (Spinalanästhesie, Periduralanästhesie bzw. Epiduralanästhesie)

- Komplikationen : Blutung, Infektionen, allergische Reaktionen, Rückenschmerzen
- **Allgemeinanästhesie** : Anästhetika inhalativ oder i.v. + Opioide i.v. + Muskelrelaxanzien i.v.
 - Arten : Inhalationsnarkose, Total intravenöse Anästhesie, Balancierte Anästhesie (kombiniert)
 - Beatmung : Maskennarkose, Larynxmaskennarkose, Intubationsnarkose
kontrollierte oder assistierte Beatmung
 - Komplikation : "cannot ventilate, cannot intubate"-Situation, Übelkeit/Erbrechen, Aspiration, Bronchospasmus

Quaddeltherapie

- analgetische Maßnahme basiert auf der intrakutanen Injektion eines Lokalanästhetikums.
- Indikationen : Muskelverspannungen, HWS-Syndrom, Lumboischialgie,...

Intravenöse Anästhetika

- **Propofol** : in Form einer Fettemulsion (weiß)
 - Indikation : Standardmedikament der Narkoseeinleitung.
 - Wirkung: Hypnotisch. Keine Analgesie. Keine Muskelrelaxation. Kreislauf↓, Atmung↓
 - NW : RR-Abfall. Atemdepression. Propofol-Infusions-Syndrom (Schwere metabolische Azidose, Rhabdomyolyse mit möglichem Nierenversagen bei hochdosierter und langer Therapie).
- **Etomidat** :
 - Indikation : bei kardiovaskulären Risikosituationen
 - Wirkung: = Propofol. Kreislauf Ø, Atmung Ø
 - NW : Leichte Atemdepression



Anaphylaxie

- **Schweregradeinteilung anaphylaktischer Reaktionen**
 - **Grad I** : Urtikaria, Juckreiz → Allergenexposition stoppen. Antihistaminika (1–2 Amp. Clemastin). Kreislaufüberwachung bis zur Besserung der Symptomatik
 - **Grad II** : zusätzlich leichter Bronchospasmus, Blutdruckabfall → zusätzlich: Sauerstoffgabe (Nasensonde). Flüssigkeitsgabe. Glukokortikoide (250 mg Prednisolon i. v.). Bei Bronchospasmus: inhalative β_2 -Mimetika
 - **Grad III** : zusätzlich Schock (anaphylaktischer Schock), schwerer Bronchospasmus
→ zusätzlich: Adrenalin i.m.
 - **Grad IV** : Kreislauf- und Atemstillstand → kardiopulmonale Reanimation
- **Prophylaxe**:
 - **Allergenkarenz** (Allergiepass ausstellen).
 - **bei anaphylaktischer Reaktion** z. B. auf Insektengift: subkutane Hyposensibilisierung (für 3–5 J.). Notfallset mitführen (Epinephrin-Autoinjektor + Antihistaminikum + Glukokortikoid)





Stimmgabel

- In der Neurologie dienen Stimmgabeln zur Prüfung der Vibrationsempfindung (Pallästhesie). Beim Stimmgabeltest wird eine Stimmgabel auf oberflächliche Knochenvorsprünge aufgesetzt, zum Beispiel auf den Knöchel. Fehlt die Vibrationswahrnehmung, so besteht ein Verdacht auf eine Neuropathie.
- In der HNO-Heilkunde führt man mit Stimmgabeln orientierende Hörtests durch, die eine grobe Lokalisation der vorliegenden Hörstörung ermöglichen.



Ikonographie



CT-Abdomen axial nach KM-Applikation: **Milzruptur**



CT-Abdomen axial nach KM-Applikation : **Milzlazeration mit Blutung in die Bauchhöhle**




CT-Abdomen nach KM-Applikation : Milzlazeration mit Blutung in die Bauchhöhle



Abdomen-Sonographie: Milz-Lazeration




Hämatom mit Fibrinfäden



Röntgen-Abdomen im Stehen (p.a.) : (mechanischer) **Dickdarmileus** (dilatierte Dickdarmschlingen mit Spiegelbildung).




Röntgen-Abdomen in Rückenlage :
(mechanischer) **Dickdarm-Ileus** (massiv erweiterte
Kolonschlingen) (bei Sigmavolvulus)

Röntgen-Abdomen in Linksseitenlage :
(mechanischer) **Dickdarm-Ileus** (massiv erweiterte
Kolonschlingen)







Röntgen-Abdomen im Stehen (p.a.) :
Volvulus des Colon sigmoideum:
 Kaffeebohnenzeichen (massive Dilatation
 sowohl des Colon transversum als auch
 des Colon descendens)


Röntgen-Abdomen in Linksseitenlage :
Dünndarmileus (erweiterte Darmschlingen mit Spiegelbildung)





Röntgen-Abdomen im Liegen und in Linksseitenlage: (Paralytischer) **Ileus** (Erweiterte Dünn- und Dickdarmschlingen sowie Spiegelbildung)





Röntgen-Abdomen im Liegen und in Linksseitenlage: (Paralytischer) **Ileus** (Erweiterte Dün- und Dickdarmschlingen sowie Spiegelbildung)




Röntgen-Abdomen im Liegen und in Linksseitenlage: (mechanischer) **Dickdarmileus** (Erweiterte Dickdarmschlingen sowie Spiegelbildung)




Röntgen-Abdomen im Stehen (p.a.) : (mechanischer) **Dünndarmileus** (Erweiterte Dünndarmschlingen sowie Spiegelbildung, zentral gelegen)





Röntgen-Abdomen im Stehen (p.a.): (mechanischer) **Dünndarmileus** (Erweiterte Dünndarmschlingen sowie Spiegelbildung, zentral gelegen). Z.n. Appendektomie vor 10 Jahren = Bridenileus



Abdomen-Sonographie : **Dünndarmileus** (Erweiterte Dünndarmschlingen) mit **Strickleiter-Phänomen** (sichtbare Dünndarm-Falten)




Abdomen-Sonographie : **Dünndarmileus** (Erweiterte Dünndarmschlingen) mit **Klaviertasten-Phänomen** (sichtbare Dünndarm-Falten)



Abdomen-Sonographie : **Dünndarmileus** mit **Klaviertasten-Phänomen** und **Strickleiter-Phänomen**



Abdomen-Sonographie : **Invagination quer**



Klassifikation der Blutungsaktivität bei gastroduodenalen Ulzera nach Forrest :


Stadium I: aktive Blutung (**Ia** = spritzende arterielle Blutung, **Ib** = Sickerblutung).

Stadium II: inaktive Blutung (**IIa** = Läsion mit sichtbarem Gefäßstumpf, **IIb** = koagelbedeckte Läsion, **IIc** = hämatinbedeckte Läsion).



Stadium III : Läsion ohne Blutungszeichen (fibrinbedeckte Läsion)




Ia : spritzende arterielle Blutung




Ib : Sickerblutung





IIa : Läsion mit sichtbarem Gefäßstumpf





IIb : koagelbedeckte Läsion





IIc : hämatinbedeckte Läsion



III : fibrinbedeckte Läsion





Röntgenaufnahme des Thorax und des Oberbauchs im (p.a. und seitlich) : **Hohlorganperforation** (Subphrenische Luftsichel rechts = freie Luft im Abdomen)




Freie Luft im Abdomen : Röntgen-Thorax im Stehen p.a.: **Hohlorganperforation** (Subphrenische Luftsichel rechts und links= freie Luft im Abdomen)





Röntgen-Abdomen im Stehen (p.a.): **Hohlorganperforation** (freie Luft im rechten Oberbauch zwischen Leber und Zwerchfell und in der rechten Flanke)




Röntgen-Abdomen in Linksseitenlage : **Hohlorganperforation** (freie Luft im Abdomen)




Verschiedene Formen der Hiatushernien




Röntgen-Thorax im Liegen (a.p.): **Upside-down-stomach** (halbrunde Raumforderung mit zentraler Aufhellung, in Projektion auf das Mediastinum und die Lungenunterfelder)
Nebenbefundlich: Vergrößerung des linken Vorhofs (Vorhofkernschatten hinter dem Herzen -grüne Linie-)





Röntgen-Thorax (p.a. und seitlich) : **Upside-down-Magen** : halbrunde Raumforderung mit Spiegelbildung in Projektion auf den linken Herzrand (p.a.) und auf den Retrokardialraum (lateral), ohne Silhouette-Phänomen
Nebenfundlich : röntgendichte, rundliche Strukturen in Projektion auf den Kolonrahmen (Kontrastmittelreste einer vorangegangenen Untersuchung)




Röntgen-Thorax (p.a. und seitlich) : **Hiatushernie** : zwei scharf begrenzte Aufhellungen mit Spiegelbildungen in Projektion auf das untere Mediastinum (Hiatushernie vom Mischtyp)




Röntgen-Thorax (p.a. und seitlich) : **große Hiatushernie mit Spiegelbildung**





Röntgen-Thorax (p.a.) : **Lungenabszess** (rundliche Raumforderung im Mittelfeld der rechten Lunge mit Spiegelbildung)






Abdomen-CT (axial/koronal nach KM-Applikation): Nebennierentumor links/rechts (Phäochromozytom)



MRT des Abdomens (T1-Gewichtung, koronar): Nebennierentumor rechts (Adenom) (NN).


Leber (L), Milz (M), Magen (Ma; ggf. mediale Milzrand), Pankreas (P) und Nieren (N).





Sonographie der Leber : isoechogene Raumforderung mit echoarmem Randsaum („Halo-Zeichen“ : Hinweis auf Malignität der Leber Raumforderung) (HCC bei Leberzirrhose)




Sonographie der Leber : Raumforderung mit inhomogener Echogenität (**HCC**). DD : Lebermetastase





Abdomen-CT (axial nach Kontrastmittelgabe in der portalvenösen Kontrastmittelfase) : multiple hypodense Läsionen im rechten Leberlappen (RL) (**HCC**). Aszites (grün). gastrale Varizen (Pfeilen). DD : Lebermetastase




Abdomen-CT (axial nach Kontrastmittelgabe) : hypodense Läsionen (**HCC**). DD: Lebermetastase



Sonographie der Leber: massive, rundliche, inhomogene Raumforderung (Lebermetastase)



Sonographie der Leber: multiple Lebermetastasen




CT Abdomen (axial, nach Kontrastmittelgabe) : Multiple Lebermetastasen mit Aszites





Sonographie der Leber: scharf abgrenzbare echoreiche Raumforderung (Leberhämangiom)





CT Abdomen (axial, nach Kontrastmittelgabe) : Fokale noduläre Hyperplasie (KM-Anreicherung in der Leber mit hypodenser zentraler Narbe)




Sonographie der Leber: echofreie Raumforderung (Leberzyste)




CT Abdomen (axial) : Echinococcus-Zyste der Leber (randsklerosierte hypodense Raumforderung, septiert rechts)






Abdomen-Sonographie : Akute Divertikulitis (Divertikeln, Darmwandverdickung)



CT-Abdomen, koronarer Schnitt, mit oralem und i.v. Kontrastmittel : Akute Divertikulitis (Divertikeln -Pfeile-, Darmwandverdickung)




CT-Abdomen, axialer Schnitt : Divertikulose





CT-Abdomen, axialer Schnitt, mit oralem und i.v. Kontrastmittel : Akute Divertikulitis (Divertikeln, Darmwandverdickung)

- a) lokale phlegmonöse Entzündung;
- b) Divertikulitis mit kleinem parakolischem Abszess;
- c) Divertikulitis mit gedeckter Perforation und großem pelvinen Abszess;
- d) Divertikulitis mit freier Perforation und Nachweis von intraperitonealer Luft



Röntgen-Abdomen mit Doppelkontrasteinlauf: Multiple Divertikel des Dickdarms (Divertikulose)



Endoskopie : Divertikeln

- 1- **Wundheilung** Wundversorgung, Wundreinigung, V. A. C. Therapie, Dekubitus Was sind die Heilungsphasen einer Wunde? Beispiele für chronische Wunde? Was sind die Typen von Ulcus Cruris? Was verursacht Ulcus Cruris Venosum Was ist das wichtigste Therapie dafür? Die Kompression. جوي
- 2- **GI-Blutung** (Ösophagusvarizen) Portalhypertension Ursache? Hepatische Enzephalopathie?
- 3- **Magen Ulcus** (Diagnose: Gastroskopie. Was muss man unbedingt machen? Biopsie. HP oder Karzinom. Was muss man den Patienten fragen? Ob er regelmäßig NSAR oder Kortikoide einnimmt. Was wenn freie Luft in Abdomenübersicht? Perforation. NotfallOP. Was sind andere extraabdominelle Krankheitsbilder, die mit Oberbauchschmerzen vorkommen: Herzinfarkt, basale Pneumonie.) DD Ulcus, wie wären die Symptome bei Ulcus, Ulkuserkrankung Therapie und Klassifikation
- 4- **Magen Karzinom** Klassifikation nach lauran und Risikofaktoren DD, Therapie? Vaskularisation von Magen? Aortaabdominalis zeichnen. Virchow Node, Anämie -Formen, Labor (da Anämie den frühesten Zeichen des Magen.Ka
- 5- **Gallenblasenkarzinom:** Cholodochkarzinom, Arten und Klassifikation, über die Operation und wie heißen diese Operationen. nach Identifikation
- 6- **Ösophaguskarzinom:** Ein Patient hat er Dysphagie, Gewichtsabnahme und B Symptome. Was ist die Diagnose □? Am Ende war die Diagnose Ösophaguskarzinom. Diagnose und wie wird Staging gemacht. CGD + Grafton, Endosono, Sono-Mid, Zonulussono, CT Thorax/Abd.
- 7- **Laparoskopie:** Welches Gaz insufflieren wir, um die Organe besser zu schauen? CO₂? Was wird damit in Bauchhöhle geschaffen? Pneumoperitoneum. Was sind die Konsequenzen für die Lunge und Herz? Kompression, Verlagerung, Erhöhung der intrathorakale Druck und Funktionseinschränkung habe ich gesagt. Der Prüfer war einverstanden dann gefragt: Können wir Laparoskopie bei allen Patienten machen. Ich habe gesagt nein, kontraindiziert für Patienten mit Herz-, und Lungeninsuffizienz (z.B COPD), dann hat der Prüfer gefragt: wenn wir CO₂ am Ende der OP absaugen aber eine Menge davon drin bleibt was kann passieren. ich habe gesagt CO₂ wird nochmal resorbiert und über die Lunge entsorgt. Der Prüfer hat gesagt genau und das führt zu einer Hyperkapnie im Blut und deshalb ist Laparoskopie bei COPD Patienten kontraindiziert. Wie ist der Ablauf einer laparoskopischen Cholezystitis? Haben Sie eine OP gesehen? Grundsätze bei der laparoskopischen op? andere op, die häufig auch im Bauch laparoskopisch gemacht wird?
- 8- **Leber:** Leberzirrhose (CHILD score), Leber Abszess, Lebertumoren (Klassifikation, Chemotherapie), Bilirubin, Zirrhose Cardiac Zeichen von Leber Vaskularisation und Segment
- 9- **Pankreas:** chronisch und akut Pankreatitis, Karzinom (Pankreaskopfkarzinom: wie gehen Sie vor? Wann Operation? Welche Schmerzmittel? Was macht Man zum Ausschluss Pankreas Ca.? Pankreaskarzinom, OP, Überlebensrate <2%.
- 10- **Unterbauchschmerzen** DD (Ektopische Schwangerschaft, Innere Blutung)
- 11- **Tumor staging Befund (TNM)** (R=Residual) (G= Grading) _was ist Unterschied zwischen differenzierten und undifferenziert Zellen bei Tumor er wollte hören Spezialisierung ???
- 12- **Erysipel** (Erreger des Erysipels und Behandlung, Formen) (DD)
- 13- **Abszess** (Def., welche Erreger), Abszess an Finger (dabei ein bisschen Hand Anatomie)
- 14- **Hernien** (Leistenhernie, UNTERSUCHUNG Anatomie, Ein/austrittspforte, Hernien Inhalt bei Männern und bei Frauen, direkt/indirekt Unterscheidung was eher erworben was eher angeboren ist? Leistenbruch warum gibt indirekt Hernie bei Kinder,? Schenkelhernien austrittspforte, inkarzierter Leistenhernie) (Leistenhernie Tx Leistenhernie-typen) (Dann wurde ich auch gefragt über inguinal Hernie (Typen. Wie können wir zwischen beide Formen durch Untersuchung differenzieren, Das Prinzip der Behandlung ist der Verschluss der Bruchpforte), Welche Operationen gibt für Leistenhernie? DD + Femoral Hernie Leistenschwellung DD (erbrechen, was tun: Magensonde, dann Medikamente, Dx: inkarzierte Hernie, Tx: OP. Post op wieder Bauchschmerzen: Anastomose Insuffizienz. Die Kollegin musste auch die Leistenbereich mahlen, medial bis lateral vene arterie nerv.) Die 3 Bestandteile von einer Hernie? Was ist die Häufigste? Was ist der Unterschied zwischen direkt und indirekt?
- 15- **Kolonkarzinom** (Was ist Kolorektal Karzinom, erzählen Sie alles! Definition / Risiko Faktoren/ Symptome/ Therapie >> Fragen über Polypösen>>Mode of Inheretence>>Wie behandelt man die Polypösen), RF von Kolonkarzinom, Tumormarker. Carcinoembryonic Antigen CEA
12-15 cm Analend 5-10 cm
Laboruntersuchungen, Kolorektales-Ca: Wie lange ist Rektum? Therapie? Untersuchungen? DD? Warum machen wir neoadjuvante Radio-chemo? Um Rezidiv- Risiko zu erniedrigen und downstaging. Kontinenz Organ zeichnen? Funktion von Korpus cavernosum recti? Windverhalt! Tx mit Leber Metastasen hat Chancen auch mit Intensiven Therapie zu profitieren Was Neoadjuvant Therapie in allgemein? Polypösen Behandlung und Ursache Inheritance. Rektumkarzinom: neoadjuvante Therapie, Leitlinien, OP, Kontinenz Das sind zwei verschiedene Dinge: OP bei Rektumkarzinom und die Fragen zu Kontinenzorgan: Sphinktermuskeln, Plexus cavernisus recti.
- 16- **Obstipation DD**
- 17- **Päkanzeröse Zustände** (Entartung)
- 18- **Anästhesiologische Klassifikation** der Patienten vor dem Op bei endoskopischer Untersuchung (Grad I-IV), Grad IV muss ein Anästhesist dabei sein.
- 19- **Milzruptur** (Op oder Konservativ, Impfung bei Splenektomie, Schockraum Milzruptur Klassifikation, Saegesser-Zeichen) (Milzruptur gefragt mit Bildern). Fall: ein Kind mit einem Unfall und an linker Seite hat er blaue Flecken. ABCDE und Vitalparameter dann FAST (hat nach FAST gefragt) dann Trauma Check und Ggfs. CT dann wurde mir ein CT gezeigt mit einem Hämatom unter Kapsel. Dann Fragen nach stationärer Aufnahme, wie lange, welche Kontrolle, wann nach Hause, welche Therapien Möglichkeiten. Welche Impfungen nach Splenektomie und wann können wir die Impfungen geben. Wann kann er wieder Sport üben. 3M
wenn alleinig 3-4 wochen post 10-14 Tage nachher (auch bei mika)
- 20- **Ikterus** (Klassifikation, posthepatische Ikterus, Gallenwege Karzinom, DD), Er hat gefragt über Ikterus was bedeutet und ein wenig pathophysiology, andere Symptome dabei. Ursachen, Bilirubin: Arten und wie wird in Leber metabolisiert, nur der Name von zuständigen Enzymen. wann sichtbar? Ab 2 mg/dl. Patient kam aus Ägyptin und hat Ikterus was kann das sein dd? Hepatitis Belharias
- 21- **Appendizitis** (Zeichen, Schnitt bei offener OP, anatomische Grundlage) (Re Iliac Schmerzen bei einem 80-jährigen Patienten, was ist VD? Zuerst Appendizitis, bei welchem Alter ist am häufigsten? warum? und alle klinischen Zeichen? Wurde Appendektomie durchgeführt und nach einer Woche mit gleichen Symptomen (Fieber und Schmerzen) ist der Patient wieder da, was machen Sie? (Labordiagnostik und Sono), was können wir mit Sono sehen? Wir haben mit Sono Raumförderung gesehen, was wird das? (Abszess) was machen wir? (Drainage) wie? (Mit Sono) und wenn keine Sono? (mit CT) und wenn keine CT? (operieren wir) und operieren wir auch wenn es septierte Abszess ist.), Alles über Appendizitis, DD. Besonders von extrauterin Gravidität Kann Karzinom im Appendix sein? Neuroendokrine Karzinom.
- 22- **Elektive Tracheostomie** (Indikationen, Komplikationen)
- 23- **Entzündliche Darmerkrankungen** (Colitis ulcerosa/ m. Crohn) Achlorpie / Hypergastrinämie
- 24- **Gastritis** (Gastritis Typen, Typ A Pathophysiologie und klinik, B12 mangel, was passiert: Polyneuropathie und Anämie.) (Chronische Gastritis Typ C oder Ulkus mit chronischer Blutung bei ibuprofen Aufnahme seit einem Jahr. Hb 8 patient stabil? Was machen sie? Sofort endo? Wie macht man endoskopie, sedierung? Patient stabil kein VE, aber fühlt sich schlapp was machen sie? Keine transfusion! Nur Eisen oral. Er war zufrieden.) Schemata der h. Pylori Behandlung, Dauer, RF der Ulkuserkrankung.

Ulcus cruris arteriosum

an Unterschenkel (prätibial), Knöchel, Zehen. häufig mit Nekrose.
kalte Haut, fehlende Fußpulse und starke Schmerzen, Claudicatio
intermittens

Ulcus cruris venosum:

meist am medialen Knöchel, in schweren Fällen um den ganzen
Knöchel herum reichend (Gamaschenulkus); oft mit distalem
Lymphödem; Gefahr von Superinfektionen; schmerzbedingte (wenig
schmerzhaft) Spitzfußstellung des Fußes.

neuropathisches Ulkus

wie ausgestanztes Ulkus (Malum per forans) an druckbelasteten
Stellen (Ballen, Fersen, Zehen) bei Diabetes mellitus, meist
schmerzlos, weitere Diabeteskomplikationen (z. B. Mikroangio-
pathien

Portale HTN

Ätiologie

Prähepatisch

[?] Pfortaderthrombose

[?] Milzvenenthrombose

Intrahepatisch (am häufigsten)

[?] Leberzirrhose (häufigste Ursache in Europa)

[?] Schistosomiasis (weltweit häufigste Ursache) Bilharziose

Posthepatisch

[?] Budd-Chiari-Syndrom Lebervenenthrombose

[?] Rechtsherzinsuffizienz. Pericarditis constrictiva

Hepatische Enzephalopathie

Funktionsstörung des Gehirns, die durch eine unzureichende
Entgiftungsfunktion

der Leber und konsekutive Akkumulation von neurotoxischen
Stoffwechselprodukten (z.B. Ammoniak) entsteht.

Tx Ursache + Lactulose

Magen CA

RF (Ätiologie)

Exogene Faktoren

Ernährung ↑ Nitratgehalt getrocknete Lebensmittel, geräucherte Alkohol, Nikotin

Endogene Faktoren

Familienanamnese Gastritis A, B Ulkuskrankheit Teilgastrrektomie Blutgruppe A

DD) Andere Magentumoren (MALT, Sarkom, GIST)

Eine Hernie besteht also im Wesentlichen aus den folgenden drei Anteilen [Abb. 4]:

Bestandteile

- **Bruchpforte:** Krankhafte Lücke, beispielsweise in der Bauchwand. Sie verläuft je nach Lage durch verschiedene Gewebsschichten hindurch (Muskeln, Sehnen, Narbengewebe etc.). Die Lokalisation der Bruchpforte legt die Bezeichnung der Hernie fest, so spricht man beispielsweise von Leistenbruch, Nabelbruch, Narbenbruch, Zwerchfellbruch usw.
- **Bruchsack:** Ausstülpung des Bauchfells, das sich durch die Bruchpforte drängt. Nach außen hin wird der Bruchsack von Unterhautfettgewebe und Haut begrenzt. Diese Schichten werden als Bruchhülle bezeichnet.
- **Bruchinhalt:** Der Bruchsack ist entweder leer oder aber – in der Mehrzahl der Fälle – mit Bruchinhalt gefüllt. Der Bruchinhalt kann aus verschiedenen Bestandteilen bestehen, beispielsweise aus Darmschlingen und/oder Anteilen des Großen Netzes (fett- und bindegewebsreiche Bauchfellschürze, die normalerweise über die Dünndarmschlingen ausgebreitet ist). Meist befindet sich im Bruchsack auch eine als Bruchwasser bezeichnete Flüssigkeit, die den Bruchinhalt gleitfähig hält.

25- **Leus** (DD paralytisch/mechanisch) Auskultationsbefund! Sie haben ein Bild mit sichtbaren Kernstrahlphänomenen (Klaviertastphänomen) und Flüssigkeitspiegel)

26- **Leber Raumforderungen** ausführlich (Vorgehen bei Adenom, Hämangiom, Echinokokkus Sono graf CT, ggf biopsie Op nur bei Gefäßzunahme und Komplikationen
mit Kontrast RT bei Echinokokkus

27- **Analkarzinom** (Therapie und Diagnose) Was ist die Analkarzinome? Was sind die Typen? Was ist der Unterschied zwischen Anal- und Kolonkarzinom? Was sind die RF von Analkarzinom? das wusste ich nicht er meinte sexualübertragende Krankheiten durch Humanpapilloma Virus.

28- **Analfistele** Klassifikation Was ist Parks Klassifikation von Analfisteln? Ich sollte dass ich auf dem Tafel zeigen wo genau die Typen sind. Ich habe schon erwähnt die Typen und 2 auf dem Tafel zeigen aber der Rest waren nicht einfach. Er hat selber gemahlen und ich sollte nur darauf mahlen wo die Typen sind? Welche Krankheit verursacht die extrasphinkteräre? CED, Divertikulose, iatrogen Manipulation, Fremdkörper

29- **Hämorrhoiden.**

30- **Ascites**

31- **Verbrennung** mit Schädigung der Atemwege. Was muss gemacht? Algorithmus bei schwieriger Intubation, wie muss man Beatmungsgerät einstellen? Algorithmus wenn man keinen Zugang kriegen kann? Wie viel Flüssigkeit gibt Mann bei Verbrennung? Verbrennung - Grad, Rule of 9, verbrannte Pat. (Grad 2 und 70-80%) zur Ihrem Praxis gekommen, was tun? (erste Versorgung- keine Kühlung bei >30%--> Schock! verbrannte Fläche einschätzen, Flüssigkeitszufuhr -Parkland Formel, ab grad2 (> 30%) grad3 (>10%) ins akut.KH/ Burn unit anweisen. Auch sehr vertieft gefragt worden. (zB wie bei der Kinder, Inhalationstrauma)

32- **Organperforaion** kann man erst mit Laparoskopie vorgehen. Ursachen für Magenperforation? Gastritis..welche? b oder c.Wie kann ich die Blutung beseitigen? Endoskopie aber jetzt wir sind in der Laparoskopie was machen wir? Wie korregieren wir

33- **Akutes Abdomen.**

34- **Cholezystitis Cholelithiasis, Choledocholithiasis, Cholangitis** (wie viel mm Ductus erweitert., Cholestase Parameter, Ursache für Hyperbilirubinämie (prehepatisch, hepatisch und posthepatisch, Cholezystektomie (Laparoskopie- welche Struktur Unterbindung und schneiden) (Bei Cholezystitis musste der Prüfling ein Bild von Gallenwegen malen und die Komplikationen von Cholezystektomie sagen (Hep. A Schädigung), was sind die Leber Synthese Parameter), Cholezystitis. der Kollege musste auch Anatomie von Leber, Gallenblase, Pankreas, Duodenum auf der Tafel mahlen. was bedeutet SGOT und SGPT, was macht Leber mit Bilirubin. (nach einer Woche kommt Patientin wieder mit rechtem Oberbauchschmerzen, was machen Ultraschall: sieht Raumforderung, danach: OP? Nein, USG Punktion oder CT Punktion.) Akute Cholezystitis: Die Kollegin (Anästhesie) hat das am Anfang als Appendizitis falsch diagnostiziert. Patient und Anamnese war nicht einfach für sie. Prüfer hat sie in Richtung Cholezystitis orientiert und sie hat sich korrigiert. Hat gefragt über OP (sie hat nur grob geantwortet, sie hat nicht Worte als "Unterbindung" benutzt, Prüfer hat das akzeptiert. Fragt über Komplikationen bei Zysticus Clip (DHC). (Ehrlich ich habe alle allgemein OP kurz vorbereitet und bin sicher) Prüfer war geduldig und sie war nicht aufgeregt das hat sie super geholfen. bedeutet Cholezystitis.? Definition? Ätiologie? Steintypen? Ursachen für Steine, Risiko Faktoren? Wie verursachen die Steine Cholezystitis? Also Pathophysiologie, anatomisch? Labor: Leberwerte, Entzündung, welche Entzündung Werte bestimmen Sie? BB, CRP, Procalcitonin. Gibt's noch eine Entzündung Wert, der leider nicht häufig verwendet wird? BSG. Verlängert oder verkürzt? Verlängert. Alle Labore sind da, was wollen Sie noch Diagnostik machen? Sono sono Befund, Wandverdickung, mögliche Steine, Murphy Zeichen Erklärung? Dann kam das Wort Gallenblasen Hydrops, was ist das? Therapie, was geben Sie als Antemetika? MCP, Dosierung? Schmerzmittel? Was sollen Sie die Patientin noch Fragen? Allergien. Was geben Sie als AB? Cipronal, clont, bei Sepsis Pip/Tazobac, bestimmte AB weg. Bakterienspektrum, welche Keime verursachen Cholezystitis? Aufsteigende Bakterien vom Darm gram negativ (E. coli, Klebsiella, Enterobakterie, Anaerobier). Gibt man immer AB oder kann man auch operieren? Wann sofort operieren oder ein bisschen Zeit lassen? Komplikationen der Cholezystitis ohne op? Dann hat Prof. Bara nach DD gefragt, Pyelonephritis/Nierensteine, wie haben Sie das ausgeschlossen? Sono groß der Stein in Sono zu sehen? Cholezystitis Sonozeichen? körperliche Untersuchung, Labor Was ist eine ERCP? Denn hat er über Cholangitis gefragt, was erwartet man im Labor und Sono, Therapie von Cholangitis (Antibiotika, ERCP und ggf. binnen 72h OP), Was machen wir, wenn keine Cholangitis nur Cholezystitis (OP erste 24h). Physiologie der Bildung der Galle. Fragen nach Cholezystitis von anderen Kandidaten, alles über Cholezystolithiasis und Pankreatitis, OP Technik und Alles, Organ Verletzung bei Cholezystektomie sehr wichtig war Gallengänge Verletzung. Wie kommt es zu Pankreatitis? Wo liegt Konkrement in diesem Fall? Wann Op? Welche Antibiose? Cipro nicht mehr Mittel der ersten Wahl! Macht Aortendissektion. Behandlung tief gefragt

35- **Divertikulose und akute Divertikulitis**, Klassifikation nach Hansen und Stock (Patient mit linke Unterbauchschmerz und dann mit Akut Abdomen- Divertikulitis mit Perforation - sofort Notfall OP - Sigmoidresektion entweder direkt End to End Anastomose oder nach Hartmann Procedere mit Anomstem.) (Sigmadivertikulitis (alles). Zenker Divertikel echt oder falsch) Was ist genau histopathologisch passiert in Divertikul? Er meinte das die Ausstülpung in den Mukosa und die Submukosa durch die Schwachstelle in der Darmwand, wo die Gefäße sind. Was sind die Typen? Was sind Beispiele für echte und falsche Divertikulose? Aus welcher Seite entsteht der Divertikel? (Sono Befund bei Divertikel? Machen Sie noch was anderes an Diagnostik oder fangen Sie mit der Behandlung an? Ich habe gesagt, wenn im sono Divertikel Zeichen ohne Abszess oder RF würde ich mit der Behandlung anfangen und wenn die Patientin Entzündung frei ist, könnte man eine Koloskopie machen, ja was weniger invasiv ist? Hämoecult, noch was? Ich habe CT mit KM als Tumorsuche gesagt. Ja, Sie wollen die Patientin entlassen, was empfehlen Sie die Patientin? Lifestyle ändern, auf Diät achten, ballstoffreiche Diät, weniger Fleisch, Sport, Nikotinkanz.) (Komplikationen von Divertikel ist Fistel, was ist Fistel? Und was sind am häufigsten? Was sind die Komplikationen einer Fistel? Wieso muss man sie früh entdecken?) (Divertikel. Klassifikation und bei Komplikationen was machen Sie bei so einer Operation? Künstlichen Darmausgang oder was genau? Abszess => CT gesteuerte Punktion. Perforation => Hartmann op, was ist Hartmann op? Was ist der Unterschied zwischen endständiges Stoma und Doppel Läufigen Stoma? Wenn die Patientin aufwacht nach Hartmann op, sie wird fragen bleibt das jetzt so? Und was machen Sie bei einer Hartmann op? Warum macht man ein Doppel läufiges Stoma?) (Diagnostische Schritte, was für Laborwerte nehmen sie ab? Was sehen sie im sono? Wie würden sie diese Patientin behandeln (Es ging hier um eine unkomplizierte Divertikulitis, deswegen Antibiose und ambulant behandeln). Was für andere Maßnahmen empfehlen sie? Wie entsteht eine Divertikulose, pseudo- und echte Divertikel der Unterschied? Was machen sie bei Abszess? Was für Operationsmöglichkeiten haben sie? Warum protektive Stoma? Warum kann es zu Anastomos Insuffizienz kommen?) (Wie oft muss der Patient mit Divertikulose koloskopiert werden??) (Stadien basierte Therapie, (Klassifikation of diverticular disease). Wenn Abszess dann wie behandeln: CT gesteuerte Abszess Drainage. Was sehen im sono, was macht bei Sepsis. typen von Perforation: offen und gedeckt. Wie diagnostiziert: ro Thorax und sono. Was sieht in rö: freie Luft. Warum link Seitenlage beim rö: Luft geht oben und besser nachweisbar. Welche anderen endokrinologischen Erkrankungen kann in Sepsis gehen: diabetische Ketoazidose, Addison Krise.) Mein Fall war Divertikulitis, DD, Komplikationen, Die häufigste Ursache für Blutung>>>Medikamente (Antikoagulation), Behandlung. Was ist normal Stuhlfrequenz? Paradoxstuhlgänge und Mechanismus

36- **Mesenterialischämie** (Postprandiale Bauchschmerzen) Angina Abdominalis bei chronischer Mesenterien Ischämie. Welches Gefäß: A. Mesent. Sup. -->was ist die Versorgungsgebiete? ..Riolan-Anastomose lindert die Beschwerden. (Die Riolan-Anastomose ist eine inkonstant vorkommende Gefäßanastomose, welche die Arteria colica media (aus der Arteria mesenterica superior) mit der Arteria colica sinistra (aus der Arteria

Pulsionsdivertikel: Ein erhöhter intraluminaler Druck führt zur Schleimhautvorwölbung durch vorhandene Muskellücken (= falsches Divertikel).

• **Traktionsdivertikel:** meist Folge von lokalen entzündlichen oder postentzündlichen Vorgängen außerhalb des Lumens, die dazu führen, dass sämtliche Wandschichten nach außen gezogen werden (= echtes Divertikel).




Abb.2.8 Lokalisation und Häufigkeit der Ösophagusdivertikel.
[aus: Hirner, Weise, Chirurgie, Thieme, 2008]

falsche Divertikel: Ausstülpung von Mukosa- und Submukosa infolge einer Schwachstelle in der Muskularis

• echte Divertikel: Ausstülpung aller Wandanteile einschließlich der Muskularis

Divertikulitis

Pseudodivertikel, die durch einen Prolaps von Mukosa und Submukosa durch Lücken in der Tunica muscularis (Gefäßdurchtritte) entstehen.

Fistelbildung, mit 65 % am häufigsten **kalovesikale** Fisteln (Pneumaturie, Fäkalurie und rezidivierende Harnwegsinfektionen), zu 25 % **kalovaginale** Fisteln.

Bei einer **paradoxen** Diarrhö ist der Wechsel zwischen festen und flüssigen Stühlen möglich, wenn die Stenose nicht lumenfüllend ausgeprägt ist. Kann fester Stuhl stark ausgeprägte Stenosen gar nicht mehr passieren, kommt es bei der **paradoxen** Diarrhö zu wiederholtem Absetzen kleiner Mengen flüssigen Stuhls.

Die Wahrscheinlichkeit bei einer Koloskopie nach stattgehabter Divertikulitis ein Adenom oder Karzinoms zu diagnostizieren ist signifikant erhöht. Ein erhöhtes Risiko für ein kolorektales Karzinom bei Divertikulose lässt sich hingegen nicht belegen.

Evidenzlevel 2, Starker Konsens

Nach Ausheilung einer konservativ behandelten Divertikulitis (i.d.R. nach **6-8 Wochen**) sollte die Indikation zur Koloskopie in Abhängigkeit von klinisch-anamnestischen Faktoren (protrahierter Verlauf, persistierende Beschwerden, Alter des Patienten, Bildgebung) gestellt werden.

Das gehäufte Auftreten von Kolondivertikeln im Sigma sei aufgrund der **zahlreichen Vasa recta**, der **hohen intraluminalen Drücke** und der sich **prellbockartig vor dem Rektum brechenden peristaltischen Wellen** zu erklären.

Die Divertikulitis ist eine entzündliche Veränderung von Kolondivertikeln. Begünstigt wird dies dadurch, dass durch die Herniation die mitgeführten Blutgefäße komprimiert werden, die prolabierte Schleimhaut lokal minderversorgt ist und ein verengter Divertikelhals zur längeren Retention von keimbelastetem Stuhl im Divertikellumen führt.

Komplikationen der Cholezystektomie

? **Verletzung** des Ductus hepatocholedochus oder eines Ductus hepaticus oder der A. hepatica

? **Galleleck**: Sekretion von Gallenflüssigkeit in die Bauchhöhle (Biliom)

? **Blutung**

? **Verletzung** umliegender Organe (Darm, Leber)

? **Perforation** der Gallenblase

? **Peritonitis**

? **Wundheilungsstörung**, Abszess

? **Thrombose**, Embolie

+++ **Postcholezystektomie Syn**

operationbedingt
Cholestasiklinose
sphinkterdysfunktion
Papillensteine

SGPT oder **S-GPT** ist die Abkürzung von: Serum-Glutamat-Pyruvat-Transferase

Alanin-Aminotransferase (ALT)

Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (**GOT**)

Aspartat-Aminotransferase (AST)

De-Ritis-Quotient = $\frac{AST}{ALT}$
bzw.

De-Ritis-Quotient = $\frac{GOT}{GPT}$

<1 Entzündung
>1 Nekrose



- In Hepatozyten wird Bilirubin mit **UDP-Glucuronsäure** glucuronidiert (= mit Zucker konjugiert/verbunden, entspricht Phase II der Biotransformation)
- Dadurch wird Bilirubin **wasserlöslich**
- Konjugiertes Bilirubin wird aktiv in die Gallenwege ausgeschieden

Gallenblasenhydrops

- Definition: Prall-elastische Vergrößerung der Gallenblase (Transversaldurchmesser >5 cm)
- Ursachen
 - **Zystikus-Obstruktion**: Durch Sludge, Konkrement oder Strikturen, hierbei i.d.R. symptomatisch und mit fließendem Übergang in eine Cholezystitis
 - **Obstruktion durch externe Kompression**: Korrelat des Courvoisier-Zeichens, bspw. durch Malignome (Pankreaskarzinom, Cholangiokarzinom)
- Differenzialdiagnose: **Atone Gallenblase**, bspw. nach parenteraler Ernährung oder bei diabetischer Neuropathie
- Therapie: Bei Zeichen der Cholezystitis entsprechende Therapie, bei asymptomatischen Formen ohne Auffälligkeiten der Wandung **Ursachenabklärung**



Das physiologische **Konzentrationsverhältnis** von Cholesterin, Phospholipiden und Gallensäuren beträgt 5:25:70. Verschiebt sich dieses Konzentrationsverhältnis zugunsten des Cholesterins, ist die Galle mit Cholesterin übersättigt und das Cholesterin fällt aus. **Lithogene Galle** ist die Folge einer erhöhten Cholesterinkonzentration (gesteigerte hepatische Cholesterinsynthese bzw. verminderter Cholesterinabbau) oder einer verminderten Konzentration der Lösungsvermittler (Gallensäureverlust-Syndrom,



mesenterica inferior) verbindet. Über diese Anastomose kann bei einem Verschluss eines der beiden Mesenterialgefäße eine Kollateralversorgung des Colons erfolgen.) . Fall mit Hypotonie und Bauchschmerzen bei einem 93 jährigen Patienten . EKG gezeigt war VHF mit Tachykardie .Akutes abomen bei mesentrial-infarakt als folge Thrombose bei VHF. Angio ct
....Therapiemöglichkeiten...Aufklärung des Risikos ...op...op komplikation (nicht so tief).

2

Unfallchirurgie

was bedeutet in Medizin Bruch? Fraktur und Hernie.

Frakturen:

Was sind die 3 häufigste Frakturen? Schenkelhalsfraktur, Radius und Schädel

Unterschenkel Fraktur Röntgen Bild wie gehen Sie vor? Welche Behandlung ist am Besten Marknagel oder Plattenosteosynthese? Was sind die Vorteile von Marknagel? (Früher Belastung möglich)

Radius (Distale Radius Frakturen: Colles, Smith) wann op? Klassifikation, Mechanism, Behandlung.

Kolles Fraktur mit Röntgenbild. Was ist der Unterschied zwischen kolles und smith. Radiusfraktur bei Kinder

Sichere und unsichere Frakturzeichen. Was machen? Direkt Röntgen, man kann nicht untersuchen wegen Schmerzen und Dislokationsgefahr)

Klavikula Fraktur, OP oder nicht ? Er hat wieder Bilder gezeigt

Kompilationen nach Fraktur und Osteosynthese

Wann konservativ und wann operativ und Jede Fraktur Ursache

Oberschenkelhalsfraktur wann op? Warum, Oberschenkelhalsfraktur mit Femur Frakturen (ein alter Patient aus dem Bett gestürzt.

Schmerzen im Beckenbereich und Oberschenkel. Wie gehen Sie vor? (Ich bin in Reha Klinik tätig, und sagte, dass es muss unbedingt operiert werden) die Angehörigen fragen können wir 2-3 Tage warten und dann gucken wir? Warum proximale Femurfraktur ist so gefährlich?)

offenen Fraktur am Sprunggelenk offene Fraktur,

Beckenfrakturen

Grünholzfraktur

BWS/LWS Fraktur,

Frakturen anderer Genese, Pathologische Frakturen

TEP, (Oberarmfraktur: häufigste Typ-subkapitale Fx bei Frauen durch indirektes Trauma)

(Heilung von Frakturen (primär und sekundär), wo ist primär erwünscht: gelenke, kein Kallus, keine Arthrose später, sekundär bei Rohrknochen schafft, verleiht Stabilität (Hebel gesetzt hat der Prüfer gesagt))

(Älter Patient kam in die Notaufnahme kann nicht auf rechtes Bein eintreten >>Schenkelhals Fraktur, Fraktur Formen der proximale Schenkel. Symptome, Behandlung, in Anamnese Prostata wurde entfernt>>>pathologische Fraktur durch Knochen Metastasen)

wie legen wir Gipsverband?

Gicht im Knie mit DD

Knieluxation

Schulterluxation ein Bild mit Schulter Luxation welche Kollegen reden Sie jetzt an? Anästhesisten für Behandlung Komplikationen

Brachial Plexus A. axillares, ein Röntgen in 2. Ebenen mit Schultergelenkluxation, gefragt über die Varianten zur Reposition einer Schulterluxation (Der Prüfer wollte wissen wie man der Reposition nach Arlt durchführen kann) .Klassifikation und Reposition und wann OP.

Springgelenkluxation

Kompartmentsyndrom Foto (hat erzählt, dass ein Mann lebt alleine zu Hause und nimmt Marcumar und ist gestürzt und das war sein Bein), welche Kompartiment gibt es in Unterschenkel **Tourniquet Syndrom**

Osteoporose (Diagnose und Behandlung)

Geschwollene rote Finger dd.. Abszess was machen Sie ? desinfizieren..Abstrich...entfernen ?

3

Kardiologie + Angiologie + Gefäßchirurgie + Herzchirurgie

Thoraxschmerzen (DD), Diagnostik Umgang mit thorakale Schmerzen in der Praxis und Klinik (beso der Stemi), wie differenziert Mann auch Aortendissektion und lungnembolie (eigentlich nur Stichpunkte z. V wells score, d-dimere, charakteristische Beschwerden usw)

DD Palpationen Patientin klagte über Palpationen im Moment aber nicht was machen Sie ? **Langzeit EKG**

Halsvenenstauung (DD) *Rechtsherzversagen, Perikardtamponade, Hypertonie, Thrombose, Rechter Herzhoden, mediastinal Tumor, Pneumothorax*

ACS Allgemeine Vorgehen und auch bei STEMI und NSTEMI was wird gemacht ? Wann wird Sauerstoff gegeben? *SpO2 < 90%*

Nicht vergessen, zum Herzkatheterlabor Bescheid zu geben, bevor sie ein Pat verlegen bei STEMI

Wie macht man PTCA ?

Was wird danach gegeben zu Hause Doppelte Therapie (ASS und Clopidogrel) wie lange ? 1 Jahr dan ASS dauerhaft

V.a Infarkt ohne ST Hebung ? NSTEMI ::>> labor (Sie wollen diesen Satz genau hören) **Trop +ve**

Umgang mit thorakale Schmerzen in der Praxis und Klinik (besonders STEMI) Pat. mit seit 2 Std. thorakale Schmerzen. Anamnese: AP typisch? RF. KU: Vital, Cor, Pulmo. Bei RR 220/120 ? Nitro. Pat. ist agitiert, blass, dann Morphin. zudem ASS/Heparin nach Verfügbarkeit. EKG mit lateralem Infarkt, Ankündigung und Transport. Umgang in der Klinik, Revaskularisation sofort.

EKG ohne spez. Befund, dann Labor bei V.a. NSTEMI (also trotzdem muss der Pat. in die Klinik), Vegetative Anamnese bei Herzinfarkt, warum ST-hebung ohne Troponin Erhöhung. Spasmus Therapie bei Herzinfarkt.

EKG mit ST Hebungen in DII, III und aVF. (Welche Wand? Was bedeutet STEMI. Behandlung. Was muss man machen bevor man ins Krankenhaus fährt? Korolabor bescheid geben. Wie lange muss bei Stenteinlage die Antikoagulation laufen und womit? Wenn man in dieser Zeit einen elektiven Eingriff machen möchte darf man die AK absetzen? Nein.)

MI und KHK (Bypassoperation)

was ist **Troponin**? Definition.

SpO2 < 90%

ACE od Kti, B-Blocker, Statin

Halsvenenstauung

Ursachen

- 1 ● Rechtsherzinsuffizienz
- 2 ● Hypervolämie
- 3 ● retrosternale Struma
- 4 ● Thrombose der Vena cava superior
- 5 ● Mediastinaltumor
- 6 ● Spannungspneumothorax
- 7 ● Perikardtamponade

Das globuläre Troponin ist ein Eiweißbaustein des Aktinfilaments

Thoraxschmerzen Vorgehen : Anamnese (SAMPLE, OPQRST) →

Körperliche Untersuchung (Vitalparameter, Herz, Pulse, Lungen,...) →

EKG, Labor (Herzenzyme, D-Dimere,...), ggf. Bildgebung (Angio- CT)
< 10 min → ggf. weiterführende Diagnostik

Palpitationen DD:-

SVT

AV Block

Sinus Tachykardie (Fieber, Anxious, Schmerzen, LE, Hypovolämie, Caffeine)

VF

Extrasystole

Menopause

Phäochromozytom

Phäochromozytom

ACS - MI

Therapie

A. Erstmaßnahmen

- Gefäßzugang
- Monitoring (RR, Puls, Pulsoxymetrie, EKG).
- Sauerstoffgabe (per Maske oder Nasensonde) bei Sauerstoffsättigung <90%
- Intramuskuläre Injektionen vermeiden
- Reanimationsbereitschaft: Defibrillator bereithalten, ggf. Elektroden aufkleben
- Intensivmedizinische Überwachung: Mind. 24 h erforderlich (nach Reperfusionstherapie)

B. Medikamentöse Therapie

☑ Thrombozytenaggregationshemmer: Acetylsalicylsäure 250 mg i.v. oder p.o. + Ticagrelor 180 mg oral (Alternativ: Prasugrel oder Clopidogrel) ^{500 mg}

☑ Antikoagulans : Unfraktioniertes Heparin. ^{Empirische Dosis} Alternativ : niedermolekulares Heparin ^{Enoxaparin 0,5-1 mg/kg i.v. 2x}

☑ Analgesie und Beruhigung : Morphin (2,5 - 5 mg i.v.), Diazepam

☑ Antianginöse Therapie (Bei instabiler AP oder NSTEMI): Nitrate (Nitroglycerin sublingual oder i.v.) + Beta-Blocker (Bisoprolol, bei stabilen Patienten)

☑ Ggf. Statine : Atorvastatin

☑ Ggf. zusätzlich PPI

C. Weitere Therapie

STEMI

☑ Dringliche Indikation für eine Koronarangiographie mit folgender perkutaner transluminaler koronarer Angioplastie (PTCA) = Perkutane Koronarintervention (PCI) : mit Ballondilatation und Stent-Einlage (Technik : siehe KHK)

☑ Indikationen der primären PCI : Immer, wenn innerhalb von 120 min verfügbar

☑ <12 h nach Symptombeginn

☑ >12 h nach Symptombeginn, falls weiterhin Symptome, hämodynamische Instabilität oder Arrhythmien

☑ 12-48 h nach Symptombeginn möglich als Routine-PCI

☑ Bevorzugter Zugangsweg: Radial (vs. femoral).

☑ Bevorzugtes Verfahren: Stent-Implantation (vs. Ballonangioplastie).

☑ Stent der Wahl: DES (Drug-eluting-Stent = Medikamentenfreisetzender Stent) der 2. Generation (vs. BMS : Bare-Metal-Stent)

☑ Alternativ: Thrombolytische Therapie („Lysetherapie“) = Fibrinolytika, Thrombolytika (Tenecteplase oder Alteplase i.v.)

☑ Indikation: wenn PTCA nicht binnen 120 Minuten verfügbar und Beschwerdebeginn <12 Stunden

☑ Blutungskomplikationen möglich

☑ Bei Fehlgeschlagene Fibrinolyse: Sofortige Angiographie und Rescue-PCI

☑ Auch nach erfolgreicher Lyse sollte im Verlauf eine Koronarangiographie erfolgen NSTEMI Durchführung einer PTCA innerhalb von 2-72 h (nach Risikoabschätzung).

Operative therapie (Bypass-Operation)

Bei ungeeigneter Anatomie für eine PTCA

- ASS - Ticagrelor
- UFH, NSTEMI
- O₂-Gabe
- Morphin
- Nitrat
- B-Blocker
- PPI

Typische Symptomatik ohne EKG-Veränderungen oder Herzenzym-Nachweis

Stationäre Aufnahme, Überwachung, Kontrolle von EKG und Herzenzymen, Nicht-invasive Diagnostik

O₂, PPI

ASS (Allex)

Sedierung und Analgesie mit Morphin (2-10mg lang sam i. v., alle 5-30 min) bzw. bei starker Unruhe des Patienten mit Diazepam. Hierdurch wird der kardiale O₂ Bedarf, der stressbedingt stark gesteigert ist, gesenkt.

- Nitrate wirken rein symptomatisch, indem sie die Schmerzen mindern und die Koronardurchblutung verbessern. Kontraindikation sind systolische Blutdruckwerte < 90 mmHg und eine Silendafil-Einnahme. VIAGRA

Nitroglycerin wird initial s. l. als Zerbeißkapsel (0,8 mg) oder Spray (2-4 Hübe) verabreicht, stationär i.v. mit Perfusor.

- Heparin: 5000 IE von unfractioniertem (UFH) oder 1 mg/kg Enoxaparin (niedermolekulares Heparin, NMH) oder 2,5 mg Fondaparinux werden i. v. injiziert. Cave: je höher die Nitratdosis, desto niedriger die Wirkung von UFH! UFH werden bei anschließender PTCA bevorzugt, NMH oder das Heparin-Analogon Fondaparinux bei Thrombolyse.

- Thrombozytenaggregationshemmung mit ASS (250-500mg), Clopidogrel (300-600mg) sowie GP-IIb/IIIa. Durch die initiale Gabe von ASS kann die Letalität um knapp 30% gesenkt werden. Als besonders vorteilhaft hat sich zudem die Kombination von ASS mit Clopidogrel erwiesen, da hierdurch die Komplikationsrate eines anschließenden interventionellen Eingriffs deutlich gesenkt werden kann. Bei instabilen Patienten werden zusätzlich noch GP-IIb/IIIa-Antagonisten verabreicht.

- β -Blocker: Sie senken die Mortalität um rund 25-50% und reduzieren das Arrhythmierisiko. Sofern keine Kontraindikationen (z. B. Hypotonie, Bradykardie) bestehen, sollten sie verabreicht werden.

- Flüssigkeitsbilanzierung und Elektrolytkontrolle (K⁺ Spiegel sollte nicht unter 4,5 mmol/l liegen).

Als Merkhilfe für die Soforttherapie dient „MONA“: M (Morphin), O (Sauerstoffgabe und Oberkörperhochlagerung), N (Nitrate) und A (Antikoagulation und Thrombozytenaggregationshemmung).

Reperfusionstherapie

Sie sollte immer versucht werden mittels

- Akut-PTCA (S. 35): Therapie der Wahl Durchführung indiziert beim frischen STEMI

Thrombolyse (konservativ)

- Bypass-Operation (S. 35).

Da rund 6 h nach Beschwerdebeginn bereits ein Großteil der betroffenen Myokardzellen irreversibel geschädigt ist, sollte die Rekanalisation unverzüglich begonnen werden. Die Gabe von GP-IIb/IIIa-Antagonisten verbessert die Prognose zusätzlich. Das Vorgehen richtet sich nach der Interventionsmöglichkeit (Abb. 5.6).

Eine Thrombolyse (Fibrinolyse) wird empfohlen, wenn eine PTCA (=Therapie der Wahl) nicht binnen 90min durchgeführt werden kann und der

Beschwerdebeginn weniger als 6 h zurückliegt. Bei Blutungsgefahr (z. B. Magengeschwüre, Operationen in den letzten 2 Wochen, Insult in den letzten 2 Monaten) ist sie kontraindiziert. Im Vergleich zur PTCA ist die medikamentöse Wiedereröffnung eines Gefäßes weniger effektiv und Re-Infarkte so wie Blutungskomplikationen häufiger (in 1 -2 % entstehen relevante intrakranielle Blutungen). Sie ist allerdings

überall verfügbar und einfach durchzuführen. Als Thrombolytika dienen Tenecteplase, Alteplase (rt-PA, recombinated tissue plasminogen activator), Urokinase oder Streptokinase (Cave: allergische Reaktionen). Die Erfolgsaussichten sind umso größer, je früher die Lyse durchgeführt wird (möglichst kein Zeitverlust!), liegen jedoch deutlich unter denen einer PTCA. Die Letalität im ersten Monat nach Infarkt kann etwa um die Hälfte gesenkt werden. Zu den Indikationen der präklinischen Fibrinolyse s. Notfallmedizin S. B21.

Bei V.a. Blutungskomplikationen (Abfall von Hk, Hb) muss die Blutungsquelle umgehend festgestellt werden (z. B. Sonografie von Pleura und Abdomen). Die Bestimmung der Parameter Myoglobin, CK-MB und Troponin hilft bei der Beurteilung der koronaren Reperfusion. Ischämisches, aber noch vitales Myokard (reduzierte Kontraktilität, aber keine Fibrose) kann sich, bei rechtzeitig wiederhergestellter Durchblutung, vollständig erholen (sog. "hibernating myocardium", Myokard im Winterschlaf). Die Vitalität kann mittels PET verifiziert werden.



5.5.3 Dauertherapie

In den ersten Tagen nach Infarkt wird die Akuttherapie in reduzierter Form weitergeführt. Die medikamentöse Dauertherapie entspricht der Behandlung einer stabilen Angina pectoris:

- Sekundärprophylaxe mit Reduktion der Risikofaktoren
- ASS (75–100 mg/d) bzw. alternativ Clopidogrel (75 mg/d)
- ACE-Hemmer oder AT₁-Rezeptor-Antagonisten
- β -Blocker
- Statine mit Ziel-LDL < 70 mg/dl. HDL \uparrow 40 mg/dl

CHA₂DS₂VASc-Score (Akronym) [4]



- Definition: Scoring-System zur klinischen Risikoeinschätzung bezüglich des Thromboembolie-Risikos bei Patienten mit Vorhofflimmern (Siehe auch: Thromboembolie-Prophylaxe bei Vorhofflimmern)

| Akronym | Risikofaktor | Punkte |
|----------------|---|--------|
| C | Chronische Herzinsuffizienz* oder linksventrikuläre Dysfunktion  | 1 |
| H | Hypertonus (arterielle Hypertonie) | 1 |
| A ₂ | Alter \geq 75 Jahre | 2 |
| D | Diabetes mellitus | 1 |
| S ₂ | Schlaganfall/TIA/Thromboembolie  | 2 |
| V | Vaskuläre Vorerkrankung, KHK, periphere arterielle Verschlusskrankheit oder Aortenplaque | 1 |
| A | Alter 65–74 Jahre | 1 |
| Sc | Sex Category: Weibliches Geschlecht | 1 |

*Auch Mitralklappenvitien stellen eine Indikation zur Antikoagulation dar 

| HAS-BLED | Kriterium | Punktwert |
|----------|--|-----------|
| H | Hypertonus | 1 |
| A | Abnorme Funktion von Niere (1 Punkt) oder Leber (1 Punkt) | 1–2 |
| S | Schlaganfall | 1 |
| B | Blutungsneigung (z.B. bekannte Hämophilie) | 1 |
| L | Labile INR-Werte (unter Therapie mit Vitamin-K-Antagonist) | 1 |
| E | Elderly, Alter > 65 Jahre | 1 |
| D | Drugs, Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern, NSAR (1 Punkt) oder Alkoholabusus (1 Punkt) | 1–2 |

Auswertung

- Score \leq 2: Niedriges bis moderates Blutungsrisiko 
- Score > 2: Hohes Blutungsrisiko 

EKG: EKG : was ist die T - Welle , die Erregungsüberleitung beschreiben ab Sinus Knoten .. ST Hebungen (II,III,avf), VHF , tachyarrhythmia absoluta (DD) ? schau dir so EKGs und was machen Sie ? AV Block, Ein langzeit Ekg mit AV Block II mobitz typ 2 gezeigt

RBBB EKG Ursachen ? Linksschinkelblock und LAHB

Tachykardien und Bradykardien und wie kann man behandelt und welche sind lebensbedrohlich, Ventrikuläre Tachykardien

und hat mich nach allen AV Block graden und Therapien gefragt, EKG mit Herzschrittmacher (warum ist so? (ich wusste nicht)) Das war AV-Block Grad 3, was soll man machen? (Herzschrittmacher)

VHF Cha2ds2vasc (Therapie? Patient mit VHF kommt zum Hausarzt und fragt wegen seinen Medikamenten. Man sollte den Patienten die Therapie erklären. Wie behandelt man akut? Kardioversion. Was muss man immer davor machen und warum? TEE. Wo wird der Thrombus gebildet und in welchem Vorhof? Komplikationen?)

(Eine Patientin klagt über Palpitationen, aber im Moment nicht, was machen sie? (langzeitiges EKG) Welche Ddx, welcher VHF-Typ kann das sein? VHF (Ätiologie, Therapie), CHADSVASCSCORE, wann Antikoagulationen?) .. VHF: Therapie, Pathophysiologie. HAS-BLED score

Wolf-Parkinson-White Syndrom

Sick-Sinus-Syndrom

Synkope (Reanimationsmaßnahmen, Defibrillationen) ein mann hatte Synkope und hat ihn seine Frau zur Notaufnahme gebracht .. RR war 110/79 und HF 30- 35 / min. Was machen Sie? EKG ... hat mir ein EKG gezeigt war AV- Block 3. Grad (die Behndlung davon (hat gesagt es gibt ein Mittel was wir sofort geben ..er wollte Atropin hören)...

Reanimation bei Kammerflimmern, Energie, Atrialfibrillation.

Subclavia-Steal-Syndrom

Herzinsuffizienz Welche Diuretika wirkt nicht nur physiologisch sondern auch prognostisch bei Herzinsuffizienz? (Aldosteronantagonisten

Pt stellt in der Notaufnahme mit Luftnot vor- vorgehen? DD Akute Herzinsuffizienz alles über Herzinsuffizienz (Definition, Einteilung ,NYHA, Akut-chronisch,Link-Recht und wurde er über Einteilung nach EF gefragt, Medikament , Ursache für Akut Herzinsuffizienz und Therapie

Kardiomyopathie: Arten, wie besteht Ischämie bei ischämische Kardiomyopathie.

Herzvitien trias von Aortenklappenstenose. Dyspnoe, Belastungssynkopen und Angina

dann fragen über Aortenklappenersatz : warum macht man das ? welche verfahren gibt es ? offen, TAVR (TAVI) Der Patient hatte in der Vorgeschichte eine OP (Biologische Aortenklappenersatz) der Professor hat mich ein bisschen über Klappenersatz gefragt, aber überhaupt nicht tief, nur warum ist es wichtig zu wissen ? ob die biologisch oder mechanisch (Antikoagulation wollte er hören).

Rheumatisches Fieber (was ist das ? kurze Pathophysiologie.)

Endokarditis

Perikardtamponade (Perikardpunktion mit und ohne Ultraschall)

Herzzeitvolumen

ZVK (wie legen wir einen ZVK an? und wie können wir feststellen, dass der Katheter im rechten Vorhof ist? Und wenn der Katheter im Röntgenbild im linken Vorhof was die Ursache sein könnten?) man kann über V. Subclavia oder V. Jugularis ein ZVK legen. Erstmal alles vorbereiten und steril arbeiten mit auch einen sterilen Schallkopf lokalisieren wir die Pnktionstelle mit dem Ultraschallkopf, dann punktieren wir schieben wir auch den Katheter mit Draht ca 20 cm bis kurz vor dem rechten Vorhof, dann ziehen wir den Draht und fixieren wir die Katheter mit nähen.Dann muss ein Röntgen Thorax angemeldet und gemacht werden, damit wir sicher machen kein Pneumothorax gibt

Aortendissektion (Selber Patient mit Thoraxschmerzen und differenziell Puls: Aortendissektion. Kann der Patient dasselbe EKG haben (mit ST Hebungen) und warum? Klassifikation nach Stanford und Ops. Ein bisschen Anatomie über Äste der Aorta. Komplikation bei Dissektion Typ A: Aortenklappeninsuffizienz., DD- Aorten Dissektion (Blutdruck differenz in beide Arm , CT angio), Aortendissektion (Stanford Klassifikation, Diagnostisch vorgehen und Behandlungsmöglichkeiten)

Aortenaneurysma Schunt, Aortenaneurysma Therapiemöglichkeiten und OP Indikation .

Lungenembolie (Wells Score, LAE -->Hypotonie.. = Hinweis auf Massive LAE-->sofort Intesivstation und Lysetherapie) (LAE Diagnostik, Wells score erzählt. Worauf müssen Sie vor CT achten ? Allergien, TSH , Krea. , was ist Krea ? Was erwartet man in Echo ? Was erwartet man im EKG ? Lagetyp? Sofortmaßnahmen Wie gibt man heparin? Ich habe gesagt Bolus 5000 IE dann perfusor ? Welche Dosierung? Was macht man mit der Patientin weiter ? ITS verlegen, nein ich meine auf längere Sicht? AK anfangen und INR Ziel 2-3 bis 6 Monate, Sie fangen einfach an oder müssen Sie vorher was machen ? Die Patientin aufklären. Kennen Sie auch andere AK ? Vit.k antagonist marcumar , coumadin , DOAK xarelto, eliquis , dosierung und wie fängt man an ? Kontrzeption und LAE ? Was empfehlen Sie die Patientin diesbezüglich?) Der Unterschied zwischen Thrombose und Embolie. Komplikationen Wann hat man den Verdacht, dass der Patient eine LAE im Rahmen einer TVT hat ? Was ist D-Dimere ? wie stellt man eine LAE fest ?

Frankstarling Mechanismus und Kurve mit Lungenödem ? was macht Nitro in der Frankstarling Kurve

Lungenödem Patient außerhalb des Krankenhauses behandeln, wenn ich nichts dabei habe ? **unblutige Aderlass**

TVT(TVT-Zeichen, Virchow Trias, Komplikationen) (Aber Sie hat kein OP / keine Lange Reise gemacht sie ist 60 jährige (nimmt keine Kontrazeptiva ein) Was könnte an Urscach sein? Er wolte Malignom hören) **Gefäßversorgung der Beine Wells Score**

Varikosis patho und Anatomie

Hypertonie (Hypertinseve Krise, Wie misst man genau der Blutdruck? Und wie entstehen die Geureusche bei der Blutdruckmessung?)

Nasenblutung bei arterieller Hypertonie (Diagnostik, Komplikation, Therapie), Hypertonie: Diagnostik? Wie messen wir RR? Wenn wir RR einmal hoch finden, können wir schon mit Therapie anfangen? NEIN , muss man 3 Mal messen an 3 verschiedene Tage! Oder 24 Stunden Ätiologie für Hypertonie,

sekundäre Hypertonie bei junges Mädchen und akut therapie hypertensiver Krise.

Mit bisschen über Nierenarterienstenose und Aortastenose. Und Pulzdefizit. ? Knieknack?

pAVK (Klassifikation nach Fontane und Ratschow, 6Ps/pAVK-Zeichen, Mesothrombose) (Pat kommt mit schmerzen im re Bein, es ist blass, und fühlt sich an, was hat er? A: pAVK. was machen Sie? Doppler, dann interventionelle Revaskularisation oder Reperfusion sgn. Thrombendarteriektomie. gleiche Pat kommt wieder nach einigen Tagen, hat schmerzen jetzt im Wade A: Reperfusion-Syndrom -> kompartiment syndrom -> Notfall OP) Akute arterielle Verschluss der Extremität, Symptome, Behandlung. Patientin seit gestern Schmerzen in der Hand dd ? Nerv, MS, Gefäße. Blässe ? Puls ? A. Ulnaris und A. Radialis nicht tastbar ? Akute Verschluss


Rauchen: was glauben Sie , wie viele Patientinnen die Sie den sagen ,sie sollen mit rauchen aufhören das umsetzen ? Und was hat Rauchen von Einfluss auf Divertik? Spielt das eine wichtige Rolle? Ich habe gesagt meine Aufgabe ist , die Patientin zu beraten, zu empfehlen und wenn Sie es nicht umsetzt ,kann ich auch nichts machen . Er hat über die Rolle vom rauchen in Gefäßchirurgie geredet , wie viel Prozent hören mit dem Rauchen auf? Habe 30% gesagt Dann meinte er unter 10% , dann haben die beide Gefäßchirurgen über Rauchen und Sport diskutiert ?was ist ballerstoffreiche Diät? Die Patienten verstehen manchmal das nicht , was sollen Sie den Pat. Sagen

6Ps Acuter Verschluss
• pain - Schmerzen

- pain - Schmerzen
- paleness - Blässe
- pulselessnes - Pulse distal des Verschlusses sind nicht palpierbar
- paralysis - Lähmung
- paresthesia - Sensibilitätsstörungen
- prostration - Schock

Aortenbifurkations-Syndrom (Leriche-Syndrom)

- Verschluss auf Höhe der Aortenbifurkation mit oder ohne Einbezug der Iliakalgefäße : Gesäß- und Beckenregion, Oberschenkel, Impotenz (Erektionsschwäche, Impotentia coeundi)



Reperfusionssyndrom (Tourniquet-Syndrom, Postischämiesyndrom) [14][15][4]

- Definition: Komplikationen als Folge der Reperfusion im Anschluss an eine Minderperfusion
- Pathophysiologie
 - Bedingt durch **Ödembildung** und Einschwemmen von Metaboliten in den Organismus, die sich während der Ischämie aufgrund mangelnden Abtransports angesammelt haben
 - Ausprägung insb. bei ausgedehnteren Verschlüssen >4-6 h
- Mögliche Symptome
 - Ischämisches Reperfusionssyndrom
 - Kompartmentsyndrom**
 - Hypovolämischer Schock**
 - Herzrhythmusstörungen
 - Crush-Niere
 - Bildung von Thromben
 - DIC, Multiorganversagen
- Therapie: Je nach Befund
 - Symptomatisch, Überwachung
 - Bei Nierenschaden bspw. **Hydratation, Diurese, keine Gabe nephrotoxischer Medikamente**, therapeutische **Alkalisierung des Urins**
 - Bei Kompartmentsyndrom einer Extremität: Ggf. **Dermatofasziotomie**
 - Evtl. **Amputation** der betroffenen Extremität

✓ **Pneumonie** Fall: Mein Fall war Pneumonie.

62-jährige Patientin hat Husten und Fieber und Schmerzen im Oberbauch, die in den Rücken ausstrahlt. Ich war aufgeregt, weil die Beschwerden unspezifisch waren. Ich habe eine ausführliche Untersuchung durchgeführt. Der Fall Vorstellung ging um das Vorgehen bei einer Infektion. Ich habe die üblichen akuten Infektionen im Bauch und Pneumonie auch. Ich habe gesagt, dass ich muss ein Röntgen machen, um eine Pneumonie auszuschließen wobei die Beschwerden nicht typisch war. Es ging um eine Atypische ambulante erworbene Pneumonie. Neu für mich war warum die Atypische Pneumonie keine richtigen Beschwerden oder Befunde macht. → *Kein interalveoläres Exudat gebildet wird* (Patient mit Husten und Fieber: BB Röntgen Thorax. Was sieht man? CRB65. Erreger. Antibiose. Wann ambulant und wann stationär behandeln.), Was ist die Indikation zur stationären Aufnahme? ~~Tachypnoe > 20/min, Fieber~~, (CRB 65, die Prüferin hat gesagt gibt es noch ein U > 7 mmol/L Buchstabe für Urea, aber das war nicht wichtig! nosokomiale, häufigste Erreger.

Nosokomiale Informationen, MRGN, MRSA. Dann hat mir Labor werte gegeben und sollte ich die Ergebnisse erzählen, gab es Anämie und erhöhte Nieren Werte, fragt ob das kann mit der Fall Pneumonie verbinden kann)

Patient alt mit Pneumonie im KH welche Antibiotika? Aminopenicillin/Beta-Laktamaseinhibitoren, Aspergillose der Lungen

② **COPD**, Asthma bronchiale (Raucher und kann nicht gut atmen--> COPD. Ursache von Obstruktion: vermehrt Schleim(kann nicht abgehustet werden) und verminderte alveoläre Oberfläche zum Gasaustausch.(Emphysem).), Warum kann Sauerstoffgabe bei Patient mit COPD gefährlich sein? Untersuchungen bei COPD BGA pO2 erhöht was noch kann erhöht sein? HCO3 warum? Kompensation Mechanismus O2 Gabe bei COPD? nein (1-2 L) warum gefährlich? Respiratory Zentrier depression

③ **Bronchialkarzinom** (histologische Einteilung)

unterschied zwischen COPD und Asthma

✓ **Hyperthyreose** (als Fall alle die Symptome sind simuliert) (Z. n. Thyroidektomie, Tetani) (Meine Patientin hat sehr gut diese Krankheit geschildert. Ich habe Logorrhoe und Wärmeintoleranz erwähnt. Patientin redet so schnell und hat sich selbst umgezogen. Ich habe alles erwähnt, warum habe ich pulsdefizit gesucht (Hyperthyreose ist eine extrakardiale VHF Ursache). DD (Morbus Basedow: triade Struma, Tachykardie, orbitopathie - Schilddrüsenkarzinom - Quervain und Hashimoto Thyreoiditis (erste Phase) Labor Antikörper Sono Szinti Therapie medikamentös radiojodtherapie Op. Ich habe selbst die Wirkung von Thiamazol und perchlorat erklärt aber habe gesagt Thiamazol hemmt die Thyreosynthese. Das war falsch. Prüfer hat gefragt wie wirkt und wie macht man Radiojodtherapie. Ich habe über TSH TRH und hypophyse Tumoren gesprochen so hat er gefragt: was ist TRH und wo findest man das. Kontrastmittel mit supprimierte TSH. Welche Risiko. Ich habe erklärt es gibt latente und manifeste hyperthyreose. Thyreotoxische krise.

Amiodarone (Hyperthyreose. 52-jährige Pat. Seit 4 Monaten nervös geworden sei. Dazu hat sie Zittern in ganzen Körper, Haarverlust, feuchter Haut, herzrasen, Durchfälle. DD Morbus Basedow, Hashimoto in frühe Phase, Thyreoiditis (ich wusste nix weiter, aber Schilddrüse Ca macht kein hyperfunktion).) Welche labor Untersuchung bei Hyperthyreose, Welche weitere Untersuchung machen Sie, welche weitere Erkrankngen erhöhen die thyreose Hormone, welche DD, Symptom und Therapie von Hyperthyreose, Vigitative Anamnese besonders Stuhlgang Diarröh oder Obstipation? bei Hyperthyreose, was macht kalte Knoten.

(Dann wurde zusätzlich ein Labor gezeigt mit Hyperthyreose. Was muss man dem Patienten fragen? Ob er Behandlung mit Amiodaron bekommen hat oder ob er in letzter Zeit Untersuchungen mit KM hatte. Welchen BBLOCKER benutzt man? Propanolol. Welche andere Untersuchungen? Sono der Schilddrüse, Szintigraphie. Warme oder kalte Knoten. Behandlung: Thyreostatika. Morbus Basedow: Antikörper gegen TSH Rezeptor)

✓ **Schilddrüsenkarzinom** Typ gefragt(Tumormarker bei papillar und follikular (Thyreoglobulin), medullarCA (Calcitonin), Bei MedullarCA - keine Radiojodtherapie (Resistenz)) Klassifikationen (Andere fragen über Schilddrüsenkarzinom, histologische typen, diagnostik, therapie, ooperative Komplikationen, Tumormarker, FNAC befund (gut/bösartig))

DM DM-I, II Pathophysiologie die beide Typen (Adipositas, Hypercholesterinämie, Risikofaktoren, Metabolisches Syndrom,) Es wurde alles über Diabetes Typ 1 und Typ 2 gefragt.

Diabetes: Typen, Pathophyso. Wie machen wir Diagnostik bei DM Typ 1: BZ und Insulinspiegel.

wie Differenziert man zwischen die Typen (Insulinkonzentration um bei Ihr Dx dm Typ 1 hat zu erklären, mangel oder normwert bei Resistance?) Risikofaktoren. Warum muss Typ 1 mit Insulin behandelt werden? Wie stellt man die Diagnose welche Therapie Möglichkeiten gibt?

(was sind DM Typen und die Pathophysiologie DM Typ1-2 Unterschied (besonders 1 und 2, Insulinmangel und Insulinresistenz), alle orale Medikamente besonders sglt 2 inhibitor wie Gliflozin (welche Ärzte mögen das ?? (Kardiologen) NW von Acarbose. Warum Metformin ist so gut? Zu welche Gruppe gehört (Acarbose, Glibenclamid, Januvia) Orale Atidiabetika typen und Mechanismen?

(Junger Mann, bewusstlos liegt auf der Straße. Was denken? Spontan atmung und puls vorhanden. Hyper- und Hypoglykämie, ...) (DKA und hyperosmolares koma.)

Ein junger Pat mit bekanntem DM typ 1 eigentlich gut eingestellt und geschult, aber er war plötzlich beim Fußballspiel bewusstlos geworden. NA kommt aber hat keine Teststreifen zur Blutzuckermessung? Was machen sie jetzt?

Wann geht das Kalium ins Keller? nach Angabe von Insulin

Was sind die Komplikationen? Welche Organen beeinflusst DM am meistens? Diabetische Nephropathie,

Komplikationen, Untersuchungen, Polyneuropathie, wie diagnostizieren? Maßnahmen für diabetischer Fuß: Fußpflege, Entlastungsschuh?

Was passiert beim diabetischen Fuß? Warum kommt zu Wunde? Was sind die Typen? Welche Beschwerden haben die Patienten?

Sensorische und motorische? Ist das Vegetative Sytem auch mitbetroffen? Zu diesem Punkt konnte nicht mehr und er hat selber gesagt ist schwierig müssen sie nicht wissen.

Warum muss man RR gut halten bei DM? wegen die deabetische Nephropathie und wie kann im Frühstadium entdecken?

Mikroalbuminurie

Insulintherapie (CT= Konventionelle Insulintherapie, Intensivierte Insulintherapie hat 2 formen: ICD=intensivierte konventionelle

Insulintherapie und Insulinpumpentherapie)

Bedarfsschema von Actrapid

Stufentherapie von DM 2?

Allgemeine Therapie Maßnahmen: Gewichtsreduktion++, Diät?

Pneumonia

Ein pulmonales Infiltrat kann auch durch eine Überwässerung im Rahmen einer akuten oder chronischen Niereninsuffizienz oder eine Lungenbeteiligung im Rahmen eines pulmorenalen Syndroms bei Vaskulitis/ Kollagenose verursacht werden [234]. Zudem ist das akute Nierenversagen auf der Grundlage der Pneumonie mit Sepsis zu differenzieren.

COPD

Sauerstoff

Eine Sauerstoffgabe kann grundsätzlich über Nasenbrillen oder Gesichtsmasken erfolgen. Gesichtsmasken verfolgen das Ziel einer Reservoir-Erhöhung, was höhere FiO_2 -Konzentrationen erlaubt, insbesondere bei Verwendung eines zusätzlich angehängten Nicht-Rückatembeutels.

Unter Sauerstoffinsufflation besteht aber immer auch die Gefahr, dass es bei ko-existenter Einschränkung der Atempumpfunktion zu einem PaCO_2 -Anstieg kommt. Vor diesem Hintergrund ist bereits vor über 50 Jahren der Begriff der „kontrollierten Sauerstofftherapie“ (controlled oxygen therapy) eingeführt worden [413]. In diesem Sinne wird eine Oxygenierung angestrebt, welche den Patienten aus dem kritischen Gefahrenbereich der Hypoxämie heraushebt, aber den Atemantrieb nicht maximal unterdrückt. Dies gelingt entweder über die Zufuhr einer definierten FiO_2 (in der Regel 28% [414]) über entsprechende Ventil-gesteuerte Sauerstoffmasken (Venturi-Maske). Alternativ wird bei einer kontrollierten Sauerstofftherapie via Monitoring eine Sauerstoffsättigung zwischen 91 und 92% angestrebt und damit die Sauerstoffzufuhr ebenfalls so begrenzt, dass der Atemantrieb nicht zu sehr reduziert wird. Studiendaten zeigen hier, dass auch Patienten mit akuter respiratorischer Insuffizienz und Hyperkapnie in der Regel keinen wesentlichen und klinisch relevanten PaCO_2 -Anstieg entwickeln

interstitielle Pneumonien: Befall des alveolären oder peribronchialen Interstitiums, ohne dass ein intraalveoläres Exsudat gebildet wird (atypische Pneumonie, s. u.).

Polymerase-Kettenreaktion (Polymerase Chain Reaction, PCR)

- Definition: Methode zur Amplifikation (Vervielfältigung) spezifischer DNA-Abschnitte aus sehr kleinen Mengen Ausgangs-DNA

intensivierte Schema.. Welche Schemen gibt es ? Wann Pump bei Typ 1 ?

Glucosenkende Maßnahmen (Insulin Einstellung bevor OP)

Autoimmun Krankheiten nennen موجود بالاوراق تبعت البروتوكولات

Conn- Syndrom: was ist das? Diagnostik? Was macht Aldosteron? Wie ist K+? Therapie aHT?

Chushing Syndrom

6

Nephrologi + Urologie

Pyelonephritis (Diagnose. Was erwartet man im BB. Was sieht man im Sono? Erreger. Behandlung: wann ambulant und wann stationär. Welche Antibiose und in welcher Verabreichungsform. Wenn Schocksymptomatik: Urosepsis. Welche Antibiose in den Fall/Und welche andere Untersuchung ist wichtig? Blutkulturen. Urosepsis), welche spezifisches Symptom(Fieber, schüttelfrost, flankenschmerzen), Differential diagnose (nephrolithiasis (schmerzen) mit HWI (Fieber), MI, Aortendissektion, Pancreatitis (wegen Rückenschmerzen) Häufigste Keime (Ecoli, Proteus, Pseudomonas) Weitere Abklärung: Labor Leukos, CRP, PCT (wegen sepsis), urine status (Glomerulitis Eiweiß im Urin) (warum Nitrate positiv), urin kultur (Erreger nachweis) Sono- Zeichen, ggf CT Abdomen, Behandlung -Flurochinolon(Cipro oder Levofloxacin.) Cephalosporin (Ceftriaxon), Akute Pyelonephritis (Ambulant Behandlung oder Einweisung?, Was sieht man im Urinstatus. Warum Nitrit eine Hinweis auf HWI sein könnte. (Nitrat durch Bakterien werden Nitrit)), Prüfer hat Nieren, Harnleiter und Blase gemalt, sollte die Kollegin die Engstellen der Harnleiter zeigen/(Die Patientin hat gürtelförmige Rückenschmerzen mit Ausstrahlung in den Bauch beidseitig, sie hat noch trüben Urin und hat Zweifel an Harnwegentzündung. bei körperlicher Untersuchung findet man Flankenschmerzen beim klopfen, der Anamnesebogen wurde nicht vollständig ausgefüllt aber das war nicht wichtig und die Prüfer vergessen haben, diese Bögen zu nehmen. Nach Anamnese, PV, Diagnostik und Therapie, (NW von Ciprofloxacin gefragt (Krämpfe und Achillessehnenruptur),) was sieht man in der Sono, Urin, welche Med. (Ciprofloxacin ist nicht die erste Wahl wegen der Resistenz) (Was ist ihre Verdacht Diagnose Warum? Was sind die DDx Wie gehen Sie weiter? Wie würden Sie die Patientin Behandeln .. Im Bezug der Antibiotika habe ich gesagt Flurochinolon als erste Wahl und es war Falsch (laut die Leitlinien) (ich musste auf der Tafel anatomie von nieren, harnleiter, gallenblase, Harnröhre und prostata mahlen. Frage war: es gibt 3 Stellen wo Harnleiter eng sind, welche sind die? was ist vesikourethral reflux?) Pyelonephritis bei alten Männern: aufgrund BPH, Meine Patientin nimmt immer Ibuprofen beim bedarf ein Ich habe gesagt ich muss Ibuprofen sofort absetzen Er hat mir nach gefragt eben die Nierenwerte Normal ist, ich habe gesagt ja) (bei wem ist häufiger eine Pyelonephritis? Männer oder Frauen? Warum? Und als Empfehlung was sollen Sie der Patientin sagen?) (Alles über Pyelonephritis wurde gefragt. Komplikationen urosepsis SIRS parameter, Erreger, Behandlung, retentionsparameter, Laboruntersuchung ins. Nitrit !!! Patophysiologie warum Nitrit +, (SIRS Sepsis) Wass soll die pat machen? 2 3 LITER PRO TAG WASSER TRINKEN. Kann sie schwimmen gehen? Nein sie ist krank, sie fühlt sich nicht gut deswegen Bettruhe. PCT wann? Bakterielle Infektionen. Gesprochen auch dass BSG macht mann nicht in der Klinikalltag also nur theoretisch.) Wie macht Urin Sediment: centrifugation. (Was meint die Patientin eitriges Urin? Wie verstehen wir das? Vermehrte Bakterien, wie viel denn ungefähr? $>5000/ml$. Warum hat sie lebhaftes MER? Ist in diesem Fall pathologisch? Müssen wir das dokumentieren? Ja aber aktuell keine Korrelat. Alkoholgeschichte erhoben, warum was konnte das in eine anderem Fall sein? Dann Fragen über den Fall, Prüfer wollte jedes Labor geklärt werden, z.B warum BB? Warum Krea? Wie rechten Mann GFR?), Mein Fall war Pyelonephritis, er wurde nicht tief gefragt, Verdacht Diagnose, Welche Labor und was sehen in urin-stix und wie macht Urin Sediment? Ultraschall Befund? Welche Antibiotika, NW Flurochinolone? warum Flurochinolone macht Aortenaneurysmen- dissektion? .. Pyelonephritis: Der Pat. Hat Aortenklappenersatz wegen Aorteninsuffizienz und bei der Untersuchung hört man ein Systolikum und ein Diastolikum! wie machen wir Diagnostik? Erreger? Was sehen wir im Sono? Beim 66 jährige Mann was kann die Ursache sein? Prostatavergrößerung. HWI Ursache dafür, pat 63 Jahre hat Harnstau wie gehen Sie vor und was ist die Verdachtdiagnose?, Nephrolithiasis Vesikoureteral bei welche Alter häufig

Blutgasanalyse: ein bisschen Ostmit respiratorischer und metabolischer Azidose. BGA aber sehr einfach, ich habe ein Zettel bekommen mit normalen Parameter von BGA und dann unter eine respiratorische Azidose und eine metabolische Azidose (Ursachen).

Hyperkaliämie (Ursachen)

Niereninsuffizienz (akut und chronisch, Indikationen für die Ersatztherapie, Nierenversagen (akutes und chronisches, die Ursachen), was sieht man im Urin? Welches Medikament ist günstig bei diab. Nephropathie? (ACE-Hemmer

Exsikkose (was sieht man in körperliche Untersuchung beim exsikkose in alter Patient: Trocken Schleimhaut. Warum ist beim alter Patient exsikkose sehr häufig: trinken wenige Flüssigkeiten. Warum: ADP Funktion reduziert. Was ist sehr gefährlich Bewusstsein Störung beim alter Patient: Delir.), Alte Patientin würde desorientiert in zna eingeliefert, Vorgehen, Exsikkose warum bei älteren Leuten?

Elektrolyteentgleisung, Ursache und Behandlung für hyponatriämie und hypokaliämie. (Wie soll die Reposition erfolgen, wann peripher wann zentral, wann oral, wie viel und wie schnell, Symptome) Kalium unter 2, was machen sie? Was sind die komplikationen?

Patient jung hat Schmerzen am Hoden nach dem Aufstehen was kann da sein? Hodentorsion. Was ist die Behandlung? schnell OP

plotzliche/akut. Hamaturie- Ursachen (er wollte über alle -itis und -Tumoren der Harnsystems wissen - Renal, Harnwege, Blasen, alle wesentlichen apparativen Untersuchungen und Behandlung. Blasenkarzinom vertieft gefragt) Woraus besteht Harn und warum ist es gelb.

7

Haematologie:

Anämie Klassifikation, DD, Beispiele für jeden. (mikrozytäre Anämie makrozytäre Anämie, normozytäre Anämie, Sichelzellanämie, Eisenmangel Ursachen), (Ursache von Anämie bei MCV <70 . Mikrozytäre Anämie. dann Eisenmangel bestätigen, wie? Ferritin und Eisen Spiegel nicht immer zuverlässig. Deshalb macht man Transferrin Sättigung, TIBC etc.

Bei MCV 120... was die Ursachen. Megaloblastie, Myelodysplastisch

B12 Mangel Ursache? Er wollte IF Mangel bei atrophischer Gastritis hören. Wo wird B12 absorbiert. (Anämie (DDx von Mikrozytäre und Makrozytäre)), Pat. mit Müdigkeit und leichte Kopfschmerzen und Schwaches Gefühl, Anämie, alles über verschiedene Anämie von andre Kandidatin gefragt. Polynuropathie und Anämie

Thrombozytopenie Patient (Thrombozyten 20.000) und Verwirrtheit ist direkt von andere Krankenhaus zu Ihnen gekommen zur Aufnahme in der Rehaklinik. Diagnose? HIT. DD: TTP

Leukozytose DD? Infekt, Sepsis, Tumor, Autoimmun, Leukämie

Hämolyse Parameter (er wollte auch haptoglobin hören) Haptoglobin \downarrow , LDH \uparrow , ind. Bilirubin \uparrow , Retikulozyten \uparrow

Hämophilie Hämostasestörung bei Gerinnungsfaktorenmangel, A (VIII), B (IX)
X rezessive vererbt
 \uparrow aPTT, Gelenksblutungen
 \rightarrow regelmäßige Substitution

erworbene qualitative Hämoagglutinationsstörung
Vorstellung: Schwere hämolyse
organische hämolyse
Hepatosplenomegalie
Dx: HbS/berührung
Sichelzellen/Blutausstrich
Tbc. Splenektomie

nur

- Physiologische Engstellen der Harnleiter
 1. Abgang des Harnleiters aus dem Nierenbecken durch medio-kaudalen 90°-Austritt (Pars abdominalis)
 2. Überkreuzung A. und V. iliaca communis (Pars pelvica)
 3. Intramuraler Verlauf in der Harnblase (Pars intramuralis)
 4. (Zudem wird die Unterkreuzung der A. und V. testicularis (♂) bzw. der A. und V. ovarica (♀) (Pars abdominalis / Pars pelvica) oft als 4. Engstelle bezeichnet)

Die Harnleiter haben eine enge retroperitoneale Lagebeziehung zum N. genitofemoralis auf der Faszie des M. psoas major!


Die Harnleiter verlaufen unter der A. testicularis (♂) bzw. der A. ovarica (♀), über den Iliakalgefäßen und unter dem Ductus deferens (♂) bzw. der A. uterina (♀)!

Der Ureter ist eine „schüchterne“ Struktur, deshalb „versteckt“ er sich vor allem (bzw. „unterkreuzt“ alles), was mit den Genitalien zu tun hat.

signifikante Bakteriurie ab
10⁵ KBE/mL

(Koloniebildende Einheit).

Bei suprapubisch
gewonnenem Katheterurin
ist bei jeder Bakteriurie
auffällig!



Vesikoureteraler Reflux (VUR) ist die Bezeichnung für den retrograden Fluss von Urin aus der Harnblase in die Harnleiter. Ursächlich hierfür können unter anderem neurogene Faktoren sowie subvesikale Harnabflussstörungen sein. Der Verdacht auf einen vesikoureteralen Reflux kann aufgrund von Flankenschmerzen oder rezidivierenden Pyelonephritiden entstehen, während diagnostisch verschiedene bildgebende Verfahren wie das Miktionsurethrogramm zum Einsatz kommen.

Konservative Therapie f

- Hohe Spontanheilungsrate!
- Indikation:
 - Reflux bis IV. Grades und stabiler renaler Funktion
 - Medikamentös kontrollierbare Infekte
 - Mediale Harnleiterostien
- Durchführung:
 - Dauerhafte antibiotische Therapie bei Bakteriurie und rezidivierenden Infekten
 - Dreizeitige Miktion zur Entleerung des refluxiven Ureters
 - Feste Miktionsfrequenz
 - Engmaschige Verlaufskontrollen

Operative Therapie

- Indikation:
 - Reflux > IV. Grades
 - Verschlechterung der renalen Funktion
 - Rezidivierende, nicht kontrollierbare Infekte
- Durchführung:
 - Endoskopisch mittels Unterspritzung des Harnleiterostiums mit Silikon
 - Offen operativ:
 - Verschiedene Methoden der anti-refluxiven Harnleiterneuimplantation
 - Ureter-Ureterostomie
 - Nephroureterektomie bei szintigrafischer Nierenfunktion unter 20%


U-Stix-Übersicht: Parameter und Normwerte

| Parameter | Normwert | Mögliche pathologische Befunde |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Erythrozyten (bzw. Hämoglobin/ Myoglobin) | <5/µl (negativ) | + / ++ / +++ |
| Leukozyten | <10/µl (negativ) | + / ++ / +++ |
| Nitrit | ∅ (negativ) | positiv |
| Protein | <10 mg/dl (negativ) | + / ++ / +++ / ++++ |
| pH-Wert | 5–6 | >6 |
| Ketone | <5 mg/dl (negativ) | + / ++ / +++ / ++++ |
| Glucose | <30 mg/dl (negativ) | 50 / 100 / 200 / 500 / >1000 |
| Bilirubin | <0,2 mg/dl (negativ) | + / ++ / +++ |
| Urobilinogen | <1 mg/dl (negativ) | + / ++ / +++ |
| Spezifisches Gewicht | 1,016–1,022 | 1,00–1,016 / 1,022–1,060 |


Urinsediment

- **Zellen: Erythrozyten, Leukozyten**
 - Phasenkontrastmikroskopie zum Nachweis dysmorpher Erythrozyten (Akanthozyten)
- **Zylinder**
 - **Hyaline Zylinder:** Unspezifischer Befund, auch bei Gesunden
 - Aufbau: Bestehend aus Tamm-Horsfall-Proteinen
 - Mikroskopie: Homogen, glasig-transparent und farblos
 - **Granulierte Zylinder:** Hinweis auf eine **Proteinurie** (bspw. im Rahmen einer Glomerulo- oder Pyelonephritis); mitunter aber auch bei Gesunden (z.B. nach starker körperlicher Belastung)
 - Aufbau: Bestehend aus einer hyalinen Matrix, in die verschieden große Tröpfchen von PlasmaOproteinen eingelagert sind
 - Mikroskopie: Meist größer als hyaline Zylinder, eingeschlossene Plasmaprotein-Tröpfchen, stark lichtbrechend
 - **Epithelzylinder:** Hinweis auf eine **Glomerulonephritis, interstitielle Nierenerkrankungen** (Tubulusschaden) , tlw. aber auch bei Gesunden
 - Aufbau: Bestehend aus zusammengelagerten, abgeschilferten Tubulusepithelzellen
 - Mikroskopie: Schlauchartige Zellzylinder, teilweise mehrreihig, mitunter schwer von Leukozytenzylindern zu unterscheiden
 - **Leukozytenzylinder:** Hinweis auf glomeruläre und interstitielle **Nephritis, Pyelonephritis** u.a.
 - Aufbau: Zusammengelagerte Leukozyten, tlw. einer Eiweiß-Grundsubstanz aufgelagert
 - Mikroskopie: Meist scharfe Randbegrenzung der Zylinder , mitunter schwer von Epithelzylindern zu unterscheiden
 - **Erythrozytenzylinder:** Hinweis auf eine **Glomerulonephritis**

Anämie



Eisenmangel Anämie



Da Bilirubin aber wasserunlöslich ist, wird es im Blut an Albumin gebunden transportiert. Diese Form von Bilirubin wird als **indirektes (unkonjugiertes, wasserunlösliches) Bilirubin (IBIL)** bezeichnet.

In der Leber wird Bilirubin dann wasserlöslich gemacht (an Glucuronsäure gebunden). Diese Form des Bilirubins wird als **direktes (konjugiertes, wasserlösliches) Bilirubin (DBIL)** bezeichnet.

Thrombophilie

Es war ein Prüfer war **Hämatologen** wahrscheinlich.. und hat sehr komische Fragen gestellt. An andere Kollegen : es war ein Mikroskop mit slide.. und er muss es gucken und sagen zelltypen.. differential Blutbild , kleines bb, usw.. wie differenziert man zwischen zelltypen.. zeigen die verschiedene zelltypen im Bild-Lymphozyten , erythrocytes, wenn Lymphozyten niedrig ist.. dann was.. wie sieht lymphoblast.. ein bisschen über **CLL** . Der Kollege war aufgeregt und hat gesagt seit Jahren hat er kein Mikroskop usw gesehen und so hat er nicht so viele Idee..Der gleiche Prüfer : fragen bei mir: hat die gleiche Bild gezeigt und fragt nach thrombozyten. Wenn niedrig dann was.. alles über **ITP** (idiopathische thrombozytische purpura) wie untersuchen: Knochenmark . Therapie.. cortisone. Dann hat er irgendwelche segmental blast oder so.. malen und zeigen .. ich habe gesagt keine Idee.. dann hat er aufgehört mit Hämatologie >> Hämatologe wurde eine Slide mit CLL über Mikroskope gezeigt darüber gefragt .. ITP ?

Blutausstrich unter Mikroskop (soll demonstrieren und befinden!)-Befund war **ALL**, Fragen über Lymphom/Leukämie., Wer ist Virchow? seiner Entdeckungen

Serumeiweißelektrophorese auf Blatt papier darstellen! ☹ dazu über Multiples Myelom

8

Neurologie

Fußheberschwäche (zentral und periphere Ursachen.)

Polyneuropathie (DD)

Kopfschmerzen (DD, Schlaganfall, intrazerebrale Blutungen, Migräne, Cephalgien)

Schlaganfall (Diagnostik ischämisch oder hämorrhagisch? Ursache von Schlaganfall. wichtig ist Embolie bei VHF., Schwellung am Bein + Schlaganfall: bei TVT mit Foramen Ovale. Was ist Foramen Ovale.. Dx mittels TEE.) (Patient mit Schlaganfall unklare Genese. Sie machen EKG. (ich musste aus EKG nur Diagnose sagen) es war Vorhofflattern. Was braucht jetzt? Antikoagulation. (Diese Frage von anderen Kollegen:) Welche Gruppe kennen Sie? Welche ist besser?) (Ursache, Symptome mit (anterior, Medien, und posterior Infarkt)

Hirnblutungen: ((Welche Sorten intrakranielle Blutungen gibt es und die wichtigsten Ursachen. Wie kann man ischämisch von Blutung unterscheiden? CCT. Was muss man bei Blutung machen? Neurochirurgie.)) Dann die nächste Frage an mich war über epidurale Blutung und Subarachnoidalblutung alle Mögliche Fragen, (wo befindet sich d Blutung und wie sollen wir diese Blutungen behandeln)

Malen der Ciclus of Willis, Wie kann man zwischen subdurale und epidurale Blutung unterscheiden

Migrän (Wie macht man die Diagnose? Klinisch. DD: Andere Kopfschmerzen beschrieben, Apoplex, Meningitis. Migräne mit Aura vs.

Apoplex. Was muss man machen um zu unterscheiden? CCT. (Er hat alles über Migräne gefragt dann alles über Spannung Ks, Cluster ks, Temporalis Artrietis und Meningitis. Dann hat mir gefragt wann soll der Arzt eine Pat. mit KS weiter diagnostische Maßnahmen und richtig diagnostizieren werden. habe ich gesagt . (Alte Pat. mit neuen aufgetretenen rez. KS . Die der Pat. nie früher gehabt) wie meine Fall (Pat. 67 J mit rez. Kopfschmerzen seit 8 wochen "3 mal während 8 W." Der Prüfer war sehr zufrieden. (40 Minuten nur über Kopfschmerzen ? ich glaube alles wurde gefragt über verschiedene Themen unter diesen allgemeinen symptome)

Meningitis: (Diagnose, was sieht man im BB und Liquorpunktion)

DIC, arteritis temporalis und polymyalgia rheumatica

Demenzerkrankungen (Dignosis, Definition des geriatrischen Patienten Parthel Index)

Notrufummer

Epileptischer Anfall bei Ihnen in der Praxis gehabt, was machen sie? Notarzt anrufen, den Patienten von Verletzungen schützen, dann Diazepam, im Krankenhaus Intubation und Narkose mittels Propofol oder Midazolam bei Status epilepticus (nach 30 min.), Was kann das sein (Ursachen)? Wie diagnostiziert man Hirntumor (cCT).

Restlessleg Syndrom DD Schmerzen im Bein (TVT und pAVK)

Delirium (Vorgehen)

Parkinson und alles über Parkinson und ich meine alles . Ich könnte nur die Sympt. sagen. und für die medik. Tx habe ich nur L-Dopa erwähnt. Er wollte aber viel mehr und die Mekanismen von L-Dopa und andere Medik. und was passiert bei Parkinson und TypenEr hat auch ganz detailliert über die Anatomie von Gehirn (Art. und auch die Gehirnspariete) gefragt.

Eine Frage mit eine Junge Pat. Nach dem Urlaub, plötzlich Beinschwäche!.Fragen sie mich! Ich habe gefragt seit wann, wie sieht es aus?

Proximale parese ? Ist aussteigend? Wie hochgradig? Dann sagte es ist eine akute neurogische Erkrankung welche mit Immunoglobuline behandelt wird. In eine Sekunde habe ich Blockout bekommen, dann sagte aber **Guillain Barre Syndrom**.

Rückenschmerzen, Spinalkanalstenose, Bandscheibenvorfall BSV. Spinalkanalstenose. Blutversorgung und Innervation der unteren Extremität. Zu welchen Rückenmarksegmenten gehören die Nerven. Es ging meistens um die laterale und die mediale Seite des US. Danach haben wir fast alle Nerven besprochen: peroneus superf, suralis. Im Prinzip handelte es sich um ischiadocus und femoralis

Innervationsgebiete und dementsprechende Dermatome. Das war in Bezug auf die DD zwischen pAVK und BSV/Spinalkanalstenose

Multipel sklerosis

9

Infektologie + Hgiene

Händedesinfektion, **Substanzen**, KISS-Protokol, Durchführung und wann normal und chirurgisch und Einwirkungszeit

Sepsis und SIRS Sepsis und Laktat, Laktat ist sehr wichtig bei Sepsis (Ziel ist weniger als 2). SIRS Kriterium ?

Didagnose von Spesis ? Therapie?

Nosokomiale Infektionen (was sind die nosokomialen Infektionen? Welche Krankheiten verursachen die nosokomialen Infektionen neben pylonephritis ?) Nosokomialinfektion ? häufigster Erreger ? Welche Patiend sind besonders betroffen ?

MRSA, MRGN, MRSA (wie läuft die Sanierung, Risikopatienten, Rate in Deutschland um 20%)

Hygiene: bei Blutkultur wie lange warten sie für disinfection mindestens 1 minute max 3 Minuten.

Fieber (Definition)(DD (Physiologie wie entsteht Fieber was ist Schüttelfrost wie entsteht?)

Bakterien (gram + und -ve) staph , wie hat die Erriger Resistente entwickelt!! Unterschied zwischen Bakterien oder Viren ?

Tetanus (3 Impfung Dosis und aktiv und passive Immunisierung, wie heißt Impfstoff für die aktive und passive Imm.)

Durchfall (warum schwarzfärbig?, paradox Durchfälle (Ein 81 jährige Pat. klagte über Leistungsverminderung und war blass und kachektisch in NA , RR 100/60 mmHg.

Polyneuropathie

Die Ursachen sind vielfältig. In westlichen Ländern stellen Diabetes mellitus und Alkoholkonsum die häufigsten Ursachen für die Polyneuropathie dar.

Speziell

Toxisch

- Endogen
 - Metabolisch/endokrin: Diabetes mellitus, Akromegalie, Schwangerschaft
 - Hereditär: Hereditäre motorisch-sensible Neuropathien (HMSN), hereditäre sensible Neuropathien (HSN), Amyloidose, Porphyrrie
- Exogen
 - Alkohol
 - Schwermetalle (Blei, Arsen, Thallium)
 - Lösungsmittel (z.B. Trichlorethylen)
 - Medikamente (z.B. Chemotherapeutika)
 - Mangelernährung/Resorptionsstörungen

Entzündlich

- Vaskulitiden, Kollagenosen, Granulomatosen, Guillain-Barré-Syndrom, nach Bestrahlung

Infektiös

- Bakteriell: Borreliose, Diphtherie, Lepra u.a.
- Viral: HIV, CMV, VZV, Influenza u.a.

Paraneoplastisch [1]

- Vor allem das kleinzellige Bronchialkarzinom (SCLC)

Berichtet dass, er vor einer Woche Verstopfung hatte, dann plötzlich Durchfall, kein Blut im Stuhl, Kreislauf stabil,

Was ist ihre Diagnose, wie gehen sie vor?

Paradoxe Stuhlgänge, und Mechanism), (Diahrrö nach Cephalosporin: clost. Toxin.. pseudomembranöse Kolitis(diagnostische Verfahren).. isolieren. Kein antidiarrhö wie Loperamid ----> Gefahr von Megakolon und perforation.) (Diahrrö im Winter... denk an Norovirus (häufig)..), (Was ist normaler Stuhlfrequenz?), (Wie macht man rectal digital Untersuchung? Was wird von der Untersuchung erwartet?), Patient mit Durchfall nach Antibiotika? V.a. Clostridium, Dx und Behandlung, Wie ist Stuhlgang?

Patient mit blutiger Stuhlgang. Wie gehen Sie weiter vor ?

Hepatitis A (Labor, Andere virale Hepatitiden bei jeder Übertragung Wege)

Ursache ein unklares Fieber (Hepatitis A und Malaria patient im Ausland)

Gastroenteritis

Mycobacterium leprae (Frage war: Pat. aus Zentralafrika - Flecken auf der Haut, Hypästhie).

Fall : einer Familie aus Syrien (weil ich aus syrien komme). Die Familie hat Ikterus (gelbliche Haut hat sie gesagt) .. der Mann die Frau und das Kind,

Hier musste ich nachfragen. Befunde erhöhte Transaminas mit erhöhtem Bilirubin, Bauchschmerzen Übelkeit und blutige Diarrhoe, alle Beschwerden sind seit 2 Tagen und sind im Verlauf besser.

Meine Verdachtsdiagnosen : glucose 6 phosphat dehydrogenase, Hepatitis A, weitere hämolytische Krankheiten, sogar Bilharziasis.

Dann sagte ich dass es entweder akute Leberentzündung oder toxisch.

Die richtige Antwort war Pilz. Das war nicht schlimm dass ich nicht genau wusste.

10

Rechtsmedizin

Berufsgenossenschaft, was ist es, wie läuft das? , Versicherung von Schüler (auch BG wie bei Erwachsenen), sind wir von BG versichert (Ich wurde auch gefragt über Krankenkasse(Ein Kind ist auf den Weg zu Schule aus dem Fahrrad gefallen und in die Notaufnahme gebracht.. wer bezahlt die Behandlung ..was macht auch diese Krankenkasse??) Kind hatte Unfall auf dem Weg zur schule. Wie ist versichert? BG alle Arbeiter Schüler sind durch BG versichert. Wofür sind die auch zuständig? Behandlung, Reha, Umschulung, Rente, Prävention (die letzte war ihm wichtig). Noch eine Frage: wenn jemand jemandem bei Unfall hilft und er hätte selbst auch einen Unfall, ist er über BG versichert? Ja(wusste ich nicht, Bonusfrage)

wo findet man die Leitlinien im Internet? *AWMF Arbeitsgemeinschaft des Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften*

aufgaben von Ärztekammer freiwillig oder pflicht städtlich ? bezahlt die Ärzte Geld ? ja je nach Gehalt.

Rechtsmedizinische Fragen (Aufklärung, Bestandteile einer medizinische Aufklärung (bei elektive Prozedere), wann warum, wie dokumentieren, Todeszeichen, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Sie haben Nachdienst, ein 95 Jahre alt pat kommt mit schwere Pneumonie, intubieren Sie? mein antwort war: wenn pat wach und orientiert ist, frage ich ihn., totenschein ausfüllen, was kreuzen Sie da, bei der 90j Patientin (schenkelhalsfraktur dann pneumonie) wen rufen Sie an ?), Pat. wurde Chirurgisch bei Fraktur bei Alkoholintoxikation operiert, dann internistisch übernommen bei kardiale Dekompensation. Auf Station in der Nacht ist er Tod vorgefunden (Junge Pat). Was machen Sie) ich wollte mit Bestätigung des Todes anfangen, hat mich unterbrochen und den Tod bestätigt, was dann? Ungeklärt, Polizei verständigen. Fertig .. Aufklärung , sind die Vordücke nötig? nein, kann man selbst schreiben

Leichenschau Sichere Todeszeichen wo findet man jede und wie lange bleibt ? Todeszeichen wann beginnen die flecken und die Starre.

Kein todeschein füllen vor Bestätigung des Todes.

Ein Patient ist Tod was wird gemacht ? Wer kann ein Rezept schreiben ?

Juristische Fragen über Aufklärung, wann soll der Chirurg/ Anesthetist der Patient wegen OP aufklären ?

Welche Medikamente müssen wir absetzen ? *Orde antidiabetika, Dematika , Lithium ,*

Verlegung eines Patienten aus Ausland (Wie)

Rö Thorax mit pneumothorax, Befund, Therapie. Pat. Nach OP Tod. Ungeklärt, Polizei verständigen.

bei Antikoaganzien ist es komplex

11

Radiologie + Strahlenschutz

Röntgen: Wie entstehen die Röntgenstrahlen wann und von wem wurde erfunden. **Spannungspneumothorax**(warum sieht man das selten im Röntgen? (weil es eine klinische Diagnose ist), wie sieht es klinisch aus? (wie tief sollen wir die drainage reinschieben)

Röntgen mit apikalem Herd, Röntgen Mit Pneumoperitoneum, Ileusbild, Pneumonie, Rippenserienfraktur, freie Luft in linksseitenlage (Danach Röntgenbild in Seitenlage mit freier Luft bei Leber und Kolon war erweitert, was kann das sein? (Kolonperforation) und wie heißt diese Situation? (Seitenlage) machen wir CT oder OP? (OP wir müssen Zeit nicht verlieren) röntgen pneumoperitoin

), im Stehen. Danach Röntgenthorax und es gab einen ballonförmigen Schatten vor dem Herzen mit Gas- Flüssigkeitsstand, was ist das?

(Abszess) das kann sein aber ist nicht (Darm) ja und was bedeutet das? (Hiatus Hernia) wie ist die Behandlung?(operativ entweder

Funduplicatio oder Hemifunduplicatio) nach wem? (nach Nessen) (Ich bin Kinderärztin ich hatte Röntgenbild Für Morbus Hirschsprung

Definition und Behandlung) (Rö-Abdomen mit holorgan perforation, Bild von Ulkus ventrikuli. welche stadium (Forrest) ist es?)

(beschreiben Sie das Bild, immer strukturiert vorgehen, z.b=> p.a thorax, mit Mittellinie Verschiebung, Kein Nachweis pneumonischer

Infiltrate, keine Ergussbildung, keine vergrößerte Lymphknoten oder RF... etc.) (Dann hat Prof. Heckenkamp der Kollegin ein Rö. Bild vom

Unterschinkell mit komplizierter Fraktur beide Tibia + Fibula. Der Pat. Ist wach ansprechbar, beschreiben Sie das Bild. Wie gehen Sie vor ?

Kompartiment Syndrom alles) (Röntgen Bild ich hatte pertrochantare fraktur. Ich konnte die fraktur nicht zeigen. Es gab keine Fraktur Linie .

Prüfer hat mir aber geholfen. Ursachen bei alten menschen? Niedriggrazanstrauma und Osteoporose), Rö Thorax mit pneumothorax, Befund,

Bild war nicht superdurchgeführt. Pat. mit zunehmender Dyspnoe seit 2 Wochen, li Lunge kollabiert. Wie kann man eine

Spannungspneumothorax diagnostizieren im Rö (Mediastinum). Therapie mit Details bezüglich durchführung der Drainage, mögliche

Komplikationene, Warum benutzt mann Tabakbeutelnaht? nicht nur zur Fixation sondern auch zur Hinderung der intrathorakalen Einfluss

von Luft .. Röntgen- Thorax mit Schrittmacher, nur beschreiben .. Röntgen-Thorax mit Spontanpneumothorax: beschreiben, Therapie? Wo

legen wir Büllau- Drainage? Typen von Drainage?

Röntgen Bild mit Raumforderung im Mediastinum was kann das sein ?

Röntgen des Shulters mit Luxation und Beschreibung Anatomie

Röntgen mit pulmonarer Stauung

MRT Angiographie Halsarterien ACC stenose (Welches Gefäß ist verschlossen und wie kann man zwischen Carotis externa und interna unterscheiden???) MRT : Verschluss arteria iliaca und Reperusionskrankheit (Mechanismus)

Die Aufgaben (landesgesetzlich geregelt) im einzelnen:

- Satzungen: u.a. Satzung der Ärztekammer, Berufsordnung, Weiterbildungsordnung und Abnahme
- entsprechender Prüfungen
- Überwachung der Berufsausübung der Ärzte
- Wahrung beruflicher Belange
- Förderung der beruflichen Fortbildung
- Förderung von Qualitätssicherungsmaßnahmen
- Errichtung von Ethikkommissionen
- Stellungnahmen und Vermittlung von Gutachtern
- Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes
- Vermittlung bei Streitigkeiten unter Ärzten sowie zwischen Arzt und Patient

Aufklärung

Folgende Punkte sollten dabei angesprochen werden:

- Art und Bedeutung der Krankheit für den Patienten
- Prognose bei Spontanverlauf und bei operativer Intervention •

Behandlungsalternativen

- peri- und intraoperativer Ablauf
- mögliche Ausweitung des Eingriffs
- allgemeine und spezielle Operationsrisiken

Die Aufklärung muss individuell dem Patienten und seinem Bildungsgrad angepasst werden. Sie sollte spätestens am Vortag der OP erfolgen, damit der Patient ausreichend Bedenkzeit hat. Die Aufklärung wird aus juristischen Gründen sorgfältig dokumentiert und vom Arzt und vom Patienten unterschrieben. Die Wahl des Anästhesieverfahrens wird dem Anästhesisten in Absprache mit dem Patienten überlassen.

Todesart und Todesursache [2]

- Todesursache: Unmittelbar zum Tode führende Ursache
- Todesart: Art und Weise, die zum Tod eines Menschen geführt hat [1]
 - Umschreibung der näheren Todesumstände, selten der exakten Todesursache
 - Unterscheidung zwischen
 - Natürlicher Todesart
 - Nicht-natürlicher Todesart
 - Ungeklärter Todesart
 - Natürlicher Tod
 - Tod aus krankhafter Ursache ohne Einwirken rechtlich relevanter Faktoren
 - Kein Nachweis einer schädlichen Fremdeinwirkung in der Krankheitsentwicklung
 - Deutliche objektivierbare Befunde für das ursächliche Krankheitsbild
 - Eine für die konkrete Todesursache charakteristische Anamnese
 - Erhebung ggf. mithilfe behandelnder Ärzte, Zahnärzte oder Heilpraktiker, eine Auskunftspflicht dieser Personen ist in den Bestattungsgesetzen der Länder verankert
 - Nicht-natürlicher Tod (bzw. Verdacht auf einen nicht-natürlichen Tod)
 - Tod durch ein von außen einwirkendes Ereignis oder durch ein von außen beeinflusstes Geschehen
 - Wird zwar durch das Einwirken von außen verursacht, impliziert aber nicht zwingend ein Fremdverschulden
 - Häufigste Ursachen: Unfälle, Suizide und Tötungsdelikte ^{DKP}
 - Beispiel: Tod einer 70-jährigen Frau durch eine Lungenembolie nach Verkehrsunfall mit Oberschenkelfraktur vor 4 Wochen
 - Ungeklärter Tod
 - Fehlen einer eindeutigen Todesursache bzw. unklarer Zusammenhang zwischen einem medizinischen Eingriff und einem Grundleiden
 - Beispiel: Tod eines scheinbar gesunden Säuglings
 - Möglichkeit 1: Bspw. plötzlicher Kindstod als natürliche Todesursache
 - Möglichkeit 2: Tod durch Fremdeinwirken
 - Angabe auf dem Totenschein: Ungeklärte Todesursache

Ist ein vermeintlich natürlicher Tod im Krankenhaus (Ableben eines multimorbiden Patienten) ursächlich auf einen anderen Zusammenhang zurückzuführen (z.B. Unfall), so handelt es sich um einen nicht-natürlichen Tod!

„Nichtnatürlich“ ist demgegenüber ein Todesfall, der auf ein von außen verursachtes, ausgelöstes oder beeinflusstes Geschehen zurückzuführen ist, unabhängig davon, ob dieses selbst- oder fremdverschuldet ist. Nichtnatürliche Todesfälle sind daher:

- Gewalteinwirkungen
- Unfälle (unabhängig davon ob selbst- oder fremdverschuldet)
- Tötungsdelikte
- Vergiftungen
- Suizide
- Behandlungsfehler
- tödlich verlaufende Folgezustände der ersten vier genannten Punkte.

Das Intervall zwischen einem am Anfang der zum Tode führenden Kausalkette stehenden äußeren Ereignis und dem Todeseintritt kann dabei beliebig lang (unter Umständen Jahre betragen) sein. Kann die Todesursache durch die Leichenschau nicht geklärt werden, bleibt dementsprechend auch die Todesart unklar.

WAS IST EIN "NICHT NATÜRLICHER TOD"?

☐☐ Tod bei nicht alters- oder krankheitsbedingter innerer Ursache, also nicht nur bei Fremdeinwirkung, sondern auch bei Unfall oder Suizid,
aber

☐☐ Tod aus unklarer medizinischer Ursache rechtfertigt alleine noch nicht die Annahme eines nicht natürlichen oder unklaren Todes

☐☐ Tod im ursächlichen Zusammenhang mit ärztlicher Behandlung / Operation wenn wenigstens entfernte Anhaltspunkte für ärztliche Kunstfehler / Verschulden des behandelnden Personals vorliegen oder wenn sich bereits aus einem der ärztlichen Behandlung vorausgehenden Geschehensablauf Hinweise auf einen nicht natürlichen Tod ergeben (z.B. Unfall, Sturz).
Bitte beachten: § 20 (3) BestattG!

Wo treten Totenflecke auf?

Totenflecke bilden sich in den abhängigen Körperpartien einer Leiche, das sind die Bereiche des Körpers, die am Boden aufliegen oder der Auflagefläche am nächsten sind. Es kommt also darauf an, wie der Verstorbene positioniert ist.

Liegt der Tote auf dem Bauch, so treten die Leichenflecke am Bauch auf.

Bei Rückenlage erscheinen sie am Rücken.

Bei aufrechter oder sitzender Haltung eines Verstorbenen bilden sich die Totenflecke z. B. im unteren Bereich der Arme und Beine.

Beim Menschen beginnt die Totenstarre bei **Zimmertemperatur** nach etwa ein bis zwei Stunden an den **Augenlidern, Kaumuskeln** (zwei bis vier Stunden) und **kleinen Gelenken**, danach setzt sie ein an **Hals, Nacken und weiter körperabwärts**, und ist nach sechs bis zwölf Stunden voll ausgeprägt (bei Hitze schneller, bei Kälte langsamer). Diese Reihenfolge, beschrieben durch die **Nysten-Regel**, findet sich jedoch nur in etwa 50 Prozent der Fälle.

Perioperativer Umgang mit Vormedikation - Kurzübersicht

| Gabe pausieren | Individuell abwägen  | Gabe fortführen |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Orale Antidiabetika<ul style="list-style-type: none">◦ Metformin <i>kbh</i>◦ Sulfonylharnstoffe◦ SGLT2-Inhibitoren• Lithium• Diuretika (am OP-Tag) | <ul style="list-style-type: none">• Alpha-2-Agonisten• Herzglykoside• SSRI• MAO-Hemmer• Theophyllin• Insuline | <ul style="list-style-type: none">• Betablocker• Calciumantagonisten• ACE-Hemmer (bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz)• Statine• Antipsychotika• Trizyklische Antidepressiva• Benzodiazepine• L-Dopa• Antiepileptika• Inhalativa bei COPD und Asthma bronchiale• Analgetika• PPI• Ovulationshemmer• Schilddrüsenmedikation |

Perioperatives Management bei oraler Antikoagulation

- DOAK [35]
 - Präoperativ
 - Bei Eingriffen mit kaum gegebenem Blutungsrisiko nicht absetzen
 - Bei Eingriffen mit niedrigem, moderatem oder hohem Blutungsrisiko absetzen erwägen
 - Intervall zwischen Absetzen und OP abhängig vom Blutungsrisiko der Operation und der Nierenfunktion des Patienten, bspw.
 - Eingriffe mit hohem Blutungsrisiko (z.B. Viszeralchirurgie): 48 h präoperativ letzte Dosis
 - Eingriffe mit niedrigem Blutungsrisiko: 24 h präoperativ letzte Dosis
 - Kein Bridging
 - Antagonisieren, falls notwendig
 - Im Notfall: Prothrombinkonzentrat, alternativ mit rekombinantem Faktor VIIa
 - Dabigatran: Antagonisierung mit Idarucizumab (z.B. Praxbind®), zudem dialysierbar
 - Rivaroxaban, Apixaban: Spezifische Antagonisierung mit Andexanet alfa, siehe auch: Rote-Hand-Briefe zu Ondexxya® (Andexanet alfa)
 - Plasmakonzentrate i.d.R. ineffektiv, da enthaltene Gerinnungsfaktoren durch Wirkung der DOAK inaktiviert werden
 - Postoperativ gerinnungshemmende Therapie so früh wie möglich wieder beginnen
 - Weitere Informationen zum Blutungsrisiko je nach OP und Dosisreduktion bei eingeschränkter Nierenfunktion: Siehe Perioperativer Umgang mit DOAK
- Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) [36]
 - Präoperativ INR bestimmen
 - Bei Eingriffen mit niedrigem Blutungsrisiko nicht absetzen
 - Größere invasive Eingriffe: 4–7 d vorher absetzen [23]
 - Ziel-INR ca. $<1,5$ [8]
 - Siehe auch Blutungsrisiko bei Operationen und Interventionen
 - Bridging erwägen, falls abgesetzt
 - Insb. bei Patienten mit hohem Thromboembolierisiko kann Bridging vorteilhaft sein
 - Weitere Informationen zur praktischen Durchführung des Bridgings und Kritik am Konzept: Siehe Bridging (Antikoagulation)
 - Antagonisieren, falls notwendig
 - Elektiv, z.B. mit 1–2 mg Vitamin K
 - Im Notfall: Prothrombinkonzentrat, alternativ Fresh Frozen Plasma

- Weitere Informationen zu den oralen Antikoagulantien: Siehe Phenprocoumon und neue orale Antikoagulantien

Beim Pausieren der Vitamin-K-Antagonisten ist die Entscheidung für oder gegen ein Bridging vom individuellen Thromboembolierisiko abhängig!

Perioperatives Management bei nicht-oraler Antikoagulation

- NMH

- Präoperativ 2 d vor dem Eingriff absetzen, falls notwendig

- Selten Bestimmen der Anti-Faktor-Xa-Aktivität nötig

- Antagonisierung mittels Protamin teilweise möglich
- Postoperativ am Folgetag nach der OP wieder ansetzen

- UFH

- Präoperativ mind. 2x/d aPTT bestimmen
- Antagonisieren, falls notwendig: Protamin

- Fondaparinux [29]

- Präoperativ je nach Nierenfunktion 36–42 h vor dem Eingriff absetzen
- Postoperativ Erstgabe frühestens 6 h nach dem Eingriff

- Weitere Informationen zu den nicht-oralen Antikoagulantien: Siehe Nicht-orale Antikoagulation

- Weitere Informationen zum Blutungsrisiko verschiedener Operationen und der Risiko-Nutzen-Abwägung mithilfe von Scores: Siehe Antikoagulation und Blutungsrisiko bei Operationen und Interventionen

Perioperatives Management bei Einnahme von

Thrombozytenaggregationshemmern [34][8]

Bei der Entscheidung, ob Patienten mit kardiovaskulären Risikofaktoren ihre bestehende Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern perioperativ pausieren sollten, ist eine Abstimmung zwischen Chirurgen, Internisten, Neurologen und Anästhesisten notwendig. Es gilt, drei Faktoren gegeneinander abzuwägen: [37]

- 1 Dringlichkeit des operativen Eingriffs
- 2 Blutungsrisiko des geplanten Eingriffs
- 3 Thromboembolierisiko des Patienten

Auch kleinere invasive Eingriffe können mit einem hohen Blutungsrisiko einhergehen (z.B. Tonsillektomie)! [29]

- Monotherapie mit ASS
 - Präoperativ i.d.R. nicht absetzen, bspw. bei
 - Eingriffen mit niedrigem bis moderatem Blutungsrisiko, siehe auch Blutungsrisiko bei Operationen und Interventionen
 - Intraarteriellen Stents (insb. bei KHK und PTCA)
 - Im Rahmen einer Sekundärprophylaxe grundsätzlich nicht absetzen
 - Ausnahmen: Präoperativ i.d.R. absetzen bei
 - Neurochirurgischen Eingriffen
 - Im Rahmen einer Primärprophylaxe ca. 5–7 d vor größeren invasiven Eingriffen
 - Postoperativ ist der Zeitpunkt des Wiederbeginns einer ASS-Therapie dem Blutungsrisiko anzupassen
- Duale Thrombozytenaggregationshemmung [23][8]
 - Präoperativ: P2Y12-Antagonisten nur vor großen Operationen mit hohem Blutungsrisiko absetzen
 - Clopidogrel 5–7 d vorher
 - Ticagrelor 5 d vorher
 - Prasugrel 7 d vorher
 - Perioperativ Therapie mit ASS möglichst fortführen
 - Postoperativ duale Plättchenhemmung schnellstmöglich wieder ansetzen
 - Elektive Operationen bestenfalls solange verschieben, bis duale Thrombozytenaggregationshemmung beendet ist bzw. von der Monotherapie abgelöst wurde
 - Im Notfall: Medikation fortführen, Blutungskomplikationen in Kauf nehmen und behandeln (v.a. mit Thrombozytenkonzentraten, evtl. kombiniert mit Desmopressin, Antifibrinolytika) [34]
- Weitere Informationen zu den Wirkstoffen, u.a. Dosierungshinweise, Kontraindikationen und Interaktionen: Siehe Thrombozytenaggregationshemmer

Heparine können die Funktion der Thrombozytenaggregationshemmer nicht ersetzen! Zwar wird ein Bridging mit NMH nach dem Absetzen von ASS und/oder Clopidogrel im klinischen Alltag oftmals durchgeführt, dieses Vorgehen ist jedoch nicht angebracht! [37]

Bei Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern oder Antikoagulantien muss perioperativ individuell zwischen dem Thrombose- und dem Blutungsrisiko abgewogen werden! Bei kleineren Eingriffen oder Interventionen mit geringem Blutungsrisiko ist ein Pausieren nicht notwendig. [34]

Perioperatives Gerinnungsmanagement - Vorgehen bei Hyperkoagulabilität [29]

- Risikogruppen: Patienten mit
 - Angeborener oder erworbener Thromboseneigung
 - Prä- oder intraoperativer Akutphasereaktion
 - Bereits präoperativ bestehender Immobilisation
- Management: Adäquate Thromboseprophylaxe durchführen!
 - Insb. bei Patienten mit kurz zurückliegender Thrombose / Embolie
 - APC-Resistenz: Antikoagulation bevorzugt mit NMH
 - Nur selten sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, bspw. bei
 - Antithrombin-Mangel: Ggf. Inhibitor-Substitution durchführen
 - Protein-C-Mangel: Ggf. Inhibitor-Substitution durchführen

Perioperatives Gerinnungsmanagement - Perioperative Thromboseprophylaxe

- Je nach individuellem Risiko für eine venöse Thromboembolie indiziert
- Für Informationen zu den Wirkstoffen und der Dosierung: Siehe Perioperative Thromboseprophylaxe und Therapeutische Antikoagulation - klinische Anwendung

Besonders unfallchirurgische/orthopädische Eingriffe gehen oft mit einer Immobilisation des Patienten einher, einem der größten Risikofaktoren für postoperative Thrombosen!

Bild: LWK kompressionsfraktur mit intaktem lig. longit. Posterior, beschreiben; sollen wir operieren? Nein !

MRT Abdomen bei einem Patient mit pulsierenden abdominalen Tumor (Aneurysma)

Inklusive perfusion und Inhalation Szintigrafie

CT-Bild: Aortenaneurysma (perforiert mit Hämatom), dunndarm ileus bei terminal ileitis, Bild war CT Abdomen Leber Tumor Und die DDx, was ist die Häufig beim Kinder HCC, Lungen embolie , Dann CCT-bilder (Patient hat Anisokor) von intrakranieller Blutungen 4 Typen von Intrakranielle Blutung, Was ist CCT ? Anatomische Aufklärung der CT Abdomen. CT-Schädel mit Epiduralem Hämatom, Subduralem Hämatom, Subarachnoidale Blutung und intrazerebrale Blutung, nur zeigen und nennen.

Nebennierentumor, nekrotisierende Faszitis

physikalische Grundlage der Ultraschal, CT, MRT (wie funktioniert)

Kontrastmittelallergie (Perchlorat, Wirkmechanismus? Cortison i.v., welches?+ Antihistaminikum+ PPI, Flüssigkeit iv Ein- Ausfuhr, ggfs Diuretica)

Strahlenschutz (Wie viel Millisievert ist Röntgen und CT und wie erklären Sie das dem Patienten (wie eine Flugfahrt) und wie funktionieren Sono und CT? Wie viel Kilokalorien muss man essen und wie muss das sein?

Wie viel Prozent O2 gibt es in der Luft. Woher bekommt man Energie in Ruhe und unter Belastung. (Lipid, Protein und Karbohydrate mit Anteilen) und was ist Frank-Starling-Law? Eine Patientin hat viele Krankenhäuser besucht und wurde hier MS diagnostiziert, wie erklären Sie der Familie? (man darf ohne Zusage von Tochter nichts machen, ich habe über Autoimmunkrankheit und enurologische Anfälle gesprochen baer das war falsch so schnell zu erklären) (wer kriegt Bestrahlung? Welche Organe meistens befallen können?)

(Strahlenschutzmaßnahmen , welches Körperregionen immer vergessen? Schilddrüse-Augen -Hände.), Strahlenschutz, die 4 oder 5 A (Abstand, Aufenthalt, Abschirmung und die andere erinnere mich nicht), ALARA.

12

Labor:

BGA, was ist das? Was sind die normale Werte?

LDL und HDL und gesamt Cholestrin.(Wenn LDL hoch , dann HDL angucken. HDL gut wenn hoch???? 😊)

CRP und Mechanismus Von CRP was bedeutet CRP? Was bedeutet PCT?

Was heißt Blutbild (kleines, diff...), was versteht mann unter BB, was sind Beispiele der Leukozyten, Laborparameter der Anämie, was bedeutet Hämatokrit, wann ist er erhöht. Was heißt Blutbild (kleines, diff...) was können wir finden? Auch Anämie. Warum? DD.

EUG, B-HCG

13

Fotos

von Hyperthyreose, Fußgangrüne, Erysipel, Erythema migrans (Behandlung und Komplikation), reumatoide Arthritis, Fazialisparese (Facialis Parese: beschreiben, wie weiß man ob zentral oder peripher? Welche Muskeln werden durch N.faszialis innerviert ?), Morbus Sudeck, ein Bild Kachexie(DD, Parenteral Ernährung bei kachektischen Pat alles ganz detailliert) Kompartmentsyndrom

14

Pharmakologie

Glukokortikoida (NW, DM Typ 2), Amiodaron, Antikoagulantien (Has bled Score), orale Antidiabetika (NW von Acarbose. Warum ist Metformin so gut?), Anihypertensiva (ABCD-Schema, ACE Mechanismus und nebenwirkung, AT1 rezeptor antagonist, Wo wirken B-Blocker... die Gruppen von Diuretika und wo wirken sie und Beispiele davon. Diuretic:Arten, wie arbeitet jeder an Niere), Überblick von Antibiose, Perchlorat, NW von Morphin, Flurchinolone(NW neu für mich ist die verwertheit bei alt Pt.) Wie wirkt Ampicillin wann und von wem wurde erfunden, Heparin(Mech. HWZ), NOAK (4 Medikamente mit Handelsname), NW von Digoxin, Gyrase-Hemmer- was ist Gyrase?, Welche Wirkstoffe hat Unacid), Genau Mechanismus von Pantoprazol, Über Medikamentabbau? Citochrom p450, Wie wird der Therapieerfolg nach Gabe von Ranitidin? Ph Metrie., Wo liegen H1 Rezeptoren ?, (Wo wird Magensäure produziert?) , Zu welcher Gruppe gehört Adrenalin ? Atrobin und Dubutamin ? was ist Rote Hand Brief? Nebenwirkung von Medikamenten (Cipro, Symatriptan, Metoclopramid), Auch als ich Ciprobay gesagt habe,hat er sofort über Komplikationen gefragt bis zum Tendinitis und Aortendissektion ... Was ist Clopidogrel ? und was macht die ? Clopidogrel mit PPI nicht gut, da PPI schwächt die Throbozytenaggregationshemmereffekt der Clopidogrel. An welchen Enzymen wirkt ASS

Fehler bei Gabe von Medikamenten, 4 Kategorien : falsches Medikament, falsche Dosis, Kontraindikationen z.B Allergie, oder Nierenversagen/Leberversagen. Diese Antwort wusste ich überhaupt nicht, hat nie von solchen Kategorien gehört, habe aber einfach aus Erfahrung die mögliche Fehlerquellen erwähnt, der Prüfer war sehr nett und hat das alles selber in diese Kategorien zugeordnet. Penicilin wie wirkt? NW von Metamizol , Metamizol schreibt man nach OP-Schmerzen.

(was ist NW von Amlodipin...er wollte ödeme hören) und NW von Statine (wollte Muskelschwäche hören)

Schmerztherapie Stoffen und Schmerzarten gefragt, Wieder fragen nach neuropathische Schmerzen und Fantomschmerzen und Therapie. Schmerztherapie nach WHO-Stufenschema, Opiode Klassifikation, Morphin (warum ist gut: weil man kann schmerzorientierend Dosis anpassen),

CO Intoxikation (was ist typische Zeichen?, Wie ist BGA bei CO Intoxikation?, Wie ist die Pathogenese der CO intoxication? Und Therapie?)

Antikoagulation: (Marcumar. Wie muss der INR sein und was bedeutet diese Zahl., Patient mit VHF unter Marcumartherapie kommt wegen neurologischen Ausfällen. Was kann das sein? Wenn man ein Patient unter Marcumartherapie als Notfall operieren muss was macht man? Marcumar absetzen, Konaktion geben und PPSB. Welche Gerinnungsfaktoren werden abhängig von vitamin K produziert? 2, 7, 9 und 10.), Was ist häufigste Indikation zur Marcumareinstellung? .. Fragen über Antikoagulation, marcumar, NOAK und DOAK Substanzen , Patient nimmt NOAK und klagt über Abgeschlagenheit => GI Blutung

Was und Warum geben wir Thrombenprophylaxe nach der OP? günstige Prophylaxe ? Bewegung. TVT Risiko

Hepatrin N.W. HIT 1 UND 2 kontrolle im BB ? Thrombozyten

Glaukomanfall Medikamente

Wie lange dauert ein Opioid Aufschreibung gültig (7 Tage)

Regionalanästhesie

• Kave Hypertension
• @ NW
• Metoprolol fsp.
• beauftragt
• Gewichtshormone

• in rhd
• Metoprolol

DNA Replikation

- Abstand erhöhen!
- Aufenthaltsdauer verkürzen!
- Aktivität vermindern!
- Abschirmung verstärken!
- Aufnahme in den Körper vermeiden!

Statine hemmen die HMG-CoA-Reduktase (3-Hydroxy-3-Methyl-Glutaryl-Coenzym-A- Reduktase), das Schrittmacherenzym der zellulären Cholesterinsynthese.

Lokale Anath. (wenn IV macht Herzrhythmusstörungen, Arterielle macht ischämi)
Propofol was achten wir? Herz puls RR welche Farbe? weiß warum? lipid

15

Notfallmedizin

Fahrradunfall (patient mit Tachykardie 100-110, RR 120 sys, leichte Dyspnoe was machen Sie außerhalb des Krankenhauses? KU und Verletzungen Überprüfen z.B. HWS und Pneumothorax abwarten bis zum Krankenhaus fall der stabil ist und wenn er plötzlich instabil geworden? Spannungspneumothorax was machen? Thoraxpunktion wo? Was kann das noch sein? Hämothorax Trauma was macht man zuerst bei Polytrauma Patient? Traumateam (FAST, Traumaspirale, Behandlung) Bluttransfusion (kreuzprobe, Aufklärung, Bedside test und die Transfusionsreaktionen, TPE) Polytrauma Definition und was sind die Ursache für Tot in erst 24 Stunde

(Internale Blutung, Hirnschaden?)

FAST Sonographie beim polytrauma. Wo sehen genau? Morrison pouch: zwischen Leber und Niere, collar pouch: zwischen Milz und Niere, Douglas pouch: zwischen rektum und Blase, epigastrium: pericardium Nachweis.

Polytrauma (Patient kommt in der Notaufnahme, was machen sie, übergabe mit notarzt, ABC schema, alle buchstaben nennen, trauma Spiral als neu schnelle diagnostik, FAST, warum sieht man Flüssigkeit in Morrison Koller und Douglas Raum: weil die bei liegendem Patient die tiefpunkte sind (ich habe gesagt durch ^{v. oben, (epigastrium) + Becken} schwerkraft sammelt sich die Flüssigkeit in diesem Bereich) (Sie haben einen Anruf bekommen, polytrauma patient kommt zu ihnen in der ZNA. Was machen sie zuerst ich habe gesagt: schockraumteam informieren und ITS! Schockraum? Schock team? Übergabe, ABCDE SCHEMA (intubierter patient), Fast, E-FAST, Hypothermie. Spannungspneumothorax ALLES mechanismus.. wie sieht klinisch aus? ! Wo legen wir drainage? (Wollte safe triangle hören und ich habe das am Ende gesagt?) Wie heißt diese Drainage? Herzversagen pathophysiologie bei spannungspneu? Beifahrer ist tot was bedeutet das für unsere patient. Patient verliert Blut (hämorthorax).) (Polytrauma, definition, Vorgehen in Schockraum: ABCDE, eFAST, CT+CTA.) (Patient hat gleichzeitig Leberruptur und Epiduralhämatom. Wer muss erst operieren? Allgemein Chirurg oder Neuro? Allgemein ist richtig !!! Dann Patient hat mehreren Frakturen am Bein, Oberarm. Unfallchirurg sagt ich mache alles in eine Runde. Was sollen Sie ihm sagen? (Nein, wegen "Damage

Control" Konzept)), polytrauma, Definition, wer hat die Def. Erfunden (Unfallchirurg in der MHH). Es wird überarbeitet mit einbeziehung von entzündlichen Marker und Interleukinen. Umgang in schockraum, ABCDE, traumacheck, FAST, EFAST, warum sucht man die Flüssigkeiten in den bek. Areale? Effekt von Schwerkraft, trauma Spirale. Pat hat Contusio Cerebri, freie Flüssigkeiten, Leberriß, mehrere offene Frakturen der Unterextremitäten, ist instabil. Wer darf zunächst operieren? Viszeral wegen Leberriß (treat first what kills first) Der Unfallchirurg wollte sofort alle Frakturen operieren, lässt ihn zu? nein, erst Fix. Extern dann nachher OP (Damage Control, war mir nicht bewusst)

junger Patient kam heute mit normale Atemgeräusche in einer Seite und die andere keine Atemgeräusche, in der Vorgeschichte hatte er Gribbe seit einer Woche und wird ein Röntgen Thorax gezeigt ... was ist das? Pneumothorax (eine Seite komplett kollabiert) Behandlung? im KH Bülau Drainage. Wie macht man das? Was gibt es in ICR?

Reanimation sehr detaillierte Fragen. Z.B. arten von Beatmung, sehr kleine technische Fragen, bis die Dose von Schockstoßen und alles über Defibrillator (steht in Amboss),

Verschlucken welche Manöver machen wir

wie transfundieren wir ein EK, also Bluttransfusion mit den möglichen Komplikationen und Bedside Test Man muss vor der Transfusion ein Bettseit machen

Bluttransfusion Du nimmst Blut aus dem Patienten auf dieses Test (A-Ak und B-Ak) und guckst die Ergebnisse, falls Gruppe A siehst du Agglutination mit A-Ak und B mit B-Ak und falls O keine Agglutination

Bedside test? Welche Blutgruppe ist die am häufigsten in Deutschland? Coombs test?

Wie viel Sauerstoff konsumieren wir pro Tag

Schock (typen, Circulus Vitiosus, Multiorganversagen, Schockindex)

Man zählt leicht nach, dass man etwa 17 Mal pro Minute atmet. Das Atemvolumen pro Minute beträgt also 17 min⁻¹ · 0,5 l = 8,5 l/min. 24 · 60 · 8,5 l = 12240 l, also über 12000 Liter pro Tag.

16

Körperliche Untersuchung

Bei der Untersuchung musste ich zusätzlich die Größe der Leber bestimmen, Kniegelenk untersuchen (hab ich nur teilweise, der Prüfer hat geholfen und ergänzt.) und wie kann man die venöse Insuffizienz palpatorisch untersuchen (wollte die Bruchpforten, also Anastomose zwischen superfiziell und tiefen Venensystem hören. Wie viele Pulse gibt es am Fuß? .. Körperliche Untersuchung: neurologische Untersuchung nach Polyneuropathie nicht vergessen! Gynäkologische Anamnese nicht vergessen!

Wie entstehen die Geräusche bei Blutdruckmessung?

Bei Pyelonephritis nach Blutdruck und Puls auch Ödem untersuchen auch Atemfrequenz

Untersuchung von HWS Gelenke

DRU wie macht man?

Leistenhernie Untersuchung

Fragen über klinische Befund Stimmritus und Pleuritis

KU Schema:

Vitalparameter

Herz Lungen Bauch Rücken Vaskuläre Neuro Orthopädie

Gezielte Untersuchung z.B. Patient mit pAVK oder Diabetes oder KHK, dann Pulsmessen.

Während der körperlichen Untersuchung hat der Prüfer viele Fragen gestellt. Was können wir bei perforierter Cholezystitis oder Pankreatitis auf den Lungen abhören? Die neurologische Untersuchung sollte nicht ausführlich durchgeführt, aber trotzdem hat er Fragen über Sensibilität, Motorik, Kraft gestellt: Wie überprüft der Arzt alles in der Notaufnahme? Nicht detailliert, aber trotzdem orientierende Untersuchung. (Video auf Amboss anschauen, sehr hilfreich). Bei Verdacht auf Perikarditis als Komplikation kann man abgeschwächte AG abhören. Bei der körperlichen Untersuchung hat er auch gefragt: Was können sie beim Ileus abhören?

4 Beatmungsformen

4.1 Nasen-Mund Beatmung

Die Mund zu Nase, Mund zu Mund oder Mund zu Nase/Mund wird vor allem während der **CPR** angewendet. Sie ist Teil der Erste-Hilfe Schulung für Laien z.B. Führerscheinzulassung.

4.2 Masken-Beutel-Beatmung

Die **Masken-Beutel-Beatmung** oder Beutel-Masken-Beatmung wird präklinisch und klinisch bei Notfällen eingesetzt, um einen Patienten während der **CPR** mit Sauerstoff zu versorgen, bis ein **endotrachealer** Tubus gelegt werden kann. Hierbei wird eine Maske über Mund und Nase des Patienten gelegt, mit dem sogenannten **C-Griff** fixiert und über den Beutel Sauerstoff in die Lunge gepresst.

Ambu-Beutel (Rubenbeutel, Beatmungsbeutel)


4.3 Maschinelle Beatmung

Bei der maschinellen Beatmung übernimmt eine Maschine die Atemarbeit des Patienten. Hier hat sich bisher noch keine Norm durchgesetzt. Es gibt von verschiedenen Herstellern oft unterschiedliche Namen z.B. BiPAP/ Bilevel, wobei die Beatmungsform bzw. -parameter jeweils identisch sind.

4.4 Extrakorporale Membranoxygenierung

ECMO

Bei der **extrakorporalen Membranoxygenierung** wird das Blut des Patienten außerhalb des Körpers vom CO₂ gereinigt und O₂ zugeführt.



Durch die Kompression der Vv. cavae ist der Blutrückfluss zum rechten Herzen vermindert. Aus dem reduzierten Herzzeitvolumen kann sich eine Schocksymptomatik entwickeln.

(Circulus vitiosus)

einen pathophysiologischen Prozess, bei dem sich zwei (oder mehr) gestörte Körperfunktionen im Sinne einer positiven Rückkoppelung wechselseitig beeinflussen und die Erkrankung dadurch aufrechterhalten oder beständig verstärken.

Die verschiedenen auslösenden Faktoren führen mit Ausnahme des kardiogenen Schocks - zur absoluten oder relativen Hypovolämie und damit zur Verminderung des Herzzeitvolumens. Hierdurch wird das sympathoadrenerge System aktiviert, wodurch es zu Tachykardien, Tachypnoe, peripherer Vasokonstriktion und Umverteilung des Blutes von Muskulatur, Splanchnikusgebiet, Haut und Nieren zugunsten von Gehirn und Herz kommt (Zentralisation). Folge sind eine periphere Hypoxie und Gewebeazidose. Diese Gewebeazidose bedingt eine präkapilläre Vasodilatation bei weiterbestehender postkapillärer Vasokonstriktion sowie eine erhöhte Gefäßpermeabilität. Dies führt zum Verlust von Flüssigkeit, Proteinen und Elektrolyten ins Interstitium (Gewebeödem), wodurch die Zellhypoxie und Hypovolämie weiter verstärkt werden (Circulus vitiosus). Dem kardiogenen Schock liegt hingegen ein myokardiales Pumpversagen zugrunde.

Eine neue Erfahrung vom 31.01. um 13:15 Uhr.

Gott sei Dank, Ich habe am 31.01.2022 die Prüfung bestanden.

Fälle: Pneumonie (meine) und Migräne sowie Cholezystitis)

Der Patient war sehr nett, wichtig ist die Desinfektion nicht zu vergessen.

1. Runde: Vorstellung, DD pleuritischer Brustschmerzen, Typen der Pneumonien was bedeutet CAP und nosokomial und Aspirationspneumonie

Erreger der Atypischen Pneumonie, ABx, Blutkultur (DF)

LAE, Wells Score und Diagnostik.

Runde 2:

<https://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/175585>

Plötzlich aufgetretene Rückenschmerzen DD u. a Spondylodizitis Dx, Behandlung und der häufigste Erreger Staph, aureus, Aortendissektion was bedeutet. PAVK vs Spinal Kanal stenose (was nennt man die Schmerzen Claudicatio Spinalis)

Runde 3:

Wundheilungs Störung alles

Eine Frau nach 2 Wochen mit Wundheilungsstörung und septischer Schock Symptomatik bei Wunde Untersuchung Rötung und krepitation Was machen Sie?

IS Überwachung, Flüssigkeit Wundenmanagement (2ry Heilung, Wunde soll offen lassen) ABx z. B pencillin weil Clostridium perfringens (Gas Gangrän ist Anaerobische Erreger). + Metronidazol

Fragen an Kollegen:

Kopfschmerzen alles und Frakturen oberflächlich

Bluttransfusion und Komplikation (tief) EKG inferior MI.

Vorbereitung ca 5 Monate (Amboss, Gams 'Fälle Bücher und mediatrum prodkasten sowie Appetizer Youtube in Chirurgie)

Die Kommission sind sehr nett gewesen

Ich wünsche euch viel Erfolg

Bestimmung der klinischen Wahrscheinlichkeit einer TVT (mittels Wells-Score)

Parameter: Z.n. TVT. Operation oder Immobilisierung. Malignom.
Klinische Zeichen einer TVT (Schmerz, Schwellung, Ödem, Beinumfangsdifferenz >3 cm, Sichtbare Kollateralvenen).
Alternative Diagnose mind. ebenso wahrscheinlich wie TVT (-2).

☐ Interpretation : 1 Punkt für jedes Parameter

☐ <2 : TVT unwahrscheinlich. ≥ 2 : TVT wahrscheinlich

RF

- Z.n. TVT
- Paralyse/Parose
immobilität
- OP $<4w$
Kürzhe $<3T$
- Malignom

KU

Schmerz/Verhärtung

Schwellung $>+3cm$
Differenz

Ödem

Kollateralebildung

alt. Diagnose

Claudicatio spinalis

Synonym: Claudicatio intermittens spinalis

1 Definition

Als Claudicatio spinalis bezeichnet man das schmerzbedingte Hinken im Rahmen einer Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule. Ursächlich ist eine kompressionsbedingte Nervenreizung im Bereich der Cauda equina.

2 Klinik

Die Claudicatio spinalis äußert sich durch belastungsabhängige intermittierende Schmerzen während des Gehens, die bei entlordosierter Haltung der Wirbelsäule (Bergaufgehen, gebücktes Gehen) sistieren. In der Regel sind neurologische Beschwerden wie Kribbelparästhesien der unteren Extremitäten assoziiert.

3 Diagnostik

Differentialdiagnostisch gilt die Abgrenzung gegenüber der pAVK-bedingten Claudicatio intermittens und den Ursachen der Lumboischialgie (Diskusprolaps, Tumor, u.a.).

3.10 Gasbrand

Synonym: Gasödem, Gasgangrän, Gasphegmone, malignes Ödem, Emphysema malignum sive septicum

Erreger: 9 von 10 Fällen werden von **Clostridium perfringens** verursacht (s. Mikrobiologie S. C 601), das wie Clostridium tetani ein anaerobes, sporenbildendes, grampositives Stäbchenbakterium ist und ebenfalls ubiquitär in der Umwelt, im Darmtrakt und auf der Haut von Mensch und Tier vorkommt.

Die restlichen Infektionen verteilen sich auf andere Arten von Clostridien (septicum, novyi u. a.). Die Erreger bilden verschiedene Endotoxine (8 kleine Toxine, Alpha-(Lecithinase), Beta-, Epsilon- und das Jotatoxin), welche alle nekrotisierende Wirkung haben. Das nekrotische Gewebe dient als Nährstoff für die Bakterien und wird zu CO₂ abgebaut.

Durch Clostridium perfringens ausgelöste andere Krankheitsbilder:

- **atoxische Infektion:** lokale eitrige Entzündung ohne Toxinbildung
- **Enteritis necroticans (Darmbrand):** nekrotisierende Infektion des Jejunums durch Clostridium perfringens Typ C. Mit einer hohen Letalität verbunden.
- **Lebensmittelvergiftung:** Enteritis mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall. Ausheilung innerhalb von 48 h ohne Therapie. Hohe Keimzahlen von Clostridium perfringens Typ A sind die Voraussetzung. Näheres s. Verdauungssystem S. 237.

Pathogenese: Meist liegt eine Mischinfektion mit anderen Bakterien (E. coli, Streptokokken, Enterobakterien) vor, welche ein anaerobes Milieu schaffen und somit die Voraussetzungen für die Ausbildung der vegetativen Formen aus den Sporen schaffen. Die Infektion entwickelt sich auf Grundlage von tiefen und verschmutzten Wunden (50%) oder aus Operationswunden nach Gallenwegs- und Darmoperationen (30%). Endogene Infektionen entwickeln sich gelegentlich bei Patienten mit Kolonkarzinom. Seltene Ursache sind septische Aborte. Die restli-



Abb.3.3 Gasbrand. [aus: Henne-Bruns et al., Duale Reihe Chirurgie, Thieme, 2008]

chen Fälle sind ohne erkennbare Ursache. Risikofaktoren sind Durchblutungsstörungen, Neoplasien oder Diabetes mellitus.

Klinik: Der Gasbrand ist ein sich extrem schnell entwickelndes Krankheitsbild (Inkubationszeit zwischen 5 Stunden und 3 Tagen). Zunächst kommt es zu einem lokalen Wundschmerz bei optisch relativ unauffälligem Befund, später wird die Wunde ödematös und es entleert sich seröses Sekret (Abb. 3.3). Die Haut um die Wunde verfärbt sich (kupfer- bis bronzefarben) und bildet einen typischen süßlichen Geruch. Als lokales Spätsymptom kommt es zu Knistern (Krepitationen) unter der Haut. Der Patient bekommt Fieber bis 40°C, wird tachykard und desorientiert. Im Verlauf kommt es zu Multiorganversagen durch die Toxinwirkung: Anämie und Ikterus durch Hämolyse, Ateminsuffizienz und akutes Nierenversagen.

Diagnostik: Wegweisend ist das klinische Bild, radio-
logisch lässt sich eine typische Muskelfiederung nachwei-
sen. Ein erster Erregernachweis gelingt mittels Wund-
randabstrich mit anschließender Gramfärbung (gram-
positives, bekapseltes Stäbchen). Gesichert werden kann
die Diagnose durch die kulturelle Anzucht unter an-
aeroben Bedingungen mit der Bildung von CO_2 (im Flüs-
sigmedium). Diese ist jedoch aufgrund des schnellen
Krankheitsverlaufes nicht vorrangig. ^{فحص الميكروسكوب} _{دور أولية}

Differenzialdiagnosen: Gasbildende Infekte (weniger dra-
matischer Verlauf, eitrige Entzündung, scharf begrenzt) u.
a.: anaerobe Streptokokkenmyositis oder Meleney-Gan-
grän (anaerobe Streptokokken und Staphylokokken), ne-
krotisierende Faszitis (s. Dermatologie S. B 687)

Therapie: Da die Infektion mit einer hohen Letalität ver-
bunden ist (40–60% trotz Therapie), muss sofort gehan-
delt werden. Die Wunde muss eröffnet, sorgfältig abgetra-
gen und gespült werden. Die Wunde wird offen behandelt,
um das anaerobe Milieu zu zerstören. Oftmals ist auch
eine Amputation die letzte lebensrettende Maßnahme.
Antibiotikagabe (Penicillin gegen Clostridien und Metroni-
dazol gegen die anaerobe Mischflora) und hyperbare Sau-
erstofftherapie ergänzen die chirurgische Intervention.

Muskelfiederung

